アバメクチン標準品
Abamectin standard

危険

［毒］II ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［71751-41-2］

49803-12	DES（CA10001000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

アベルメクチン-8,9-Z B1a標準品
Abamectin-8,9-Z B1a standard

$C_{48}H_{72}O_{14}$...873.07 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［113665-89-7］

49312-33	A2S（A644P001）	残留農薬試験用	1mg	￥122,000

アベート標準品 → テメホス標準品

アビエチン酸
Abietic acid

警告

$C_{20}H_{30}O_2$...302.45
CAS RN® ［514-10-3］ mp174℃～175℃ †

01000-32	>80.0%(GC)	G	25g	￥6,500
01000-52	>80.0%(GC)	G	5g	￥2,000

アビエチン酸
Abietic acid

警告

$C_{20}H_{30}O_2$...302.45
CAS RN® ［514-10-3］

17313-1A	TFS（17313-0250）	25g	￥7,800
17313-2A	TFS（17313-1000）	100g	￥20,500

アブシンチン
Absinthin

［凍］ -20℃以下

49871-41	PHY（84170）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

アカセチン
Acacetin

$C_{16}H_{12}O_5$...284.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［480-44-4］

49060-00	PHY（89482）	天然物化学研究用	20mg	￥51,000

アカシア → アラビアゴム末

アコニン
Acconine

$C_{25}H_{41}NO_9$...499.59 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［509-20-6］

49871-47	PHY（82295）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

アキュジェットS アメシスト
accu-jet^{R}S, amethyst

70263-53	BRA（26353）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥58,000

アキュジェットS ペトロル
accu-jet^{R}S, petrol

70263-52	BRA（26352）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥58,000

アキュジェットS アンスラサイト
accu-jet^{R}S, anthracite

70263-50	BRA（26350）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥58,000

アキュジェットS ベリー
accu-jet[R]S, berry

70263-51	BRA（26351）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥58,000

アキュサインワンステップAMPテスト
AccuSign[R] One-step AMP test

検出感度 AMP(アンフェタミン):1000ng/mL

49502-01	PBM（DOA-204-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-11	PBM（DOA-204-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アキュサインワンステップBARテスト
AccuSign[R] One-step BAR test

検出感度 BAR(バルビツール酸類):300ng/mL

49502-05	PBM（DOA-206-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-15	PBM（DOA-206-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アキュサインワンステップBZOテスト
AccuSign[R] One-step BZO test

検出感度 BZO(ベンゾジアゼピン類):300ng/mL

49502-06	PBM（DOA-207-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-16	PBM（DOA-207-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アキュサインワンステップCOCテスト
AccuSign[R] One-step COC test

検出感度 COC(コカイン):300ng/mL

49502-04	PBM（DOA-200-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-14	PBM（DOA-200-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アキュサインワンステップDOA4-AMPテスト(THC/OPI/COC/AMP)
AccuSign One-step DOA4-AMP test (THC/OPI/COC/AMP)

検出感度(ng/mL) THC(大麻代謝物):50, OPI(モルヒネ):300, COC(コカイン):300, AMP(アンフェタミン):1000

49502-18	PBM（DOA-240-35）	薬毒物分析用	35test	￥75,000
49502-19	PBM（DOA-240-10）	薬毒物分析用	10test	￥28,000

アキュサインワンステップDOA4-METテスト(THC/OPI/COC/MET)
AccuSign[R] One-step DOA4-MET test(THC/OPI/COC/MET)

検出感度(ng/mL) THC(大麻代謝物):50, OPI(モルヒネ):300, COC(コカイン):300, MET(メタンフェタミン):1000

49502-20	PBM（DOA-241-35）	薬毒物分析用	35test	￥75,000
49502-21	PBM（DOA-241-10）	薬毒物分析用	10test	￥28,000

アキュサインワンステップMETテスト
AccuSign[R] One-step MET test

検出感度 MET(メタンフェタミン):1000ng/mL

49502-00	PBM（DOA-202-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-10	PBM（DOA-202-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アキュサインワンステップMETテスト(500)
AccuSign[R] One-step MET test(500)

検出感度 MET(メタンフェタミン):500ng/mL

49502-22	PBM（DOA-202E-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000

アキュサインワンステップMTDテスト
AccuSign[R] One-step MTD test

検出感度 MTD(メタドン):300ng/mL

49502-08	PBM（DOA-208-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-23	PBM（DOA-208-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アキュサインワンステップOPIテスト
AccuSign[R] One-step OPI test

検出感度 OPI(モルヒネ):300ng/mL

49502-03	PBM（DOA-203-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-13	PBM（DOA-203-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アキュサインワンステップPCPテスト
AccuSign[R] One-step PCP test

検出感度 PCP(フェンシクリジン):25ng/mL

49502-07	PBM（DOA-205-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-24	PBM（DOA-205-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アキュサインワンステップTCAテスト
AccuSign[R] One-step TCA test

検出感度 TCA(三環系抗うつ薬):1000ng/mL

49502-09	PBM（DOA-209-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-17	PBM（DOA-209-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アキュサインワンステップTHCテスト
AccuSign[R] One-step THC test

検出感度 THC(大麻代謝物):50ng/mL

49502-02	PBM（DOA-201-35）	薬毒物分析用	35test	￥22,000
49502-12	PBM（DOA-201-10）	薬毒物分析用	10test	￥8,500

アセナフテン
Acenaphthene

警告

$C_{12}H_{10}$...154.20 ［PRTR］1-15
CAS RN® ［83-32-9］bp279℃† mp95℃†

01001-01	>98.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥39,000
01001-31	>98.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥4,500

アセナフテン
Acenaphthene

警告

$C_{12}H_{10}$...154.20 ［PRTR］1-15
CAS RN® ［83-32-9］bp279℃ mp90℃～95℃ d1.06 Fp135℃

20134-1A	TFS（20134-0050）		5g	￥2,900
20134-2A	TFS（20134-1000）		100g	￥7,200
20134-3A	TFS（20134-5000）		500g	￥28,100

アセナフテン標準品
Acenaphthene standard

$C_{12}H_{10}$...154.20 ［PRTR］1-15
CAS RN® ［83-32-9］bp279℃†

49804-00	ACC（H-108N）	環境分析用	100mg	￥3,900

アセナフテン-d_{10}
Acenaphthene-d_{10}

警告

$C_{12}D_{10}$...164.26 ［PRTR］1-15
CAS RN® ［15067-26-2］

01891-96	>99.0%(GC)	環境分析用	G	100mg	￥11,000

アセナフテン-d_{10}標準品
Acenaphthene-d_{10} standard

警告

$C_{12}D_{10}$...164.26 ［PRTR］1-15 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［15067-26-2］

49803-11	DES（C20505100）	環境分析用	100mg	￥8,500

アセナフテン-d_{10}標準原液
Acenaphthene-d_{10} standard stock solution

危険

$C_{12}D_{10}$...164.26 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［15067-26-2］

1mg/mL アセトン溶液

01070-96	水質試験用		2mL×5	￥9,000

アセナフテンキノン
Acenaphthenequinone

警告

$C_{12}H_6O_2$...182.17
CAS RN® ［82-86-0］

01501-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥9,000
01501-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

アセナフテンキノン
Acenaphthenequinone

警告

$C_{12}H_6O_2$...182.17
CAS RN® ［82-86-0］ mp257℃～263℃

10219-1A	TFS（10219-0250）		25g	￥10,800
10219-2A	TFS（10219-1000）		100g	￥34,200

アセナフチレン
Acenaphthylene

危険

$C_{12}H_8$...152.19
CAS RN® ［208-96-8］ bp280℃† mp88℃～91℃†

01002-32	>80.0%(GC)	G	25g	￥16,500

アセナフチレン標準品
Acenaphthylene standard

$C_{12}H_8$...152.19
CAS RN®［208-96-8］

49804-01	ACC（H-125N）	環境分析用	100mg	￥15,000

アセナフチレン-d_8
Acenaphthylene-d_8

$C_{12}D_8$...160.24
CAS RN®［93951-97-4］

49120-00	CDN（D-128）	99 atom% D	100mg	￥34,100

アセフェート標準品
Acephate standard

危険

$C_4H_{10}NO_3SP$...183.16 ［PRTR］1-212 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［30560-19-1］

49801-00	DES（C10010000）	残留農薬試験用	250mg	￥19,000

アセフェート標準液
Acephate standard solution

$C_4H_{10}NO_3SP$...183.16 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［30560-19-1］

10mg/L アセトニトリル溶液

49862-78	DES（L10010000AL）	残留農薬試験用	10mL	￥9,000

アセキノシル標準品
Acequinocyl standard

$C_{24}H_{32}O_4$...384.50 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［57960-19-7］ mp59.6℃ †

49861-40	DES（C10010500）	残留農薬試験用	50mg	￥20,000

2-[(2-アミノ-2-オキソエチル)アミノ]エタンスルホン酸
2-[(2-Amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid

$C_4H_{10}N_2O_4S$...182.20
CAS RN® [7365-82-4] mp270℃～295℃

22800-1A	TFS（22800-0250）				25g	￥4,800
22800-2A	TFS（22800-1000）				100g	￥18,800
22800-3A	TFS（22800-2500）				250g	￥35,700

アセスルファムK標準品
Acesulfame K standard

$C_4H_4KNO_4S$...201.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [55589-62-3]

01690-96		>99.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥5,500

アセタール
Acetal

危険

$CH_3CH(OC_2H_5)_2$...118.17 [危] 4-1-II
CAS RN® [105-57-7] bp102.7℃† d(20/4℃) 0.8314†

01003-31		>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥2,500
10222-1A	TFS（10222-2500）				250mL	￥15,200
10222-2A	TFS（10222-0010）				1L	￥41,300
10222-3A	TFS（10222-0050）				5mL	￥5,300

アセトアルデヒド
Acetaldehyde

危険

CH_3CHO...44.05 [危] 4-SI-S-I [労] 57,57-2 [PRTR] 1-12 [変]
CAS RN® [75-07-0] bp20.2℃† d(16/4℃) 0.788† Fp-38℃†

01004-00		>90.0%(T)	鹿特級	G	500mL	￥9,000
01004-01		>85.0%(T)	1級	G	500mL	￥5,500

アセトアルデヒド
Acetaldehyde

危険

CH_3CHO...44.05 ［危］4-SI-S-I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-12 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［75-07-0］ bp21℃ mp123℃ d0.785 Fp-27℃

14951-1A	TFS（14951-0010）	1L	￥15,100
14951-3A	TFS（14951-0100）	10mL	￥5,700
14951-4A	TFS（14951-2500）	250mL	￥9,400

アセトアルデヒド
Acetaldehyde

危険

CH_3CHO...44.05 ［危］4-SI-S-I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-12 ［変］ ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［75-07-0］

800004-1	M（8.00004.0501）	500mL	￥5,480

アセトアルデヒド-2,2,2-d_3
Acetaldehyde-2,2,2-d_3

CD_3CHO...47.07 ［危］4-SI-S-I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-12 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［19901-15-6］

49120-02	CDN（D-682）	98 atom% D	1g	￥62,700

アセトアルデヒド-d_4
Acetaldehyde-d_4

CD_3CDO...48.07 ［危］4-SI-S-I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-12 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1632-89-9］

49135-93	CDN（D-163）	99 atom% D	1g	￥17,600

アセトアルデヒドアンモニア,トリマー三水和物
Acetaldehydeammonia, trimer trihydrate

警告

$(C_2H_5N)_3 \cdot 3H_2O$...183.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［58052-80-5］ mp92℃～95℃†

01006-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥4,100

アセトアルデヒドアンモニア,トリマー三水和物
Acetaldehydeammonia, trimer trihydrate

警告

$(C_2H_5N)_3 \cdot 3H_2O$...183.25
CAS RN® [58052-80-5] bp110℃ mp95℃～97℃ Fp55℃

14853-1A	TFS（14853-0250）	25g	￥5,200
14853-3A	TFS（14853-1000）	100g	￥10,800
14853-5A	TFS（14853-5000）	500g	￥40,700

アセトアルデヒドジエチルアセタール → アセタール

アセトアルデヒド-d_4ジエチルアセタール
Acetaldehyde-d_4 diethyl acetal

$CD_3CD(OC_2H_5)_2$...122.19 ［危］4-1-II
CAS RN® [352438-71-2]

49120-03	CDN（D-5134）	98 atom% D	500mg	￥42,900

アセトアルデヒドジメチルアセタール
Acetaldehyde dimethyl acetal

危険

$CH_3CH(OCH_3)_2$...90.12 ［危］4-1-S-II
CAS RN® [534-15-6] bp64.5℃† d(20/20℃) 0.85▲ Fp-17℃†

10302-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥6,800

アセトアルデヒドジメチルアセタール-d_{10}
Acetaldehyde dimethyl acetal-d_{10}

$CD_3CD(OCD_3)_2$...100.18 ［危］4-1-S-II
CAS RN® [1219798-83-0]

49135-94	CDN（D-6026）	98 atom% D	500mg	￥63,800

アセトアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン-3,5,6-d_3
Acetaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d_3

$CH_3CH:NNHC_6D_3(NO_2)_2$...227.19 ［危］5-NC-2-II
CAS RN® ［259824-51-6］

49145-12	CDN（D-7049）	99 atom% D	50mg	￥78,100

アセトアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン(DNPH)標準原液
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) standard stock solution

危険

$CH_3CH:NNHC_6H_3(NO_2)_2$...224.17 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1019-57-4］ Fp-4℃▲

0.509mg/mL(アセトアルデヒドとして 0.1mg/mL) 酢酸エチル溶液

01007-96	悪臭物質測定用		2mL×5	￥6,700

アセトアルデヒドオキシム
Acetaldehyde oxime

危険

$CH_3CH:NOH$...59.06 ［危］4-2-S-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［107-29-9］ bp114.5℃†

10223-1A	TFS（10223-0250）	25g	￥5,600
10223-2A	TFS（10223-1000）	100g	￥15,000

アセトアルデヒドテトラマー → メタアルデヒド

アセトアルドキシム → アセトアルデヒドオキシム

アセトアミド
Acetamide

警告

CH_3CONH_2...59.06 ［労］57,57-2 ［PRTR］2-1
CAS RN® ［60-35-5］ bp222℃† mp81℃†

01009-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥11,000
01009-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,000

アセトアミド
Acetamide

警告

CH_3CONH_2...59.06 ［労］57,57-2［PRTR］2-1
CAS RN® ［60-35-5］ bp221℃ mp79℃～81℃

15363-2A	TFS（15363-1000）	100g	￥3,700
15363-3A	TFS（15363-5000）	500g	￥9,100

アセトアミド-2,2,2-d_3
Acetamide-2,2,2-d_3

CD_3CONH_2...62.08 ［労］57,57-2［PRTR］2-1
CAS RN® ［23724-60-9］

49120-04	CDN（D-90） 99 atom% D	500mg	￥38,500

アセトアミド-d_5
Acetamide-d_5

C_2D_5NO...64.09 ［労］57,57-2［PRTR］2-1
CAS RN® ［33675-83-1］

49120-06	CDN（D-228） 99 atom% D	500mg	￥46,200

アセトアミジン塩酸塩(塩酸アセトアミジン)
Acetamidine hydrochloride

警告

$CH_3C(:NH)NH_2$･HCl...94.54
CAS RN® ［124-42-5］ mp166℃～167℃†

01010-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,000

アセトアミジン塩酸塩(塩酸アセトアミジン)
Acetamidine hydrochloride

警告

$CH_3C(:NH)NH_2$･HCl...94.54
CAS RN® ［124-42-5］ mp160℃～170℃

17021-1A	TFS（17021-0100）	10g	￥3,600
17021-2A	TFS（17021-1000）	100g	￥4,600
17021-3A	TFS（17021-5000）	500g	￥15,300

1-アセトアミドアダマンタン
1-Acetamidoadamantane

$C_{12}H_{19}NO$...193.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［880-52-4］ mp148℃～150℃▲

13360-1A	TFS（13360-0250）	25g	￥10,800
13360-2A	TFS（13360-1000）	100g	￥21,900

p-アセトアミドベンズアルデヒド → *p*-アセチルアミノベンズアルデヒド

p-アセチルアミノベンズアルデヒド
p-Acetylaminobenzaldehyde

$CH_3CONHC_6H_4CHO$...163.17
CAS RN® ［122-85-0］ mp154℃～158℃

40002-1A	TFS（40002-0100）	10g	￥5,600
40002-2A	TFS（40002-0250）	25g	￥10,800
40002-3A	TFS（40002-1000）	100g	￥32,900

アセトアミドベンゼン → アセトアニリド

4-アセトアミド安息香酸
4-Acetamidobenzoic acid

$CH_3CONHC_6H_4CO_2H$...179.17
CAS RN® ［556-08-1］ mp259℃～262℃(dec.)▲

15843-1A	TFS（15843-0250）	25g	￥5,800
15843-2A	TFS（15843-1000）	100g	￥15,900

2-アセトアミドフルオレン
2-Acetamidofluorene

$C_{15}H_{13}NO$...223.26
CAS RN® ［53-96-3］ mp192℃～196℃▲

10230-1A	TFS（10230-0050）	5g	￥15,000

2-アセトアミドフルオレン標準品
2-Acetamidofluorene standard

$C_{15}H_{13}NO$...223.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［53-96-3］

49834-80	DES（C10012000）	環境分析用	100mg	￥12,000

S-(アセトアミドメチル)-*N*-Boc-*L*-システイン
S-(Acetamidomethyl)-*N*-Boc-*L*-cysteine

$C_{11}H_{20}N_2O_5S$...292.35
CAS RN® ［19746-37-3］

01017-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥15,000
01017-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

2-アセトアミド-6-メチルピリジン
2-Acetamido-6-methylpyridine

$C_8H_{10}N_2O$...150.17
CAS RN® ［5327-33-3］

01547-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥6,500
01547-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥3,800

3-アセトアミドフェノール
3-Acetamidophenol

$C_8H_9NO_2$...151.16
CAS RN® ［621-42-1］ mp146℃～149℃▲

10232-1A	TFS（10232-0250）	25g	￥4,000
10232-2A	TFS（10232-1000）	100g	￥10,800

4-アセトアミドフェノール → *p*-ヒドロキシアセトアニリド

4-アセトアミドフェニルボロン酸
4-Acetamidophenylboronic acid

$C_8H_{10}BNO_3$...178.98 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［101251-09-6］ mp215℃～220℃▲

36761-1A	TFS（36761-0050）	5g	￥33,500
36761-2A	TFS（36761-0010）	1g	￥9,100

アセトアミノフェン標準品
Acetaminophen standard

危険

$C_8H_9NO_2$...151.16 ［PRTR］1-335 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［103-90-2］

01602-96	>99.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥9,500

アセトアミノフェン検出キット
Acetaminophen detection kit

危険

［劇］II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-79

01601-96		薬毒物分析用	C	1pack(10回分)	￥13,000

アセタミプリド標準品
Acetamiprid standard

危険

$C_{10}H_{11}ClN_4$...222.67 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［135410-20-7］ mp101.0℃～103.3℃†

01695-96	>98.0%(GC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥14,000
49866-78 DES（C10013000）		残留農薬試験用		100mg	￥21,000

アセタミプリド-d_3標準品
Acetamiprid-d_3 standard

$C_{10}H_8ClD_3N_4$...225.69 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1353869-35-8］

49837-47 DES（C10013100）		残留農薬試験用		50mg	☆

アセタミプリド代謝物IM-2-1標準品
Acetamiprid metabolite IM-2-1 standard

$C_9H_9ClN_4$...208.64 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［190604-92-3］

49865-13 DES（C10013200）		残留農薬試験用		10mg	￥30,000

アセトアニリド
Acetanilide

危険

$C_6H_5NHCOCH_3$...135.16
CAS RN® [103-84-4] bp304℃～305℃† mp113℃～115℃†

01018-01	>98.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥4,600
01018-31	>98.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,000

アセトアニリド-2,3,4,5,6-d_5
Acetanilide-2,3,4,5,6-d_5

$CH_3CONHC_6D_5$...140.19
CAS RN® [15826-91-2]

49120-10	CDN（D-894）	99 atom% D	1g	￥52,800

アセトアニリド-d_8
Acetanilide-d_8

C_8D_8HNO...143.21
CAS RN® [22778-17-2]

49120-11	CDN（D-5109）	99 atom% D	500mg	￥40,700

アセチドラジド → アセトヒドラジド

アセトアセトアルデヒドジメチルアセタール
Acetoacetaldehyde dimethyl acetal

警告

$CH_3COCH_2CH(OCH_3)_2$...132.15 [危] 4-2-III
CAS RN® [5436-21-5] d(20/20℃) 0.99†

10772-32	>94.0%(GC)	G	25g	￥3,400

アセトアセトアニリド
Acetoacetanilide

警告

$CH_3COCH_2CONHC_6H_5$...177.19 [変]
CAS RN® [102-01-2] mp84℃～88℃△

01023-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,000

アセトカルミン溶液
Acetocarmine solution

危険

［労］57,57-2
CAS RN®［308074-85-3］

01024-32		G	25mL	￥2,300

アセトクロール標準品
Acetochlor standard

$C_{14}H_{20}ClNO_2$...269.76 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［34256-82-1］

49803-54	DES（C10018000）	残留農薬試験用	100mg	￥14,000

アセトクロール-d_{11}
Acetochlor-d_{11}

$C_{14}H_9D_{11}ClNO_2$...280.83
CAS RN®［1189897-44-6］

49120-14	CDN（D-5920）	98 atom% D	50mg	￥105,600

アセトクロール-d_{11}標準液
Acetochlor-d_{11} standard solution

$C_{14}H_9D_{11}ClNO_2$...280.83 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1189897-44-6］

100mg/L アセトン溶液

49863-77	DES（XA10018100AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥41,000

アセトヒドラジド
Acetohydrazide

$C_2H_6N_2O$...74.08
CAS RN®［1068-57-1］ mp57℃～60℃▲

10235-1A	TFS（10235-0250）		25g	￥6,200
10235-2A	TFS（10235-1000）		100g	￥23,300

アセトヒドロキサム酸
Acetohydroxamic acid

$C_2H_5NO_2$...75.06
CAS RN® [546-88-3] mp86℃～90℃▲

17013-1A	TFS（17013-0050）		5g	￥8,200

アセトイン → 3-ヒドロキシ-2-ブタノン

アセトイン → 3-ヒドロキシ-2-ブタノン(ダイマー含有)

1′-アセトナフトン
1′-Acetonaphthone

警告

$CH_3COC_{10}H_7$...170.20 ［危］4-3-III
CAS RN® [941-98-0] bp302℃† mp12℃† d(20/20℃) 1.12▲

01028-32	>90.0%(GC)		25mL	￥3,600
40009-1A	TFS（40009-2500）		250g	￥13,900
40009-2A	TFS（40009-0010）		1kg	￥50,500

2′-アセトナフトン
2′-Acetonaphthone

警告

$CH_3COC_{10}H_7$...170.20
CAS RN® [93-08-3] bp300℃～301℃† mp55℃†

01029-32	>98.0%(GC)		25g	￥3,100
15888-1A	TFS（15888-5000）		500g	￥14,000
15888-3A	TFS（15888-1000）		100g	￥3,900

アセトン
Acetone

危険

CH_3COCH_3...58.07 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® [67-64-1] bp56.12℃† d(20/4℃) 0.791† Fp-18℃†

01060-79	>99.9%(GC)	Primepure(M、Org)		1L	￥4,800
01026-00	>99.5%(GC)	特級		500mL	￥1,100

01026-70	>99.5%(GC)	特級	G	3L	￥4,700
01026-87	>99.5%(GC)	特級	M	7kg	￥6,300
01026-80	>99.5%(GC)	特級	M	14kg	☆
01026-02		特級(医薬品試験用)	G	500mL	￥1,300
01026-01	>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥900
01026-71	>99.0%(GC)	鹿1級	G	3L	￥4,400
01026-89	>99.0%(GC)	鹿1級	M	7kg	￥5,500
01026-81	>99.0%(GC)	鹿1級	M	14kg	☆
01026-03	>99.5%(GC)	UGR	G	500mL	￥3,000
01157-08	>99.5%(GC)	RoHS2対応用	G	500mL	￥1,900
01157-84	>99.5%(GC)	RoHS2対応用	M	14kg	☆
01026-1B	>99.7%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	1L	￥2,700
01026-2B	>99.7%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	3L	￥6,000
22-1B	>99.7%(GC)	分光分析用	G	500mL	￥3,100
01025-1B	>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)	G	1L	￥3,000
01025-2B	>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)	G	3L	￥7,000
12-3B	>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)	G	1L	￥2,400
12-4B	>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)	G	3L	￥5,800
01025-97	>99.8%(GC)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析用(10万倍濃縮)	G	1L×6	￥24,000
01025-79	>99.8%(GC)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析用(1万倍濃縮)	G	1L	￥3,400
01025-76	>99.8%(GC)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析用(1万倍濃縮)	G	3L	￥8,000
01026-96	>99.8%(GC)	ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ試験用	G	200mL	￥2,400
01026-76	>99.8%(GC)	ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ試験用	G	1L	￥4,700
01026-79	>99.8%(GC)	生薬純度試験用	G	1L	￥3,100
01041-76	>99.0%(GC)	医薬品製造用	G	3L	￥4,800
01041-82	>99.0%(GC)	医薬品製造用	M	14kg	☆

アセトン, AcroSeal[R]
Acetone, AcroSeal[R]

危険

CH_3COCH_3...58.07 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［67-64-1］ bp56℃ mp95℃ d0.79 Fp-20℃

32680-1A	TFS（32680-0010）	1L	￥24,300
32680-2A	TFS（32680-1000）	100mL	￥11,500

アセトン(脱水)
Acetone, dehydrated

危険

CH_3COCH_3...58.07 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［67-64-1］ bp56.12℃† d(20/4℃) 0.791† Fp-18℃†

01866-05	>99.5%(GC)	Organics	G	500mL	￥4,100
01866-25	>99.5%(GC)	Organics	G	100mL	￥2,100
01866-75	>99.5%(GC)	Organics	G	3L	￥16,000

アセトン(脱水) -Super-
Acetone, dehydrated -Super-

危険

CH_3COCH_3...58.07 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［67-64-1］ bp56.12℃† d(20/4℃) 0.791† Fp-18℃†

(Packed under Ar)、water:0.001%max△

01863-85	>99.5%(GC)	Organics	S	14kg	☆

アセトン-d_6(重水素化率100.0%)
Acetone-d_6, 100.0 atom % D

CD_3COCD_3...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［666-52-4］ bp56℃▲ d0.87▲

32061-1A	TFS（32061-0075）	0.75mL×10	￥17,400

アセトン-d_6(重水素化率99.5%)
Acetone-d_6, 99.5 atom % D

C_3D_6O...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN®［666-52-4］bp55℃ mp93℃ d0.87 Fp-20℃

16622-1A	TFS（16622-0100）		10mL	￥5,800
16622-2A	TFS（16622-0250）		25mL	￥11,100
16622-3A	TFS（16622-0500）		50mL	￥22,600

アセトン-d_6(重水素化率99.5%)
Acetone-d_6, 99.5 atom % D

C_3D_6O...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN®［666-52-4］bp55℃ mp93℃ d0.87 Fp-20℃

32064-1A	TFS（32064-0075）		0.75mL×10	￥11,700

アセトン-d_6(重水素化率99.5%) TMS 1vol%添加
Acetone-d_6, 99.5 atom % D with 1vol% TMS

CD_3COCD_3...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN®［666-52-4］

18116-1A	TFS（18116-0500）	NMR用	50mL	￥34,800
18116-2A	TFS（18116-0100）	NMR用	10mL	￥10,300

アセトン-d_6(重水素化率99.8%)
Acetone-d_6, 99.8 atom % D

CD_3COCD_3...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN®［666-52-4］bp56℃▲ d0.87▲

32532-1A	TFS（32532-0500）		50mL	￥34,000
32532-2A	TFS（32532-0100）		10mL	￥10,000
32063-1A	TFS（32063-0075）		0.75mL×10	￥5,600

アセトン-d_6(重水素化率99.8%以上)
Acetone-d_6, 99.8+ atom % D

CD_3COCD_3...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN®［666-52-4］bp55℃▲ d0.87▲

21-1M	M（1.00021.0100）	MagniSolv™	100mL	￥58,600
21-3M	M（1.00021.0009）	MagniSolv™	0.75mL×10	￥6,970

アセトン-d_6(重水素化率99.9%)
Acetone-d_6, 99.9 atom % D

C_3D_6O...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN®［666-52-4］bp55℃ mp93℃ d0.87 Fp-20℃

32062-1A	TFS（32062-0075）		0.75mL×10	￥5,700

アセトン-d_6(重水素化率99.9%) TMS 0.03vol%添加
Acetone-d_6, 99.9 atom % D with 0.03vol% TMS

危険

CD_3COCD_3...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN®［666-52-4］bp56℃▲ d0.87▲

01054-96		NMR用	G	50mL	￥26,500
01054-43		NMR用	G	10mL	￥7,500
35138-1A	TFS（35138-0500）			50mL	￥37,800
35138-2A	TFS（35138-0100）			10mL	￥9,200

アセトン-d_6(重水素化率99%以上)
Acetone-d_6, 99+ atom % D

C_3D_6O...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN®［666-52-4］bp55℃ mp93℃ d0.87 Fp-20℃

17490-1A	TFS（17490-0100）		10mL	￥4,900
17490-2A	TFS（17490-0500）		50mL	￥18,700

アセトンクロロホルム0.5水 → 1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール0.5水

アセトンシアンヒドリン
Acetone cyanohydrin

危険

$(CH_3)_2C(OH)CN$...85.10 ［劇］I［危］4-3-S-III［労］57,57-2［PRTR］1-14
CAS RN®［75-86-5］ mp-19℃† d0.929～0.934△ Fp76.7℃†

stabilized with sulfuric acid

01027-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥16,500
01027-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,400

アセトン-d_6(重水素化率99.9%)
Acetone-d_6, 99.9 atom % D

危険

CD_3COCD_3...64.11 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN®［666-52-4］bp56℃▲ d0.87▲

01053-96		NMR用	G	50mL	￥26,500
01053-43		NMR用	G	10mL	￥6,400
01053-97		NMR用		0.75mL×10	￥5,400

1,3-アセトンジカルボン酸
1,3-Acetonedicarboxylic acid

$C_5H_6O_5$...146.09 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［542-05-2］ mp133℃(dec.)▲

17315-2A	TFS（17315-1000）			100g	￥10,000

アセトンジメチルアセタール
Acetone dimethyl acetal

危険

$(CH_3O)_2C(CH_3)_2$...104.14 ［危］4-1-II
CAS RN®［77-76-9］bp83℃† mp-47℃† d(20/20℃) 0.85▲

10301-00		>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥9,500
10301-30		>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,900
11563-1A	TFS（11563-5000）				500mL	￥6,700
11563-2A	TFS（11563-0010）				1L	￥11,400
11563-3A	TFS（11563-0025）				2.5L	￥22,400

アセトン-d_6-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン(DNPH)標準品
Acetone-d_6-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) standard

警告

$(CD_3)_2C$:$NNHC_6H_3(NO_2)_2$...244.23 ［危］5-NC-2-II

01048-96		>98.0%(GC)	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ測定用	G	100mg	￥14,000

アセトンオキシム → アセトオキシム

アセトニトリル

Acetonitrile

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］ bp81.6℃ † d(20/4℃) 0.782 † Fp5.6℃ †

01149-79		>99.9%(GC)	Primepure(M)	G	1L	￥5,300
01031-00		>99.5%(GC)	特級	G	500mL	￥2,100
01031-70		>99.5%(GC)	特級	G	3L	￥8,500
01031-80		>99.5%(GC)	特級	M	14kg	☆
01031-01		>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥1,800
01031-81		>99.0%(GC)	鹿1級	M	14kg	☆
01031-03		>99.5%(GC)	UGR	G	500mL	￥6,700
01140-08		>99.5%(GC)	RoHS2対応用	G	500mL	￥3,500
01031-08		>99.5%(GC)	非水滴定用	G	500mL	￥8,500
01033-23		>99.9%(GC)	LC/MS用	G	200mL	￥3,900
01031-84		>99.8%(GC)	大量分取液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	3L×2	￥12,000
01031-96		>99.8%(GC)	大量分取液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	M	18L	☆
01033-2B		>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)	G	1L	￥5,200
01033-3B		>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(5000倍濃縮)	G	3L	￥12,000
17-2B		>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)	G	1L	￥4,500
17-3B		>99.8%(GC)	残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)	G	3L	￥10,000
01033-78		>99.8%(GC)	ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ試験用	G	1L	￥5,600
01031-79		>99.8%(GC)	ﾁｳﾗﾑ測定用	G	1L	￥7,500
01031-76		>99.8%(GC)	ﾁｳﾗﾑ測定用	G	3L	￥17,000
12636-1M	M（1.12636.0050）	>99.8%(GC)	DNA合成用		50mL	￥6,470
01031-5B		>99.8%(GC)	DNA合成用	G	3L	￥14,500
01030-13		>99.8%(GC)	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ測定用	G	200mL	￥4,900
01030-79		>99.8%(GC)	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ測定用	G	1L	￥11,000
16-1B		>99.7%(GC)	分光分析用	G	500mL	￥4,800
01031-3B		>99.7%(GC)	けい光分析用	G	500mL	￥7,000
01030-08		>99.5%(GC)	電気化学用	G	500mL	￥7,000
01030-23		>99.5%(GC)	電気化学用	G	100mL	￥3,200

アセトニトリル
Acetonitrile

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

32573-1A	TFS（32573-0010）	1L	￥10,600
32573-2A	TFS（32573-0025）	2.5L	￥14,800

アセトニトリル
Acetonitrile

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

32668-1A	TFS（32668-0010）	1L	￥12,300
32668-2A	TFS（32668-0025）	2.5L	￥32,500

アセトニトリル
Acetonitrile

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

26826-1A	TFS（26826-0010）	1L	￥15,700
26826-2A	TFS（26826-0025）	2.5L	￥27,100

アセトニトリル
Acetonitrile

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

42325-1A	TFS（42325-0010）	1L	￥13,300
42325-2A	TFS（42325-0025）	2.5L	￥23,800
42325-3A	TFS（42325-5000）	500mL	￥9,100

アセトニトリル
Acetonitrile

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］ bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

25856-1A	TFS（25856-0010）	1L	￥13,300
25856-2A	TFS（25856-0025）	2.5L	￥24,600
25856-3A	TFS（25856-0250）	25L	￥145,600

アセトニトリル
Acetonitrile

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］ bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

26827-1A	TFS（26827-0010）	1L	￥14,800
26827-2A	TFS（26827-0025）	2.5L	￥19,000

アセトニトリル
Acetonitrile

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］ bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

32675-1A	TFS（32675-0010）	1L	￥9,100
32675-2A	TFS（32675-0025）	2.5L	￥39,600

アセトニトリル
Acetonitrile

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］ bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

16765-1A	TFS（16765-0010）	1L	￥16,700
16765-2A	TFS（16765-0025）	2.5L	￥27,800
16765-3A	TFS（16765-2500）	250mL	￥5,100

アセトニトリル -Plus-
Acetonitrile -Plus-

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］ bp81.6℃† d(20/4℃) 0.782† Fp5.6℃†

01033-79	>99.9%(GC)	LC/MS用	G	1L	￥8,000
01033-76	>99.9%(GC)	LC/MS用	G	3L	￥18,000
01031-1B	>99.9%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	1L	￥7,500
01031-2B	>99.9%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	3L	￥17,000
01858-79	>99.9%(GC)	HPLC用(医薬品試験用)	G	1L	￥8,000
01858-76	>99.9%(GC)	HPLC用(医薬品試験用)	G	3L	￥18,000

アセトニトリル, AcroSeal^R
Acetonitrile, AcroSeal^R

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］ bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

36431-1A	TFS（36431-0010）	1L	￥16,100
36431-2A	TFS（36431-0025）	2.5L	￥24,300
36431-3A	TFS（36431-1000）	100mL	￥7,700
36431-4A	TFS（36431-5000）	500mL	￥8,700

アセトニトリル, AcroSeal^R
Acetonitrile, AcroSeal^R

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］ bp81℃～82℃ mp46℃ d0.781 Fp2℃

32681-1A	TFS（32681-0010）	1L	￥13,200
32681-2A	TFS（32681-0025）	2.5L	￥24,300
32681-3A	TFS（32681-1000）	100mL	￥7,200

アセトニトリル(脱水)
Acetonitrile, dehydrated

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］bp81.6℃† d(20/4℃) 0.782† Fp5.6℃†

water:0.002%max△

01837-95	>99.5%(GC)	Organics	G	3L	￥17,000

アセトニトリル(脱水) -Super-
Acetonitrile, dehydrated -Super-

危険

CH_3CN...41.05 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［75-05-8］bp81.6℃† d(20/4℃) 0.782† Fp5.6℃†

(Packed under Ar)、water:0.001%max△

01837-05	>99.5%(GC)	Organics	G	500mL	￥4,800
01837-25	>99.5%(GC)	Organics	G	100mL	￥2,400
01860-83	>99.5%(GC)	Organics	S	7kg	☆
01860-85	>99.5%(GC)	Organics	S	14kg	☆

アセトニトリル-d_3(重水素化率99%)
Acetonitrile-d_3, 99 atom % D

CD_3CN...44.07 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［2206-26-0］bp79℃～81℃ mp46℃ d0.844 Fp2℃

16623-2A	TFS（16623-0100）	10mL	￥10,700
16623-3A	TFS（16623-0250）	25mL	￥25,600
16623-4A	TFS（16623-0500）	50mL	￥44,700
16623-5A	TFS（16623-2500）	250mL	￥165,500

アセトニトリル-d_3(重水素化率99%) TMS 1vol%添加
Acetonitrile-d_3, 99 atom % D with 1vol% TMS

CD_3CN...44.07 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［2206-26-0］

21453-1A	TFS（21453-0500）	NMR用	50mL	￥56,900
21453-2A	TFS（21453-0250）	NMR用	25mL	￥33,300
21453-3A	TFS（21453-0100）	NMR用	10mL	￥19,300

アセトニトリル-d_3(重水素化率99.8%)
Acetonitrile-d_3, 99.8 atom % D

CD_3CN...44.07 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［2206-26-0］bp79℃～81℃ mp46℃ d0.844 Fp2℃

32066-1A	TFS（32066-0075）	0.75mL×10	￥7,000

アセトニトリル-d_3(重水素化率99.8%)
Acetonitrile-d_3, 99.8 atom % D

CD_3CN...44.07 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［2206-26-0］bp79℃～81℃ mp46℃ d0.844 Fp2℃

21742-1A	TFS（21742-1000）	100mL	￥72,900

アセトニトリル-d_3(重水素化率99.9%)
Acetonitrile-d_3, 99.9 atom % D

危険

CD_3CN...44.07 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［2206-26-0］bp79℃～81℃† d0.84▲

01055-08		NMR用	500mL	☆
01055-96		NMR用	50mL	￥34,000
01055-43		NMR用	10mL	￥8,500
01055-97		NMR用	0.75mL×10	￥6,600
35139-1A	TFS（35139-0100）		10mL	￥10,800

アセトニトリル-d_3(重水素化率99.9%)
Acetonitrile-d_3, 99.9 atom % D

CD_3CN...44.07 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［2206-26-0］ bp79℃～81℃† d0.84▲

32065-1A	TFS（32065-0075）		0.75mL×10	￥16,100

アセトニトリル-d_3(重水素化率99.9%) TMS 1vol%添加
Acetonitrile-d_3, 99.9 atom % D with 1vol% TMS

危険

CD_3CN...44.07 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［2206-26-0］

01838-43	NMR用	G	10mL	￥15,500

アセトニトリル-d_3(重水素化率99.95%以上)
Acetonitrile-d_3, 99.95+ atom % D

CD_3CN...44.07 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN® ［2206-26-0］ bp79℃～81℃† d0.84▲

13753-2M	M（1.13753.0009）	MagniSolv™	0.75mL×10	￥23,300

アセトニトリル:蒸留水(1:1)
Acetonitrile/distilled water mixed solution(1:1)

危険

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13

03986-76	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	3L	☆

アセトニトリル/水 混液(4:1)
Acetonitrile/water mixed solution(4:1)

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13

01768-76	HPLC用(医薬品試験用)	G	3L	￥16,000

アセトニトリル/水 混液(3:2)
Acetonitrile/water mixed solution(3:2)

危険

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13

03974-79	HPLC用(医薬品試験用)	1L	￥7,000

アセトニルアセトン → 2,5-ヘキサンジオン

アセトニルアセトン-d_{10} → 2,5-ヘキサンジオン-d_{10}

アセトニルクロリド → クロロアセトン

4-アセトフェネチジン
4-Acetophenetidide

危険

$C_{10}H_{13}NO_2$...179.21
CAS RN® ［62-44-2］ mp133℃～138℃

21659-1A	TFS（21659-0025）	2.5kg	￥29,100
21659-3A	TFS（21659-1000）	100g	￥4,700
21659-4A	TFS（21659-5000）	500g	￥7,100

4-アセトフェネチジン標準品 → フェナセチン標準品

m-アセトフェノール → *m*-ヒドロキシアセトフェノン

o-アセトフェノール → *o*-ヒドロキシアセトフェノン

p-アセトフェノール → *p*-ヒドロキシアセトフェノン

アセト-d_3-フェノン
Aceto-d_3-phenone

$C_6H_5COCD_3$...123.16 ［危］4-3-III［労］57,57-2
CAS RN® ［17537-31-4］

49120-16	CDN（D-91）	99 atom% D		10g	￥35,200

アセトフェノン
Acetophenone

警告

$C_6H_5COCH_3$...120.14 ［危］4-3-III［労］57,57-2
CAS RN® ［98-86-2］bp202℃† mp20.5℃† d(15/15℃) 1.033† Fp82.2℃†

01034-00	>99.5%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,600
01034-01	>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥3,800

アセトフェノン
Acetophenone

警告

$C_6H_5COCH_3$...120.14 ［危］4-3-III［労］57,57-2
CAS RN® ［98-86-2］bp202℃ mp19.6℃ d1.028 Fp77℃

10241-1A	TFS（10241-0010）		1L	￥8,100
10241-2A	TFS（10241-0025）		2.5L	￥13,300
10241-3A	TFS（10241-0050）		5mL	￥3,300
10241-4A	TFS（10241-0100）		10L	￥31,100
10241-5A	TFS（10241-2500）		250mL	￥4,300

アセトフェノン-2′,3′,4′,5′,6′-d_5
Acetophenone-2′,3′,4′,5′,6′-d_5

$C_8H_3D_5O$...125.17 ［危］4-3-III［労］57,57-2
CAS RN® ［28077-64-7］

49136-00	CDN（D-760）	98 atom% D	5g	￥44,000

アセトフェノン-d_8
Acetophenone-d_8

$C_6D_5COCD_3$...128.19 ［危］4-3-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［19547-00-3］

49136-01	CDN（D-2967）	98 atom% D		1g	￥22,000

p-アセトトルイジド
p-Acetotoluidide

警告

$CH_3C_6H_4NHCOCH_3$...149.18
CAS RN® ［103-89-9］bp307℃† mp148℃～153℃△

01037-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,300

p-アセトトルイジド
p-Acetotoluidide

警告

$CH_3C_6H_4NHCOCH_3$...149.18
CAS RN® ［103-89-9］bp307℃ mp148℃～151℃ d1.21 Fp168℃

40016-2A	TFS（40016-1000）			100g	￥7,000
40016-3A	TFS（40016-5000）			500g	￥23,900

アセトバニロン
Acetovanillone

$HOC_6H_3(OCH_3)COCH_3$...166.17
CAS RN® ［498-02-2］bp295℃～300℃▲ mp113℃～116℃▲

10242-1A	TFS（10242-0250）			25g	￥4,400
10242-2A	TFS（10242-1000）			100g	￥9,400
49869-00	PHY（83252）	天然物化学研究用		100mg	￥40,000

アセトオキシム
Acetoxime

警告

$(CH_3)_2C:NOH$...73.09
CAS RN® [127-06-0] bp135℃† mp59℃～64℃△ d0.901†

01038-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,400
10239-1A	TFS（10239-1000）				100g	￥8,000
10239-3A	TFS（10239-5000）				500g	￥37,100

2-アセトキシ安息香酸-3,4,5,6-d_4
2-Acetoxybenzoic-3,4,5,6-d_4 acid

$C_9H_4D_4O_4$...184.18
CAS RN® [97781-16-3]

49136-03	CDN（D-6290）	98 atom% D		50mg	￥101,200

o-アセトキシ安息香酸 → アセチルサリチル酸

1′-アセトキシチャビコールアセテート
1′-Acetoxychavicol acetate

$C_{13}H_{14}O_4$...234.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [52946-22-2]

49060-01	PHY（82458）		天然物化学研究用	10mg	￥66,000

4-アセトキシインドール
4-Acetoxyindole

$C_{10}H_9NO_2$...175.18 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5585-96-6] mp98℃～104℃△

01976-62		>98.0%(GC)	G	1g	￥6,500

2-アセトキシ-1-メトキシプロパン
2-Acetoxy-1-methoxypropane

警告

$CH_3OCH_2CH(OCOCH_3)CH_3$...132.15 ［危］4-2-III
CAS RN® ［108-65-6］ bp145℃～146℃† mp-87℃† d0.966～0.974△

01948-79	>99.9%(GC)	Primepure(M)	G	1L	￥11,000
01948-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥2,600
01948-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥900
01948-70	>99.0%(GC)	鹿特級	G	3L	￥13,500

5-アセトキシメチル-2-フルアルデヒド
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde

$C_8H_8O_4$...168.14
CAS RN® ［10551-58-3］ mp52℃～56℃▲

16340-1A	TFS（16340-0020）	2g	￥5,200
16340-2A	TFS（16340-0100）	10g	￥14,000

α-アセトキシナフタレン → 酢酸1-ナフチル

2-アセトキシプロピルトリメチルアンモニウムクロリド → 塩化メタコリン

15-アセトキシシルペノール標準液
15-Acetoxyscirpenol standard solution

$C_{17}H_{24}O_6$...324.36 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57-2 ［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2623-22-5］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。50mg/L アセトニトリル溶液

49160-61	B.P.（10002875）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥98,000

アセトキシバレレン酸
Acetoxyvalerenic acid

$C_{17}H_{24}O_4$...292.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［84638-55-1］

49060-02	PHY（89151）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

アセツル酸 → *N*-アセチルグリシン

アセチルアセトアルデヒドジメチルアセタール
Acetylacetaldehyde dimethyl acetal

$C_6H_{12}O_3$...132.15 ［危］4-2-III
CAS RN® ［5436-21-5］bp178℃▲ d0.99▲

29233-1A	TFS（29233-2500）	250mL	￥24,100
29233-2A	TFS（29233-0010）	1L	￥65,700

α-アセチルアセトアニリド → アセトアセトアニリド

アセチルアセトン
Acetylacetone

危険

$CH_3COCH_2COCH_3$...100.11 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN® ［123-54-6］bp140.6℃† mp-23℃† d(20℃) 0.971～0.978△ Fp34℃†

01040-00	>99.5%(GC)	特級	G	500mL	￥4,300
01040-30	>99.5%(GC)	特級	G	25mL	￥1,800
01040-70	>99.5%(GC)	特級	G	3L	￥20,000
01040-01	>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥4,200
01040-71	>99.0%(GC)	鹿1級	G	3L	￥17,500

2′-アセチルアクテオシド
2′-Acetylacteoside

$C_{31}H_{38}O_{16}$...666.62
CAS RN® ［94492-24-7］

49870-46	PHY（83476）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

6-アセチルアクテオシド
6-Acetylacteoside

$C_{31}H_{38}O_{16}$...666.62 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［441769-43-3］

49060-03	PHY（89554）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

N-アセチル-d_3-*D L*-アラニン-2,3,3,3-d_4
N-Acetyl-d_3-*DL*-alanine-2,3,3,3-d_4

$CD_3CD(NHCOCD_3)COOH$...138.17 ［冷］ 0℃～6℃

49145-16	CDN（D-6182）	98 atom% D	250mg	￥52,800

N-アセチル-d_3-*D L*-アラニン-3,3,3-d_3
N-Acetyl-d_3-*DL*-alanine-3,3,3-d_3

$CD_3CH(NHCOCD_3)COOH$...137.16 ［冷］ 0℃～6℃

49148-40	CDN（D-6181）	98 atom% D	250mg	￥57,200

N-アセチル-*D*-アラニン-2,3,3,3-d_4
N-Acetyl-*D*-alanine-2,3,3,3-d_4

$CD_3CD(NHCOCH_3)COOH$...135.15 ［冷］ 0℃～6℃

49145-14	CDN（D-6769）	98 atom% D	250mg	￥57,200

N-アセチル-*D L*-アラニン-2,3,3,3-d_4
N-Acetyl-*DL*-alanine-2,3,3,3-d_4

$CD_3CD(NHCOCH_3)COOH$...135.15 ［冷］ 0℃～6℃

49148-39	CDN（D-6179）	98 atom% D	250mg	￥57,200

N-アセチル-*D L*-アラニン-3,3,3-d_3
N-Acetyl-*DL*-alanine-3,3,3-d_3

$CD_3CH(NHCOCH_3)COOH$...134.14 ［冷］ 0℃～6℃

49148-37	CDN（D-6180）	98 atom% D	250mg	￥57,200

N-アセチル-*L*-アラニン-2,3,3,3-d_4
N-Acetyl-*L*-alanine-2,3,3,3-d_4

$CD_3CD(NHCOCH_3)COOH$...135.15 ［冷］ 0℃～6℃

49145-15	CDN（D-6028）	98 atom% D	100mg	￥48,400

N-アセチル-*L*-アラニン-3,3,3-d_3
N-Acetyl-*L*-alanine-3,3,3-d_3

$CD_3CH(NHCOCH_3)COOH$...134.14 ［冷］ 0℃～6℃

49148-38	CDN（D-6027）	98 atom% D		100mg	￥51,700

p-アセチルアミノベンズアルデヒド
p-Acetylaminobenzaldehyde

$CH_3CONHC_6H_4CHO$...163.17
CAS RN® ［122-85-0］ mp152℃～157℃△

01011-50	>97.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥7,000

5-アセチル-2-アミノベンゾニトリル
5-Acetyl-2-aminobenzonitrile

$C_9H_8N_2O$...160.17 ［劇］III
CAS RN® ［33720-71-7］

01790-62	>97.0%(HLC)		G	1g	￥22,000

2-[[7-(アセチルアミノ)-6-(ベンジルオキシ)-2-フェニルパーヒドロピラノ[3,2-*d*][1,3]ジオキシン-8-イル]オキシ]プロパン酸
2-[[7-(Acetylamino)-6-(benzyloxy)-2-phenylperhydropyrano[3,2-*d*][1,3]dioxin-8-yl]oxy]propanoic acid

$C_{25}H_{29}NO_8$...471.49
CAS RN® ［499104-69-7］ mp220℃～222℃▲

49241-01	TFS（RH01183DE）	97%		5g	☆
49241-02	TFS（RH01183DA）	97%		1g	￥52,900
49241-03	TFS（RH01183CB）	97%		250mg	￥22,200

2-アセチルアミノ-5-ブロモピリジン
2-Acetylamino-5-bromopyridine

警告

$C_7H_7BrN_2O$...215.04
CAS RN® ［7169-97-3］ mp175℃～179℃▲

01483-55				5g	￥7,500

2-アセチルアミノ-3-(2,5-ジフルオロフェニル)アクリル酸
2-Acetylamino-3-(2,5-difluorophenyl)acrylic acid

$C_{11}H_9F_2NO_3$...241.19
CAS RN®［959246-37-8］

01498-52	>95.0%		G	5g	￥22,500
01498-62	>95.0%		G	1g	￥7,000

N-アセチルアミノエタノール → *N*-(2-ヒドロキシエチル)アセトアミド

N-アセチル-3-(アミノエチル)-6-メトキシインドール → *N*-アセチル-6-メトキシトリプタミン

D L-*N*-アセチル-2-アミノ-3-(5-メチルインドリル)プロピオン酸 → *N*-アセチル-5-メチル-*D L*-トリプトファン

2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール標準品
2-Acetylamino-5-nitrothiazole standard

警告

$C_5H_5N_3O_3S$...187.17 ［危］5-NC-1-I
CAS RN®［140-40-9］ mp264℃～265℃†

01929-96	>98.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥10,000

3-アセチルアミノフェニルボロン酸
3-Acetylaminophenylboronic acid

警告

$C_8H_{10}BNO_3$...178.98 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［78887-39-5］

01774-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥11,000
01774-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,100

p-アセチルアニソール → *p*-メトキシアセトフェノン

9-アセチルアントラセン
9-Acetylanthracene

$C_{16}H_{12}O$...220.26
CAS RN® [784-04-3] mp75℃～76℃▲

10244-1A	TFS（10244-0050）		5g	￥6,600

N-アセチル-*DL*-アスパラギン酸-2,3,3-d_3
N-Acetyl-*DL*-aspartic-2,3,3-d_3 acid

$HOOCCD_2CD(NHCOCH_3)COOH$...178.15
CAS RN® [89829-69-6]

49145-17	CDN（D-5980）	98 atom% D	50mg	￥73,700

アセチルベンセン → アセトフェノン

6-アセチル-1,4-ベンゾジオキサン
6-Acetyl-1,4-benzodioxane

$C_{10}H_{10}O_3$...178.18
CAS RN® [2879-20-1] mp80℃～82℃▲

01541-32		>97.0%(HLC)	25g	￥19,500
01541-52		>97.0%(HLC)	5g	￥6,500
17675-1A	TFS（17675-0100）		10g	￥12,200

2-アセチル安息香酸
2-Acetylbenzoic acid

$CH_3COC_6H_4CO_2H$...164.15
CAS RN® [577-56-0] mp115℃～118℃▲

10247-1A	TFS（10247-0050）	5g	￥4,600
10247-2A	TFS（10247-0250）	25g	￥15,000

4-アセチル安息香酸
4-Acetylbenzoic acid

警告

$CH_3COC_6H_4CO_2H$...164.15
CAS RN® [586-89-0] mp208℃～210℃▲

01361-32	>93.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
01361-52	>93.0%(HLC)	G	5g	￥4,000
17586-2A	TFS（17586-0100）		10g	￥21,500

3-アセチルベンゾニトリル
3-Acetylbenzonitrile

C_9H_7NO...145.15 [劇] III
CAS RN® [6136-68-1] mp93℃～98℃▲

30784-1A	TFS（30784-0050）		5g	￥7,100

4-アセチルベンゾニトリル
4-Acetylbenzonitrile

$CH_3COC_6H_4CN$...145.15 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1443-80-7] mp57℃～58℃†

16758-1A	TFS（16758-0250）		25g	￥16,700
16758-2A	TFS（16758-0050）		5g	￥3,900

5-アセチルベンゾオキサゾール
5-Acetylbenzoxazole

警告

$C_9H_7NO_2$...161.15
CAS RN® [1225716-41-5]

01014-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥43,000
01014-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥10,500

N-アセチル-5-ベンジルオキシ-*DL*-トリプトファン
N-Acetyl-5-benzyloxy-*DL*-tryptophan

$C_{20}H_{20}N_2O_4$...352.38 [凍] -20℃以下
CAS RN® [55443-80-6]

01977-97	>98.0%(T)	G	250mg	￥20,500

4-アセチルビフェニル
4-Acetylbiphenyl

$C_{14}H_{12}O$...196.24
CAS RN® [92-91-1]

01369-02	>95.0%(GC)	G	500g	￥15,000
01369-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥4,000

*N*ε-アセチル-*N*α-Boc-*L*-リシン
*N*ε-Acetyl-*N*α-Boc-*L*-lysine

$C_{13}H_{24}N_2O_5$...288.33
CAS RN® [6404-26-8]

01064-32	>97.0%	G	25g	￥12,000
01064-52	>97.0%	G	5g	￥4,100

3-*O*-アセチル-11-ケト-β-ボスウェル酸
3-*O*-Acetyl 11-keto-β-boswellic acid

$C_{32}H_{48}O_5$...512.71 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [67416-61-9]

49060-05	PHY（89153）	天然物化学研究用	10mg	￥81,000

3-*O*-アセチルα-ボスウェル酸
3-*O*-Acetyl α-boswellic acid

$C_{32}H_{50}O_4$...498.73 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [89913-60-0]

49060-06	PHY（89555）	天然物化学研究用	10mg	￥105,000

3-*O*-アセチルβ-ボスウェル酸
3-*O*-Acetyl β-boswellic acid

$C_{32}H_{50}O_4$...498.73 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5968-70-7]

49060-04	PHY（89152）	天然物化学研究用	10mg	￥85,000

2-アセチル-6-ブロモピリジン
2-Acetyl-6-bromopyridine

C_7H_6BrNO...200.03
CAS RN® [49669-13-8]

01713-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
01713-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,400

3-アセチル-5-ブロモピリジン
3-Acetyl-5-bromopyridine

C_7H_6BrNO...200.03
CAS RN® [38940-62-4]

01711-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
01711-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,400

5-アセチル-2-ブロモピリジン
5-Acetyl-2-bromopyridine

C_7H_6BrNO...200.03
CAS RN® [139042-59-4]

01015-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥25,000
01015-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

2-アセチル-5-ブロモチオフェン
2-Acetyl-5-bromothiophene

C_6H_5BrOS...205.07
CAS RN® [5370-25-2] bp103℃(4mm)▲ mp94℃～96℃▲

30833-1A	TFS（30833-0250）		25g	￥19,900
30833-2A	TFS（30833-0050）		5g	￥4,600

N-アセチル-*S*-(カルバモイルエチル-d_4)-*L*-システイン
N-Acetyl-*S*-(carbamoylethyl-d_4)-*L*-cysteine

$H_2NCO(CD_2)_2SCH_2CH(NHCOCH_3)COOH$...238.30 ［冷］ 0℃～6℃

49145-18	CDN（D-6589）	99 atom% D	50mg	￥73,700

アセチル-d$_3$-*L*-カルニチン塩酸塩
Acetyl-d$_3$-*L*-carnitine hydrochloride

$HOOCCH_2CH(OCOCD_3)CH_2N(CH_3)_3Cl$...242.71 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［362049-62-5］

49120-19	CDN（D-5488）	99 atom% D		100mg	￥74,800

アセチルセルロース → 酢酸セルロース

5-アセチル-2-クロロフェニルボロン酸
5-Acetyl-2-chlorophenylboronic acid

警告

$C_8H_8BClO_3$...198.41 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［1022922-17-3］

01992-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥13,000
01992-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,800

2-アセチル-5-クロロチオフェン
2-Acetyl-5-chlorothiophene

C_6H_5ClOS...160.62
CAS RN® ［6310-09-4］ bp117℃～118℃▲ mp46℃～49℃▲

30670-1A	TFS（30670-0050）			5g	￥8,400

アセチルコエンザイムA三リチウム三水和物
Acetyl Coenzyme A trilithium salt trihydrate

$C_{23}H_{35}Li_3N_7O_{17}P_3S \cdot 3H_2O$...881.50 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［72-89-9］

100490-N	MP（100490）	92%～95%		10mg	￥20,800

2-アセチルシクロヘキサノン
2-Acetylcyclohexanone

$C_8H_{12}O_2$...140.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［874-23-7］ bp224℃～226℃▲ d1.063▲

34619-1A	TFS（34619-0050）			5g	￥5,300
34619-2A	TFS（34619-0250）			25g	￥18,800

1-アセチルシクロヘキセン
1-Acetylcyclohexene

$C_8H_{12}O$...124.18 ［危］4-2-III
CAS RN® ［932-66-1］ mp73℃▲

10250-1A	TFS（10250-0050）			5g	￥7,300
10250-2A	TFS（10250-0250）			25g	￥24,700

N-アセチル-*L*(+)-システイン
N-Acetyl-*L*(+)-cysteine

$HSCH_2CH(NHCOCH_3)COOH$...163.19
CAS RN® ［616-91-1］ mp109℃～110℃†

01763-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,200

3-*O*-アセチル9,11-デヒドロβ-ボスウェル酸
3-*O*-Acetyl 9,11-dehydro β-boswellic acid

$C_{32}H_{48}O_4$...496.71 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［122651-20-1］

49868-93	PHY（83240）	天然物化学研究用	5mg	￥86,000

$^{13}C_{17}$-15-アセチルデオキシニバレノール標準液
$^{13}C_{17}$-15-Acetyldeoxynivalenol standard solution

［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10μg/mL アセトニトリル溶液

49161-23	B.P.（10002840）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

$^{13}C_{17}$-3-アセチルデオキシニバレノール標準液
$^{13}C_{17}$-3-Acetyldeoxynivalenol standard solution

$^{13}C_{17}H_{22}O_7$...355.22 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25mg/L アセトニトリル溶液

49150-62	B.P.（10002811）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

15-アセチルデオキシニバレノール標準品
15-Acetyldeoxynivalenol standard

$C_{17}H_{22}O_7$...338.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［88337-96-6］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49150-75	B.P.（10000322）	ｶﾋﾞ毒分析用	10mg	￥130,000
49150-74	B.P.（10000305）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mg	￥73,000

15-アセチルデオキシニバレノール標準液
15-Acetyldeoxynivalenol standard solution

$C_{17}H_{22}O_7$...338.35 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57-2 ［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［88337-96-6］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100mg/L アセトニトリル溶液

49150-11	B.P.（10000338）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥65,000
49150-33	B.P.（10003650）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥38,000

3-アセチルデオキシニバレノール標準品
3-Acetyldeoxynivalenol standard

$C_{17}H_{22}O_7$...338.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［50722-38-8］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49150-73	B.P.（10000319）	ｶﾋﾞ毒分析用	10mg	￥130,000
49150-72	B.P.（10000302）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mg	￥73,000

3-アセチルデオキシニバレノール標準液
3-Acetyldeoxynivalenol standard solution

$C_{17}H_{22}O_7$...338.35 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57-2 ［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［50722-38-8］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100mg/L アセトニトリル溶液

49150-10	B.P.（10000337）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥65,000
49150-32	B.P.（10003649）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥38,000

N-アセチル-3-(2,6-ジフルオロフェニル)-*D*-アラニン
N-Acetyl-3-(2,6-difluorophenyl)-*D*-alanine

$C_{11}H_{11}F_2NO_3$...243.20
CAS RN® [266360-56-9]

01624-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥9,000
01624-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,800

アセチルジメチルアミン → *N*,*N*-ジメチルアセトアミド

(1*S*,3*S*)-3-アセチル-2,2-ジメチルシクロブタンアセトニトリル
(1*S*,3*S*)-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetonitrile

$C_{10}H_{15}NO$...165.23 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [39863-94-0] d0.96▲

mixture of ca.90:10 *Z*/*E*

27515-1A	TFS（27515-0025）	2.5g	￥38,000

3-アセチル-4,5-ジメチル-5-ヒドロキシ-1,5-ジヒドロ-2*H*-ピロール-2-オン
3-Acetyl-4,5-dimethyl-5-hydroxy-1,5-dihydro-2*H*-pyrrol-2-one

$C_8H_{11}NO_3$...169.17
CAS RN® [98593-79-4] mp172℃～174℃▲

27194-1A	TFS（27194-0010）	1g	￥22,000

3-アセチル-2,4-ジメチルピロール
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole

$C_8H_{11}NO$...137.17
CAS RN® [2386-25-6] mp136℃～139℃▲

10251-2A	TFS（10251-0100）	10g	￥71,300

5-アセチル-2,4-ジメチルチアゾール
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole

C_7H_9NOS...155.22 ［危］4-3-III
CAS RN® [38205-60-6] bp228℃～230℃▲ d1.15▲

29636-1A	TFS（29636-0050）	5g	￥6,400

N-アセチルジフェニルアミン → *N*,*N*-ジフェニルアセトアミド

アセチレンジカルボン酸
Acetylenedicarboxylic acid

HOOCC≡CCOOH...114.05 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［142-45-0］ mp180℃～187℃(dec.)▲

10252-1A	TFS（10252-0250）	25g	￥13,000

アセチレンジカルボン酸一カリウム
Acetylenedicarboxylic acid monopotassium salt

C_4HO_4K...152.14
CAS RN® ［928-04-1］ mp133℃(dec.)▲

10253-1A	TFS（10253-0050）	5g	￥3,100

N-アセチルエタノールアミン → *N*-(2-ヒドロキシエチル)アセトアミド

アセチルオイゲノール
Acetyleugenol

$C_{12}H_{14}O_3$...206.23
CAS RN® ［93-28-7］

49060-08	PHY（82460）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

N-アセチル-2-フルオロ-*DL*-フェニルアラニン
N-Acetyl-2-fluoro-*DL*-phenylalanine

$C_{11}H_{12}FNO_3$...225.21
CAS RN® ［66574-84-3］ mp153℃～155℃▲

31083-1A	TFS（31083-0050）	5g	￥11,600

4-アセチル-3-フルオロフェニルボロン酸
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid

警告

$C_8H_8BFO_3$...181.95 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［481725-35-3］

01993-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥12,500

5-アセチル-2-フルオロフェニルボロン酸
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid

警告

$C_8H_8BFO_3$...181.95 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［870777-29-0］ mp112℃～117℃†

01994-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥11,000
01994-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,600

2-アセチルフラン
2-Acetylfuran

$C_4H_3OCOCH_3$...110.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1192-62-7］ mp29℃～30℃† d1.098†

10255-1A	TFS（10255-1000）	100g	￥6,400
10255-2A	TFS（10255-2500）	250g	￥15,300

α-*N*-アセチルガラクトサミニダーゼ
α-*N*-Acetyl-galactosaminidase

［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49889-06	NEB（P0734S）	3000units	￥25,000

N-アセチル-*D*-グルコサミン
N-Acetyl-*D*-glucosamine

$C_6H_{11}O_5(NHCOCH_3)$...221.20 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7512-17-6］ mpabt 205℃(dec.)▲

01510-30		鹿特級	G	25g	￥5,200

β-*N*-アセチルグルコサミニダーゼ S
β-*N*-Acetylglucosaminidase S

［冷］ 4℃

49899-53	NEB（P0744S）	100units	￥26,100
49899-52	NEB（P0744L）	500units	￥104,100

N-アセチル-d_3-グルホシネート水和物
N-Acetyl-d_3-glufosinate hydrate

$C_7H_{13}D_3NO_6P$...244.19 ［冷］ 0℃～6℃

49149-45	CDN（D-7961）			10mg	￥52,800

N-アセチル-*D*-グルタミン酸-2,3,3,4,4-d_5
N-Acetyl-*D*-glutamic-2,3,3,4,4-d_5 acid

$HOOCCD_2CD_2CD(NHCOCH_3)COOH$...182.18
CAS RN® ［14341-87-8］

49145-19	CDN（D-6388）	98 atom% D		50mg	￥48,400

N-アセチル-*L*-グルタミン酸-2,3,3,4,4-d_5
N-Acetyl-*L*-glutamic-2,3,3,4,4-d_5 acid

$HOOCCD_2CD_2CD(NHCOCH_3)COOH$...182.18

49145-20	CDN（D-6371）	98 atom% D		50mg	￥105,600

N-アセチル-d_3-グリシン-2,2-d_2
N-Acetyl-d_3-glycine-2,2-d_2

$CD_3CONHCD_2COOH$...122.13
CAS RN® ［1219805-82-9］

49145-21	CDN（D-6998）	98 atom% D		100mg	￥38,500

N-アセチルグリシン
N-Acetylglycine

$CH_3CONHCH_2COOH$...117.10
CAS RN® ［543-24-8］ mp206℃～208℃†

01611-30		>97.0%(T)	鹿特級	25g	￥2,300
10257-1A	TFS（10257-5000）			500g	￥12,500
10257-2A	TFS（10257-1000）			100g	￥3,400

N-アセチル-d_3-グリシン-d_2-*N*-メチル-d_3-アミド
N-Acetyl-d_3-glycine-d_2-*N*-methyl-d_3-amide

$CD_3CONHCD_2CONHCD_3$...138.19
CAS RN® ［1219802-57-9］

49145-22	CDN（D-6342）	98 atom% D		50mg	￥62,700

N-アセチルグリホサート標準品 → グリホサート-*N*-アセチル標準品

N-2-アセチルグアニン
N-2-Acetylguanine

$C_7H_7N_5O_2$...193.16
CAS RN®［19962-37-9］ mp>260℃▲

25840-1A	TFS（25840-0010）			1g	￥11,300

8-アセチルハルパギド
8-Acetylharpagide

$C_{17}H_{26}O_{11}$...406.38 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［6926-14-3］

49871-42	PHY（82700）		天然物化学研究用	10mg	￥40,000

β-*N*-アセチルヘキソサミニダーゼf
β-*N*-Acetyl-Hexosaminidase f

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49888-84	NEB（P0721S）			500units	￥12,400

N-アセチル-3-ヒドロキシインドール
N-Acetyl-3-hydroxyindole

$C_{10}H_9NO_2$...175.18 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［33025-60-4］

01978-62	>98.0%(GC)		G	1g	￥13,500

1-アセチルイミダゾール
1-Acetylimidazole

$C_3H_3N_2COCH_3$...110.11
CAS RN®［2466-76-4］ mp99℃～105℃†

01566-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,600

1-アセチルイミダゾール
1-Acetylimidazole

$C_3H_3N_2COCH_3$...110.11
CAS RN® [2466-76-4] mp93℃～96℃

16950-1A	TFS（16950-0050）		5g	￥3,800
16950-2A	TFS（16950-0250）		25g	￥7,900
16950-3A	TFS（16950-1000）		100g	￥21,400

3-アセチルインドール
3-Acetylindole

警告

$C_{10}H_9NO$...159.18
CAS RN® [703-80-0] mp185℃～191℃▲

01479-32		>95.0%(HLC)	25g	￥10,000
01479-52		>95.0%(HLC)	5g	￥4,600
10259-1A	TFS（10259-0050）		5g	￥6,100
10259-2A	TFS（10259-0250）		25g	￥20,200

1-アセチルインドール-3-カルボキシアルデヒド
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde

$C_{11}H_9NO_2$...187.19 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [22948-94-3] mp162℃～168℃△

01979-42		>99.0%(GC)	10g	￥10,500

1-アセチルインドール-3-カルボキシアルデヒド
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde

$C_{11}H_9NO_2$...187.19
CAS RN® [22948-94-3] mp165℃

39970-1A	TFS（39970-0010）	1g	￥4,300
39970-2A	TFS（39970-0050）	5g	￥14,800

1-アセチルインドール-3-オール → *N*-アセチル-3-ヒドロキシインドール

7-アセチルインターメディン
7-Acetylintermedine

$C_{17}H_{27}NO_6$...341.39 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［74243-01-9］

49871-43	PHY（83759）		天然物化学研究用	5mg	￥61,000

7-アセチルインターメディン *N*-オキシド
7-Acetylintermedine *N*-oxide

$C_{17}H_{27}NO_7$...357.39 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［685132-59-6］

49871-44	PHY（83795）		天然物化学研究用	5mg	￥61,000

N-アセチル-*L*-ロイシン
N-Acetyl-*L*-leucine

$C_8H_{15}NO_3$...173.20
CAS RN®［1188-21-2］ mp190℃▲

01470-02		>95.0%(HLC)	G	500g	￥15,000
01470-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥3,200
34701-1A	TFS（34701-0050）			5g	￥4,700
34701-2A	TFS（34701-0250）			25g	￥18,800

N-アセチル-d_3-*L*-ロイシン-d_{10}-*N*-メチル-d_3-アミド
N-Acetyl-d_3-*L*-leucine-d_{10}-*N*-methyl-d_3-amide

$(CD_3)_2CDCD_2CD(NHCOCD_3)CONHCD_3$...202.34

49145-23	CDN（D-6117）	98 atom% D		10mg	￥48,400

7-アセチルリコプサミン塩酸塩
7-Acetyllycopsamine hydrochloride

$C_{17}H_{27}NO_6$･HCl...377.85 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［73544-48-6］

49871-45	PHY（85874）		天然物化学研究用	5mg	￥61,000

7-アセチルリコプサミン *N*-オキシド
7-Acetyllycopsamine *N*-oxide

$C_{17}H_{27}NO_7$...357.39 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［685132-58-5］

49871-46	PHY（84275）	天然物化学研究用	5mg	￥61,000

6-*N*-アセチル-*L*-リシン-3,3,4,4,5,5,6,6-d_8
6-*N*-Acetyl-*L*-lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d_8

$CH_3CONH(CD_2)_4CH(NH_2)COOH$...196.27

49145-24	CDN（D-6690）	99 atom% D	10mg	￥22,000

N^{α}-アセチル-*L*-リシン
N^{α}-Acetyl-*L*-lysine

$C_8H_{16}N_2O_3$...188.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1946-82-3］ mp256℃～258℃▲

22763-1A	TFS（22763-2500）	250mg	￥5,600
22763-2A	TFS（22763-0010）	1g	￥13,800

N-アセチル-3-メルカプトアラニン → *N*-アセチル-*L*(+)-システイン

N-アセチル-*DL*-メチオニン
N-Acetyl-*DL*-methionine

$C_7H_{13}NO_3S$...191.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1115-47-5］

01614-02	>98.0%(T)	G	500g	￥11,000
01614-32	>98.0%(T)	G	25g	￥2,100

2-アセチル-6-メトキシナフタレン
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene

$CH_3OC_{10}H_6COCH_3$...200.23
CAS RN®［3900-45-6］ mp107℃～109℃▲

13478-1A	TFS（13478-0100）	10g	￥18,100
13478-2A	TFS（13478-0010）	1g	￥3,100

N-アセチル-5-メトキシトリプトアミン-α,α,β,β-d_4
N-Acetyl-5-methoxytryptamine-α,α,β,β-d_4

$C_{13}H_{12}D_4N_2O_2$...236.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［66521-38-8］

49120-26	CDN（D-2952）	98 atom% D	10mg	￥70,400

N-アセチル-d_3-5-メトキシトリプタミン
N-Acetyl-d_3-5-methoxytryptamine

$C_{13}H_{13}D_3N_2O_2$...235.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［90735-69-6］

49149-46	CDN（D-7977）		5mg	￥30,800

N-アセチル-d_3-5-メトキシトリプタミン-α,α,β,β-d_4
N-Acetyl-d_3-5-methoxytryptamine-α,α,β,β-d_4

$C_{13}H_9D_7N_2O_2$...239.32 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［615251-68-8］

49149-47	CDN（D-7976）		5mg	￥52,800

N-アセチル-6-メトキシトリプタミン
N-Acetyl-6-methoxytryptamine

$C_{13}H_{16}N_2O_2$...232.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［22375-73-1］

01980-97	>98.0%(HLC)	G	100mg	￥15,000

アセチルメチルアミン → *N*-メチルアセトアミド

アセチルメチルカルビノール → 3-ヒドロキシ-2-ブタノン

アセチルメチルカルビノール → 3-ヒドロキシ-2-ブタノン(ダイマー含有)

N-アセチル-5-メチル-*DL*-トリプトファン
N-Acetyl-5-methyl-*DL*-tryptophan

$C_{14}H_{16}N_2O_3$...260.28
CAS RN® [71953-90-7]

01981-97	>99.0%(T)	G	500mg	￥22,000

1-アセチルナフタレン → 1′-アセトナフトン

2-アセチルナフタレン → 2′-アセトナフトン

2-アセチル-1-ナフトール
2-Acetyl-1-naphthol

$HOC_{10}H_6COCH_3$...186.20
CAS RN® [711-79-5] mp98℃～100℃†

19500-1A	TFS（19500-0250）		25g	￥6,200
19500-2A	TFS（19500-0050）		5g	￥2,400

N-アセチルノイラミン酸
N-Acetylneuraminic acid

$C_{11}H_{19}NO_9$...309.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [131-48-6] mp184℃～186℃(dec.)†

01616-93	鹿特級	G	10mg	￥3,300

N-アセチル-4-ニトロアニリン → *p*-ニトロアセトアニリド

2-(アセチルオキシ)-3-メチル安息香酸
2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid

$C_{10}H_{10}O_4$...194.18
CAS RN® [4386-39-4]

49241-07	TFS（SB01734EA）	97%	10g	￥37,600
49241-08	TFS（SB01734DA）	97%	1g	￥14,800

4-アセチルフェノキシ酢酸
4-Acetylphenoxyacetic acid

$C_{10}H_{10}O_4$...194.18
CAS RN® [1878-81-5] mp171℃～173℃▲

37937-1A	TFS（37937-0050）		5g	￥3,900

N-アセチル-*L*-フェニルアラニン
N-Acetyl-*L*-phenylalanine

$C_6H_5CH_2CH(NHCOCH_3)CO_2H$...207.22
CAS RN® [2018-61-3] mp165℃～167℃†

01012-32	>97.0%	G	25g	￥10,000
01012-52	>97.0%	G	5g	￥4,100

N-アセチル-*L*-フェニルアラニル-3,5-ジヨード-*L*-チロシン
N-Acetyl-*L*-phenylalanyl-3,5-diiodo-*L*-tyrosine

$C_{20}H_{20}I_2N_2O_5$...622.19 [労] 57,57-2
CAS RN® [3786-08-1] mp219℃～221℃(dec.)▲

22765-1A	TFS（22765-2500）		250mg	￥9,600

2-アセチルフェニルボロン酸
2-Acetylphenylboronic acid

$C_8H_9BO_3$...163.96 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [308103-40-4] mp170℃(dec.)▲

35882-1A	TFS（35882-0010）		1g	￥7,700

3-アセチルフェニルボロン酸
3-Acetylphenylboronic acid

$C_8H_9BO_3$...163.96 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [204841-19-0] mp204℃～208℃▲

35883-1A	TFS（35883-0100）		10g	￥20,900
35883-2A	TFS（35883-0010）		1g	￥4,500

4-アセチルフェニルボロン酸
4-Acetylphenylboronic acid

警告

$C_8H_9BO_3$...163.96 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［149104-90-5］ mp237℃～242℃▲

01810-35		>95.0%(HLC)	Organics	G	25g	￥10,000
01810-55		>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥5,000
36940-1A	TFS（36940-0050）				5g	￥9,200
36940-2A	TFS（36940-0010）				1g	￥3,400

2-アセチルフェニルボロン酸ピナコールエステル
2-Acetylphenylboronic acid pinacol ester

$C_{14}H_{19}BO_3$...246.11 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［325141-75-1］

02053-55	>97.0%(GC)	Organics	G	5g	￥20,000
02053-65	>97.0%(GC)	Organics	G	1g	￥7,500

1-アセチル-2-フェニルヒドラジン
1-Acetyl-2-phenylhydrazine

危険

$C_6H_5NHNHCOCH_3$...150.17
CAS RN® ［114-83-0］ mp129℃～133℃△

01056-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥11,500

4-アセチル-4-フェニルピペリジン塩酸塩
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride

$C_{13}H_{17}NO \cdot HCl$...239.73
CAS RN® ［10315-03-4］ mp232℃～234℃▲

13458-1A	TFS（13458-0050）	5g	￥13,000
13458-2A	TFS（13458-0250）	25g	￥49,200

1-アセチルピペラジン → *N*-アセチルピペラジン

N-アセチルピペラジン
N-Acetylpiperazine

警告

$C_6H_{12}N_2O$...128.17
CAS RN® [13889-98-0] mp31℃～34℃▲

34683-1A	TFS（34683-0050）		5g	￥6,100
34683-2A	TFS（34683-0250）		25g	￥25,600

2-(4-アセチルピペラジン-1-イル)ピリジン-5-ボロン酸ピナコールエステル
2-(4-Acetylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester

$C_{17}H_{26}BN_3O_3$...331.22 [PRTR] 1-405
CAS RN® [1073372-01-6] mp198.5℃～200.5℃▲

49241-09	TFS（MAY00066DA）	97%	1g	￥17,300

1-アセチル-4-ピペリジンカルボン酸
1-Acetyl-4-piperidinecarboxylic acid

$C_8H_{13}NO_3$...171.19
CAS RN® [25503-90-6] mp182℃～185℃▲

19463-1A	TFS（19463-0500）		50g	￥54,900
19463-2A	TFS（19463-0050）		5g	￥4,100

1-アセチル-4-ピペリドン
1-Acetyl-4-piperidone

$C_7H_{11}NO_2$...141.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [32161-06-1] bp218℃† d1.146†

01057-32		>97.0%(GC)	G	25mL	￥8,500
01057-52		>97.0%(GC)	G	5mL	￥4,100
16682-1A	TFS（16682-0250）			25g	￥20,700
16682-2A	TFS（16682-1000）			100g	￥51,300

N-アセチル-4-ピペリドン → 1-アセチル-4-ピペリドン

N-アセチル-*L*-プロリン
N-Acetyl-*L*-proline

$C_7H_{11}NO_3$...157.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［68-95-1］ mp115℃～117℃▲

37664-1A	TFS（37664-0010）		1g	￥6,800
37664-2A	TFS（37664-0050）		5g	￥27,000

3-アセチルプロピオン酸 → レブリン酸

2-アセチルピラジン
2-Acetylpyrazine

$C_6H_6N_2O$...122.12 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［22047-25-2］

01622-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,000
01622-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,000

2-アセチルピリジン
2-Acetylpyridine

警告

C_7H_7NO...121.13 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1122-62-9］ mp8℃～10℃▲ d1.08▲

01511-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥6,200
10268-2A	TFS（10268-1000）		100g	￥16,900
10268-1A	TFS（10268-0250）		25g	￥5,200

3-アセチルピリジン
3-Acetylpyridine

$CH_3COC_5H_4N$...121.13 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［350-03-8］ bp220℃† d1.102†

10269-1A	TFS（10269-1000）	100g	￥14,500
10269-2A	TFS（10269-0100）	10g	￥3,500

4-アセチルピリジン
4-Acetylpyridine

警告

$CH_3COC_5H_4N$...121.13 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1122-54-9］ bp212℃† mp13℃～16℃† d1.095†

01512-02		>98.0%(GC)		500mL	￥42,500
01512-32		>98.0%(GC)		25mL	￥4,600
10270-1A	TFS（10270-1000）			100g	￥12,100
10270-2A	TFS（10270-0100）			10g	￥3,800

2-アセチルピロール
2-Acetylpyrrole

C_6H_7NO...109.12
CAS RN® ［1072-83-9］ mp88℃～91℃▲

25249-1A	TFS（25249-0050）			5g	￥3,700

アセチルサリチル酸
Acetylsalicylic acid

危険

$CH_3COOC_6H_4COOH$...180.15 ［労］57,57-2
CAS RN® ［50-78-2］ mp136℃†

01058-00		>99.0%(T)	鹿特級	500g	￥5,000

アセチルサリチル酸標準品
Acetylsalicylic acid standard

$CH_3COOC_6H_4COOH$...180.15 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［50-78-2］

49860-78	DES（C10024000）		環境分析用	250mg	￥12,000

アセチルサリチルサリチル酸
Acetylsalicylsalicylic acid

$C_{16}H_{12}O_6$...300.26
CAS RN® ［530-75-6］ mp153℃～158℃▲

26935-1A	TFS（26935-2500）			250mg	￥33,000

N-アセチル-*L*-セリン-2,3,3-d_3
N-Acetyl-*L*-serine-2,3,3-d_3

$HOCD_2CD(NHCOCH_3)COOH$...150.14 ［凍］ -20℃以下

49145-25	CDN（D-6999）	98 atom% D	50mg	￥88,000

8-アセチルシャンジシドメチルエステル
8-Acetylshanzhiside methyl ester

$C_{19}H_{28}O_{12}$...448.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［57420-46-9］

49060-09	PHY（82461）	天然物化学研究用	10mg	￥80,000

N-アセチルスルファニリルクロリド
N-Acetylsulfanilyl chloride

$C_8H_8ClNO_3S$...233.67
CAS RN® ［121-60-8］ mp145℃～148℃(dec.)▲

15072-1A	TFS（15072-1000）	100g	￥4,300
15072-2A	TFS（15072-5000）	500g	￥12,300

2-アセチルチアゾール
2-Acetylthiazole

C_5H_5NOS...127.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［24295-03-2］ d1.22▲

26541-2A	TFS（26541-0050）	5g	￥23,400

2-アセチルチオフェン
2-Acetylthiophene

危険

$CH_3COC_4H_3S$...126.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［88-15-3］ bp213.5℃† mp10℃～11℃† d(20/20℃) 1.17▲

01623-30		>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥6,900
10272-1A	TFS（10272-1000）				100g	￥5,600
10272-3A	TFS（10272-5000）				500g	￥23,600

3-アセチルチオフェン
3-Acetylthiophene

$(C_4H_3S)COCH_3$...126.17
CAS RN® [1468-83-3] bp208℃～210℃(748mm)▲ mp58℃～61℃▲

18802-1A	TFS（18802-0100）	10g	￥14,200
18802-2A	TFS（18802-0010）	1g	￥4,200

5-アセチルチオフェン-2-ボロン酸
5-Acetylthiophene-2-boronic acid

警告

$C_6H_7BO_3S$...169.99 [PRTR] 1-405
CAS RN® [206551-43-1] mp133℃～138℃†

01995-35	>97.0%(HLC)	Organics	G	25g	￥18,000
01995-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥5,800

5-アセチルチオフェン-2-ボロン酸ピナコールエステル
5-Acetylthiophene-2-boronic acid pinacol ester

$C_{12}H_{17}BO_3S$...252.14 [PRTR] 1-405 [凍] -20℃以下
CAS RN® [942070-32-8]

01775-65	>97.0%(GC)	Organics	G	1g	￥8,000

5-アセチルチオフェン-2-カルボニトリル
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile

C_7H_5NOS...151.18 [劇] III
CAS RN® [88653-55-8] mp77℃～78℃▲

49241-10	TFS（TL00354EB）	97%	25g	☆
49241-11	TFS（TL00354EA）	97%	10g	￥67,200
49241-12	TFS（TL00354DE）	97%	5g	￥36,800

1-アセチル-2-チオ尿素
1-Acetyl-2-thiourea

危険

$CH_3CONHCSNH_2$...118.16 [変]
CAS RN® [591-08-2] mp167℃～171℃△

01059-30		鹿特級	G	25g	￥6,700

N-アセチル-d_3-*L*-トレオニン-2,3-d_2
N-Acetyl-d_3-*L*-threonine-2,3-d_2

49145-26	CDN（D-7000）	98 atom% D	50mg	￥73,700

p-アセチルトルエン → *p*-メチルアセトフェノン

N-アセチル-*p*-トルイジン → *p*-アセトトルイジド

*N*α-アセチル-L-トリプトファン
*N*α-Acetyl-L-tryptophan

$C_{13}H_{14}N_2O_3$...246.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1218-34-4］

02116-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
02116-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,200

N-アセチル-*L*-チロシンエチルエステル一水和物
N-Acetyl-*L*-tyrosine ethyl ester monohydrate

$C_{13}H_{17}NO_4 \cdot H_2O$...269.29
CAS RN® ［36546-50-6］ mp80℃～81℃▲

10275-1A	TFS（10275-0010）	1g	￥7,000
10275-2A	TFS（10275-0100）	10g	￥28,500

アシベンゾラル酸標準品
Acibenzolar acid standard

$C_7H_4N_2O_2S$...180.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［35272-27-6］ mp260℃～265℃▲

49865-81	DES（C10027900）	残留農薬試験用	50mg	￥32,000

アシベンゾラル-*S*-メチル標準品
Acibenzolar-*S*-methyl standard

$C_8H_6N_2OS_2$...210.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［135158-54-2］

49830-58	DES（C10028000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

アシベンゾラル-*S*-メチル代謝物B標準品 → アシベンゾラル酸標準品

アシッドオレンジ10 → オレンジG

アシッドレッド
Acid red

$C_{27}H_{29}N_2NaO_7S_2$...580.65
CAS RN® [3520-42-1]

01067-32	G	25g	￥7,500

アシッドレッド265 → C.I.アシッドレッド265

アシッドレッド29 → クロモトロープ2R

アシッドバイオレット6B
Acid violet 6B

警告

$C_{39}H_{40}N_3NaO_6S_2$...733.87 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-67
CAS RN® [1694-09-3]

01069-32	G	25g	￥4,100

アシッドイエロー23 → タートラジン

アシフルオルフェン標準品
Acifluorfen standard

$C_{14}H_7ClF_3NO_5$...361.65 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [50594-66-6]

49827-11	DES（C10030000）	残留農薬試験用	50mg	￥16,000

アクロニフェン標準品
Aclonifen standard

$C_{12}H_9ClN_2O_3$...264.66 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［74070-46-5］

49863-49	DES（C10042000）	残留農薬試験用	250mg	￥13,000

ｃ ｉ ｓ-アコニン酸
cis-Aconitic acid

$C_6H_6O_6$...174.10 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［585-84-2］

49871-48	PHY（83833）	天然物化学研究用	100mg	￥22,500

ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-アコニット酸
trans-Aconitic acid

$C_6H_6O_6$...174.10
CAS RN®［4023-65-8］

49060-11	PHY（82257）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

アコニチン
Aconitine

$C_{34}H_{47}NO_{11}$...645.73 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［302-27-2］

49060-12	PHY（89376）	天然物化学研究用	20mg	￥51,000

アクリジン
Acridine

警告

$C_{13}H_9N$...179.21
CAS RN®［260-94-6］bp360℃† mp110.5℃†

01073-31	>98.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥29,000

アクリジン標準品
Acridine standard

$C_{13}H_9N$...179.21
CAS RN®［260-94-6］

49797-67	ACC（H-187N）	環境分析用	100mg	￥4,500

アクリジン-9-カルボン酸 *n* 水和物
Acridine-9-carboxylic acid *n*-hydrate

$C_{14}H_9NO_2 \cdot nH_2O$
CAS RN® [332927-03-4] mp290℃(dec.)▲

40022-1A	TFS（40022-0050）		5g	￥18,300
40022-2A	TFS（40022-0010）		1g	￥5,800

アクリジンオレンジ
Acridine orange

危険

$C_{17}H_{20}ClN_3 \cdot 1/2ZnCl_2$...369.95 [PRTR] 1-1
CAS RN® [10127-02-3]

14217-30	鹿特級	G	25g	￥22,000

アクリジンオレンジ
Acridine orange

危険

$C_{17}H_{20}ClN_3 \cdot 1/2ZnCl_2$...369.95 [PRTR] 1-1
CAS RN® [10127-02-3] mp165℃

30091-1A	TFS（30091-0250）		25g	￥11,100
30091-2A	TFS（30091-1000）		100g	￥30,000

アクリジンオレンジ
Acridine orange zinc chloride double salt

$C_{17}H_{20}Cl_3N_3Zn$...438.09 [PRTR] 1-1
CAS RN® [10127-02-3]

15931-1M	M（1.15931.0025）	顕微鏡用(Certistain®)	25g	￥51,100

アクリジンイエロー
Acridine yellow

$C_{15}H_{16}ClN_3$...273.75
CAS RN® [135-49-9]

01077-32		G	25g	￥49,000

9(10*H*)-アクリジノン
9(10*H*)-Acridinone

警告

$C_{13}H_9NO$...195.21
CAS RN® [578-95-0]

01598-32		G	25g	￥10,000
01598-52		G	5g	￥3,600
40025-1A	TFS（40025-0100）		10g	￥17,600
40025-2A	TFS（40025-0250）		25g	￥29,700

9(10*H*)-アクリドン → 9(10*H*)-アクリジノン

アクリフラビン
Acriflavine, neutral

CAS RN® [8048-52-0] mp179℃～181℃(dec.)▲

21140-1A	TFS（21140-1000）		100g	￥30,500
21140-2A	TFS（21140-0250）		25g	￥9,800

アクリフラビン塩酸塩
Acriflavine hydrochloride

CAS RN® [8063-24-9] mp260℃▲

34684-1A	TFS（34684-1000）		100g	￥26,600
34684-2A	TFS（34684-0100）		10g	￥6,300
34684-3A	TFS（34684-0250）		25g	￥8,300

アクリナトリン標準品
Acrinathrin standard

$C_{26}H_{21}F_6NO_5$...541.43 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [101007-06-1] mp82℃†

49802-02	DES（C10044000）	残留農薬試験用	100mg	￥25,000

アクリノール
Acrinol

警告

$C_{15}H_{15}N_3O \cdot C_3H_6O_3 \cdot H_2O$...361.39
CAS RN® [1837-57-6(anhydr), 6402-23-9] mp245℃(dec.)†

01079-30	>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥6,300

アクロキャップ加圧ろ過デバイス 0.1μm 滅菌済
AcroCap™ positive pressure devices 0.1μm gamma-irradiated

97005-15	PALL（4481）	分離精製用	1pack(10個)	￥18,300

アクロキャップ加圧ろ過デバイス 0.2μm 滅菌済
AcroCap™ positive pressure devices 0.2μm gamma-irradiated

97005-16	PALL（4480）	分離精製用	1pack(10個)	￥15,400

アクロキャップ加圧ろ過デバイス 0.45μm 滅菌済
AcroCap™ positive pressure devices 0.45μm gamma-irradiated

97005-17	PALL（4482）	分離精製用	1pack(10個)	￥15,400

アクロディスク MSシリンジフィルター 0.2μm, 13mm, WWPTFEメンブレン
Acrodisc MS Syringe Filter 0.2μm, 13mm, WWPTFE membrane

97004-91	PALL（MS-3301）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(60個)	￥26,000

アクロディスク MSシリンジフィルター 0.2μm, 25mm, WWPTFEメンブレン
Acrodisc MS Syringe Filter 0.2μm, 25mm, WWPTFE membrane

97004-90	PALL（MS-3201）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥36,800

アクロディスク One PSFシリンジフィルター GxF/wwPTFE 25mm 0.2μm
Acrodisc[R] One PSF Syringe Filter GXF/wwPTFE Membrane 25mm 0.2μm

97010-27	PALL（AP-4913T）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥27,800
97010-28	PALL（AP-4913）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥103,000
97010-31	PALL（AP-4915）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥494,400

アクロディスク One PSFシリンジフィルター GxF/wwPTFE 25mm 0.2μm オートパックチューブ入り
Acrodisc[R] One PSF Syringe Filter GXF/wwPTFE Membrane 25mm 0.2μm

97010-30	PALL（AP-4914）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥106,100

アクロディスク One PSFシリンジフィルター GxF/wwPTFE 25mm 0.45μm
Acrodisc[R] One PSF Syringe Filter GXF/wwPTFE Membrane 25mm 0.45μm

97010-36	PALL（AP-4919TC）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥27,800
97010-37	PALL（AP-4919）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥103,000
97010-39	PALL（AP-4921）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥494,400

アクロディスク One PSFシリンジフィルター GxF/wwPTFE 25mm 0.45μm オートパックチューブ入り
Acrodisc[R] One PSF Syringe Filter GXF/wwPTFE Membrane 25mm 0.45μm

97010-38	PALL（AP-4920）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥106,100

アクロディスク One PSFシリンジフィルター wwPTFE 25mm 0.2μm
Acrodisc[R] One PSF Syringe Filter wwPTFE Membrane 25mm 0.2μm

97010-23	PALL（AP-4910TC）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥25,800
97010-24	PALL（AP-4910）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥94,800
97010-26	PALL（AP-4912）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥468,700

アクロディスク One PSFシリンジフィルター wwPTFE 25mm 0.2μm オートパックチューブ入り
Acrodisc[R] One PSF Syringe Filter wwPTFE Membrane 25mm 0.2μm

97010-25	PALL（AP-4911）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥97,900

アクロディスク One PSFシリンジフィルター wwPTFE 25mm 0.45μm
Acrodisc[R] One PSF Syringe Filter wwPTFE Membrane 25mm 0.45μm

97010-32	PALL（AP-4916TC）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥25,800
97010-33	PALL（AP-4916）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥94,800
97010-35	PALL（AP-4918）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥468,700

アクロディスク One PSFシリンジフィルター wwPTFE 25mm 0.45μm オートパックチューブ入り
Acrodisc[R] One PSF Syringe Filter wwPTFE Membrane 25mm 0.45μm

97010-34	PALL（AP-4917）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥97,900

アクロディスク One シリンジフィルター wwPTFE 25mm 0.2μm
Acrodisc[R] One Syringe Filter wwPTFE Membrane Membrane 25mm 0.2μm

97010-17	PALL（4927TC）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,200
97010-18	PALL（4927）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥84,500
97010-19	PALL（4929）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥293,600

アクロディスク One シリンジフィルター wwPTFE 25mm 0.45μm
Acrodisc[R] One Syringe Filter wwPTFE Membrane Membrane 25mm 0.45μm

97010-20	PALL（4914T）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(50個)	￥23,200
97010-21	PALL（4914）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(200個)	￥84,500
97010-22	PALL（4932）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥293,600

アクロディスク One シリンジフィルター wwPTFE 13mm 0.2μm ミニスパイク仕様
Acrodisc[R] One Syringe Filter wwPTFE Membrane Minispike outlet 13mm 0.2μm

97010-11	PALL（2400TC）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥22,100
97010-12	PALL（2400）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(300個)	￥62,800
97010-13	PALL（2401）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥203,300

アクロディスク One シリンジフィルター wwPTFE 13mm 0.45μm ミニスパイク仕様
Acrodisc[R] One Syringe Filter wwPTFE Membrane Minispike outlet 13mm 0.45μm

97010-14	PALL（2402TC）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥22,100
97010-15	PALL（2402）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(300個)	￥62,800
97010-16	PALL（2403）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(1000個)	￥203,300

アクロディスクPSFシリンジフィルター GxF 25mm
Acrodisc[R] PSF GxF syringe filters GxF/glass fiber 25mm

97004-49	PALL（AP-4523T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥24,200

アクロディスクPSFシリンジフィルター GxF/ナイロン 25mm 0.45μm
Acrodisc[R] PSF syringe filters with GxF/Nylon 0.45μm 25mm

97004-46	PALL（AP-4549T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥26,800

アクロディスクPSFシリンジフィルター GxF/PTFE 25mm 0.45μm
Acrodisc[R] PSF syringe filters with GxF/PTFE 0.45μm 25mm

97004-37	PALL（AP-4303TC）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥30,900

アクロディスクPSFシリンジフィルター GxF/PVDF 25mm 0.45μm
Acrodisc[R] PSF syringe filters with GxF/PVDF 0.45μm 25mm

97004-39	PALL（AP-4310T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥28,800

アクロディスクPSFシリンジフィルター ナイロン 25mm 0.2μm
Acrodisc® PSF syringe filters with Nylon 0.2μm 25mm

97004-44	PALL（AP-4436T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(50個)	￥24,700

アクロディスクPSFシリンジフィルター ナイロン 25mm 0.45μm
Acrodisc® PSF syringe filters with Nylon 0.45μm 25mm

97004-45	PALL（AP-4438T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(50個)	￥24,700

アクロディスクPSFシリンジフィルター PTFE 25mm 0.2μm
Acrodisc® PSF syringe filters with PTFE 0.2μm 25mm

97004-35	PALL（AP-4225T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(50個)	￥27,800

アクロディスクPSFシリンジフィルター PTFE 25mm 0.45μm
Acrodisc® PSF syringe filters with PTFE 0.45μm 25mm

97004-36	PALL（AP-4219TC）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(50個)	￥27,800

アクロディスクPSFシリンジフィルター PVDF 25mm 0.45μm
Acrodisc® PSF syringe filters with PVDF 0.45μm 25mm

97004-38	PALL（AP-4408T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(50個)	￥25,800

アクロディスクPSFシリンジフィルター バーサポア 25mm 0.8μm
Acrodisc® PSF syringe filters with Versapor® 0.8μm 25mm

97004-34	PALL（AP-4189T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(50個)	￥24,200

アクロディクスシリンジフィルター PTFE 25mm 1.0μm
Acrodisc[R] syringe filters with PTFE 25mm 1.0μm

97004-10	PALL（4226T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥34,500

アクロディスク・シリンジフィルター PTFE 13mm 0.2μm メイルスリップルアー
Acrodisc[R] syringe filters with PTFE membrane 13mm 0.2μm male slip

97004-95	PALL（4423T）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(100個)	￥24,700

アクロディクスシリンジフィルター PVDF 25mm 0.2μm
Acrodisc[R] syringe filters with PVDF 25mm 0.2μm

97004-15	PALL（4406T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥25,800

アクロディクスシリンジフィルター PVDF 25mm 0.45μm
Acrodisc[R] syringe filters with PVDF 25mm 0.45μm

97004-16	PALL（4408T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥25,800

アクロディクスシリンジフィルター PVDF 13mm 0.2μm メールスリップルアー仕様
Acrodisc[R] syringe filters with PVDF 13mm 0.2μm male slip luer

97004-11	PALL（4455T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥25,800

アクロディクスシリンジフィルター PVDF 13mm 0.45μm メールスリップルアー仕様
Acrodisc[R] syringe filters with PVDF 13mm 0.45μm male slip luer

97004-12	PALL（4457T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥25,800

アクロディクスシリンジフィルター PVDF 13mm 0.2μm ミニスパイク仕様
Acrodisc[R] syringe filters with PVDF 13mm 0.2μm minispike

97004-13	PALL（4450T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥25,800

アクロディクスシリンジフィルター PVDF 13mm 0.45μm ミニスパイク仕様
Acrodisc[R] syringe filters with PVDF 13mm 0.45μm minispike

97004-14	PALL（4452T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥25,800

アクロパック20 スーポア 0.8/0.2μm フィリングベル付 滅菌済
AcroPak[TM]20 filters Supor[R] 0.8/0.2μm with filling bell gamma-irradiated

97005-31	PALL（12203）	分離精製用	1pack(3個)	￥14,900

アクロパック200 スーポア 0.8/0.2μm フィリングベル付 滅菌済
AcroPak[TM]200 filters Supor[R] 0.8/0.2μm with filling bell gamma-irradiated

97005-32	PALL（12941）	分離精製用	1pack(3個)	￥28,700

アクロパック1000 スーポア 0.1/0.1μm 滅菌済
AcroPak[TM]1000 Supor[R] 0.1/0.1μm gamma-irradiated

97005-39	PALL（12999）	分離精製用	1pack	￥35,600

アクロパック1000 スーポア 0.2/0.2μm 滅菌済
AcroPak™1000 Supor® 0.2/0.2μm gamma-irradiated

97005-40	PALL（12996）	分離精製用	1pack	￥29,200

アクロパック1000 スーポア 0.8/0.2μm 滅菌済
AcroPak™1000 Supor® 0.8/0.2μm gamma-irradiated

97005-37	PALL（12992）	分離精製用	1pack	￥25,300

アクロパック1000 スーポア 0.8/0.45μm 滅菌済
AcroPak™1000 Supor® 0.8/0.45μm gamma-irradiated

97005-38	PALL（12994）	分離精製用	1pack	￥25,300

アクロパック1500 スーポア 0.2/0.2μm 滅菌済
AcroPak™1500 Supor® 0.2/0.2μm gamma-irradiated

97005-41	PALL（12686）	分離精製用	1pack	￥43,100

アクロパック1500 スーポア 0.8/0.2μm 滅菌済
AcroPak™1500 Supor® 0.8/0.2μm gamma-irradiated

97005-42	PALL（12675）	分離精製用	1pack	￥43,100

アクロパック500 スーポア 0.1/0.1μm 滅菌済
AcroPak™500 Supor® 0.1/0.1μm gamma-irradiated

97005-35	PALL（12997）	分離精製用	1pack	￥25,800

アクロパック500 スーポア 0.2/0.2μm 滅菌済
AcroPak™500 Supor® 0.2/0.2μm gamma-irradiated

97005-36	PALL（12995）	分離精製用	1pack	￥21,000

アクロパック500 スーポア 0.8/0.2μm 滅菌済
AcroPak™500 Supor® 0.8/0.2μm gamma-irradiated

97005-33	PALL（12991）	分離精製用	1pack	￥20,000

アクロパック500 スーポア 0.8/0.45μm 滅菌済
AcroPak™500 Supor® 0.8/0.45μm gamma-irradiated

97005-34	PALL（12993）	分離精製用	1pack	￥20,000

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL 1.0μm グラスファイバー
AcroPrep™ advance filter plates 1mL 1.0μm glass fiber

97008-36	PALL（8131）	分離精製用	1pack(5個)	￥42,500

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 2mL 1.0μm グラスファイバー
AcroPrep™ advance filter plates 2mL 1.0μm glass fiber

97008-37	PALL（8231）	分離精製用	1pack(5個)	￥50,500

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL 1.0μm グラスファイバー
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 1.0μm glass fiber

97008-35	PALL（8031）	分離精製用	1pack(10個)	￥37,900

アクロプレップアドバンスフィルタープレート1mL3.0μmグラスファイバー/0.2μmスーポア
AcroPrep™ advance filter plates 1mL 3.0μm glass fiber/0.2μm Supor®

97008-04	PALL（8175）	分離精製用	1pack(5個)	￥54,000

アクロプレップアドバンスフィルタープレート2mL3.0μmグラスファイバー/0.2μmスーポア
AcroPrep™ advance filter plates 2mL 3.0μm glass fiber/0.2μm Supor®

97008-05	PALL（8275）	分離精製用	1pack(5個)	￥50,500

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL 3.0μmグラスファイバー/0.2μmスーポア
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 3.0μm glass fiber/0.2μm Supor®

97008-02	PALL（8075）	分離精製用	1pack(10個)	￥44,800

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL 3.0μmグラスファイバー/1.2μmスーポア
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 3.0μm glass fiber/1.2μm Supor®

97008-03	PALL（8040）	分離精製用	1pack(10個)	￥44,800

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL ムスタングQ
AcroPrep™ advance filter plates 1mL Mustang®-Q

97008-12	PALL（8171）	分離精製用	1pack(5個)	￥73,400

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL ムスタングQ
AcroPrep™ advance filter plates 350μL Mustang®-Q

97008-08	PALL（8071）	分離精製用	1pack(10個)	￥73,400

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL ムスタングS
AcroPrep™ advance filter plates 1mL Mustang®-S

97008-13	PALL（8172）	分離精製用	1pack(5個)	￥73,400

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL ムスタングS
AcroPrep™ advance filter plates 350μL Mustang®-S

97008-09	PALL（8072）	分離精製用	1pack(10個)	￥73,400

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL オメガ100K MWCO
AcroPrep™ advance filter plates 1mL Omaga 100K MWCO

97008-26	PALL（8166）	分離精製用	1pack(5個)	￥44,800

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL オメガ10K MWCO
AcroPrep™ advance filter plates 1mL Omaga 10K MWCO

97008-24	PALL（8164）	分離精製用	1pack(5個)	￥44,800

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL オメガ30K MWCO
AcroPrep™ advance filter plates 1mL Omaga 30K MWCO

97008-25	PALL（8165）	分離精製用	1pack(5個)	￥44,800

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL オメガ3K MWCO
AcroPrep™ advance filter plates 1mL Omaga 3K MWCO

97008-23	PALL（8163）	分離精製用	1pack(5個)	￥44,800

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL オメガ100K MWCO
AcroPrep™ advance filter plates 350μL Omaga 100K MWCO

97008-22	PALL（8036）	分離精製用	1pack(10個)	￥45,900

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL オメガ10K MWCO
AcroPrep™ advance filter plates 350μL Omaga 10K MWCO

97008-20	PALL（8034）	分離精製用	1pack(10個)	￥45,900

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL オメガ30K MWCO
AcroPrep™ advance filter plates 350μL Omaga 30K MWCO

97008-21	PALL（8035）	分離精製用	1pack(10個)	￥45,900

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL オメガ3K MWCO
AcroPrep™ advance filter plates 350μL Omaga 3K MWCO

97008-19	PALL（8033）	分離精製用	1pack(10個)	￥45,900

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL 0.2μm PTFE
AcroPrep™ advance filter plates 1mL 0.2μm PTFE

97008-16	PALL（8147）	分離精製用	1pack(5個)	￥44,800

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL 0.45μm PTFE
AcroPrep™ advance filter plates 1mL 0.45μm PTFE

97008-17	PALL（8148）	分離精製用	1pack(5個)	￥44,800

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 2mL 0.2μm PTFE
AcroPrep™ advance filter plates 2mL 0.2μm PTFE

97008-18	PALL（8247）	分離精製用	1pack(5個)	￥52,700

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL 0.2μm PTFE
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 0.2μm PTFE

97008-14	PALL（8047）	分離精製用	1pack(10個)	￥52,700

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL 0.45μm PTFE
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 0.45μm PTFE

97008-15	PALL（8048）	分離精製用	1pack(10個)	￥52,700

アクロプレップアドバンスフィルタープレート wwPTFE 1mL 0.2μm
AcroPrep™ advance filter plates 1mL 0.2μm wwPTFE

97010-42	PALL（8682）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(5個)	￥43,500

アクロプレップアドバンスフィルタープレート wwPTFE 1mL 0.45μm
AcroPrep™ advance filter plates 1mL 0.45μm wwPTFE

97010-43	PALL（8684）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(5個)	￥43,500

アクロプレップアドバンスフィルタープレート wwPTFE 2mL 0.2μm
AcroPrep™ advance filter plates 2mL 0.2μm wwPTFE

97010-44	PALL（8782）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(5個)	￥49,000

アクロプレップアドバンスフィルタープレート wwPTFE 2mL 0.45μm
AcroPrep™ advance filter plates 2mL 0.45μm wwPTFE

97010-45	PALL（8784）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(5個)	￥49,000

アクロプレップアドバンスフィルタープレート wwPTFE 350uL 0.2μm
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 0.2μm wwPTFE

97010-40	PALL（8582）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(10個)	￥35,100

アクロプレップアドバンスフィルタープレート wwPTFE 350uL 0.45μm
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 0.45μm wwPTFE

97010-41	PALL（8584）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(10個)	￥35,100

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL 0.2μm スーポア
AcroPrep™ advance filter plates 1mL 0.2μm Supor®

97008-32	PALL（8119）	分離精製用	1pack(5個)	￥42,500

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL 0.45μm スーポア
AcroPrep™ advance filter plates 1mL 0.45μm Supor®

97008-10	PALL（8129）	分離精製用	1pack(5個)	￥42,500

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 1mL 1.2μm スーポア
AcroPrep™ advance filter plates 1mL 1.2μm Supor®

97008-11	PALL（8130）	分離精製用	1pack(5個)	￥42,500

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL 0.2μm スーポア
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 0.2μm Supor®

97008-27	PALL（8019）	分離精製用	1pack(10個)	￥39,600

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL 0.45μm スーポア
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 0.45μm Supor®

97008-06	PALL（8029）	分離精製用	1pack(10個)	￥39,600

アクロプレップアドバンスフィルタープレート 350μL 1.2μm スーポア
AcroPrep™ advance filter plates 350μL 1.2μm Supor®

97008-07	PALL（8039）	分離精製用	1pack(10個)	￥39,600

アクロプレップアドバンスフィルタープレート用蓋
AcroPrep™ Advance multi-well plate lids

97008-91	PALL（8001）	分離精製用	1pack(10個)	￥17,900

アクロプレップ24-ウェル 清澄化および滅菌ろ過用フィルタープレート(8入)
AcroPrep™ 24-well Cell Clarification and Sterile Filtration Plate-Depth filter plus 0.65/ 0.2μm Supor EKV (8/pkg)

97007-77	PALL（97026）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥47,800

アクロプレップ24-ウェル 清澄化および滅菌ろ過用フィルタープレート(2入)
AcroPrep™ 24-well Cell Clarification and Sterile Filtration Plate-Depth filter plus 0.65/ 0.2μm Supor EKV (2/pkg)

97007-78	PALL（97016）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥12,000

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 10K オメガ
AcroPrep™ 24-well filter plates 10 K Omega™ filter plate

97008-44	PALL（97053）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97008-45	PALL（97054）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 100K オメガ
AcroPrep™ 24-well filter plates 100K Omega™ filter plate

97008-50	PALL（97059）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97008-51	PALL（97060）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 1K オメガ
AcroPrep™ 24-well filter plates 1K Omega™ filter plate

97008-40	PALL（97049）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97008-41	PALL（97050）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 3K オメガ
AcroPrep™ 24-well filter plates 3 K Omega™ filter plate

97008-42	PALL（97051）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97008-43	PALL（97052）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 30K オメガ
AcroPrep™ 24-well filter plates 30K Omega™ filter plate

97008-46	PALL（97055）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97008-47	PALL（97056）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 50K オメガ
AcroPrep™ 24-well filter plates 50K Omega™ filter plate

97008-48	PALL（97057）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97008-49	PALL（97058）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 30-40μm PP/PE
AcroPrep™ 24-well filter plates 30-40μm PP/PE filter plate

97008-52	PALL（97061）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97008-53	PALL（97062）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 0.1μm スーポア
AcroPrep™ 24-well filter plates 0.1μm Supor® filter plate

97007-81	PALL（97029）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97007-82	PALL（97030）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 0.45μm スーポア
AcroPrep™ 24-well filter plates 0.45μm Supor® filter plate

97007-83	PALL（97031）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97007-84	PALL（97032）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 0.8μm スーポア
AcroPrep™ 24-well filter plates 0.8μm Supor® filter plate

97007-85	PALL（97033）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97007-86	PALL（97034）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 1.2μm スーポア
AcroPrep™ 24-well filter plates 1.2μm Supor® filter plate

97007-87	PALL（97035）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97007-88	PALL（97036）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート 7mL 5μm スーポア
AcroPrep™ 24-well filter plates 5μm Supor® filter plate

97007-89	PALL（97047）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100
97007-90	PALL（97048）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ24-ウェル 滅菌ろ過用フィルタープレート(8入)
AcroPrep™ 24-well Sterile Filtration Plate-0.65/0.2μm Supor EKV (8/pkg)

97007-79	PALL（97027）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(8個)	￥39,100

アクロプレップ24-ウェル 滅菌ろ過用フィルタープレート(2入)
AcroPrep™ 24-well Sterile Filtration Plate-0.65/0.2μm Supor EKV (2/pkg)

97007-80	PALL（97017）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(2個)	￥9,800

アクロプレップ384フィルタープレート 100μLウエル ナチュラル 1.0μm グライファイバー ロングチップ
AcroPrep™ 384-well filter plates 100μL/well natural 1.0μm glass fiber long tips

97008-66	PALL（5072）	分離精製用	1pack(10個)	￥68,800

アクロプレップ384フィルタープレート 100μLウエル ナチュラル 10Kオメガメンブレン ロングチップ
AcroPrep™ 384-well filter plates 100μL/well natural 10K Omega™ membrane long tips

97008-62	PALL（5076）	分離精製用	1pack(10個)	￥68,800

アクロプレップ384フィルタープレート 100μLウエル ナチュラル 30Kオメガメンブレン ロングチップ
AcroPrep™ 384-well filter plates 100μL/well natural 30K Omega™ membrane long tips

97008-63	PALL（5078）	分離精製用	1pack(10個)	￥68,800

アクロプレップ384フィルタープレート 100μLウエル ナチュラル 10Kオメガメンブレン ショートチップ
AcroPrep™ 384-well filter plates 100μL/well natural 10K Omega™ membrane short tips

97008-69	PALL（5077）	分離精製用	1pack(10個)	￥68,800

アクロプレップ384フィルタープレート 100μLウエル ナチュラル 30Kオメガメンブレン ショートチップ
AcroPrep™ 384-well filter plates 100μL/well natural 30K Omega™ membrane short tips

97008-70	PALL（5079）	分離精製用	1pack(10個)	￥68,800

アクロプレップ384フィルタープレート 100μLウエル ナチュラル 1.2μm スーポアメンブレン ショートチップ
AcroPrep™ 384-well filter plates 100μL/well natural 1.2μm Supor®membrane short tips

97008-76	PALL（5085）	分離精製用	1pack(10個)	￥68,800

アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm
Acro® 37 TF Vent Device With PTFE Membrane-0.2μm, 37mm

97009-61	PALL（4464）	微生物検査用	1pack(24個)	￥44,200

アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm
Acro® 37 TF Vent Device With PTFE Membrane-0.2μm, 37mm

97009-62	PALL（4465）	微生物検査用	1pack(200個)	￥304,800

アクロベント 0.2μm ホース口
AcroVent™ Device-0.2μm, hose barb

97009-52	PALL（4249）	微生物検査用	1pack(10個)	￥16,900

アクリルアミド
Acrylamide

危険

CH_2:$CHCONH_2$...71.07 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-2 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［79-06-1］ mp85℃† Fp138℃†

01080-00		>97.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥4,000
01080-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,200
16483-1A	TFS（16483-5000）				500g	￥9,700
814326-N	MP（814326）	>99.9%	ULTRA PURE		500g	￥20,200

アクリルアミドHGX
Acrylamide HGX

危険

CH_2:CHCONH$_2$...71.07 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-2 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［79-06-1］ mp85℃† Fp138℃†

01080-08	>99.9%(HLC)	電気泳動用	G	500g	￥17,500
01080-23	>99.9%(HLC)	電気泳動用	G	100g	￥7,500
01080-33	>99.9%(HLC)	電気泳動用	G	25g	￥3,800

アクリルアミド標準品
Acrylamide standard

危険

CH_2:CHCONH$_2$...71.07 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-2 ［変］ ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［79-06-1］ mp85℃▲ Fp138℃▲

01078-96	>99.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥5,800

アクリルアミド-1-^{13}C
Acrylamide-1-^{13}C

CH_2:CH ^{13}CONH$_2$...72.07 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-2 ［変］
CAS RN® ［287399-24-0］

49120-28 CDN（C-3277）	99 atom% ^{13}C		10mg	￥39,600

アクリルアミド-2,3,3-d$_3$
Acrylamide-2,3,3-d$_3$

$C_3H_2D_3NO$...74.09 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-2 ［変］
CAS RN® ［122775-19-3］

49136-09 CDN（D-5184）	98 atom% D		100mg	￥24,200

アクリルアミド-d$_5$
Acrylamide-d$_5$

C_3D_5NO...76.10 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-2 ［変］
CAS RN® ［108152-65-4］

49136-10 CDN（D-6055）	98 atom% D		100mg	￥38,500

30(w/v)% アクリルアミド/ビス(19:1)溶液
30(w/v)% Acrylamide/Bis mixed solution (19:1)

危険

［劇］III ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-2 ［変］

01074-08	電気泳動用		500mL	￥9,500

30(w/v)% アクリルアミド/ビス(29:1)溶液
30(w/v)% Acrylamide/Bis mixed solution (29:1)

危険

［劇］III ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-2 ［変］

01075-08	電気泳動用		500mL	￥9,500

30(w/v)% アクリルアミド/ビス(37.5:1)溶液
30(w/v)% Acrylamide/Bis mixed solution (37.5:1)

危険

［劇］III ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-2 ［変］

01076-08	電気泳動用		500mL	￥9,500

アクリルアミドモノマー標準原液
Acrylamide monomer standard stock solution

危険

C_3H_5NO...71.07 ［劇］III［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［79-06-1］

1mg/mL メタノール溶液

01888-96	水質試験用		2mL×5	￥6,000

2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid

$C_7H_{13}NO_4S$...207.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［15214-89-8］ mp185℃▲

40029-1A	TFS（40029-0050）		5g	￥2,600

3-アクリルアミドフェニルボロン酸
3-Acrylamidophenylboronic acid

$C_9H_{10}BNO_3$...190.99 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［99349-68-5］

01066-35	>97.0%(HLC)	Organics	G	25g	￥22,000
01066-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥7,500

アクリル酸
Acrylic acid

危険

CH_2:CHCOOH...72.06 ［劇］III ［危］4-2-S-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-4 保存 15℃～25℃
CAS RN® ［79-10-7］ bp141.0℃† mp13℃† d1.051† Fp54℃†

01081-01	>97.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥3,000

アクリル酸-d_4
Acrylic acid-d_4

CD_2:CDCOOD...76.08 ［劇］III ［危］4-2-S-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-4 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［285138-82-1］

stabilized with hydroquinone

49120-30	CDN（D-2724）	98 atom% D		250mg	￥101,200

アクリロニトリル
Acrylonitrile

危険

CH_2:CHCN...53.06 ［劇］III ［危］4-1-II ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-9 ［変］
CAS RN® ［107-13-1］ bp77.3℃† mp-83.5℃† d0.803～0.809△ Fp0℃†

01082-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,300
01082-01	>98.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥2,400

アクリロニトリル CRM4040-b
Acrylonitrile, CRM4040-b

CH_2:CHCN...53.06 ［劇］III［危］4-1-II［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-9 ［変］ ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［107-13-1］

Certified value:99.97±0.08%

49003-02	NMI（CRM4040-b）	認証標準物質	15mL	☆

アクリロニトリル-2-d_1
Acrylonitrile-2-d_1

CH_2:CDCN...54.06 ［劇］III［危］4-1-II［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-9 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［4635-82-9］

stabilized with hydroquinone

49120-31	CDN（D-229）	98 atom% D	500mg	￥30,800

アクリロニトリル-d_3
Acrylonitrile-d_3

CD_2:CDCN...56.08 ［劇］III［危］4-1-II［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-9 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［53807-26-4］

49120-32	CDN（D-1455）	98 atom% D	1g	￥61,600

N-アクリロキシスクシンイミド
N-Acryloxysuccinimide

$C_7H_7NO_4$...169.13 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［38862-24-7］ mp69℃▲

40030-1A	TFS（40030-0050）	5g	￥29,600
40030-2A	TFS（40030-0010）	1g	￥7,300

アクテイン
Actein

$C_{37}H_{56}O_{11}$...676.83
CAS RN® ［18642-44-9］

49060-13	PHY（89154）	天然物化学研究用	10mg	￥80,000

アクチジオン → シクロヘキシイミド

アクチジオン標準品 → シクロヘキシイミド標準品

アクチノマイシンD
Actinomycin D

$C_{62}H_{86}N_{12}O_{16}$...1255.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［50-76-0］ mp241℃～243℃▲

29494-1A	TFS（29494-0050）	5mg	￥15,800
29494-2A	TFS（29494-0250）	25mg	￥55,900

アシクロヌクレオチドセット
Acyclonucleotide Set

［凍］ -20℃以下

0.5μmol of each

49887-81	NEB（N0460S）	1z	￥14,400

アシノナピル標準品
Acynonapyr standard

$C_{24}H_{26}F_6N_2O_3$...504.46 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1332838-17-1］

49867-58	DES（C10045700）	残留農薬試験用	10mg	￥33,000

1-アダマンタンアミン塩酸塩
1-Adamantanamine hydrochloride

警告

$C_{10}H_{17}N$･HCl...187.70
CAS RN®［665-66-7］ mp>300℃▲

01627-22		>99.0%	G	100g	￥10,000
01627-32		>99.0%	G	25g	￥6,500
01627-42		>99.0%	G	10g	￥4,600
15167-2A	TFS（15167-0250）			25g	￥17,200
15167-3A	TFS（15167-1000）			100g	￥43,900

2-アダマンタンアミン塩酸塩
2-Adamantanamine hydrochloride

$C_{10}H_{17}N \cdot HCl$...187.70
CAS RN® [10523-68-9] mp>300℃▲

01634-32		>98.0%(GC)	G	25g	￥19,000
01634-52		>98.0%(GC)	G	5g	￥6,500
16730-1A	TFS（16730-0050）			5g	￥11,000

1-アダマンタンアミン硫酸塩
1-Adamantanamine sulfate

$C_{10}H_{17}N \cdot H_2SO_4$...249.33
CAS RN® [31377-23-8] mp300℃▲

16091-1A	TFS（16091-0250）			25g	￥18,900

アダマンタン
Adamantane

警告

$C_{10}H_{16}$...136.23
CAS RN® [281-23-2] mp205℃～210℃†

01632-12		>99.0%	G	250g	￥17,500
01632-32		>99.0%	G	25g	￥4,500
01632-42		>99.0%	G	10g	￥3,200
14611-1A	TFS（14611-1000）			100g	￥16,900
14611-2A	TFS（14611-0050）			5g	￥2,700
14611-3A	TFS（14611-0250）			25g	￥4,500

アダマンタン-d$_{16}$
Adamantane-d$_{16}$

$C_{10}D_{16}$...152.33
CAS RN® [30470-60-1]

49120-33	CDN（D-1165）	98 atom% D		500mg	￥70,400

1-アダマンタン酢酸
1-Adamantaneacetic acid

$C_{12}H_{18}O_2$...194.26
CAS RN® [4942-47-6] mp136℃～138℃▲

33156-1A	TFS（33156-0010）		1g	￥3,900
33156-2A	TFS（33156-0100）		10g	￥19,100

1-アダマンタンカルボン酸
1-Adamantanecarboxylic acid

警告

$C_{11}H_{16}O_2$...180.24
CAS RN® [828-51-3] mp172℃～176℃▲

01641-02		>95.0%(GC)	G	500g	￥19,500
01641-32		>95.0%(GC)	G	25g	￥3,500
14788-1A	TFS（14788-0250）			25g	￥6,300
14788-2A	TFS（14788-0050）			5g	￥2,400
14788-3A	TFS（14788-1000）			100g	￥17,300

アダマンタンカルボン酸-d_{15}
Adamantane-d_{15}-carboxylic acid

$C_{11}HD_{15}O_2$...195.33
CAS RN® [33830-12-5]

49136-11	CDN（D-6630）	99 atom% D	100mg	￥49,500

1-アダマンタンカルボン酸クロリド
1-Adamantanecarboxylic acid chloride

$C_{11}H_{15}ClO$...198.68
CAS RN® [2094-72-6] mp48℃～52℃▲

15248-1A	TFS（15248-0050）	5g	￥5,700
15248-2A	TFS（15248-0250）	25g	￥21,800

1,3-アダマンタン二酢酸
1,3-Adamantanediacetic acid

$C_{14}H_{20}O_4$...252.30
CAS RN® [17768-28-4] mp234℃～237℃†

01635-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥22,500
01635-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥6,000

1,3-アダマンタンジカルボン酸
1,3-Adamantane dicarboxylic acid

$C_{12}H_{16}O_4$...224.25
CAS RN® [39269-10-8] mp276℃～278℃†

01633-32	>98.0%	G	25g	￥16,000
01633-52	>98.0%	G	5g	￥4,500

1,3-アダマンタンジオール
1,3-Adamantanediol

$C_{10}H_{16}O_2$...168.23
CAS RN® [5001-18-3]

01628-32	>99.0%(GC)	G	25g	￥7,500
01628-52	>99.0%(GC)	G	5g	￥4,000

1-アダマンタンメタノール
1-Adamantanemethanol

$C_{10}H_{15}CH_2OH$...166.25
CAS RN® [770-71-8] mp115℃～118℃†

01630-42	>99.0%(GC)	G	10g	￥9,000
01630-52	>99.0%(GC)	G	5g	￥6,000
18005-1A TFS（18005-0100）			10g	￥14,700

1-アダマンタンメチルアミン
1-Adamantanemethylamine

$C_{11}H_{19}N$...165.27 [危] 4-3-III
CAS RN® [17768-41-1] d0.93▲

17742-1A TFS（17742-0010）			1g	￥15,700

1-アダマンタノール
1-Adamantanol

$C_{10}H_{16}O$...152.23
CAS RN® [768-95-6] mp>240℃▲

01626-22		>98.0%(GC)	G	100g	￥13,000
01626-32		>98.0%(GC)	G	25g	￥6,400
01626-52		>98.0%(GC)	G	5g	￥5,200
15710-1A	TFS（15710-0050）			5g	￥2,600
15710-2A	TFS（15710-0250）			25g	￥6,900

2-アダマンタノール
2-Adamantanol

$C_{10}H_{16}O$...152.23
CAS RN® [700-57-2] mp260℃～265℃(dec.)▲

01629-32		>99.0%(GC)	G	25g	￥9,500
01629-52		>99.0%(GC)	G	5g	￥4,000
16731-1A	TFS（16731-0050）			5g	￥10,000

2-アダマンタノン
2-Adamantanone

$C_{10}H_{14}O$...150.21
CAS RN® [700-58-3] mp282℃～286℃▲

01631-32		>99.0%(GC)	G	25g	￥8,500
01631-52		>99.0%(GC)	G	5g	￥3,200
29250-1A	TFS（29250-0250）			25g	￥11,700
29250-2A	TFS（29250-0050）			5g	￥4,000

1-(1-アダマンチル)エチルアミン塩酸塩
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride

警告

$C_{12}H_{21}N \cdot HCl$...215.76
CAS RN® [1501-84-4] mp>300℃†

01637-52		>98.0%	G	5g	￥5,400

1-アダマンチルメチルケトン
1-Adamantyl methyl ketone

$C_{12}H_{18}O$...178.27
CAS RN®［1660-04-4］ mp53℃～55℃▲

16474-1A	TFS（16474-0010）		1g	￥4,100
16474-2A	TFS（16474-0050）		5g	￥8,900
16474-3A	TFS（16474-0250）		25g	￥38,000

2-(1-アダマンチル)プロパン-2-オール
2-(1-Adamantyl)propan-2-ol

$C_{13}H_{22}O$...194.31
CAS RN®［775-64-4］

01191-97	>97.0%(GC)	G	500mg	￥15,000

マイクロチューブ 0.5mL用アダプター
0.5mL adapter, Microcentrifuge tube rack

70027-06	BRA（780608）	実験器具用	20個	￥2,800

アダプター 毛細管用
Adapter for capillaries

70005-72	BRA（25933）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥1,200

アダプター パスツールピペット用
Adapter for Pasteur pipettes

70005-75	BRA（25960）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥1,200

アダプター ピペットチップ用
Adapter for pipette tips

70005-76	BRA（25961）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥1,700

排出チューブアダプター セリペッタープロ用
Adapter, discharge tube, seripettor[R]*pro*

70005-63	BRA（6208）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥5,500

吸引チューブアダプター セリペッタープロ用
Adapter, filling valve, seripettor[R]*pro*

70005-64	BRA（6707）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥3,600

25mL、50mLPD-チップ用アダプター ハンディステップ、ハンディステップS用
Adapter, PD-Tips 25mL and 50mL, HandyStep[R] and HandyStep[R]S

70023-65	BRA（702398）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	10個	￥5,000

アダプターケース,白色
Adapter housing accu-jet[R]S, white

70263-54	BRA（26658）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥2,200

アダプターサポート ダークブルー アキュジェットプロ用
Adapter housing dark-blue, accu-jet[R]*pro*

70266-52	BRA（26652）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥2,200

アダプターサポート グリーン アキュジェットプロ用
Adapter housing green, accu-jet[R]*pro*

70266-54	BRA（26654）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥2,200

アダプターサポート マゼンタ アキュジェットプロ用
Adapter housing magenta, accu-jet^{R}*pro*

70266-53	BRA（26653）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥2,200

アダプターサポート ロイヤルブルー アキュジェットプロ用
Adapter housing royal-blue, accu-jet^{R}*pro*

70266-55	BRA（26655）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥2,200

25mL、50mLPD-チップ用アダプター 滅菌済 ハンディステップ、ハンディステップS用
Adapter sterile, PD-Tips 25mL and 50mL, HandyStep^{R} and HandyStep^{R}S

70023-66	BRA（702399）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	5個	￥5,000

アダプターサポート (ブルー)
Adapter support, blue

70260-54	BRA（26221）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥1,200

アダプターサポート (グリーン)
Adapter support, green

70260-56	BRA（26223）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥1,200

アダプターサポート マクロピペットコントローラー用
Adapter support, macro pipette controller

70260-48	BRA（26220）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥1,200

アダプターサポート (マゼンダ)
Adapter support, magenta

70260-55	BRA（26222）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1pack	￥1,200

アデニン
Adenine

警告

$C_5H_5N_5$...135.12 ［変］
CAS RN® ［73-24-5］ mp360℃(dec.)†

01086-30	>97.0%(UV-VIS)	鹿特級	G	25g	￥7,000

アデニン
Adenine

警告

$C_5H_5N_5$...135.12 ［変］
CAS RN® ［73-24-5］ mp360℃～365℃

14744-1A	TFS（14744-0250）			25g	￥9,700
14744-2A	TFS（14744-1000）			100g	￥24,500
14744-3A	TFS（14744-5000）			500g	￥106,400

アデニン-2-d_1
Adenine-2-d_1

$C_5H_5DN_5$...136.13 ［変］
CAS RN® ［109923-52-6］

49145-27	CDN（D-6291）	97 atom% D		100mg	￥66,000

アデニン硫酸塩
Adenine sulfate

$C_5H_5N_5 \cdot 0.5H_2SO_4$...184.16
CAS RN® ［321-30-2］ mp205℃～215℃▲

16363-1A	TFS（16363-0250）			25g	￥11,900
16363-2A	TFS（16363-1000）			100g	￥33,500

アデニン硫酸塩二水和物(硫酸アデニン)
Adenine sulfate dihydrate

警告

$(C_5H_5N_5)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot 2H_2O$...404.36
CAS RN® [6509-19-9] mp285℃(dec.)†

01638-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥14,000

アデノシン
Adenosine

$C_{10}H_{13}N_5O_4$...267.24
CAS RN® [58-61-7] mp233℃～238℃▲

01087-32	>98.0%(HLC)		G	25g	￥5,500
01087-52	>98.0%(HLC)		G	5g	￥2,400
16404-1A	TFS（16404-0050）			5g	￥5,400
16404-2A	TFS（16404-0250）			25g	￥18,300

アデノシン
Adenosine

$C_{10}H_{13}N_5O_4$...267.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [58-61-7]

49871-49	PHY（80977）		天然物化学研究用	100mg	￥22,500

アデノシン-2-d_1
Adenosine-2-d_1

$C_{10}H_{12}DN_5O_4$...268.24
CAS RN® [109923-50-4]

49120-35	CDN（D-1827）	98 atom% D		50mg	￥60,500

アデノシン5′-二りん酸二ナトリウム *n* 水和物
Adenosine 5′-diphosphate disodium salt *n*-hydrate

$C_{10}H_{13}N_5O_{10}Na_2P_2 \cdot nH_2O$ [凍] -20℃以下
CAS RN® [16178-48-6]

16467-1A	TFS（16467-0010）			1g	￥15,500
16467-2A	TFS（16467-0050）			5g	￥59,300

アデノシン5′-一りん酸
Adenosine 5′-monophosphate

$C_{10}H_{14}N_5O_7P$...347.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［61-19-8］ mp178℃～185℃▲

10279-1A	TFS（10279-0050）	5g	￥8,800
10279-2A	TFS（10279-0250）	25g	￥38,400

アデノシン-5三リン酸(ATP)
Adenosine-5Triphosphate(ATP)

［凍］ -20℃以下

10mM

49889-16	NEB（P0756S）	1mL	￥6,200
49889-17	NEB（P0756L）	5mL	￥24,500

アデノシン5′-三りん酸二ナトリウム水和物
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate

$C_{10}H_{14}N_5O_{13}Na_2P_3 \cdot nH_2O$ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［34369-07-8］ mp188℃～190℃▲

10280-1A	TFS（10280-0100）	10g	￥19,600

アデノシン5′-三りん酸二ナトリウム三水和物
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate

$C_{10}H_{14}N_5O_{13}P_3Na_2 \cdot 3H_2O$...605.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［51963-61-2］

01091-62	>90.0%(UV-VIS)	G	1g	￥4,500

S-アデノシルメチオニン (SAM) (32mM)
S-Adenosylmethionine (SAM) (32mM)

［凍］ -20℃以下

32mM

49882-74	NEB（B9003S）	0.5mL	￥6,400

S-アデノシル-*L*-メチオニン-d_3(*S*-メチル-d_3)四(*p*-トルエンスルホン酸)塩
S-Adenosyl-*L*-methionine-d_3 (*S*-methyl-d_3) tetra(*p*-toluenesulfonate) salt

$C_{15}H_{19}D_3N_6O_5S \cdot 4CH_3C_6H_4SO_3H$...1090.27 ［凍］ -20℃以下

49120-36	CDN（D-4093）	99 atom% D	10mg	￥140,400

アデニレートキナーゼ
Adenylate kinase

［凍］ -20℃以下

from Bacillus stearothermophilus,freezedry

49119-01	ニプロ（13301）	500U	￥10,000

アジピン酸
Adipic acid

警告

$HOOC(CH_2)_4COOH$...146.14 ［労］57,57-2
CAS RN® ［124-04-9］ mp152℃ †

01093-00	>98.5%(T)	鹿特級	P	500g	￥3,100
01093-01	>97.5%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,800
01141-08	>98.5%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥3,900

アジピン酸
Adipic acid

警告

$HOOC(CH_2)_4COOH$...146.14 ［労］57,57-2
CAS RN® ［124-04-9］ bp265℃ mp151℃～153℃ Fp196℃

10281-1A	TFS（10281-0010）	1kg	￥4,400
10281-2A	TFS（10281-0025）	2.5kg	￥7,000
10281-4A	TFS（10281-0250）	25kg	￥37,700
10281-5A	TFS（10281-5000）	500g	￥2,900

アジピン酸ジヒドラジド
Adipic dihydrazide

警告

$C_6H_{14}N_4O_2$...174.20
CAS RN® [1071-93-8] mp178℃～182℃▲

01107-02	>97.0%(HLC)			500g	￥11,500
01107-32	>97.0%(HLC)			25g	￥1,800
20331-1A	TFS（20331-0250）			25g	￥6,700

アジピンケトン → シクロペンタノン

アジポニトリル
Adiponitrile

危険

$NC(CH_2)_4CN$...108.14 ［劇］III ［危］4-3-III ［労］57,57-2
CAS RN® [111-69-3] bp295℃† mp2.3℃† d(20/4℃) 0.965† Fp93℃†

01094-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	￥1,900

アドニトール → リビトール

アドニトール
Adonitol

$HOCH_2(CHOH)_3CH_2OH$...152.14
CAS RN® [488-81-3] mp101℃～104℃

16703-1A	TFS（16703-0050）			5g	￥6,400
16703-2A	TFS（16703-0100）			10g	￥11,000
16703-3A	TFS（16703-1000）			100g	￥64,200

l-アドレナリン
l-Adrenaline

危険

$(OH)_2C_6H_3CH(OH)CH_2NHCH_3$...183.20
CAS RN® [51-43-4] mp211℃～212℃†

01650-60	>98.0%(T)	鹿特級		1g	￥8,000

アドレノクロムセミカルバゾン標準品
Adrenochrome semicarbazone standard

$C_{10}H_{12}N_4O_3$...236.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［69-81-8］

49860-79	DES（C10045850）	環境分析用	100mg	￥23,000

アエゲリン
Aegeline

$C_{18}H_{19}NO_3$...297.34
CAS RN® ［456-12-2］

49870-47	PHY（83467）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アフィドピロペン標準品
Afidopyropen standard

$C_{33}H_{39}NO_9$...593.66 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［915972-17-7］

49867-61	DES（C10047000）	残留農薬試験用	25mg	￥24,000

$^{13}C_{17}$-アフラトキシンB_1標準液
$^{13}C_{17}$-Aflatoxin B_1 standard solution

$^{13}C_{17}H_{12}O_6$...329.14 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。0.5mg/L アセトニトリル溶液

49160-24	B.P.（10002818）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

$^{13}C_{17}$-アフラトキシンB_2標準液
$^{13}C_{17}$-Aflatoxin B_2 standard solution

$^{13}C_{17}H_{14}O_6$...331.16 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。0.5mg/L アセトニトリル溶液

49160-43	B.P.（10002819）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

アフラトキシンB$_1$標準品
Aflatoxin B$_1$ standard

$C_{17}H_{12}O_6$...312.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1162-65-8］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49160-26	B.P.（10000311）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mg	￥70,000

アフラトキシンB$_1$標準液
Aflatoxin B$_1$ standard solution

$C_{17}H_{12}O_6$...312.27 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57-2 ［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1162-65-8］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。2mg/L アセトニトリル溶液

49150-18	B.P.（10000340）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥50,000
49150-34	B.P.（10003652）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥36,000

アフラトキシンB$_2$標準品
Aflatoxin B$_2$ standard

$C_{17}H_{14}O_6$...314.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7220-81-7］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49160-27	B.P.（10000312）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mg	￥100,000

アフラトキシンB$_2$標準液
Aflatoxin B$_2$ standard solution

危険

$C_{17}H_{14}O_6$...314.28 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57-2 ［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［7220-81-7］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。0.5mg/L アセトニトリル溶液

49150-19	B.P.（10000341）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥50,000
49150-35	B.P.（10003653）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥36,000

$^{13}C_{17}$-アフラトキシンG_1標準液
$^{13}C_{17}$-Aflatoxin G_1 standard solution

$^{13}C_{17}H_{12}O_7$...345.14 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。0.5mg/L アセトニトリル溶液

49160-44	B.P.（10002820）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

$^{13}C_{17}$-アフラトキシンG_2標準液
$^{13}C_{17}$-Aflatoxin G_2 standard solution

$^{13}C_{17}H_{14}O_7$...347.16 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。0.5mg/L アセトニトリル溶液

49160-45	B.P.（10002822）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

アフラトキシンG_1標準品
Aflatoxin G_1 standard

$C_{17}H_{12}O_7$...328.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1165-39-5］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49160-28	B.P.（10000313）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mg	￥110,000

アフラトキシンG_1標準液
Aflatoxin G_1 standard solution

危険

$C_{17}H_{12}O_7$...328.27 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1165-39-5］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。2mg/L アセトニトリル溶液

49150-20	B.P.（10000342）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥50,000
49150-36	B.P.（10003654）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥36,000

アフラトキシンG_2標準品
Aflatoxin G_2 standard

$C_{17}H_{14}O_7$...330.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7241-98-7］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49160-32	B.P.（10000314）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mg	☆

アフラトキシンG_2標準液
Aflatoxin G_2 standard solution

$C_{17}H_{14}O_7$...330.28 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［7241-98-7］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。0.5mg/L アセトニトリル溶液

49150-21	B.P.（10000343）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥50,000
49150-37	B.P.（10003655）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥36,000

$^{13}C_{17}$-アフラトキシンM_1標準液
$^{13}C_{17}$-Aflatoxin M_1 standard solution

$^{13}C_{17}H_{12}O_7$...345.14 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。0.5mg/L アセトニトリル溶液

49160-65	B.P.（10002832）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

アフラトキシンM_1標準液
Aflatoxin M_1 standard solution

$C_{17}H_{12}O_7$...328.27 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［6795-23-9］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。0.5mg/L アセトニトリル溶液

49150-22	B.P.（10000349）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥58,000
49150-38	B.P.（10003661）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥37,000

β-アガラーゼI
β-Agarase I

［凍］ -20℃以下

1,000units/mL

49887-01	NEB（M0392S）		100units	￥16,400
49887-02	NEB（M0392L）		500units	￥65,200

アガロース
Agarose

CAS RN® ［9012-36-6］

23902-2A	TFS（23902-1000）		100g	￥26,200
23902-3A	TFS（23902-5000）		500g	￥105,000

アガロース KANTO
Agarose KANTO

CAS RN®［9012-36-6］				
01097-23	電気泳動用	P	100g	￥11,000
01097-79	電気泳動用	P	1kg	☆

アガロース KANTO HC(短フラグメント用)
Agarose KANTO HC

CAS RN®［9012-36-6］				
01089-23	電気泳動用	P	100g	￥27,000
01089-79	電気泳動用	P	1kg	☆

アガロース KANTO LE(低電気浸透度)
Agarose KANTO LE

CAS RN®［9012-36-6］				
01098-23	電気泳動用	P	100g	￥20,000
01098-79	電気泳動用	P	1kg	☆

アガロース KANTO LM(低融点)
Agarose KANTO LM

CAS RN®［9012-36-6］				
01096-96	電気泳動用	P	50g	￥19,000
01096-08	電気泳動用	P	500g	☆

アガロース KANTO ME(中電気浸透度)
Agarose KANTO ME

CAS RN®［9012-36-6］				
01088-23	電気泳動用	P	100g	￥18,000
01088-79	電気泳動用	P	1kg	☆

アガロース KANTO S
Agarose KANTO S

CAS RN® [9012-36-6]				
01095-23	電気泳動用		100g	￥12,500
01095-79	電気泳動用		1kg	☆

アガロース KANTO ST(高ゲル強度)
Agarose KANTO ST

CAS RN® [9012-36-6]				
01090-23	電気泳動用		100g	￥20,000
01090-79	電気泳動用		1kg	☆

アガロース低電気浸透度(Mr<=0.07)
Agarose low EEO, for electrophoresis, (Mr<=0.07)

CAS RN® [9012-36-6]			
15982-1A	TFS（15982-0100）	10g	￥12,400
15982-2A	TFS（15982-0250）	25g	￥18,200

アガロース中電気浸透度(Mr=0.16-0.19)
Agarose medium EEO, for electrophoresis, (Mr= 0.16 - 0.19)

CAS RN® [9012-36-6]			
40042-1A	TFS（40042-1000）	100g	￥26,700
40042-2A	TFS（40042-0250）	25g	￥9,300

アガロース中低電気浸透度(Mr=0.12)
Agarose medium-low EEO, for electrophoresis, (Mr=0.12)

CAS RN® [9012-36-6]			
40041-1A	TFS（40041-0250）	25g	￥7,800
40041-2A	TFS（40041-1000）	100g	￥23,800
40041-3A	TFS（40041-5000）	500g	￥72,200

アガロース,免疫拡散グレード
Agarose, Immunodiffusion Grade

CAS RN®［9012-36-6］

952014-N	MP（952014）		50g	￥29,200

アグヌシド
Agnuside

$C_{22}H_{26}O_{11}$...466.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［11027-63-7］

49060-14	PHY（89155）	天然物化学研究用	10mg	￥56,000

アグロチェックほう素テスト
Agrocheck boron test

［冷］ 0℃～6℃

01871-96		簡易分析ｷｯﾄ	1pack(100回分)	￥15,000

アグロチェックグルタミン酸テスト
Agrocheck glutamic acid test

［冷］ 0℃～6℃

01874-96		簡易分析ｷｯﾄ	1pack(50回分)	￥18,000

アグロチェックマグネシウムテスト
Agrocheck magnesium test

危険

［冷］ 0℃～6℃

01872-96		簡易分析ｷｯﾄ	1pack(100回分)	￥15,000

アジュマリシン
Ajmalicine

$C_{21}H_{24}N_2O_3$...352.42
CAS RN®［483-04-5］

49060-16	PHY（82463）	天然物化学研究用	25mg	￥46,000

アジュゴル
Ajugol

$C_{15}H_{24}O_9$...348.34 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［52949-83-4］

49871-50	PHY（84198）		天然物化学研究用	10mg	￥40,000

アクロミド標準品
Aklomide standard

$C_7H_5ClN_2O_3$...200.57 ［危］5-NC-2-II
CAS RN®［3011-89-0］ mp172℃†

01936-96		>98.0%(HLC)	食品分析用	200mg	￥5,500

アラクロール標準品
Alachlor standard

警告

$C_{14}H_{20}ClNO_2$...269.76 ［PRTR］1-101 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［15972-60-8］

49802-37	DES（C10060000）		残留農薬試験用	250mg	￥14,000

アラクロール-d_{13}
Alachlor-d_{13}

$C_{14}H_7D_{13}ClNO_2$...282.84 ［PRTR］1-101
CAS RN®［1015856-63-9］

49120-38	CDN（D-5918）	98 atom% D		50mg	￥123,200

L-アラニル-*L*-グルタミン 100x, 液体
L-Ala-*L*-Glutamine 100x, Liquid

［冷］ 2℃～8℃

49433-16	BIOCO（5-10K50-H）			100mL	￥9,000

L-アラニル-*L*-グルタミン, 粉末
L-Ala-*L*-Glutamine (Stable Glutamine), Powder

49433-68	BIOCO（CN-38-O）			100g	￥60,000
49433-69	BIOCO（CN-38-R）			500g	￥245,000

D-アラニン
D-Alanine

$CH_3CH(NH_2)COOH$...89.09
CAS RN® [338-69-2] mp289℃～291℃†

01651-60		>98.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥2,900
17208-1A	TFS（17208-0050）				5g	￥5,800
17208-2A	TFS（17208-0250）				25g	￥17,800

D-アラニン-2,3,3,3-d_4
D-Alanine-2,3,3,3-d_4

$CD_3CD(NH_2)COOH$...93.11
CAS RN® [1202063-27-1]

49145-28	CDN（D-6346）	98 atom% D			250mg	￥70,400

D-アラニン-2-d_1
D-Alanine-2-d_1

$CH_3CD(NH_2)COOH$...90.09
CAS RN® [56595-54-1]

49120-39	CDN（D-1274）				500mg	￥88,000

D-アラニン-3,3,3-d_3
D-Alanine-3,3,3-d_3

$CD_3CH(NH_2)COOH$...92.11
CAS RN® [177614-69-6]

49120-40	CDN（D-2560）	99 atom% D			250mg	￥70,400

D L-アラニン
DL-Alanine

$CH_3CH(NH_2)COOH$...89.09
CAS RN® [302-72-7] mp297℃†

01100-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,900
15909-1A	TFS（15909-1000）				100g	￥3,800
15909-2A	TFS（15909-5000）				500g	￥9,300

D L-アラニン-2,3,3,3-d_4
DL-Alanine-2,3,3,3-d_4

$CD_3CD(NH_2)COOH$...93.11
CAS RN® [53795-92-9]

49120-43	CDN（D-92）	98 atom% D			1g	￥44,000

D L-アラニン-2-d_1
DL-Alanine-2-d_1

$CH_3CD(NH_2)COOH$...90.09
CAS RN® [31024-91-6]

49120-41	CDN（D-1457）	98 atom% D			500mg	￥44,000

D L-アラニン-3,3,3-d_3
DL-Alanine-3,3,3-d_3

$CD_3CH(NH_2)COOH$...92.11
CAS RN® [53795-94-1]

49120-42	CDN（D-1462）	99 atom% D			1g	￥39,600

L-アラニン
L-Alanine

$CH_3CH(NH_2)COOH$...89.09
CAS RN® [56-41-7] mp297℃(dec.)†

01101-30		>99.0%(T)	特級	G	25g	￥3,900
01101-60		>99.0%(T)	特級	G	1g	￥1,700
10283-1A	TFS（10283-1000）				100g	￥8,300
10283-2A	TFS（10283-0250）				25g	￥3,400

L-アラニン
L-Alanine

$C_3H_7NO_2$...89.09
CAS RN® [56-41-7]

49871-51	PHY（80344）		天然物化学研究用		100mg	￥22,500

L-アラニン
L-Alanine

49433-70	BIOCO（CN-9002-O）		100g	￥12,500
49433-71	BIOCO（CN-9002-R）		500g	￥46,000

L-アラニン CRM6011-a
L-Alanine, CRM6011-a

$CH_3CH(NH_2)COOH$...89.09 保存 15℃
CAS RN® [56-41-7]

Certified value:99.9±0.2%

49004-57	NMI（CRM6011-a）	認証標準物質	0.5g	☆

L-アラニン-2,3,3,3-d_4
L-Alanine-2,3,3,3-d_4

$CD_3CD(NH_2)COOH$...93.11
CAS RN® [18806-29-6]

49120-46	CDN（D-1488）	98 atom% D	500mg	￥33,000

L-アラニン-2-d_1
L-Alanine-2-d_1

$CH_3CD(NH_2)COOH$...90.09
CAS RN® [21386-65-2]

49120-44	CDN（D-902）	98 atom% D	500mg	￥81,400

L-アラニン-3,3,3-d_3
L-Alanine-3,3,3-d_3

$CD_3CH(NH_2)COOH$...92.11
CAS RN® [63546-27-0]

49120-45	CDN（D-1297）	99 atom% D	500mg	￥36,300

L-アラニン-d_7
L-Alanine-d_7

$CD_3CD(ND_2)COOD$...96.13
CAS RN® [74280-71-0]

49145-33	CDN（D-3709）	98 atom% D	500mg	￥49,500

L-アラニン-*N*,*N*,*O*-d_3
L-Alanine-*N*,*N*,*O*-d_3

$CH_3CH(ND_2)COOD$...92.11
CAS RN® [19470-97-4]

49148-45	CDN（D-6192）	99 atom% D		1g	￥52,800

β-アラニン
β-Alanine

$NH_2CH_2CH_2COOH$...89.09
CAS RN® [107-95-9] mp196℃～198℃(dec.)†

01102-30		>98.0%(T)	鹿特級	25g	￥2,800

β-アラニン-2,2,3,3-d_4
β-Alanine-2,2,3,3-d_4

$H_2NCD_2CD_2COOH$...93.11
CAS RN® [116173-67-2]

49145-34	CDN（D-6498）	98 atom% D		250mg	￥61,600

L-アラニンベンジルエステル *p*-トルエンスルホナート
L-Alanine benzyl ester *p*-toluenesulfonate

$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot C_7H_8O_3S$...179.21
CAS RN® [42854-62-6]

01652-32		>93.0%		25g	￥10,000
01652-52		>93.0%		5g	￥4,100

D-アラニン-2,3,3,3-d_4-*N*-*t*-Boc
D-Alanine-2,3,3,3-d_4-*N*-*t*-Boc

$C_8H_{11}D_4NO_4$...193.23

49145-30	CDN（D-6666）	98 atom% D		100mg	￥48,400

D-アラニン-3,3,3-d_3-*N*-*t*-Boc
D-Alanine-3,3,3-d_3-*N*-*t*-Boc

$C_8H_{12}D_3NO_4$...192.22
CAS RN® [177614-70-9]

49148-41	CDN（D-5898）	99 atom% D		250mg	￥75,900

L-アラニン-2,3,3,3-d_4-*N*-*t*-Boc
L-Alanine-2,3,3,3-d_4-*N*-*t*-Boc

$C_8H_{11}D_4NO_4$...193.23
CAS RN® [714964-61-1]

49120-50	CDN（D-5722）	98 atom% D	500mg	￥70,400

L-アラニン-2-d_1-*N*-*t*-Boc
L-Alanine-2-d_1-*N*-*t*-Boc

$C_8H_{14}DNO_4$...190.21
CAS RN® [88181-11-7]

49148-43	CDN（D-3978）	98 atom% D	250mg	￥96,800

L-アラニン-3,3,3-d_3-*N*-*t*-Boc
L-Alanine-3,3,3-d_3-*N*-*t*-Boc

$C_8H_{12}D_3NO_4$...192.22
CAS RN® [161602-47-7]

49120-49	CDN（D-3872）	99 atom% D	500mg	￥49,500

D-アラニン *tert*-ブチルエステル塩酸塩
D-Alanine *tert*-butyl ester hydrochloride

$C_7H_{15}NO_2$·HCl...181.65
CAS RN® [59531-86-1]

02120-52	>97.0%(T)	G	5g	￥24,000
02120-62	>97.0%(T)	G	1g	￥7,500

β-アラニン *tert*-ブチルエステル塩酸塩
β-Alanine *tert*-butyl ester hydrochloride

$C_7H_{15}NO_2$·HCl...181.65 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [58620-93-2]

02121-32	>95.0%	G	25g	￥19,000
02121-52	>95.0%	G	5g	￥5,800

β-アラニン-*tert*-ブチルエステル塩酸塩 → H-βAla-OtBu塩酸塩

アラニン脱水素酵素
Alanine dehydrogenase

［凍］ -20℃以下

from Bacillus stearothermophilus,freezedry

49119-02	ニプロ（13309）		500U	￥10,000

D L-アラニンエチルエステル塩酸塩
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride

$C_5H_{11}NO_2$･HCl...153.60
CAS RN® ［617-27-6］ mp87℃▲

40043-1A	TFS（40043-0250）		25g	￥16,900

β-アラニンエチルエステル塩酸塩
β-Alanine ethyl ester hydrochloride

$C_5H_{11}NO_2$･HCl...153.60
CAS RN® ［4244-84-2］ mp67℃～70℃†

01605-32		>95.0%	25g	￥10,000
01605-52		>95.0%	5g	￥4,000
30306-1A	TFS（30306-0100）		10g	￥7,600

D-アラニン-2,3,3,3-d_4-*N*-Fmoc
D-Alanine-2,3,3,3-d_4-*N*-Fmoc

$C_{18}H_{13}D_4NO_4$...315.35

49145-31	CDN（D-6667）	98 atom% D	100mg	￥55,000

D-アラニン-3,3,3-d_3-*N*-Fmoc
D-Alanine-3,3,3-d_3-*N*-Fmoc

$C_{18}H_{14}D_3NO_4$...314.34

49148-42	CDN（D-6665）	99 atom% D	100mg	￥57,200

D L-アラニン-2-d_1-*N*-Fmoc
DL-Alanine-2-d_1-*N*-Fmoc

$C_{18}H_{16}DNO_4$...312.33

49145-32	CDN（D-7248）	98 atom% D	250mg	￥51,700

L-アラニン-2,3,3,3-d_4-*N*-Fmoc
L-Alanine-2,3,3,3-d_4-*N*-Fmoc

$C_{18}H_{13}D_4NO_4$...315.35
CAS RN® [225101-69-9]

49120-53	CDN（D-5723）	98 atom% D		500mg	￥88,000

L-アラニン-2-d_1-*N*-Fmoc
L-Alanine-2-d_1-*N*-Fmoc

$C_{18}H_{16}DNO_4$...312.33
CAS RN® [225101-64-4]

49148-44	CDN（D-6127）	98 atom% D		250mg	￥92,400

L-アラニン-3,3,3-d_3-*N*-Fmoc
L-Alanine-3,3,3-d_3-*N*-Fmoc

$C_{18}H_{14}D_3NO_4$...314.34
CAS RN® [284665-07-2]

49120-52	CDN（D-5721）	99 atom% D		500mg	￥52,800

L-アラニンメチルエステル塩酸塩
L-Alanine methyl ester hydrochloride

$C_4H_9NO_2$･HCl...139.57
CAS RN® [2491-20-5] mp109℃～111℃▲

01594-32		>95.0%	G	25g	￥10,000
01594-52		>95.0%	G	5g	￥4,000
30836-1A	TFS（30836-0250）			25g	￥14,900
30836-2A	TFS（30836-0050）			5g	￥4,500

β-アラニンメチルエステル塩酸塩
β-Alanine methyl ester hydrochloride

$C_4H_9NO_2$･HCl...139.57
CAS RN® [3196-73-4] mp103℃～105℃▲

01391-32		>95.0%	G	25g	￥10,000
01391-52		>95.0%	G	5g	￥4,000
37147-1A	TFS（37147-0050）			5g	￥9,600
37147-2A	TFS（37147-0250）			25g	￥31,700

アラントラクトン
Alantolactone

$C_{15}H_{20}O_2$...232.31
CAS RN® [546-43-0]

49060-17	PHY（89156）		天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アラニカルブ標準品
Alanycarb standard

危険

$C_{17}H_{25}N_3O_4S_2$...399.53 [劇] III [PRTR] 1-52 [凍] -20℃以下
CAS RN® [83130-01-2]

49833-13	DES（C10063000）		残留農薬試験用	100mg	￥51,000

アラニカルブ標準品
Alanycarb standard

危険

$C_{17}H_{25}N_3O_4S_2$...399.53 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [83130-01-2] mp46.6℃～47.0℃▲

02009-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥22,000

アラニカルブ標準液
Alanycarb standard solution

危険

$C_{17}H_{25}N_3O_4S_2$...399.53 [劇] III [危] 4-1-II [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [83130-01-2]

100mg/L シクロヘキサン溶液

49831-68	DES（XA10063000CY）		残留農薬試験用	1mL	￥20,000

N-β-アラニル-*L*-ヒスチジン → *L*-カルノシン

アラー標準品 → ダミノジッド標準品

アルベンダゾール標準品
Albendazole standard

警告

$C_{12}H_{15}N_3O_2S$...265.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［54965-21-8］ mp208℃～210℃ †

01514-96		>96.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥9,000
49831-25	DES（C10065000）		食品分析用		100mg	￥29,000

アルベンダゾール-2-アミノスルホン標準品
Albendazole-2-aminosulfone standard

$C_{10}H_{13}N_3O_2S$...239.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［80983-34-2］

49833-37	DES（C10065200）	食品分析用	50mg	￥44,000

アルビフロリン
Albiflorin

$C_{23}H_{28}O_{11}$...480.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［39011-90-0］

49060-18	PHY（89833）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

アルブミン,ウシ
Albumin, Bovine

［冷］ 0℃～5℃

810133-N	MP（810133）	50mL	￥32,000
810061-N	MP（810061）	50mL	￥35,000
810101-N	MP（810101）	50mL	☆
810111-N	MP（810111）	50mL	￥55,100

アルブミン,ウシ
Albumin, Bovine

［冷］ 0℃～5℃

840042-N	MP（840042）			50g	￥35,000
840043-N	MP（840043）			100g	￥57,900
840532-N	MP（840532）			50g	☆
840533-N	MP（840533）			100g	☆
810032-N	MP（810032）			50g	￥25,300
810033-N	MP（810033）			100g	￥57,000
810034-N	MP（810034）			500g	☆
810661-N	MP（810661）			50g	￥31,900
810667-N	MP（810667）			1kg	☆
840052-N	MP（840052）	Microbiological Grade		50g	￥19,300
810013-N	MP（810013）			10g	￥51,500
810683-N	MP（810683）			100g	￥85,400
820451-N	MP（820451）			100g	☆

アルブミン(卵製,粉末)
Albumin, egg

CAS RN®［9006-59-1］

01103-01	鹿1級	P	500g	￥6,500
01103-31	鹿1級	G	25g	￥2,100

アルブミン(卵製,粉末)
Albumin, from egg, powder

CAS RN®［9006-59-1］ mp60℃

40045-1A	TFS（40045-0500）	50g	￥6,700
40045-2A	TFS（40045-1000）	100g	￥8,600
40045-3A	TFS（40045-5000）	500g	￥24,700

アルブミン,ヒト
Albumin, Human

［冷］ 0℃～5℃

823031-N	MP（823031）		1g	￥20,000
823032-N	MP（823032）		5g	￥57,700
823022-N	MP（823022）		10g	☆
823030-N	MP（823030）		500mg	￥7,300
810171-N	MP（810171）		50mL	￥35,000
823051-N	MP（823051）		50mL	￥81,900
823234-N	MP（823234）		5g	￥75,300
823002-N	MP（823002）		10g	☆

アルブテロール-d_3(3-ヒドロキシメチル-d_2;α-d_1)
Albuterol-d_3 (3-hydroxymethyl-d_2;α-d_1)

$C_{13}H_{18}D_3NO_3$...242.32
CAS RN®［1219798-60-3］

49120-55	CDN（D-5921）	98 atom% D	10mg	￥88,000

アルシアンブルー8GX
Alcian blue 8 GX

［労］57-2

5234-1M	M（1.05234.0010）	顕微鏡用	10g	￥58,300

アルシアンブルー染色液
Alcian blue solution

［労］57,57-2

1647-1M	M（1.01647.0500）	顕微鏡用	500mL	￥17,500

アルコール脱水素酵素
Alcohol dehydrogenase

［凍］ -20℃以下

from Zymomonas mobilis,freezedry

49119-03	ニプロ（13402）		1000U	￥18,000

アルデヒド類-2,4-DNPH混合標準原液(GC用)
Aldehydes-2,4-DNPH standard stock solution, for GC

危険

［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
Fp-4℃†

ホルムアルデヒド-2,4-DNPH 0.700mg/mL(ホルムアルデヒドとして0.1mg/mL),アセトアルデヒド-2,4-DNPH 0.509mg/mL(アセトアルデヒドとして0.1mg/mL)酢酸エチル溶液

01105-96	大気汚染物質測定用		2mL×5	￥14,000

アルデヒド類-2,4-DNPH混合標準原液(HPLC用)
Aldehydes-2,4-DNPH standard stock solution, for HPLC

危険

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
Fp5.6℃†

ホルムアルデヒド-2,4-DNPH 0.700mg/mL(ホルムアルデヒドとして0.1mg/mL),アセトアルデヒド-2,4-DNPH 0.509mg/mL(as アセトアルデヒドとして0.1mg/mL)アセトニトリル溶液

01104-96	大気汚染物質測定用		2mL×5	￥14,000

アルデヒド類-2,4-DNPH混合標準原液II(10種混合)
Aldehydes-2,4-DNPH standard stock solution II

危険

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

各0.1mg/mL アセトニトリル溶液.ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,アクロレイン,アセトン,プロピオンアルデヒド,クロトンアルデヒド,ブチルアルデヒド,ベンズアルデヒド,イソ吉草酸アルデヒド,バレルアルデヒド.

01106-96	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ測定用		2mL×5	￥23,000

アルジカルブ標準品
Aldicarb standard

危険

$C_7H_{14}N_2O_2S$...190.26 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［116-06-3］

49801-01 DES（C10070000）	残留農薬試験用		100mg	￥13,000

アルジカルブオキシム標準液
Aldicarb-oxime standard solution

危険

$C_5H_{11}NOS$...133.21 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1646-75-9］

10mg/L アセトニトリル溶液

49828-06	DES（LA10079500AL）	残留農薬試験用	1mL	￥61,000

アルジカルブスルホン標準品
Aldicarb-sulfone standard

$C_7H_{14}N_2O_4S$...222.26 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1646-88-4］

49803-97	DES（C10080000）	残留農薬試験用	100mg	￥23,000

アルジカルブスルホン-d_3標準液
Aldicarb-sulfone-d_3 standard solution

$C_7H_{11}D_3N_2O_4S$...225.28 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1795135-15-7］

100mg/L アセトン溶液

49863-79	DES（XA10080100AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥34,000

アルジカルブスルホキシド標準品
Aldicarb-sulfoxide standard

$C_7H_{14}N_2O_3S$...206.26 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1646-87-3］

49803-06	DES（C10080500）	残留農薬試験用	100mg	￥34,000

アルドステロン
Aldosterone

$C_{21}H_{28}O_5$...360.44
CAS RN®［52-39-1］

21536-1A	TFS（21536-0050）		5mg	￥15,200
21536-2A	TFS（21536-0250）		25mg	￥49,800
21536-3A	TFS（21536-1000）		100mg	￥151,400

アルドステロン分析用ヒト血清(3濃度レベル) CRM6402-b
Aldosterone in Human Serum(3 Concentration Levels), CRM6402-b

［凍］ -20℃以下

49875-24	NMI（CRM6402-b）	認証標準物質	1pack	☆

アルドリン標準品
Aldrin standard

危険

$C_{12}H_8Cl_6$...364.90［審］-1［劇］II［労］57,57-2［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［309-00-2］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49830-89	DES（C10090000）	残留農薬試験用	250mg	￥20,000

アレンドロン酸-2,2,3,3,4,4-d_6
Alendronic-2,2,3,3,4,4-d_6 acid

$C_4H_7D_6NO_7P_2$...255.13
CAS RN®［1035437-39-8］

49144-40	CDN（D-6880）	99 atom% D	50mg	☆

アルウリチン酸
Aleuritic acid

$C_{16}H_{32}O_5$...304.42
CAS RN®［533-87-9］ mp88℃～94℃▲

13373-1A	TFS（13373-0250）		25g	￥27,100

アルフゾシン-d_7塩酸塩(テトラヒドロフロイル-d_7)
Alfuzosin-d_7 hydrochloride (tetrahydrofuroyl-d_7)

49145-35	CDN（D-7228）	98 atom% D	5mg	￥99,000

アルギン酸
Alginic acid

$C_6H_{12}O_3$...132.15
CAS RN®［9005-32-7］ mp>300℃▲

27058-1A	TFS（27058-1000）		100g	￥7,800

アルギン酸ナトリウム
Alginic acid, sodium salt

CAS RN® [9005-38-3]

17777-1A	TFS（17777-0050）		5g	￥7,700
17777-2A	TFS（17777-2500）		250g	￥9,300
17777-3A	TFS（17777-5000）		500g	￥13,700

アリソルA
Alisol A

$C_{30}H_{50}O_5$...490.71
CAS RN® [19885-10-0]

49871-52	PHY（83835）	天然物化学研究用	10mg	￥57,000

アリソルA 24-アセテート
Alisol A 24-acetate

$C_{32}H_{52}O_6$...532.75
CAS RN® [18674-16-3]

49871-53	PHY（83836）	天然物化学研究用	10mg	￥48,000

アリソルB
Alisol B

$C_{30}H_{48}O_4$...472.69
CAS RN® [18649-93-9]

49871-54	PHY（84199）	天然物化学研究用	10mg	￥57,000

アリソルB 23-アセテート
Alisol B 23-acetate

$C_{32}H_{50}O_5$...514.73
CAS RN® [26575-95-1]

49871-55	PHY（82464）	天然物化学研究用	10mg	￥46,000

アリザリン
Alizarin

$C_{14}H_8O_4$...240.20 ［変］
CAS RN® ［72-48-0］ bp430℃† mp287℃～289℃†

15369-1A	TFS（15369-0250）		25g	￥4,900
15369-2A	TFS（15369-1000）		100g	￥12,700
15369-3A	TFS（15369-5000）		500g	￥43,700
49870-48	PHY（83274）	天然物化学研究用	25mg	￥43,000

アリザリンコンプレキソン
Alizarin complexon

警告

$C_{19}H_{15}O_8N$...385.32
CAS RN® ［3952-78-1］

01755-60	鹿特級	G	1g	￥12,500
01755-90	鹿特級	G	100mg	￥3,100

アリザリンコンプレキソン二水和物
Alizarin complexone dihydrate

$C_{19}H_{15}NO_8 \cdot 2H_2O$...421.35
CAS RN® ［455303-00-1］ mp190℃▲

15583-1A	TFS（15583-0010）	indicator grade	1g	￥7,800
15583-2A	TFS（15583-0050）	indicator grade	5g	￥29,000

アリザリン-3-メチルアミン-*N*,*N*-二酢酸二水和物 → アリザリンコンプレキソン二水和物

アリザリンレッドS
Alizarin red S

$C_{14}H_5O_2(OH)_2SO_3Na$...342.25
CAS RN® ［130-22-3］

01113-30	特級	G	25g	￥9,500
40048-1A	TFS（40048-0250）	certified	25g	￥7,100

アリザリンイエローR
Alizarin yellow R

$NO_2C_6H_4N:NC_6H_3OHCOONa$...309.20
CAS RN®［1718-34-9］

01117-30	鹿特級	G	25g	￥7,500

アルカリブルー6B
Alkali blue 6B

警告

CAS RN®［30586-13-1］

01118-31	鹿1級	G	25g	￥7,500

アルカリペプトン水(腸炎ビブリオ用)
Alkaline peptone water

警告

保存 10℃～30℃

711503-5	Oxd（CM1028B）		500g	￥13,000

アルキルフェノール類混合標準液(7種)
Alkylphenols standard solution

危険

［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-186［変］［冷］0℃～6℃

各0.1mg/mL (4-ノニルフェノール 1mg/mL) ジクロロメタン溶液.4-*tert*-ブチルフェノール,4-*n*-ヘプチルフェノール,4-*n*-ヘキシルフェノール,4-*n*-オクチルフェノール,4-*tert*-オクチルフェノール,4-*n*-ペンチルフェノール.

01890-96	環境分析用		2mL×5	￥24,000

アルキルフェノール類混合標準原液II(13種)
Alkylphenols standard stock solution II

危険

［劇］III［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-186［変］［冷］0℃～6℃

各0.1mg/mL (ノニルフェノール:1mg/mL) ジクロロメタン溶液.ビスフェノール A,2-*tert*-ブチルフェノール,3-*tert*-ブチルフェノール,4-*tert*-ブチルフェノール,4-*sec*-ブチルフェノール,4-*n*-ブチルフェノール,4-エチルフェノール,4-*n*-ヘプチルフェノール,4-*n*-ヘキシルフェノール,4-*n*-オクチルフェノール,4-*tert*-オクチルフェノール,4-*n*-ペンチルフェノール

01920-96	水質試験用		2mL×5	￥32,000

アラントイン
Allantoin

$C_4H_6N_4O_3$...158.11
CAS RN® [97-59-6] mp230℃～231℃(dec.)†

01564-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,000
10284-1A	TFS（10284-5000）				500g	￥23,900
10284-2A	TFS（10284-1000）				100g	￥6,400

アラントイン
Allantoin

$C_4H_6N_4O_3$...158.11
CAS RN® [97-59-6]

49871-56	PHY（89518）	天然物化学研究用		100mg	￥22,500

アレルゲンアイ ELISA II そば
Allergeneye ELISA II Buckwheat

［冷］ 2℃～8℃

49171-44	プリマ（077852）	1kit	￥78,000

アレルゲンアイ ELISA II 卵
Allergeneye ELISA II Egg

［冷］ 2℃～8℃

49171-41	プリマ（077834）	1kit	￥78,000

アレルゲンアイ ELISA II 牛乳
Allergeneye ELISA II Milk

［冷］ 2℃～8℃

49171-42	プリマ（077836）	1kit	￥78,000

アレルゲンアイ ELISA II 落花生
Allergeneye ELISA II Peanut

［冷］ 2℃～8℃

49171-45	プリマ（077860）	1kit	￥78,000

アレルゲンアイ ELISA II 小麦
Allergeneye ELISA II Wheat

［冷］ 2℃～8℃

49171-43	プリマ（077847）	1kit	￥78,000

アレルゲンアイイムノクロマト アーモンド(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Almond (heated)

保存 30℃以下

49171-66	プリマ（023312）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-67	プリマ（023176）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマトそば(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Buckwheat (heated)

保存 30℃以下

49171-11	プリマ（035019）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-12	プリマ（034874）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマトカゼイン(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Casein (heated)

保存 30℃以下

49171-07	プリマ（034963）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-08	プリマ（034811）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマトカゼイン(未加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Casein (Unheated)

保存 30℃以下

49171-18	プリマ（054150）	1pack(5回分)	￥10,000
49171-19	プリマ（056509）	1pack(20回分)	￥26,000

アレルゲンアイイムノクロマト甲殻類(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Crustacean (heated)

保存 30℃以下

49171-31	プリマ（035030）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-15	プリマ（034903）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマト卵(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Egg (heated)

保存 30℃以下

49171-05	プリマ（035035）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-06	プリマ（034806）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマトSS卵(未加熱用)
Allergeneye immuno chromatography SS Egg (Unheated)

保存 30℃以下

49171-16	プリマ（054147）	1pack(5回分)	￥10,000
49171-17	プリマ（056213）	1pack(20回分)	￥26,000

アレルゲンアイイムノクロマト落花生(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Peanut (heated)

保存 30℃以下

49171-13	プリマ（035022）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-14	プリマ（034900）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマトごま(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Sesame (heated)

保存 30℃以下

49171-48	プリマ（080944）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-49	プリマ（080941）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマト大豆(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Soya (heated)

保存 30℃以下

49171-46	プリマ（080954）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-47	プリマ（080946）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマトくるみ(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Walnut (heated)

保存 30℃以下

49171-73	プリマ（073979）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-74	プリマ（074083）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマトSS小麦(未加熱用)
Allergeneye immuno chromatography SS Wheat (Unheated)

保存 30℃以下

49171-20	プリマ（054231）	1pack(5回分)	￥10,000
49171-21	プリマ（055971）	1pack(20回分)	￥26,000

アレルゲンアイイムノクロマト小麦(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Wheat (heated)

保存 30℃以下

49171-09	プリマ（035001）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-10	プリマ（034845）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイイムノクロマトSSホエー(未加熱用)
Allergeneye immuno chromatography SS Whey (Unheated)

保存 30℃以下

49171-26	プリマ（054192）	1pack(5回分)	￥10,000
49171-27	プリマ（055942）	1pack(20回分)	￥26,000

アレルゲンアイイムノクロマトホエー(加熱用)
Allergeneye immuno chromatography Whey (heated)

保存 30℃以下

49171-28	プリマ（034984）	1pack(5回分)	￥12,000
49171-30	プリマ（034816）	1pack(20回分)	￥32,000

アレルゲンアイクイック そば
Allergeneye Quick Buckwheat

保存 30℃以下

49171-54	プリマ（027868）	1pack(20回分)	￥24,000

アレルゲンアイクイック そば ふき取り綿棒つきパック
Allergeneye Quick Buckwheat Wiping Swab pack

保存 30℃以下

49171-59	プリマ（053088）	1pack(5回分)	￥8,000

アレルゲンアイクイック 甲殻類
Allergeneye Quick Crustacean

保存 30℃以下

49171-55	プリマ（027907）	1pack(20回分)	￥24,000

アレルゲンアイクイック 甲殻類 ふき取り綿棒つきパック
Allergeneye Quick Crustacean Wiping Swab pack

保存 30℃以下

49171-60	プリマ（053185）	1pack(5回分)	￥8,000

アレルゲンアイクイック 卵
Allergeneye Quick Egg

保存 30℃以下

49171-51	プリマ（027616）	1pack(20回分)	￥24,000

アレルゲンアイクイック 卵 ふき取り綿棒つきパック
Allergeneye Quick Egg Wiping Swab pack

保存 30℃以下

49171-56	プリマ（089882）	1pack(5回分)	￥8,000

アレルゲンアイクイック 牛乳(カゼイン)
Allergeneye Quick Milk(Casein)

保存 30℃以下

49171-52	プリマ（027648）	1pack(20回分)	￥24,000

アレルゲンアイクイック 牛乳 ふき取り綿棒つきパック
Allergeneye Quick Milk Wiping Swab pack

保存 30℃以下

49171-57	プリマ（089887）	1pack(5回分)	￥8,000

アレルゲンアイ クイック 落花生
Allergeneye Quick Peanut

保存 30℃以下

49171-61	プリマ（027878）	1pack(20回分)	￥24,000

アレルゲンアイ クイック 落花生 ふき取り綿棒5本付パック
Allergeneye Quick Peanut Wiping Swab pack

保存 30℃以下

49171-62	プリマ（053148）	1pack(5回分)	￥8,000

アレルゲンアイクイック Pluswab 卵
Allergeneye Quick Pluswab Egg

保存 30℃以下

49171-68	プリマ（019517）	1pack(5回分)	￥9,000

アレルゲンアイクイック Pluswab 牛乳(カゼイン)
Allergeneye Quick Pluswab Milk(casein)

保存 30℃以下

49171-69	プリマ（019768）	1pack(5回分)	￥9,000

アレルゲンアイクイック Pluswab 小麦
Allergeneye Quick Pluswab Wheat

保存 30℃以下

49171-70	プリマ（019771）	1pack(5回分)	￥9,000

アレルゲンアイ クイック ごま
Allergeneye Quick Sesami

保存 30℃以下

49171-63	プリマ（027949）	1pack(20回分)	￥24,000

アレルゲンアイ クイック ごま ふき取り綿棒つきパック
Allergeneye Quick Sesami Wiping Swab pack

保存 30℃以下

49171-64	プリマ（053240）	1pack(5回分)	￥8,000

アレルゲンアイ クイック 大豆
Allergeneye Quick Soya

保存 30℃以下

49171-71	プリマ（027933）	1pack(20回分)	￥24,000

アレルゲンアイ クイック 大豆 ふき取り綿棒つきパック
Allergeneye Quick Soya Wiping Swab pack

保存 30℃以下

49171-72	プリマ（053237）	1pack(5回分)	￥8,000

アレルゲンアイクイック 小麦
Allergeneye Quick Wheat

保存 30℃以下

49171-53	プリマ（027826）	1pack(20回分)	￥24,000

アレルゲンアイクイック 小麦 ふき取り綿棒つきパック
Allergeneye Quick Wheat Wiping Swab pack

保存 30℃以下

49171-58	プリマ（053075）	1pack(5回分)	￥8,000

アレスリン標準品
Allethrin standard

警告

$C_{19}H_{26}O_3$...302.40 ［危］4-2-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［584-79-2］ Fp65℃▲

49826-69	DES（CA10100000）	残留農薬試験用	100mg	￥11,000

アリドクロール標準品
Allidochlor standard

$C_8H_{12}ClNO$...173.63 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［93-71-0］

49828-92	DES（C10110000）	残留農薬試験用	100mg	￥14,000

L-(±)-アリイン
L-(±)-Alliin

$C_6H_{11}NO_3S$...177.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［17795-26-5］

49060-20	PHY（89470）	天然物化学研究用	10mg	￥40,000

α-アロクリプトピン
α-Allocryptopine

$C_{21}H_{23}NO_5$...369.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［485-91-6］

49871-57	PHY（89897）	天然物化学研究用	10mg	￥51,000

アロファンアミド → ビウレット

アロプリノール標準品
Allopurinol standard

$C_5H_4N_4O$...136.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［315-30-0］

49863-50	DES（C10118000）	環境分析用		100mg	￥14,000

アロキサン一水和物
Alloxan monohydrate

$C_4H_2N_2O_4 \cdot H_2O$...160.08 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2244-11-3］

21537-1A	TFS（21537-0250）			25g	￥8,800
21537-2A	TFS（21537-0100）			10g	￥5,600

アロキシジムナトリウム標準品
Alloxydim-sodium standard

$C_{17}H_{24}NNaO_5$...345.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［55635-13-7］

49803-13	DES（C10120000）	残留農薬試験用		250mg	￥14,000

アリルアルコール
Allyl alcohol

危険

CH_2:$CHCH_2OH$...58.07 ［毒］II ［危］4-2-S-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-28 ［変］
CAS RN® ［107-18-6］ bp96℃～97℃† mp-50℃† d(20/4℃) 0.8540† Fp21℃†

01124-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥3,600
01124-01	>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥2,900

アリルアミン
Allylamine

危険

CH_2:$CHCH_2NH_2$...57.09 ［毒］II ［危］4-1-S-II ［PRTR］1-26
CAS RN® ［107-11-9］ bp55℃～58℃† mp-88℃† d(20/4℃) 0.763† Fp-29℃†

01125-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥7,500
01125-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,000

アリルアミン臭化水素酸塩
Allylamine hydrobromide

CH_2:$CHCH_2NH_2$･HBr...138.00

49007-01	昭化（0170-0150）	98.5%	500g	￥46,670
49007-02	昭化（0170-0380）	98.5%	15kg	☆

アリルアミン塩酸塩(塩酸アリルアミン)
Allylamine hydrochloride

危険

CH_2:$CHCH_2NH_2$･HCl...93.55
CAS RN® ［10017-11-5］

01126-31		>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥5,100

アリルアミン塩酸塩
Allylamine hydrochloride

CH_2:$CHCH_2NH_2$･HCl...93.55
CAS RN® ［10017-11-5］

49009-35	昭化（0170-2350）	500g	￥168,340
49009-36	昭化（0170-2380）	15kg	☆

N-アリルアニリン
N-Allylaniline

$C_6H_5NHCH_2CH$:CH_2...133.19 ［劇］III ［危］4-3-III
CAS RN® ［589-09-3］ bp218℃～220℃▲ d0.982▲

10287-1A	TFS（10287-0250）	25g	￥15,300
10287-2A	TFS（10287-0050）	5g	￥4,200
10287-3A	TFS（10287-1000）	100g	￥61,000

4-アリルアニソール
4-Allylanisole

$CH_2CHCH_2C_6H_4OCH_3$...148.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［140-67-0］ bp215℃～216℃† d0.965†

10288-1A	TFS（10288-0250）			25g	￥5,400
10288-2A	TFS（10288-0050）			5g	￥2,700
10288-3A	TFS（10288-1000）			100g	￥15,900
49870-97	PHY（82205）		天然物化学研究用	100mg	￥40,000

アリルベンゼン
Allylbenzene

警告

$C_6H_5CH_2CH{:}CH_2$...118.17 ［危］4-2-III
CAS RN® ［300-57-2］ bp156℃～157℃† d0.890†

01663-41	>98.0%(GC)	鹿1級	G	10mL	￥10,500
10289-1A	TFS（10289-0250）			25mL	￥7,000
10289-2A	TFS（10289-1000）			100mL	￥22,800

1-アリル-3-ブチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
1-Allyl-3-butylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_{12}H_{17}F_6N_3O_4S_2$...445.40
CAS RN® ［863498-34-4］ d1.379▲

01935-35		素材研究用	G	25mL	￥30,000
01935-55		素材研究用	G	5mL	￥10,000
01935-15		素材研究用	G	250mL	￥110,000

1-アリル-3-ブチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート
1-Allyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate

危険

$C_{10}H_{17}BF_4N_2$...252.06 ［劇］II ［PRTR］1-405
CAS RN® ［863498-32-2］

01934-35		素材研究用	G	25mL	￥24,000
01934-55		素材研究用	G	5mL	￥9,000
01934-15		素材研究用	G	250mL	￥94,000

2-アリルシクロヘキサノン
2-Allylcyclohexanone

$C_9H_{14}O$...138.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［94-66-6］ d0.92▲

30517-1A	TFS（30517-0050）		5g	￥29,500

アリルシクロヘキシルアミン
Allylcyclohexylamine

$C_9H_{17}N$...139.23 ［危］4-2-III
CAS RN® ［6628-00-8］ d0.96▲

10292-1A	TFS（10292-0050）		5g	￥8,300

4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン
4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene

危険

$C_{11}H_{14}O_2$...178.22 ［危］4-3-III ［PRTR］2-6
CAS RN® ［93-15-2］ bp248℃† d1.033†

01662-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥8,000
01662-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥1,800
25963-1A	TFS（25963-0050）		5mL	￥3,900

アリルジフェニルホスフィン
Allyldiphenylphosphine

$C_{15}H_{15}P$...226.25
CAS RN® ［2741-38-0］ d1.04▲

32086-1A	TFS（32086-0050）	tech.	5g	￥21,900

アリル2,3-エポキシプロピルエーテル → アリルグリシジルエーテル

1-アリル-3-エチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
1-Allyl-3-ethylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_{10}H_{13}F_6N_3O_4S_2$...417.35
CAS RN® [652134-11-7] d1.45▲

01932-35	素材研究用	G	25mL	￥30,000
01932-55	素材研究用	G	5mL	￥9,000
01932-15	素材研究用	G	250mL	￥130,000

1-アリル-3-エチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート
1-Allyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate

危険

$C_8H_{13}BF_4N_2$...224.00 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [945732-42-3]

01931-35	素材研究用	G	25mL	￥24,000
01931-55	素材研究用	G	5mL	￥8,000
01931-15	素材研究用	G	250mL	￥90,000

アリルグリシジルエーテル
Allyl glycidyl ether

危険

CH_2:$CHCH_2OC_3H_5O$...114.14 [危] 5-AE-2-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-29 [変]
CAS RN® [106-92-3] bp154℃† d(20/4℃) 0.968† Fp57℃†

01131-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥3,100
01131-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,000

(*S*)-α-アリルグリシン → (*S*)-(-)-2-アミノ-4-ペンテン酸

アリルグアヤコール → オイゲノール

1-(3-アリル-4-ヒドロキシフェニル)エタン-1-オン
1-(3-Allyl-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one

$C_{11}H_{12}O_2$...176.21
CAS RN® [1132-05-4] mp115℃～118℃▲

49241-17	TFS（KM05715DA）	97%			1g	￥6,000

1-アリルイミダゾール
1-Allylimidazole

危険

$C_6H_8N_2$...108.14 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [31410-01-2] d1.000†

01968-23		>99.0%(GC)	素材研究用	G	100mL	￥19,000
01968-33		>99.0%(GC)	素材研究用	G	25mL	￥6,200
33517-1A	TFS（33517-0250）				25g	￥5,900
33517-2A	TFS（33517-1000）				100g	￥15,800

1-アリル-3*H*-イミダゾリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
1-Allyl-3*H*-imidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_8H_9F_6O_4S_2N_3$...389.30

49210-00	SOLVI（IM2308C50）	99%			50g	￥94,000

アリルメルカプタン
Allyl mercaptan

H_2C:$CHCH_2SH$...74.14 [危] 4-2-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [870-23-5] bp67℃～68℃▲ d0.93▲

15371-1A	TFS（15371-0250）		tech.		25g	￥13,800

4-アリル-2-メトキシフェノール → オイゲノール

1-アリル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$C_9H_{11}F_6N_3O_4S_2$...403.32
CAS RN® [655249-87-9] d1.49▲

01988-35	素材研究用	G	25mL	￥30,000
01988-55	素材研究用	G	5mL	￥9,500
01988-15	素材研究用	G	250mL	￥120,000

1-アリル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_9H_{11}F_6N_3O_4S_2$...403.32
CAS RN® [655249-87-9]

49518-82	ILT（IL-0239-HP-0100）	99%	100g	￥66,000
49518-81	ILT（IL-0239-HP-0025）	99%	25g	￥29,000

1-アリル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミド
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide

$C_9H_{11}N_5$...189.21
CAS RN® [917956-73-1]

49518-84	ILT（IL-0240-HP-0100）	>98%	100g	￥51,000
49518-83	ILT（IL-0240-HP-0025）	>98%	25g	￥23,000

1-アリル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート
1-Allyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

危険

$C_7H_{11}BF_4N_2$...209.98 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [851606-63-8]

01987-35	素材研究用	G	25mL	￥22,000
01987-55	素材研究用	G	5mL	￥9,000
01987-15	素材研究用	G	250mL	￥105,000

1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン → アリルグリシジルエーテル

o-アリルフェノール
o-Allylphenol

危険

CH_2:$CHCH_2C_6H_4OH$...134.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1745-81-9］ bp220℃† mp-6℃† d(20/4℃) 1.028†

01664-01	>97.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥15,000
01664-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,500

アリルフェニルエーテル
Allyl phenyl ether

警告

$C_6H_5OCH_2CH$:CH_2...134.17 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1746-13-0］ d(20/20℃) 0.98▲

01135-31	>90.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥3,900

1-アリル-2-チオ尿素
1-Allyl-2-thiourea (Allylthiourea)

危険

CH_2:$CHCH_2NHCSNH_2$...116.18
CAS RN® ［109-57-9］ mp78℃†

01137-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥6,400
14880-1A	TFS（14880-5000）			500g	￥60,800
14880-2A	TFS（14880-0250）			25g	￥4,800
14880-4A	TFS（14880-1000）			100g	￥13,600

アリルトリブチルすず
Allyltributyltin

危険

$C_{15}H_{32}Sn$...331.12 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239
CAS RN® ［24850-33-7］ d1.068▲

26555-1A	TFS（26555-0010）			1g	￥3,500

アリルトリメチルシラン
Allyltrimethylsilane

危険

$(CH_3)_3SiCH_2CH:CH_2$...114.26 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［762-72-1］ bp84℃～88℃† d0.719†

01666-32	>95.0%(GC)	G	25mL	￥8,500
01666-52	>95.0%(GC)	G	5mL	￥3,400
19699-1A	TFS（19699-0500）		50mL	￥15,600
19699-2A	TFS（19699-0100）		10mL	￥5,500

アリルトリメチルシラン
Allyltrimethylsilane

警告

$(CH_3)_3SiCH_2CH:CH_2$...114.26 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［762-72-1］ bp85℃ d0.719 Fp7℃

34999-1A	TFS（34999-0100）	10mL	￥4,800
34999-2A	TFS（34999-0500）	50mL	￥16,300

アリルトリフェニルホスホニウムブロミド
Allyltriphenylphosphonium bromide

$C_{21}H_{20}BrP$...383.26
CAS RN® ［1560-54-9］ mp222℃～225℃▲

10304-1A	TFS（10304-0250）	25g	￥3,100
10304-3A	TFS（10304-1000）	100g	￥7,800

アリル尿素
Allylurea

$CH_2:CHCH_2NHCONH_2$...100.11
CAS RN® ［557-11-9］ mp86℃～91℃△

01138-31	鹿1級	G	25g	￥10,500

アルヌストーン
Alnustone

$C_{19}H_{18}O$...262.34
CAS RN®［33457-62-4］

49871-58	PHY（84200）	天然物化学研究用	10mg	￥35,000

アロエエモジン
Aloe emodin

$C_{15}H_{10}O_5$...270.23
CAS RN®［481-72-1］

49060-23	PHY（89157）	天然物化学研究用	20mg	￥55,000

アロエ エモジン 8-グルコシド
Aloe emodin 8-glucoside

$C_{21}H_{20}O_{10}$...432.37
CAS RN®［33037-46-6］

49871-59	PHY（85718）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アロエニンA
Aloenin A

$C_{19}H_{22}O_{10}$...410.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［38412-46-3］

49060-24	PHY（89557）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

アロエレシンD
Aloeresin D

$C_{29}H_{32}O_{11}$...556.55
CAS RN®［105317-67-7］

49871-60	PHY（85719）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アロインA
Aloin A

$C_{21}H_{22}O_9$...418.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1415-73-2］

49060-25	PHY（89558）	天然物化学研究用	10mg	￥40,000

アロインB
Aloin B

$C_{21}H_{22}O_9$...418.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［28371-16-6］

49868-94	PHY（83206）	天然物化学研究用	10mg	￥85,000

アルピネチン
Alpinetin

$C_{16}H_{14}O_4$...270.27
CAS RN®［36052-37-6］

49060-26	PHY（89849）	天然物化学研究用	10mg	￥51,000

アルタン B-65v
Altan B-65v

55001-13	ALT	食品添加物	1L×12	￥12,000
55001-15	ALT	食品添加物	4.8L×3	￥10,000

アルタンNAハンドソープ
Altan NA Handsoap

55001-20	ALT		500mL×20	￥32,500
55001-21	ALT		500mL×1	￥1,625
55001-22	ALT		5kg×3	￥18,750
55001-23	ALT		5kg×1	￥6,250

アルタンノロエース
Altan Noroace

55001-00	ALT	食品添加物	500mL×20	￥26,000
55001-01	ALT	食品添加物	500mL×1	￥1,500
55001-02	ALT	食品添加物	4.8L×4	￥20,000
55001-03	ALT	食品添加物	4.8L×1	￥5,500

アルタンノロエース77
Altan Noroace 77

55001-10	ALT	食品添加物	500mL×20	￥34,000
55001-11	ALT	食品添加物	4.8L×4	￥24,000

アルタヌエン標準液
Altenuene standard solution

$C_{15}H_{16}O_6$...292.28 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［29752-43-0］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10μg/mL アセトニトリル溶液

49161-18	B.P.（10003684）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥51,000

アルテルナリア抽出物
Alternaria Alternata Extract

［冷］ 0℃～6℃

49906-62	ITEA（10117）	1mL	￥21,000

アルテリナリオール標準液
Alternariol standard solution

［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

49160-33	B.P.（10003681）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥66,000

$^{13}C_{14}$-アルテリナリオール標準液
$^{13}C_{14}$-Alternariol standard solution

$^{13}C_{14}H_{10}O_5$...272.12 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25mg/L アセトニトリル溶液

49161-31	B.P.（10006457）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	￥77,000

アルテリナリオールメチルエーテル標準液
Alternariolmethylether standard solution

［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

49160-34	B.P.（10003682）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥66,000

$^{13}C_{15}$-アルテリナリオールメチルエーテル標準液
$^{13}C_{15}$-Alternariolmethylether standard solution

$^{13}C_{15}H_{12}O_5$...287.14 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25mg/L アセトニトリル溶液

49161-32	B.P.（10006458）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	￥77,000

アルタトキシン I 標準液
Altertoxin I standard solution

$C_{20}H_{16}O_6$...352.33 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［56258-32-3］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10μg/mL アセトニトリル溶液

49161-19	B.P.（10003685）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥51,000

アルトレノゲスト標準品
Altrenogest standard

$C_{21}H_{26}O_2$...310.42 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［850-52-2］

49832-23	DES（C10144000）	食品分析用	100mg	￥23,000

D(+)-アルトロース
D(+)-Altrose

$C_6H_{12}O_6$...180.15
CAS RN® ［1990-29-0］ mp106℃～108℃▲

25802-1A	TFS（25802-1000）		100mg	￥36,400

アルミナ → 酸化アルミニウム

アルミナ(α型) → 酸化アルミニウム(α型)

アルミナ(活性) → 酸化アルミニウム(活性)

アルミナ(活性)(粒状) → 酸化アルミニウム(活性)(粒状)

アルミナ CRM5801-a → 熱膨張率測定用セラミックス(Al_2O_3) CRM5801-a

アルミナ(粉末)(α型) → 酸化アルミニウム(粉末)(α型)

アルミナ(粉末)(α型) → 酸化アルミニウム(粉末)(α型)

アルミナ(粉末)(α型) → 酸化アルミニウム(粉末)(α型)

アルミナ(粉末)(γ型) → 酸化アルミニウム(粉末)(γ型)

アルミナ(粉末)(γ型) → 酸化アルミニウム(粉末)(γ型)

アルミナB 活性度I
Alumina B activity I

［労］57,57-2

020691-N	MP（02069）	500g	￥10,400

アルミナB 活性度スーパーI
Alumina B activity super I

［労］57,57-2

045681-N	MP（04568）	500g	￥10,900

アルミナB 活性度スーパーI(ダイオキシン分析用)
Alumina B activity super I for dioxin analysis

［労］57,57-2

045691-N	MP（04569）	500g	￥12,100

アルミナ60GF$_{254}$中性 → 酸化アルミニウム60GF$_{254}$中性

アルミナ60G中性 → 酸化アルミニウム60G中性

アルミナN 活性度I
Alumina N activity I

［労］57,57-2

020841-N	MP（02084）	500g	￥10,400

アルミニウム標準液(Al 1000)
Aluminium standard solution (Al 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

Al・HNO_3(0.2mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

01783-1B	Al:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	P	250mL	￥8,000
01783-2B	Al:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	P	100mL	￥3,800

アルミニウム標準原液(Al-1000)
Aluminium standard stock solution (Al-1000)

危険

［劇］III ［労］57,57-2

Al・HCl酸性溶液

01782-23	医薬品試験用	P	100mL	￥5,000

アルミニウム(粒状)
Aluminium, granule

Al...26.98 ［労］57-2
CAS RN® ［7429-90-5］ bp2327℃† mp660℃†

particle size 5mm～7mm

01145-01		鹿1級	P	500g	￥3,800

アルミニウム(粒状),2N5
Aluminium, granule, 2N5

Al...26.98 ［労］57-2
CAS RN® ［7429-90-5］

01145-08	>99.5%(Im.S.)	高純度試薬	P	500g	￥4,600

アルミニウム(板状)
Aluminium, plate

Al...26.98 ［労］57-2
CAS RN® ［7429-90-5］

20cm×30cm×0.4mm, 8sheets

01146-02				500g	￥6,000

アルミニウム(粉末)
Aluminium, powder

危険

Al...26.98 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7429-90-5］

01147-11		鹿1級	G	250g	￥3,200
01147-31		鹿1級	G	25g	￥1,500

アルミニウムアセチルアセトナート
Aluminium acetylacetonate

危険

$Al(CH_3COCHCOCH_3)_3$...324.30
CAS RN® ［13963-57-0］ mp194℃▲

19697-1A	TFS（19697-1000）		100g	￥6,800
19697-2A	TFS（19697-0050）		5g	￥3,800

アルミニウムアセチルアセトナート,3N
Aluminium acetylacetonate, 3N

危険

$Al(CH_3COCHCOCH_3)_3$...324.30
CAS RN® [13963-57-0]

01843-23	>99.9%(lm.S.)	高純度試薬		100g	￥14,500

アルミニウム *n*-ブトキシド → アルミニウムトリ-*n*-ブトキシド

アルミニウム *s e c*-ブトキシド → アルミニウムトリ-*s e c*-ブトキシド

アルミニウム *n*-ブチラート → アルミニウムトリ-*n*-ブトキシド

アルミニウム *s e c*-ブチラート → アルミニウムトリ-*s e c*-ブトキシド

アルミナドープ酸化亜鉛
Aluminium-doped zinc oxide

AlZnO...108.36

mean particle size 20nm～40nm

49526-39	ILT（NO-0061-UP-0100）	99.90%	100g	￥199,000
49526-38	ILT（NO-0061-UP-0025）	99.90%	25g	￥32,000
49526-40	ILT（NO-0061-UP-0500）	99.90%	500g	☆

アルミニウムエトキシド → アルミニウムトリエトキシド

アルミニウムエチラート → アルミニウムトリエトキシド

アルミニウムイソプロポキシド → アルミニウムトリイソプロポキシド

アルミニウムイソプロポキシド
Aluminium isopropoxide

$[(CH_3)_2CHO]_3Al$...204.24 ［危］2-IS-III
CAS RN® ［555-31-7］ bp125℃～130℃ mp129℃～136℃

20517-1A	TFS（20517-0010）	1kg	￥7,800
20517-3A	TFS（20517-0051）	5kg	￥33,600
20517-4A	TFS（20517-5000）	500g	￥5,100

アルミニウムイソプロポキシド,3N → アルミニウムトリイソプロポキシド,3N

アルミニウムイソプロピラート → アルミニウムトリイソプロポキシド

アルミニウムイソプロピラート,3N → アルミニウムトリイソプロポキシド,3N

アルミニウム-ニッケル触媒
Aluminium-nickel catalyst

［労］57,57-2［PRTR］1-308
CAS RN® ［12635-29-9］ mp1350℃▲

raney-type alloy,powder,Al-Ni50/50

20623-2A	TFS（20623-1000）	100g	￥8,200
20623-3A	TFS（20623-5000）	500g	￥22,200

アルミニウム *i s o*-プロポキシド → アルミニウムトリイソプロポキシド

アルミニウム *i s o*-プロポキシド,3N → アルミニウムトリイソプロポキシド,3N

アルミニウム *i s o*-プロピラート → アルミニウムトリイソプロポキシド

アルミニウム *i s o*-プロピラート,3N → アルミニウムトリイソプロポキシド,3N

アルミニウムトリ-*n*-ブトキシド
Aluminium tri-*n*-butoxide

警告

$[CH_3(CH_2)_2CH_2O]_3Al$...246.32 ［危］2-IS-III
CAS RN® ［3085-30-1］ mp102℃†

moisture sensitive

01784-35	>95.0%(T)	Organics	G	25g	￥10,500

アルミニウムトリ-*sec*-ブトキシド
Aluminium tri-*sec*-butoxide

警告

$[C_2H_5CH(CH_3)O]_3Al$...246.32 ［危］4-2-III
CAS RN® ［2269-22-9］ bp180℃～182℃† d(20/20℃) 0.96† Fp26℃†

air/moisture sensitive

01785-15	>95.0%(T)	Organics	G	250mL	￥6,000
01785-85	>95.0%(T)	Organics	M	16kg	☆

アルミニウムトリ-*sec*-ブトキシド
Aluminium tri-*sec*-butoxide

警告

$[C_2H_5CH(CH_3)O]_3Al$...246.32 ［危］4-2-III
CAS RN® ［2269-22-9］ bp200℃～206℃ d0.96 Fp27℃

19121-2A	TFS（19121-1000）		100g	￥5,100
19121-3A	TFS（19121-5000）		500g	￥11,600

アルミニウムトリエトキシド
Aluminium triethoxide

警告

$(C_2H_5O)_3Al$...162.16
CAS RN® ［555-75-9］ mp140℃†

air/moisture sensitive

01787-35	>95.0%(T)	Organics	G	25g	￥6,900

アルミニウムトリイソプロポキシド
Aluminium triisopropoxide

危険

$[(CH_3)_2CHO]_3Al$...204.24 ［危］2-IS-III
CAS RN® ［555-31-7］ mp119℃†

moisture sensitive

01788-15	>95.0%(T)	Organics	G	250g	￥10,000
01788-85	>95.0%(T)	Organics	M	10kg	☆

アルミニウムトリイソプロポキシド,3N
Aluminium triisopropoxide, 3N

危険

$[(CH_3)_2CHO]_3Al$...204.24 ［危］2-IS-III
CAS RN® ［555-31-7］ mp119℃†

moisture sensitive

01788-13	>99.9%(Im.S.)	高純度試薬	G	250g	￥15,500

アルミノン
Aluminon

警告

$C_{22}H_{23}N_3O_9$...473.43
CAS RN® ［569-58-4］

01272-30		特級	G	25g	￥6,400
10306-1A	TFS（10306-1000）			100g	￥18,100
10306-2A	TFS（10306-0250）			25g	￥7,100

HD-01用アルミフレキダクト、取り付けバンド
ALUMINUM FLEXIBLE DUCT, INSTALLATION BAND FOR HD-01

49785-63	興研（900974）			1ｾｯﾄ	☆

MU-01用アルミフレキダクト、取り付けバンド
ALUMINUM FLEXIBLE DUCT, INSTALLATION BAND FOR MU-01

49785-77	興研（900982）		1ｾｯﾄ	☆

アルミパッキン(25コイリ)
Aluminum packing

96946-27		有機合成用	25個/pack	￥4,900

アマランス
Amaranth

$NaO_3SC_{10}H_6N:NC_{10}H_4(OH)(SO_3Na)_2$...604.48
CAS RN® ［915-67-3］

01190-32		G	25g	￥4,300

アマランス
Amaranth

$NaO_3SC_{10}H_6N:NC_{10}H_4(OH)(SO_3Na)_2$...604.48
CAS RN® ［915-67-3］ mp218℃～220℃

15303-1A	TFS（15303-0250）		25g	￥5,200
15303-2A	TFS（15303-1000）		100g	￥13,800
15303-3A	TFS（15303-5000）		500g	￥48,000

アマロゲンチン
Amarogentin

$C_{29}H_{30}O_{13}$...586.53 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［21018-84-8］

49060-27	PHY（80178）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アンバージェット^{R}4200-Cl
Amberjet^R 4200-Cl

CAS RN® ［60177-39-1］

30133-1A	TFS（30133-5000）		500g	￥8,700

アンバージェット®4600-Cl
Amberjet® 4600-Cl

CAS RN®［63181-94-2］

30132-1A	TFS（30132-5000）	500g	￥12,500

アンバーライト®CG-50-タイプ1
Amberlite® CG-50-type1 ion-exchange resin

CAS RN®［9042-11-9］

20211-1A	TFS（20211-0250）	25g	￥9,700
20211-2A	TFS（20211-1000）	100g	￥32,900

アンバーライト®IRA-900Cl
Amberlite® IRA-900 Cl ion-exchange resin

CAS RN®［9050-97-9］

20231-1A	TFS（20231-5000）	500g	￥8,200

アンバーライト®IRC-748
Amberlite® IRC-748 ion-exchange resin

CAS RN®［79620-28-3］

33539-1A	TFS（33539-2500）	250g	￥20,000
33539-2A	TFS（33539-0010）	1kg	￥33,300

アンバーライト®XAD1180
Amberlite® XAD 1180 ion-exchange resin

CAS RN®［9003-69-4］

29915-1A	TFS（29915-1000）	100g	￥6,100
29915-2A	TFS（29915-5000）	500g	￥21,500

アンバーライト®XAD-4
Amberlite® XAD-4

CAS RN®［9003-69-4］

20223-1A	TFS（20223-1000）	100g	￥6,300
20223-2A	TFS（20223-5000）	500g	￥22,700

アンバーライト®XAD-7 HP
Amberlite® XAD-7 HP

CAS RN®［37380-43-1］

20224-1A	TFS（20224-1000）	100g	￥5,500
20224-2A	TFS（20224-5000）	500g	￥19,500

アンバーリスト®15(dry)
Amberlyst® 15(dry) ion-exchange resin

CAS RN®［9037-24-5］

20214-1A	TFS（20214-0250）	25g	￥7,800
20214-2A	TFS（20214-5000）	500g	￥28,700

アンバーリスト®15(wet)
Amberlyst® 15(wet) ion-exchange resin

CAS RN®［9037-24-5］

20215-1A	TFS（20215-0250）	25g	￥5,000
20215-2A	TFS（20215-5000）	500g	￥15,000

アンバーリスト®A-21
Amberlyst® A-21 ion-exchange resin

CAS RN®［9049-93-8］

20217-1A	TFS（20217-2500）	250g	￥13,900
20217-2A	TFS（20217-0010）	1kg	￥47,200

アンバーセップ900-OH
Ambersep 900-OH

CAS RN®［197809-12-4］

30134-1A	TFS（30134-5000）		500g	￥15,800
30134-2A	TFS（30134-1000）		100g	￥7,900

アメントフラボン
Amentoflavone

$C_{30}H_{18}O_{10}$...538.45
CAS RN®［1617-53-4］

49060-28	PHY（80351）	天然物化学研究用	10mg	￥43,000

L(+)-アメトプテリン二水和物
L(+)-Amethopterin dihydrate

$C_{20}H_{22}N_8O_5 \cdot 2H_2O$...490.47 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［133073-73-1］ mp195℃▲

20810-1A	TFS（20810-0250）		25mg	￥7,100
20810-2A	TFS（20810-1000）		100mg	￥18,100

アメトクトラジン標準品
Ametoctradin standard

$C_{15}H_{25}N_5$...275.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［865318-97-4］

49863-51	DES（C10148900）	残留農薬試験用	100mg	￥45,000

アメトクトラジン代謝物B塩酸塩標準品 → アメトクトラジン代謝物M650F01塩酸塩標準品

アメトクトラジン代謝物G塩酸塩標準品 → アメトクトラジン代謝物M650F06塩酸塩標準品

アメトクトラジン代謝物M650F01塩酸塩標準品
Ametoctradin metabolite M650F01 hydrochloride standard

$C_{11}H_{16}N_5O_2Cl$...285.72 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2421146-55-4］

49867-13	DES（C10148910）	残留農薬試験用	10mg	￥44,000

アメトクトラジン代謝物M650F06塩酸塩標準品
Ametoctradin metabolite M650F06 hydrochloride standard

$C_{13}H_{20}N_5O_2Cl$...313.78 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2421146-53-2］

49867-14	DES（C10148915）		残留農薬試験用	10mg	￥31,000

アメトリン標準品
Ametryn standard

警告

$C_9H_{17}N_5S$...227.33 ［PRTR］2-10 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［834-12-8］

49803-55	DES（C10150000）		残留農薬試験用	250mg	￥14,000

N-アミジノ-*N*-メチルグリシン一水和物 → クレアチン一水和物

1-アミジノピラゾール塩酸塩
1-Amidinopyrazole hydrochloride

警告

$C_4H_6N_4 \cdot HCl$...146.57
CAS RN® ［4023-02-3］

01380-32	>95.0%		G	25g	￥10,000
01380-52	>95.0%		G	5g	￥3,900

アミジノスルフィン酸
Amidinosulfinic acid

危険

$NH_2C(:NH)SO_2H$...108.12
CAS RN® ［1758-73-2］ mp124℃～127℃(dec.)†

01552-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,200

アミジノチオ尿素
Amidinothiourea

$C_2H_6N_4S$...118.16
CAS RN® [2114-02-5] mp160℃～164℃▲

25919-1A	TFS（25919-0100）			10g	￥3,200
25919-2A	TFS（25919-1000）			100g	￥18,600

アミドブラック10B
Amido black 10B

警告

$C_{22}H_{14}N_6O_9S_2Na_2$...616.49
CAS RN® [1064-48-8]

01210-32				G	25g	￥3,800
1167-1M	M（1.01167.0025）	>80.0%(UV-VIS)	電気泳動用		25g	￥17,900

アミドール → 2,4-ジアミノフェノール二塩酸塩(二塩酸2,4-ジアミノフェノール)

アミドスルホン酸 → アミド硫酸

アミド硫酸
Amidosulfuric acid

警告

$HOSO_2NH_2$...97.09
CAS RN® [5329-14-6] mp205℃†

37372-00	>99.5%(T)	特級		P	500g	￥3,000
37372-20	>99.5%(T)	特級		G	100g	￥2,000
37372-30	>99.5%(T)	特級		G	25g	￥1,400
37372-80	>99.5%(T)	特級		B	20kg	☆
37372-01	>99.0%(T)	鹿1級		P	500g	￥1,800
37372-81	>99.0%(T)	鹿1級		B	20kg	☆
37372-96	>99.90%(T)	容量分析用標準物質		G	50g	￥13,000

0.1mol/Lアミド硫酸溶液(*N*/10)
0.1mol/L Amidosulfuric acid solution (*N*/10)

警告

$HOSO_2NH_2$...97.09
CAS RN®［5329-14-6］

37878-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥4,200

アミー輸送培地
Amies transport medium

警告

711425-2	Oxd（CM0425J）		250g	￥10,000

アミノアセトアルデヒドジメチルアセタール
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal

危険

$C_4H_{11}NO_2$...105.13 ［危］4-2-III
CAS RN®［22483-09-6］ d0.96▲

01199-32		>95.0%(GC)	G	25mL	￥6,700
15334-1A	TFS（15334-0250）			25g	￥5,800
15334-2A	TFS（15334-1000）			100g	￥15,300
15334-3A	TFS（15334-5000）			500g	￥60,700

4′-アミノアセトアニリド
4′-Aminoacetanilide

警告

$C_8H_{10}N_2O$...150.17 ［変］
CAS RN®［122-80-5］ mp159℃～165℃▲

01005-52		>95.0%	G	5g	￥4,200
01005-62		>95.0%	G	1g	￥2,400
40060-1A	TFS（40060-1000）			100g	￥17,300
40060-2A	TFS（40060-0250）			25g	￥5,100

4′-アミノアセトアニリド-2′,3′,5′,6′-d_4
4′-Aminoacetanilide-2′,3′,5′,6′-d_4

$C_8H_6D_4N_2O$...154.20 ［変］
CAS RN® ［1219802-76-2］

49136-12	CDN（D-6617）	98 atom% D	250mg	￥66,000

アミノ酢酸 → グリシン

アミノ酢酸 CRM6022-a → グリシン CRM6022-a

アミノアセトニトリル二硫酸塩
Aminoacetonitrile bisulfate

$H_2NCH_2CN \cdot H_2SO_4$...154.14 ［劇］III
CAS RN® ［151-63-3］ mp123℃～125℃▲

15372-1A	TFS（15372-0050）		5g	￥4,300

2′-アミノアセトフェノン
2′-Aminoacetophenone

警告

C_8H_9NO...135.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［551-93-9］ bp70℃～71℃(3mm)▲

01197-32		>98.0%(GC)	25mL	￥7,500
40062-1A	TFS（40062-0100）		10g	￥8,800
40062-2A	TFS（40062-0050）		5g	￥4,900

p-アミノアセトフェノン
p-Aminoacetophenone

警告

$NH_2C_6H_4COCH_3$...135.16
CAS RN® ［99-92-3］ mp105℃～107℃†

01196-30		96.5%～101.3%(T 鹿特級)	25g	￥5,200
10309-1A	TFS（10309-1000）		100g	￥10,000
10309-2A	TFS（10309-0100）		10g	￥3,000
10309-3A	TFS（10309-0250）		25g	￥4,300

9-アミノアクリジン0.5水和物
9-Aminoacridine hemihydrate

$C_{13}H_{10}N_2 \cdot 0.5H_2O$...203.23
CAS RN® [65944-23-2] mp230℃～235℃▲

13441-1A	TFS（13441-0010）	1g	￥19,200

1-アミノアダマンタン-d_{15}
1-Aminoadamantane-d_{15}

$C_{10}H_2D_{15}N$...166.34
CAS RN® [33830-10-3]

49149-48	CDN（D-7965）	10mg	￥31,900

1-アミノアダマンタン塩酸塩 → 1-アダマンタンアミン塩酸塩

2-アミノアダマンタン塩酸塩 → 2-アダマンタンアミン塩酸塩

trans-4-アミノアダマンタン-1-オール塩酸塩
trans-4-Aminoadamantan-1-ol hydrochloride

$C_{10}H_{18}ClNO$...203.70
CAS RN® [62075-23-4]

>99.0% *trans*

01639-45	>98.0%(HLC)	Organics		10g	￥25,500

L-2-アミノアジピン酸
L-2-Aminoadipic acid

$C_6H_{11}NO_4$...161.15
CAS RN® [1118-90-7]

02055-52	>95.0%(T)		G	5g	￥24,000
02055-62	>95.0%(T)		G	1g	￥8,000

1-アミノアントラセン標準品
1-Aminoanthracene standard

$C_{14}H_{11}N$...193.24
CAS RN® [610-49-1]

49797-47	ACC（R-059N）	環境分析用	50mg	￥3,000

2-アミノアントラセン標準品
2-Aminoanthracene standard

$C_{14}H_{11}N$...193.24
CAS RN® [613-13-8]

49797-48	ACC（R-060N）	環境分析用	50mg	￥3,000

1-アミノアントラキノン
1-Aminoanthraquinone

警告

$C_{14}H_9NO_2$...223.22 [PRTR] 1-19
CAS RN® [82-45-1] mp251℃～254℃ †

01198-32		G	25g	￥3,000

1-アミノアントラキノン標準品
1-Aminoanthraquinone standard

$C_{14}H_9NO_2$...223.22 [PRTR] 1-19
CAS RN® [82-45-1]

49797-49	ACC（R-061N）	環境分析用	50mg	￥3,000

2-アミノアントラキノン標準品
2-Aminoanthraquinone standard

$C_{14}H_9NO_2$...223.22 [変]
CAS RN® [117-79-3]

49797-50	ACC（R-093N）	環境分析用	5mg	￥4,500

4-アミノアンチピリン
4-Aminoantipyrine

警告

$C_{11}H_{13}N_3O$...203.24
CAS RN® [83-07-8] mp107℃～110℃ †

01200-00		>99.0%(T)	特級	G	500g	￥85,000
01200-30		>99.0%(T)	特級	G	25g	￥6,800
10315-1A	TFS（10315-1000）				100g	￥8,300
10315-2A	TFS（10315-0250）				25g	￥4,000
10315-3A	TFS（10315-5000）				500g	￥31,700

4-アミノアゾベンゼン標準品
4-Aminoazobenzene standard

$NH_2C_6H_4N{:}NC_6H_5$...197.23 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [60-09-3] mp126℃▲

49863-44	DES（C10167500）		環境分析用		100mg	￥12,000

p-アミノアゾベンゼン
p-Aminoazobenzene

警告

$NH_2C_6H_4N{:}NC_6H_5$...197.23 ［労］57,57-2
CAS RN® [60-09-3] mp126℃ †

01202-31		>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥4,100

p-アミノベンズアルデヒド(ポリマー)
p-Aminobenzaldehyde, polymer

$(NH_2C_6H_4CHO)_n$
CAS RN® [28107-09-7]

01205-32				G	25g	￥15,000

3-アミノベンズアミド
3-Aminobenzamide

$C_7H_8N_2O$...136.15
CAS RN® [3544-24-9] mp111℃～115℃▲

33908-1A	TFS（33908-0010）	1g	￥8,200
33908-2A	TFS（33908-0050）	5g	￥19,400

4-アミノベンズアミド
4-Aminobenzamide

$C_7H_8N_2O$...136.15
CAS RN® [2835-68-9] mp181℃～185℃▲

35164-1A	TFS（35164-0250）	25g	￥3,200
35164-2A	TFS（35164-1000）	100g	￥8,800

4-アミノベンズアミジン二塩酸塩
4-Aminobenzamidine dihydrochloride

$C_7H_9N_3$･2HCl...208.08 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [2498-50-2] mp>300℃▲

22805-1A	TFS（22805-0050）	5g	￥13,700
22805-2A	TFS（22805-0010）	1g	￥10,700

5-アミノベンゼン-1,3-ジオール塩酸塩
5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride

$C_6H_7NO_2$･HCl...161.58
CAS RN® [6318-56-5] mp>300℃▲

49241-18	TFS（BTB10193DE）	5g	☆
49241-19	TFS（BTB10193DA）	1g	￥57,300
49241-20	TFS（BTB10193CB）	250mg	￥28,300

3-アミノベンゼン-1-スルホンアミド
3-Aminobenzene-1-sulfonamide

$C_6H_8N_2O_2S$...172.20
CAS RN® [98-18-0] mp139℃～140℃▲

49241-23	TFS（SB01949DA）	97%	1g	￥2,700

p-アミノベンゼンスルホンアミド → スルファニルアミド

m-アミノベンゼンスルホン酸
m-Aminobenzenesulfonic acid (*m*=3)

$NH_2C_6H_4SO_3H$...173.19
CAS RN® [121-47-1] mp>300℃†

37376-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,900

o-アミノベンゼンスルホン酸
o-Aminobenzenesulfonic acid (*o*=2)

警告

$NH_2C_6H_4SO_3H$...173.19
CAS RN® [88-21-1] mp>300℃†

37375-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,400

p-アミノベンゼンスルホン酸 → スルファニル酸

p-アミノベンゼンスルホン酸ナトリウム二水和物 → スルファニル酸ナトリウム二水和物

o-アミノベンゼンチオール → *o*-アミノチオフェノール

2-アミノベンズイミダゾール
2-Aminobenzimidazole

警告

$C_7H_7N_3$...133.15
CAS RN® [934-32-7] mp227℃～232℃△

01580-51	>95.0%(T)	鹿1級	G	5g	￥7,500
17402-1A	TFS（17402-0250）			25g	￥12,500
17402-3A	TFS（17402-1000）			100g	￥36,500

1-アミノベンズイミダゾール-2-スルホン酸
1-Aminobenzimidazole-2-sulfonic acid

$C_7H_7N_3O_3S$...213.21
CAS RN® [120341-04-0] mp252℃～253℃▲

27628-1A	TFS（27628-0010）			1g	￥38,000

4-アミノベンゾ-18-クラウン-6 1.5水和物塩酸塩
4-Aminobenzo-18-crown-6 sesquihydrate hydrochloride

$C_{16}H_{25}NO_6 \cdot HCl \cdot 1.5H_2O$...390.85 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［205504-06-9］ mp113℃～117℃ †

27746-1A	TFS（27746-2500）				250mg	￥29,300

4-アミノ安息香酸-2,3,5,6-d_4
4-Aminobenzoic-2,3,5,6-d_4 acid

$H_2NC_6D_4COOH$...141.16
CAS RN® ［350820-01-8］

49120-62	CDN（D-4209）	98 atom% D			250mg	￥92,400

m-アミノ安息香酸
m-Aminobenzoic acid

警告

$NH_2C_6H_4COOH$...137.13
CAS RN® ［99-05-8］ mp174℃ †

01208-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,500
15585-1A	TFS（15585-1000）				100g	￥6,300
15585-2A	TFS（15585-0250）				25g	￥3,500
15585-3A	TFS（15585-5000）				500g	￥18,800

o-アミノ安息香酸 → アントラニル酸

p-アミノ安息香酸
p-Aminobenzoic acid

警告

$NH_2C_6H_4COOH$...137.13
CAS RN® ［150-13-0］ mp185℃～189℃ △

01209-30		99.5%～100.2%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,600
14621-1A	TFS（14621-2500）				250g	￥5,000
14621-2A	TFS（14621-0010）				1kg	￥15,700

4-アミノ安息香酸エチルエステル標準品
4-Aminobenzoic acid ethyl ester standard (Benzocaine)

$C_9H_{11}NO_2$...165.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［94-09-7］

49830-73	DES（C10171450）	残留農薬試験用	100mg	￥10,000

2-アミノベンゾニトリル → アントラニロニトリル

3-アミノベンゾニトリル
3-Aminobenzonitrile

$C_7H_6N_2$...118.13 ［劇］III
CAS RN® ［2237-30-1］

02056-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥18,000
02056-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥6,200
17304-1A	TFS（17304-0250）		25g	￥12,500
17304-2A	TFS（17304-0050）		5g	￥3,400
17304-3A	TFS（17304-1000）		100g	￥51,700

4-アミノベンゾニトリル
4-Aminobenzonitrile

危険

$H_2NC_6H_4CN$...118.13 ［劇］III
CAS RN® ［873-74-5］ mp83℃～85℃†

01203-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥8,500
01203-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥2,900
16447-1A	TFS（16447-0500）		50g	￥14,300
16447-2A	TFS（16447-0100）		10g	￥4,300

2-アミノベンゾフェノン
2-Aminobenzophenone

警告

$H_2NC_6H_4COC_6H_5$...197.23
CAS RN® ［2835-77-0］ bp280℃† mp105℃～108℃†

10316-1A	TFS（10316-1000）	100g	￥22,700
10316-2A	TFS（10316-0250）	25g	￥7,700

4-アミノベンゾフェノン
4-Aminobenzophenone

$C_{13}H_{11}NO$...197.23
CAS RN® [1137-41-3] mp120℃～124℃▲

10317-1A	TFS（10317-0100）				10g	￥8,300
10317-2A	TFS（10317-0250）				25g	￥14,400

2-アミノベンゾチアゾール
2-Aminobenzothiazole

警告

$C_7H_6N_2S$...150.20
CAS RN® [136-95-8] mp126℃～131℃△

01519-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,700

2-アミノベンゾチアゾール
2-Aminobenzothiazole

警告

$C_7H_6N_2S$...150.20
CAS RN® [136-95-8] mp129℃～134℃

14881-1A	TFS（14881-0050）				5g	￥2,400
14881-2A	TFS（14881-1000）				100g	￥5,800
14881-3A	TFS（14881-5000）				500g	￥22,800

6-アミノベンゾチアゾール
6-Aminobenzothiazole

警告

$C_7H_6N_2S$...150.20
CAS RN® [533-30-2] mp89℃～90℃†

01214-52		>95.0%(HLC)		G	5g	￥13,000
01214-62		>95.0%(HLC)		G	1g	￥4,300
49243-25	TFS（CC05914EB）	97%			25g	￥99,000
49243-27	TFS（CC05914DA）	97%			1g	￥9,600

6-アミノベンゾ[*b*]チオフェン1,1-ジオキシド
6-Aminobenzo[*b*]thiophene 1,1-dioxide

$C_8H_7NO_2S$...181.21
CAS RN® [20503-40-6] mp150℃～156℃▲

49241-24	TFS（MWP00044DA）	1g	￥36,500
49241-25	TFS（MWP00044CB）	250mg	￥13,400

1-アミノベンゾトリアゾール
1-Aminobenzotriazole

警告

$C_6H_6N_4$...134.13
CAS RN® [1614-12-6] mp82℃～84℃▲

34864-1A	TFS（34864-1000）	100mg	￥19,800
34864-2A	TFS（34864-2500）	250mg	￥39,400

2-アミノベンゾトリフルオリド
2-Aminobenzotrifluoride

$C_7H_6F_3N$...161.12 ［危］4-2-III
CAS RN® [88-17-5] d1.296▲

10318-1A	TFS（10318-1000）	100mL	￥6,100
10318-2A	TFS（10318-0050）	5mL	￥2,100
10318-3A	TFS（10318-5000）	500mL	￥23,900

4-アミノベンゾトリフルオリド
4-Aminobenzotrifluoride

警告

$NH_2C_6H_4CF_3$...161.12 ［危］4-3-III ［変］
CAS RN® [455-14-1] mp3℃～8℃▲ d1.283▲

01206-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥5,400
20891-1A	TFS（20891-0500）		50mL	￥26,700
20891-2A	TFS（20891-0100）		10mL	￥10,800

6-アミノ-1,3-ベンゾキサゾール-2(3*H*)-オン
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3*H*)-one

$C_7H_6N_2O_2$...150.13
CAS RN® [22876-17-1] mp199℃～204℃▲

49241-26	TFS（CC75714DA）	95%	1g	￥19,200
49241-27	TFS（CC75714CB）	95%	250mg	￥16,700

N-(4-アミノベンゾイル)グリシン → *p*-アミノ馬尿酸

2-アミノベンジルアルコール
2-Aminobenzyl alcohol

警告

C_7H_9NO...123.15
CAS RN® [5344-90-1] mp82℃～86℃▲

15373-1A	TFS（15373-0100）		10g	￥3,500
15373-2A	TFS（15373-0250）		25g	￥7,000

3-アミノベンジルアルコール
3-Aminobenzyl alcohol

C_7H_9NO...123.15
CAS RN® [1877-77-6] mp92℃～95℃▲

18457-1A	TFS（18457-0050）		5g	￥5,300

4-アミノベンジルシアニド
4-Aminobenzyl cyanide

$C_8H_8N_2$...132.16 ［劇］III
CAS RN® [3544-25-0] mp44℃～48℃▲

10321-1A	TFS（10321-0100）		10g	￥12,000

(*R*)-(-)-2-アミノ-1-ベンジルオキシブタン
(*R*)-(-)-2-Amino-1-benzyloxybutane

$C_{11}H_{17}NO$...179.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [142559-11-3] bp80℃(0.15mm)▲

30009-1A	TFS（30009-5000）		500mg	￥42,900

D L-2-アミノ-3-(5-ベンジルオキシ-3-インドリル)プロピオン酸 → 5-ベンジルオキシ-*D L*-トリプトファン

2-アミノ-3-ベンジルオキシピリジン
2-Amino-3-benzyloxypyridine

$C_{12}H_{12}N_2O$...200.23
CAS RN® [24016-03-3] mp92℃～94℃▲

16298-1A	TFS（16298-0050）		5g	￥6,900

4-アミノ-1-ベンジルピペリジン
4-Amino-1-benzylpiperidine

$C_{12}H_{18}N_2$...190.28 ［危］4-3-III
CAS RN® [50541-93-0] bp152℃† d1.01†

01469-32		>95.0%(GC)	25mL	￥10,000
01469-52		>95.0%(GC)	5mL	￥4,000
18766-1A	TFS（18766-1000）		100g	￥43,300
18766-2A	TFS（18766-0250）		25g	￥13,400
18766-3A	TFS（18766-0050）		5g	￥4,800

4-アミノ-1-ベンジルピペリジン二塩酸塩
4-Amino-1-benzylpiperidine dihydrochloride

警告

$C_{12}H_{18}N_2 \cdot {}_2HCl$...190.28
CAS RN® [1205-72-7]

01471-32		>95.0%	25g	￥10,000
01471-52		>95.0%	5g	￥4,000

4-(4′-アミノベンジル)チオモルホリン1,1-ジオキシド
4-(4′-Aminobenzyl)thiomorpholine 1,1-dioxide

$C_{11}H_{16}N_2O_2S$...240.32
CAS RN® [263339-24-8] mp156℃▲

49241-28	TFS（MO00124DA）	90%	1g	￥32,100
49241-30	TFS（MO00124CB）	90%	250mg	￥9,600

3-*exo*-アミノビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2-*exo*-カルボキサミド
3-*exo*-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-*exo*-carboxamide

$C_8H_{12}N_2O$...152.19
CAS RN® [105786-40-1] mp235℃～253℃▲

27781-1A	TFS（27781-2500）		250mg	￥17,000

3-*exo*-アミノビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2-*exo*-カルボン酸
3-*exo*-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-*exo*-carboxylic acid

$C_8H_{11}NO_2$...153.17
CAS RN® [92511-32-5] mp261℃～263℃▲

26569-2A	TFS（26569-0010）		1g	￥55,800

(*R*)-2′-アミノ-1,1′-ビナフタレン-2-オール
(*R*)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol

$C_{20}H_{15}NO$...285.33
CAS RN® [137848-28-3]

49212-04	ダイセル（100601-001G）		1g	￥116,900

(*S*)-2′-アミノ-1,1′-ビナフタレン-2-オール
(*S*)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol

$C_{20}H_{15}NO$...285.33
CAS RN® [137848-29-4]

49212-05	ダイセル（100602-001G）		1g	￥116,900

2-アミノビフェニル
2-Aminobiphenyl

$C_{12}H_{11}N$...169.22
CAS RN® [90-41-5] mp48℃～53℃▲

10322-1A	TFS（10322-0050）		5g	￥4,200
10322-2A	TFS（10322-0250）		25g	￥11,700

2-アミノビフェニル標準品
2-Aminobiphenyl standard

$C_{12}H_{11}N$...169.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [90-41-5]

49834-81	DES（C10173020）	環境分析用	100mg	￥15,000

3-アミノビフェニル標準品
3-Aminobiphenyl standard

$C_{12}H_{11}N$...169.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2243-47-2］

49835-85	DES（C10173030）	環境分析用	100mg	￥14,000

4-アミノビフェニル標準液
4-Aminobiphenyl standard solution

$C_{12}H_{11}N$...169.22 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［92-67-1］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49863-22	DES（L10173040CY）	環境分析用	10mL	￥19,000

4-アミノビフェニル標準液
4-Aminobiphenyl standard solution

危険

$C_{12}H_{11}N$...169.22 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13
CAS RN®［92-67-1］

100mg/L アセトニトリル溶液

49879-10	ACC（RAC-02）	環境分析用	1mL	￥7,500

4-アミノビフェニル-d_9標準液
4-Aminobiphenyl-d_9 standard solution

$C_{12}H_2ND_9$...178.27 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［344298-96-0］

100mg/L アセトン溶液

49860-01	DES（XA10173041AC）	環境分析用	1mL	￥45,000

アミノブラック10B → アミドブラック10B

3-アミノ-*N*-Boc-*L*-アラニン
3-Amino-*N*-Boc-*L*-alanine

$C_8H_{16}N_2O_4$...204.22
CAS RN® [73259-81-1]

01812-32	>95.0%	G	25g	￥10,000
01812-52	>95.0%	G	5g	￥4,000

(*S*)-4-アミノ-2-(Boc-アミノ)酪酸
(*S*)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid

$C_9H_{18}N_2O_4$...218.25
CAS RN® [25691-37-6]

01379-52	>95.0%	G	5g	￥18,000
01379-62	>95.0%	G	1g	￥6,400

(*S*)-3-アミノ-1-*N*-Boc-ピロリジン
(*S*)-3-Amino-1-*N*-Boc-pyrrolidine

$C_9H_{18}N_2O_2$...186.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [147081-44-5]

01671-32	>97.0%(GC)	G	25mL	￥16,000
01671-52	>97.0%(GC)	G	5mL	￥4,800

3-アミノ-1-Boc-ピロリジン
3-Amino-1-Boc-pyrrolidine

危険

$C_9H_{18}N_2O_2$...186.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [186550-13-0]

01722-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥18,000
01722-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥6,400

6-アミノ-2-*N*-Boc-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン
6-Amino-2-*N*-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline

$C_{14}H_{20}N_2O_2$...248.32
CAS RN® [164148-92-9]

01668-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥22,500
01668-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

2′-アミノ-5′-ブロモアセトフェノン
2′-Amino-5′-bromoacetophenone

C_8H_8BrNO...214.05
CAS RN® [29124-56-9]

01943-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥13,000
01943-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,400

2-アミノ-3-ブロモ安息香酸
2-Amino-3-bromobenzoic acid

$C_7H_6BrNO_2$...216.03
CAS RN® [20776-51-6] mp173℃～175℃▲

01235-62		>97.0%(HLC)	G	1g	￥14,000
49241-31	TFS（MO07275EA）	97%		10g	￥61,400
49241-32	TFS（MO07275DA）	97%		1g	￥8,800
49241-33	TFS（MO07275CB）	97%		250mg	￥4,400

2-アミノ-4-ブロモ安息香酸
2-Amino-4-bromobenzoic acid

$C_7H_6BrNO_2$...216.03
CAS RN® [20776-50-5]

01020-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥32,000
01020-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥9,500

2-アミノ-5-ブロモ安息香酸
2-Amino-5-bromobenzoic acid

$C_7H_6BrNO_2$...216.03
CAS RN® [5794-88-7]

01035-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥18,000
01035-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥6,000
30562-1A	TFS（30562-0050）		5g	￥7,200
30562-3A	TFS（30562-0250）		25g	￥29,600

2-アミノ-6-ブロモ安息香酸
2-Amino-6-bromobenzoic acid

$C_7H_6BrNO_2$...216.03
CAS RN® [20776-48-1]

01339-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥17,000
01339-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,800

3-アミノ-2-ブロモ安息香酸
3-Amino-2-bromobenzoic acid

$C_7H_6BrNO_2$...216.03
CAS RN® [168899-61-4]

01798-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥16,000

3-アミノ-4-ブロモ安息香酸
3-Amino-4-bromobenzoic acid

警告

$C_7H_6BrNO_2$...216.03
CAS RN® [2840-29-1]

01484-55			5g	￥10,000

2-アミノ-4-ブロモベンゾニトリル
2-Amino-4-bromobenzonitrile

$C_7H_5BrN_2$...197.03 [劇] III
CAS RN® [304858-65-9]

01241-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥10,500

2-アミノ-5-ブロモベンゾニトリル
2-Amino-5-bromobenzonitrile

警告

$C_7H_5BrN_2$...197.03 [劇] III
CAS RN® [39263-32-6] mp95℃～96℃▲

35025-1A	TFS（35025-0010）		1g	￥4,900
35025-2A	TFS（35025-0050）		5g	￥17,300

2-アミノ-6-ブロモベンゾニトリル
2-Amino-6-bromobenzonitrile

$C_7H_5BrN_2$...197.03 ［劇］III
CAS RN® ［77326-62-6］

01242-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥27,000
01242-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

3-アミノ-5-ブロモベンゾトリフルオリド
3-Amino-5-bromobenzotrifluoride

$C_7H_5BrF_3N$...240.02
CAS RN® ［54962-75-3］

01714-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥3,900
01714-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,000

2-アミノ-5-ブロモ-2′-フルオロベンゾフェノン
2-Amino-5-bromo-2′-fluorobenzophenone

$C_{13}H_9BrFNO$...294.11
CAS RN® ［1479-58-9］

02057-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥19,000
02057-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,500

D L-2-アミノ-3-(6-ブロモインドリル)プロピオン酸 → 6-ブロモ-*D L*-トリプトファン

5-アミノ-4-ブロモ-3-メチルピラゾール臭化水素酸塩
5-Amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide

$C_4H_6BrN_3$・HBr...256.92
CAS RN® ［167683-86-5］

01485-65			1g	￥35,000

2-アミノ-3-ブロモ-5-メチルピリジン
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine

警告

$C_6H_7BrN_2$...187.03
CAS RN® [17282-00-7] mp70℃～74℃▲

01486-45			10g	￥7,500
34859-1A	TFS（34859-0050）		5g	￥4,400
34859-2A	TFS（34859-0010）		1g	￥2,000

2-アミノ-5-ブロモ-3-メチルピリジン
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine

警告

$C_6H_7BrN_2$...187.03
CAS RN® [3430-21-5]

01532-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥6,700
01532-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥3,800

2-アミノ-5-ブロモ-4-メチルピリジン
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine

警告

$C_6H_7BrN_2$...187.03
CAS RN® [98198-48-2] mp151℃▲

01487-55			5g	￥12,000

1-アミノ-4-ブロモナフタレン
1-Amino-4-bromonaphthalene

$C_{10}H_8BrN$...222.08 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2298-07-9]

01233-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥15,500
01233-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥7,000

2-アミノ-5-ブロモニコチン酸
2-Amino-5-bromonicotinic acid

$C_6H_5BrN_2O_2$...217.02
CAS RN® [52833-94-0]

36106-1A	TFS（36106-0010）		1g	￥21,100

2-アミノ-5-ブロモ-3-ニトロピリジン
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine

$C_5H_4BrN_3O_2$...218.00
CAS RN® [6945-68-2]

01539-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥9,500
01539-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

6-アミノ-3-ブロモ-2-メチルピリジン
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine

$C_6H_7BrN_2$...187.03
CAS RN® [42753-71-9] mp82℃～83℃

36075-1A	TFS（36075-0010）		1g	￥5,700
36075-2A	TFS（36075-0050）		5g	￥20,500

2-アミノ-5-ブロモピラジン
2-Amino-5-bromopyrazine

警告

$C_4H_4BrN_3$...173.99
CAS RN® [59489-71-3] mp105℃～106℃†

01758-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥7,500
01758-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥3,100
49248-33	TFS（MO00943DE）		5g	￥42,800
49248-34	TFS（MO00943DA）		1g	￥9,600

2-アミノ-3-ブロモピリジン
2-Amino-3-bromopyridine

警告

$C_5H_5BrN_2$...173.01
CAS RN® [13534-99-1] mp49℃～53℃▲

01750-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥13,500
01750-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,300
36058-1A TFS（36058-0010）			1g	￥3,300

2-アミノ-4-ブロモピリジン
2-Amino-4-bromopyridine

警告

$C_5H_5BrN_2$...173.01
CAS RN® [84249-14-9]

01723-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥29,000
01723-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥8,500

2-アミノ-5-ブロモピリジン
2-Amino-5-bromopyridine

警告

$Br(C_5H_3N)NH_2$...173.01
CAS RN® [1072-97-5] mp136℃～138℃▲

01488-25			100g	￥10,500
15374-1A TFS（15374-0050）			5g	￥4,800
15374-2A TFS（15374-0250）			25g	￥10,900

2-アミノ-6-ブロモピリジン
2-Amino-6-bromopyridine

警告

$C_5H_5BrN_2$...173.01
CAS RN® [19798-81-3]

01531-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥10,500
01531-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥6,600

3-アミノ-2-ブロモピリジン
3-Amino-2-bromopyridine

警告

$C_5H_5BrN_2$...173.01
CAS RN® [39856-58-1]

01724-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,500
01724-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,200

3-アミノ-2-ブロモピリジン
3-Amino-2-bromopyridine

警告

$C_5H_5BrN_2$...173.01
CAS RN® [39856-58-1] mp74℃～79℃

36060-1A TFS（36060-0010）			1g	￥5,100

3-アミノ-5-ブロモピリジン
3-Amino-5-bromopyridine

$C_5H_5BrN_2$...173.01
CAS RN® [13535-01-8]

01036-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥32,000
01036-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥9,500

5-アミノ-2-ブロモピリジン
5-Amino-2-bromopyridine

警告

$C_5H_5BrN_2$...173.01
CAS RN® [13534-97-9]

01530-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥9,000
01530-62	>97.0%(GC)	G	1g	￥4,100

2-アミノ-5-ブロモ-3-ピリジノール
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol

$C_5H_5BrN_2O$...189.01
CAS RN® [39903-01-0]

01044-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥32,000
01044-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

2-アミノ-5-ブロモピリミジン
2-Amino-5-bromopyrimidine

$C_4H_4BrN_3$...173.99
CAS RN® [7752-82-1]

02058-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥21,000
02058-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥7,000

2-アミノ-5-ブロモチアゾール臭化水素酸塩
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide

警告

$C_3H_3BrN_2S$･HBr...259.95
CAS RN® [61296-22-8] mp165℃(dec.)▲

01759-32	>95.0%	G	25g	￥6,700
01759-52	>95.0%	G	5g	￥2,700
15600-1A	TFS（15600-0250）		25g	￥23,600

2-アミノ-5-ブロモトルエン → 4-ブロモ-2-メチルアニリン

(±)-2-アミノ-1-ブタノール
(±)-2-Amino-1-butanol

$C_4H_{11}NO$...89.13 [危] 4-3-III
CAS RN® [96-20-8] mp-2℃▲ d0.94▲

10325-1A	TFS（10325-1000）	100mL	￥4,900
10325-2A	TFS（10325-0050）	5mL	￥2,700
10325-3A	TFS（10325-5000）	500mL	￥16,600

(*R*)-(-)-2-アミノ-1-ブタノール
(*R*)-(-)-2-Amino-1-butanol

$C_4H_{11}NO$...89.13 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［5856-63-3］ mp-2℃▲ d0.94▲

24403-1A	TFS（24403-1000）		100mL	￥40,300
24403-2A	TFS（24403-0250）		25mL	￥11,100

4-アミノ-1-ブタノール
4-Amino-1-butanol

$C_4H_{11}NO$...89.13 ［危］4-3-III
CAS RN® ［13325-10-5］

02059-32		>97.0%(GC)	25g	￥25,000
02059-52		>97.0%(GC)	5g	￥8,000
17635-1A	TFS（17635-0050）		5g	￥10,900
17635-2A	TFS（17635-0010）		1g	￥4,000
17635-3A	TFS（17635-0250）		25g	￥40,000

4-アミノ-2-ブタノール
4-Amino-2-butanol

$C_4H_{11}NO$...89.13 ［危］4-3-III
CAS RN® ［39884-48-5］ d0.93▲

33023-1A	TFS（33023-0010）		1g	￥31,100

2-アミノ-4-ｔｅｒｔ-ブチルフェノール
2-Amino-4-*tert*-butylphenol

$C_{10}H_{15}NO$...165.23
CAS RN® ［1199-46-8］ mp160℃～163℃▲

18583-1A	TFS（18583-0500）		50g	￥14,400

(±)-3-アミノ-ｉｓｏ-酪酸-2,3,3-d_3
(±)-3-Amino-*iso*-butyric-2,3,3-d_3 acid

$H_2NCD_2CD(CH_3)COOH$...106.13
CAS RN® ［1219803-65-2］

49145-38	CDN（D-7229）	98 atom% D	50mg	￥57,200

(*S*)-3-アミノ酪酸
(*S*)-3-Aminobutyric acid

$C_4H_9NO_2$...103.11
CAS RN® [3775-72-2]

01827-97	>97.0%(T)	G	100mg	￥8,000

4-アミノ酪酸
4-Aminobutyric acid

警告

$C_4H_9NO_2$...103.11
CAS RN® [56-12-2] mp194℃～204℃▲

01754-02	>95.0%	G	500g	￥10,500
01754-32	>95.0%	G	25g	￥2,500
10328-1A	TFS（10328-1000）		100g	￥13,000
10328-2A	TFS（10328-0250）		25g	￥4,500
10328-3A	TFS（10328-5000）		500g	￥39,400

4-アミノ酪酸-2,2,3,3,4,4-d_6
4-Aminobutyric-2,2,3,3,4,4-d_6 acid

$H_2NCD_2CD_2CD_2COOH$...109.15
CAS RN® [70607-85-1]

49120-66	CDN（D-1828）	99 atom% D	100mg	￥79,200

4-アミノ酪酸-2,2-d_2
4-Aminobutyric-2,2-d_2 acid

$H_2NCH_2CH_2CD_2COOH$...105.13
CAS RN® [67910-98-9]

49120-65	CDN（D-1731）	98 atom% D	250mg	￥70,400

4-アミノ酪酸-4,4-d_2
4-Aminobutyric-4,4-d_2 acid

$C_4H_7D_2NO_2$...105.13
CAS RN® [107022-06-0]

49136-15	CDN（D-6846）	98 atom% D	100mg	￥70,400

D(-)-2-アミノ酪酸
D(-)-2-Aminobutyric acid

$C_2H_5CH(NH_2)CO_2H$...103.11
CAS RN® [2623-91-8] mp>300℃▲

15214-1A	TFS（15214-0050）		5g	￥18,700

D-2-アミノ酪酸-d_6
D-2-Aminobutyric-d_6 acid

$CD_3CD_2CD(NH_2)COOH$...109.15

49145-37	CDN（D-7012）	98 atom% D	50mg	￥66,000

D L-2-アミノ酪酸
DL-2-Aminobutyric acid

$C_4H_9NO_2$...103.11
CAS RN® [2835-81-6]

01595-02		>95.0%	500g	￥15,000
01595-32		>95.0%	25g	￥3,400

D L-2-アミノ酪酸-d_6
DL-2-Aminobutyric-d_6 acid

$CD_3CD_2CD(NH_2)COOH$...109.15
CAS RN® [350820-17-6]

49120-63	CDN（D-5010）	98 atom% D	100mg	￥48,400

L(+)-2-アミノ酪酸
L(+)-2-Aminobutyric acid

$C_2H_5CH(NH_2)CO_2H$...103.11
CAS RN® [1492-24-6] mp>300℃▲

21538-1A	TFS（21538-0050）		5g	￥29,100
21538-2A	TFS（21538-0010）		1g	￥9,900

L-2-アミノ酪酸-3,3-d_2
L-2-Aminobutyric-3,3-d_2 acid

$CH_3CD_2CH(NH_2)COOH$...105.13
CAS RN® [352431-37-9]

49120-64	CDN（D-5244）	98 atom% D	10mg	￥48,400

L-2-アミノ酪酸-d_6
L-2-Aminobutyric-d_6 acid

$CD_3CD_2CD(NH_2)COOH$...109.15

49136-14	CDN（D-6945）	98 atom% D	50mg	￥68,200

γ-アミノ酪酸 → 4-アミノ酪酸

γ-アミノ酪酸
γ-Aminobutyric acid

警告

$C_4H_9NO_2$...103.11
CAS RN® ［56-12-2］

49871-61	PHY（83415）	天然物化学研究用	100mg	￥22,500

α-アミノ-γ-ブチロラクトン臭化水素酸塩
α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide

$C_4H_7NO_2$･HBr...182.01
CAS RN® ［6305-38-0］ mp221℃▲

10329-1A	TFS（10329-0100）	10g	￥17,800

6-アミノカプロン酸 → 6-アミノヘキサン酸

6-アミノ-*n*-カプロン酸ラクタム → ε-カプロラクタム

ω-アミノカプリル酸
ω-Aminocaprylic acid

$H_2N(CH_2)_7CO_2H$...159.22
CAS RN® ［1002-57-9］ mp194℃～196℃(dec.)▲

22683-1A	TFS（22683-0050）	5g	￥29,100
22683-2A	TFS（22683-0010）	1g	￥7,700

アミノカルブ標準品
Aminocarb standard

$C_{11}H_{16}N_2O_2$...208.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2032-59-9］

49826-70	DES（C10190000）		残留農薬試験用	250mg	￥15,000

4-アミノ-5-カルバモイルイミダゾール塩酸塩
4-Amino-5-carbamoylimidazole hydrochloride

$C_4H_6N_4O \cdot HCl$...126.11
CAS RN® ［72-40-2］

01822-32		>95.0%	G	25g	￥10,000
01822-52		>95.0%	G	5g	￥4,000

3-アミノ-4-カルベトキシピラゾール
3-Amino-4-carbethoxypyrazole

$C_6H_9N_3O_2$...155.15
CAS RN® ［6994-25-8］ mp105℃～107℃▲

01393-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
01393-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000
10331-2A	TFS（10331-0050）			5g	￥11,300

3-(アミノカルボニル)-1 *H*-インドール-5-アミン塩酸塩0.5水和物
3-(Aminocarbonyl)-1*H*-indol-5-amine hydrochloride 0.5 hydrate

$C_9H_9N_3O \cdot HCl \cdot 0.5H_2O$...220.65
CAS RN® ［306936-36-7］ mp296℃～298℃▲

49241-37	TFS（SP01297DA）	97%		1g	￥26,100

4-アミノカルボニルフェニルボロン酸
4-Aminocarbonylphenylboronic acid

警告

$C_7H_8BNO_3$...164.95 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［123088-59-5］ mp229℃～234℃†

01996-55		>97.0%(HLC)	Organics	5g	￥11,500
01996-65		>97.0%(HLC)	Organics	1g	￥6,100

7-アミノセファロスポラン酸
7-Aminocephalosporanic acid

$C_{10}H_{12}N_2O_5S$...272.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［957-68-6］ mp>300℃▲

18441-1A	TFS（18441-0010）	1g	￥5,700
18441-2A	TFS（18441-0050）	5g	￥20,000

1-アミノ-2-クロロベンゼン → *o*-クロロアニリン

1-アミノ-3-クロロベンゼン → *m*-クロロアニリン

1-アミノ-4-クロロベンゼン → *p*-クロロアニリン

2-アミノ-3-クロロ安息香酸 → 3-クロロアントラニル酸

2-アミノ-4-クロロ安息香酸
2-Amino-4-chlorobenzoic acid

$C_7H_6ClNO_2$...171.57
CAS RN® ［89-77-0］ mp231℃～235℃▲

10332-1A	TFS（10332-0250）	25g	￥5,500
10332-2A	TFS（10332-1000）	100g	￥17,300

2-アミノ-5-クロロ安息香酸
2-Amino-5-chlorobenzoic acid

$C_7H_6ClNO_2$...171.57
CAS RN® ［635-21-2］ mp209℃～213℃▲

10333-1A	TFS（10333-0250）	25g	￥47,900

2-アミノ-5-クロロ安息香酸
2-Amino-5-chlorobenzoic acid

$C_7H_6ClNO_2$...171.57
CAS RN® [635-21-2]

02062-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥14,000
02062-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,800

2-アミノ-6-クロロ安息香酸
2-Amino-6-chlorobenzoic acid

$C_7H_6ClNO_2$...171.57
CAS RN® [2148-56-3] mp143℃～147℃▲

30050-2A	TFS（30050-0010）	1g	￥3,800
30050-3A	TFS（30050-0100）	10g	￥13,900

3-アミノ-4-クロロ安息香酸
3-Amino-4-chlorobenzoic acid

警告

$C_7H_6ClNO_2$...171.57
CAS RN® [2840-28-0]

01603-02	>95.0%(HLC)	G	500g	￥15,500
01603-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥3,100

3-アミノ-5-クロロ安息香酸
3-Amino-5-chlorobenzoic acid

$C_7H_6ClNO_2$...171.57
CAS RN® [21961-30-8]

01823-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥23,500
01823-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

4-アミノ-2-クロロ安息香酸
4-Amino-2-chlorobenzoic acid

$C_7H_6ClNO_2$...171.57
CAS RN® [2457-76-3] mp210℃～215℃▲

20323-1A	TFS（20323-0050）	5g	￥10,500

4-アミノ-3-クロロ安息香酸
4-Amino-3-chlorobenzoic acid

$C_7H_6ClNO_2$...171.57
CAS RN® [2486-71-7]

01518-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01518-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

2-アミノ-3-クロロベンゾニトリル
2-Amino-3-chlorobenzonitrile

$C_7H_5ClN_2$...152.57 [劇] III
CAS RN® [53312-77-9]

01828-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥16,500
01828-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,800

2-アミノ-5-クロロベンゾニトリル
2-Amino-5-chlorobenzonitrile

$C_7H_5ClN_2$...152.57 [劇] III
CAS RN® [5922-60-1]

02063-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥18,000
02063-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥5,500

5-アミノ-2-クロロベンゾニトリル
5-Amino-2-chlorobenzonitrile

$C_7H_5ClN_2$...152.57 [劇] III
CAS RN® [35747-58-1]

01832-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥24,500
01832-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

2-アミノ-5-クロロベンゾフェノン
2-Amino-5-chlorobenzophenone

$C_{13}H_{10}ClNO$...231.67
CAS RN® [719-59-5] mp96℃～100℃▲

01201-52	>97.0%	G	5g	￥4,100
01201-62	>97.0%	G	1g	￥2,400
10334-1A	TFS（10334-1000）		100g	￥4,800
10334-2A	TFS（10334-0250）		25g	￥3,000

2-アミノ-5-クロロベンゾフェノンオキシム
2-Amino-5-chlorobenzophenone oxime

$C_{13}H_{11}ClN_2O$...246.69
CAS RN® [18097-52-4]

mixture of *syn* and *anti* isomers

10335-1A	TFS（10335-0250）	25g	￥61,300

2-アミノ-4-クロロベンゾチアゾール
2-Amino-4-chlorobenzothiazole

$C_7H_5ClN_2S$...184.64
CAS RN® [19952-47-7] mp203℃～205℃▲

15847-1A	TFS（15847-0050）	5g	￥7,100

2-アミノ-5-クロロベンゾトリフルオリド
2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride

$H_2NC_6H_3(Cl)CF_3$...195.56 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [445-03-4] bp66℃～67℃(3mm)▲ mp8.8℃▲ d1.386▲

20324-1A	TFS（20324-0250）	25g	￥9,100

5-アミノ-2-クロロベンゾトリフルオリド
5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride

$H_2NC_6H_3(Cl)CF_3$...195.56
CAS RN® [320-51-4] mp34℃～36℃▲

10337-1A	TFS（10337-0250）	25g	￥7,200
10337-2A	TFS（10337-0050）	5g	￥3,500
10337-3A	TFS（10337-1000）	100g	￥21,600

2-アミノ-5-クロロベンゾオキサゾール
2-Amino-5-chlorobenzoxazole

$C_7H_5ClN_2O$...168.57
CAS RN® [61-80-3] mp181℃～184℃▲

10338-1A	TFS（10338-0050）		5g	￥11,400
10338-2A	TFS（10338-0250）		25g	￥47,300

2-アミノ-4-クロロ-5-フルオロ安息香酸
2-Amino-4-chloro-5-fluorobenzoic acid

$C_7H_5ClFNO_2$...189.57
CAS RN® [108288-16-0]

01249-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥18,000

D L-2-アミノ-3-(5-クロロインドリル)プロピオン酸 → 5-クロロ-*D L*-トリプトファン

D L-2-アミノ-3-(6-クロロインドリル)プロピオン酸 → 6-クロロ-*D L*-トリプトファン

2-アミノ-4-クロロ-6-メトキシピリミジン
2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine

$C_5H_6ClN_3O$...159.57
CAS RN® [5734-64-5] mp169℃～176℃†

34709-1A	TFS（34709-0050）		5g	￥3,300
34709-2A	TFS（34709-0250）		25g	￥10,600

2-アミノ-6-クロロ-4-メトキシピリミジン → 2-アミノ-4-クロロ-6-メトキシピリミジン

4-アミノ-3-クロロ-5-メチルベンゾニトリル
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile

$C_8H_7ClN_2$...166.60 [劇] III
CAS RN® [158296-69-6]

01940-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
01940-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,700

4-アミノ-6-クロロ-2-メチルメルカプトピリミジン
4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine

警告

$C_5H_6ClN_3S$...175.64
CAS RN® [1005-38-5] mp130℃～134℃▲

10339-1A	TFS（10339-0050）	5g	￥17,200
10339-2A	TFS（10339-0010）	1g	￥5,600
10339-3A	TFS（10339-0250）	25g	￥68,100

2-アミノ-4-クロロ-6-メチルピリミジン
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine

警告

$C_5H_6ClN_3$...143.57
CAS RN® [5600-21-5] mp182℃～186℃▲

01523-32	>99.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01523-52	>99.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

4-アミノ-3-クロロ-5-ニトロベンゾトリフルオリド
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride

$C_7H_4ClF_3N_2O_2$...240.56
CAS RN® [57729-79-0] mp66℃～68℃▲

35007-2A	TFS（35007-0050）	5g	￥43,700

2-アミノ-5-クロロフェノール
2-Amino-5-chlorophenol

C_6H_6ClNO...143.56
CAS RN® [28443-50-7] mp147℃～151℃▲

29728-1A	TFS（29728-0050）	5g	￥4,800

3-アミノ-4-クロロフェノール
3-Amino-4-chlorophenol

C_6H_6ClNO...143.56
CAS RN® [16026-77-0]

01618-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
01618-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,400

(*R*)-2-アミノ-1-(3-クロロフェニル)エタノール塩酸塩
(*R*)-2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethanol hydrochloride

警告

$C_8H_{10}ClNO \cdot HCl$...208.08
CAS RN® [169032-01-3]

光学純度:>98% ee(HLC)

01061-35	>98.0%	不斉合成用	25g	￥24,000

3-アミノ-3-(*p*-クロロフェニル)プロピオン酸
3-Amino-3-(*p*-chlorophenyl)propionic acid

$C_9H_{10}ClNO_2$...199.63
CAS RN® [19947-39-8] mp243℃～245℃▲

33433-1A	TFS（33433-0010）	1g	￥12,200
33433-2A	TFS（33433-0050）	5g	￥46,300

3-アミノ-6-クロロ-4-ピコリン
3-Amino-6-chloro-4-picoline

$C_6H_7ClN_2$...142.58
CAS RN® [66909-38-4] mp69℃～73℃▲

36099-1A	TFS（36099-0010）	1g	￥11,600

2-アミノ-6-クロロプリン
2-Amino-6-chloropurine

$C_5H_4ClN_5$...169.57
CAS RN® [10310-21-1] mp>300℃▲

14929-1A	TFS（14929-0010）	1g	￥6,900
14929-2A	TFS（14929-0050）	5g	￥23,100

2-アミノ-3-クロロピラジン
2-Amino-3-chloropyrazine

$C_4H_4ClN_3$...129.54
CAS RN® [6863-73-6]

01046-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥32,000
01046-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥9,500

2-アミノ-6-クロロピラジン
2-Amino-6-chloropyrazine

$C_4H_4ClN_3$...129.54
CAS RN® [33332-28-4]

01446-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥9,500
01446-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥4,300

2-アミノ-5-クロロピリジン
2-Amino-5-chloropyridine

警告

$C_5H_5ClN_2$...128.55
CAS RN® [1072-98-6] mp134℃～138℃†

01468-02		>95.0%(GC)	G	500g	￥15,000
01468-32		>95.0%(GC)	G	25g	￥4,000
10341-1A	TFS（10341-0250）			25g	￥6,400
10341-2A	TFS（10341-1000）			100g	￥17,200
10341-3A	TFS（10341-5000）			500g	￥69,400

2-アミノ-5-クロロピリジン-3,4,6-d_3
2-Amino-5-chloropyridine-3,4,6-d_3

$C_5H_2D_3ClN_2$...131.57
CAS RN® [1093384-99-6]

49136-17	CDN（D-6691）	98 atom% D	250mg	￥88,000

2-アミノ-6-クロロピリジン
2-Amino-6-chloropyridine

$C_5H_5ClN_2$...128.55
CAS RN® [45644-21-1] mp72℃～73.5℃

42950-1A	TFS（42950-0010）	1g	￥3,200
42950-2A	TFS（42950-0050）	5g	￥10,500

3-アミノ-2-クロロピリジン
3-Amino-2-chloropyridine

警告

$C_5H_5ClN_2$...128.55
CAS RN® [6298-19-7] mp77℃～82℃▲

10342-1A	TFS（10342-0100）		10g	￥6,400
10342-2A	TFS（10342-0500）		50g	￥16,100

3-アミノ-4-クロロピリジン
3-Amino-4-chloropyridine

警告

$C_5H_5ClN_2$...128.55 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [20511-15-3]

01727-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥12,500
01727-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,700

4-アミノ-2-クロロピリジン
4-Amino-2-chloropyridine

警告

$C_5H_5ClN_2$...128.55
CAS RN® [14432-12-3] mp90℃～94℃▲

01438-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
01438-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,700
34545-1A	TFS（34545-0050）		5g	￥5,400
34545-2A	TFS（34545-0250）		25g	￥18,900

4-アミノ-2-クロロピリミジン
4-Amino-2-chloropyrimidine

$C_4H_4ClN_3$...129.54
CAS RN® [7461-50-9]

01092-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥21,500
01092-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,500

2-アミノ-6-クロロ-4-ピリミジノール *n*水和物
2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol *n*-hydrate

$C_4H_4ClN_3O \cdot nH_2O$
CAS RN® [206658-81-3] mp252℃▲

10343-1A	TFS（10343-0050）		5g	￥12,100

6-アミノクリセン標準品
6-Aminochrysene standard

$C_{18}H_{13}N$...243.30
CAS RN® [2642-98-0]

49797-51	ACC（R-065N）	環境分析用	10mg	￥3,000

3-アミノクマリン
3-Aminocoumarin

警告

$C_9H_7NO_2$...161.15
CAS RN® [1635-31-0]

01728-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥16,000

2-アミノ-*p*-クレゾール
2-Amino-*p*-cresol

C_7H_9NO...123.15
CAS RN® [95-84-1] mp134℃～139℃▲

01500-32	>97.0%(T)	G	25g	￥4,600
01500-52	>97.0%(T)	G	5g	￥2,900
16321-1A	TFS（16321-2500）		250g	￥10,600

3-アミノ-*o*-クレゾール
3-Amino-*o*-cresol

$H_2NC_6H_3(CH_3)OH$...123.15
CAS RN® [53222-92-7] mp129℃～130℃▲

20904-1A	TFS（20904-2500）		250mg	￥4,400
20904-2A	TFS（20904-0010）		1g	￥13,500

4-アミノ-*m*-クレゾール
4-Amino-*m*-cresol

C_7H_9NO...123.15 ［変］
CAS RN®［2835-99-6］ mp176℃～180℃▲

16320-1A	TFS（16320-0500）	50g	￥19,200
16320-3A	TFS（16320-2500）	250g	￥68,200

5-アミノ-*o*-クレゾール → 5-アミノ-2-メチルフェノール

3-アミノクロトノニトリル
3-Aminocrotononitrile

$CH_3C(NH_2)$:CHCN...82.10 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1118-61-2］

15245-2A	TFS（15245-1000）	100g	￥3,900
15245-3A	TFS（15245-5000）	500g	￥15,000

2-アミノ-2-シアノアセトアミド
2-Amino-2-cyanoacetamide

$C_3H_5N_3O$...99.09 ［劇］III
CAS RN®［6719-21-7］ mp120℃～124℃▲

38276-1A	TFS（38276-0050）	5g	￥21,400
38276-2A	TFS（38276-0250）	25g	￥70,700

2-アミノ-5-シアノピリジン
2-Amino-5-cyanopyridine

$C_6H_5N_3$...119.12 ［劇］III
CAS RN®［4214-73-7］ mp159℃～165℃▲

35762-1A	TFS（35762-0050）	5g	￥6,400
35762-2A	TFS（35762-0250）	25g	￥22,800

アミノシクロヘキサン → シクロヘキシルアミン

1-アミノ-1-シクロヘキサンカルボン酸
1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid

$C_7H_{13}NO_2$...143.18
CAS RN® [2756-85-6] mp>300℃†

20395-1A	TFS（20395-0250）	25g	￥13,800

t r a n s-2-アミノ-1-シクロヘキサンカルボン酸
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid

$C_7H_{13}NO_2$...143.18
CAS RN® [5691-19-0] mp274℃～278℃▲

26563-2A	TFS（26563-0010）	1g	￥57,500

アミノシクロヘキサン塩酸塩 → シクロヘキシルアミン塩酸塩(塩酸シクロヘキシルアミン)

t r a n s-4-アミノシクロヘキサノール
trans-4-Aminocyclohexanol

危険

$C_6H_{13}NO$...115.17
CAS RN® [27489-62-9] mp108℃～113℃▲

01373-02	>95.0%(GC)	G	500g	￥29,500
01373-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥3,700
34668-1A	TFS（34668-0050）		5g	￥3,400
34668-2A	TFS（34668-0250）		25g	￥10,300

(1 *R*,2 *R*)-2-アミノシクロヘキサノール塩酸塩
(1*R*,2*R*)-2-Aminocyclohexanol Hydrochloride

$C_6H_{14}ClNO$...151.63
CAS RN® [13374-31-7]

49212-00	ダイセル（110445-001G）	1g	￥11,600

(1 *S*,2 *S*)-2-アミノシクロヘキサノール塩酸塩
(1*S*,2*S*)-2-Aminocyclohexanol Hydrochloride

$C_6H_{14}ClNO$...151.63
CAS RN® [13374-30-6]

49212-01	ダイセル（110446-001G）	1g	￥11,400

ｃ ｉ ｓ-2-アミノシクロヘキサノール塩酸塩
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride

$C_6H_{13}NO \cdot HCl$...151.63
CAS RN® [6936-47-6] mp186℃～190℃▲

26585-1A	TFS（26585-0010）		1g	￥85,600

ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-2-アミノシクロヘキサノール塩酸塩
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride

$C_6H_{13}NO \cdot HCl$...151.63
CAS RN® [5456-63-3] mp172℃～175℃▲

01613-52	>95.0%(T)	G	5g	￥18,000
01613-62	>95.0%(T)	G	1g	￥6,400
20698-1A	TFS（20698-0050）		5g	￥13,000

ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-2-アミノ-4-シクロヘキセン-1-カルボン酸
trans-2-Amino-4-cyclohexene-1-carboxylic acid

$C_7H_{11}NO_2$...141.16
CAS RN® [97945-19-2] mp281℃～283℃▲

27776-1A	TFS（27776-2500）		250mg	￥32,700

(1*R*,2*S*)-(-)-2-アミノシクロヘキサ-4-エンカルボン酸塩酸塩
(1*R*,2*S*)-(-)-2-Aminocyclohex-4-enecarboxylic acid hydrochloride

$C_7H_{11}NO_2 \cdot HCl$...177.62
mp191℃～220℃▲

36903-1A	TFS（36903-0500）		50mg	￥58,000

3-[(1*R*,2*R*)-2-アミノシクロヘキシルアミノ]-4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルアミノ]シクロブト-3-エン-1,2-ジオン塩酸塩
3-[(1*R*,2*R*)-2-Aminocyclohexylamino]-4-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenylamino]cyclobut-3-ene-1,2-dione Hydrochloride

$C_{18}H_{17}F_6N_3O_2 \cdot HCl$...457.79

49216-74	ダイセル（200217-100MG）		100mg	￥27,400

3-[(1 *S*,2 *S*)-2-アミノシクロヘキシルアミノ]-4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルアミノ]シクロブト-3-エン-1,2-ジオン塩酸塩
3-[(1*S*,2*S*)-2-Aminocyclohexylamino]-4-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenylamino]cyclobut-3-ene-1,2-dione Hydrochloride

$C_{18}H_{17}F_6N_3O_2 \cdot HCl$...457.79

49216-73　ダイセル（200212-100MG）　100mg　￥32,600

(2 *S*)-2-[[[[(1 *R*,2 *R*)-2-アミノシクロヘキシル]アミノ]チオキソメチル]アミノ]- *N*-(ジフェニルメチル)- *N*,3,3-トリメチルブタンアミド
(2*S*)-2-[[[[(1*R*,2*R*)-2-Aminocyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-*N*-(diphenylmethyl)-*N*,3,3-trimethylbutanamide

$C_{27}H_{38}N_4OS$...466.68
CAS RN® ［1421052-39-2］

49214-91　ダイセル（135575-100MG）　100mg　￥34,200

(2 *S*)-2-[[[[(1 *S*,2 *S*)-2-アミノシクロヘキシル]アミノ]チオキソメチル]アミノ]- *N*-(ジフェニルメチル)- *N*,3,3-トリメチルブタンアミド
(2*S*)-2-[[[[(1*S*,2*S*)-2-Aminocyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-*N*-(diphenylmethyl)-*N*,3,3-trimethylbutanamide

$C_{27}H_{38}N_4OS$...466.68
CAS RN® ［1421697-46-2］

49214-92　ダイセル（135576-100MG）　100mg　￥34,200

(2 *R*)-2-[[[[(1 *S*,2 *S*)-2-アミノシクロヘキシル]アミノ]チオキソメチル]アミノ]- *N*,3,3-トリメチル- *N*-(フェニルメチル)ブタンアミド
(2*R*)-2-[[[[(1*S*,2*S*)-2-Aminocyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-*N*,3,3-trimethyl-*N*-(phenylmethyl)butanamide

$C_{21}H_{34}N_4OS$...390.58

49214-77　ダイセル（135399-100MG）　100mg　￥35,800

(2*S*)-2-[[[[(1*R*,2*R*)-2-アミノシクロヘキシル]アミノ]チオキソメチル]アミノ]-*N*,3,3-トリメチル-*N*-(フェニルメチル)ブタンアミド
(2*S*)-2-[[[[(1*R*,2*R*)-2-Aminocyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-*N*,3,3-trimethyl-*N*-(phenylmethyl)butanamide

$C_{21}H_{34}N_4OS$...390.58
CAS RN® [479423-21-7]

49214-76	ダイセル（135398-100MG）	100mg	￥35,800

N-[(1*R*,2*R*)-2-アミノシクロヘキシル]-*N*′-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チオウレア
N-[(1*R*,2*R*)-2-Aminocyclohexyl]-*N*′-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea

$C_{15}H_{17}F_6N_3S$...385.37
CAS RN® [860994-58-7]

49214-27	ダイセル（120925-100MG）	100mg	￥28,000

cis-2-アミノ-1-シクロペンタンカルボキサミド
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxamide

$C_6H_{12}N_2O$...128.17
CAS RN® [135053-11-1] mp132℃～134℃▲

33442-1A	TFS（33442-0010）	1g	￥37,900

(1*R*,3*S*)-3-アミノシクロペンタンカルボン酸
(1*R*,3*S*)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid

$C_6H_{11}NO_2$...129.15
CAS RN® [71830-08-5] mp172.1℃(dec.)▲

光学純度:98% ee

36227-1A	TFS（36227-0010）	1g	￥49,700

(1*S*,3*R*)-3-アミノシクロペンタンカルボン酸
(1*S*,3*R*)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid

$C_6H_{11}NO_2$...129.15
CAS RN® [71830-07-4] mp192℃(dec.)▲

光学純度:98% ee

36228-1A	TFS（36228-0010）	1g	￥49,700

1-アミノ-1-シクロペンタンカルボン酸
1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid

$H_2NC_5H_8CO_2H$...129.15
CAS RN® [52-52-8] mp320℃～322℃(dec.)▲

10347-1A	TFS（10347-0050）		5g	￥10,700
10347-2A	TFS（10347-0100）		10g	￥20,500

cis-2-アミノ-1-シクロペンタンカルボン酸
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid

$C_6H_{11}NO_2$...129.15
CAS RN® [37910-65-9] mp218℃～220℃▲

27774-1A	TFS（27774-5000）		500mg	￥29,400

cis-2-アミノ-1-シクロペンタンカルボン酸塩酸塩
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride

$C_6H_{11}NO_2$･HCl...165.61
CAS RN® [212755-84-5] mp199℃～202℃▲

29838-1A	TFS（29838-2500）		250mg	￥10,400

(1*R*,4*S*)-4-アミノシクロペント-2-エンカルボン酸
(1*R*,4*S*)-4-Aminocyclopent-2-enecarboxylic acid

$C_6H_9NO_2$...127.14
CAS RN® [134003-04-6] mp180℃▲

光学純度:98% ee

36226-1A	TFS（36226-0010）		1g	￥22,100

1-アミノ-1-シクロプロパンカルボン酸
1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid

$H_2NC_3H_4CO_2H$...101.10
CAS RN® [22059-21-8] mp257℃(dec.)▲

01701-52		>95.0%	5g	￥18,000
01701-62		>95.0%	1g	￥6,400
30142-1A	TFS（30142-2500）		250mg	￥21,200

1-アミノシクロプロパン-2,2,3,3-d_4-カルボン酸
1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d_4-carboxylic acid

$C_4H_3D_4NO_2$...105.12
CAS RN® [84392-07-4]

49136-18	CDN（D-6292）	98 atom% D	100mg	￥79,200

アミノシクロピラクロル標準品
Aminocyclopyrachlor standard

$C_8H_8ClN_3O_2$...213.62 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [858956-08-8]

49312-04	A2S（A240P010）	残留農薬試験用	10mg	￥67,000

2-アミノ-2-デオキシグルコース塩酸塩 → *D*(+)-グルコサミン塩酸塩(塩酸 *D*(+)-グルコサミン)

4-アミノ-2,6-ジクロロフェノール
4-Amino-2,6-dichlorophenol

警告

$NH_2C_6H_2Cl_2OH$...178.01
CAS RN® [5930-28-9] mp167℃～170℃†

01555-32		>95.0%	G	25g	￥9,500
01555-52		>95.0%	G	5g	￥3,300
10348-1A	TFS（10348-0250）			25g	￥6,500
10348-2A	TFS（10348-0050）			5g	￥2,100
10348-3A	TFS（10348-1000）			100g	￥21,600

3-アミノ-2,5-ジクロロピリジン
3-Amino-2,5-dichloropyridine

警告

$C_5H_4Cl_2N_2$...163.00
CAS RN® [78607-32-6] mp124℃～125℃▲

01548-52		>97.0%(GC)	G	5g	￥10,500
01548-62		>97.0%(GC)	G	1g	￥4,500
49254-65	TFS（SPB06843DA）	95%		1g	￥2,700

3-アミノ-2,6-ジクロロピリジン
3-Amino-2,6-dichloropyridine

$C_5H_4Cl_2N_2$...163.00
CAS RN® [62476-56-6] mp122℃～123℃†

49254-66	TFS（RF05052EA）	97%		10g	￥54,900
49254-67	TFS（RF05052DA）	97%		1g	￥4,100

4-アミノ-2,6-ジクロロピリジン
4-Amino-2,6-dichloropyridine

$C_5H_4Cl_2N_2$...163.00
CAS RN® [2587-02-2]

01729-52			G	5g	￥17,000
01729-62			G	1g	￥5,900

4-アミノ-3,5-ジクロロピリジン
4-Amino-3,5-dichloropyridine

$Cl_2(C_5H_2N)NH_2$...163.00
CAS RN® [22889-78-7]

01443-32		>98.0%(HLC)	G	25g	￥7,500
01443-52		>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

2-アミノ-4,6-ジクロロピリミジン
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine

警告

$C_4H_3Cl_2N_3$...163.99
CAS RN® [56-05-3] mp219℃～226℃▲

01524-32		>98.0%(HLC)	G	25g	￥9,000
01524-52		>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,100
10349-1A	TFS（10349-0100）	tech.		10g	￥10,600
10349-2A	TFS（10349-0500）	tech.		50g	￥43,600

5-アミノ-4,6-ジクロロピリミジン
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine

警告

$C_4H_3Cl_2N_3$...163.99
CAS RN® [5413-85-4] mp145℃～148℃▲

01550-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥9,500
01550-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥4,400

1-アミノ-3,3-ジエトキシプロパン
1-Amino-3,3-diethoxypropane

$C_7H_{17}NO_2$...147.21 [危] 4-2-III
CAS RN® [41365-75-7] bp72℃(16mm)▲ d0.91▲

26985-1A	TFS（26985-0250）	25g	￥21,800

4-アミノ-α-ジエチルアミノ-*o*-クレゾール二塩酸塩
4-Amino-α-diethylamino-*o*-cresol dihydrochloride

$C_{11}H_{18}N_2O \cdot 2HCl$...267.19
CAS RN® [6297-14-9] mp215℃～218℃▲

16190-1A	TFS（16190-0050）	5g	￥10,900

p-アミノ-*N*,*N*-ジエチルアニリン → *N*,*N*-ジエチル-*p*-フェニレンジアミン

p-アミノ-*N*,*N*-ジエチルアニリン二塩酸塩→ *N*,*N*-ジエチル-*p*-フェニレンジアミン二塩酸塩(塩酸 *N*,*N*-ジエチル-*p*-フェニレンジアミン)

p-アミノ-*N*,*N*-ジエチルアニリン硫酸塩 → *N*,*N*-ジエチル-*p*-フェニレンジアミン硫酸塩(硫酸 *N*,*N*-ジエチル-*p*-フェニレンジアミン)

3-アミノ-*N*,*N*-ジエチル-4-メトキシベンゼンスルホンアミド
3-Amino-*N*,*N*-diethyl-4-methoxybenzenesulfonamide

$C_{11}H_{18}N_2O_3S$...258.34
CAS RN® [97-35-8]

01370-02	>95.0%(HLC)	G	500g	￥15,000
01370-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥3,200

2-アミノ-3,5-ジフルオロ安息香酸
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid

$C_7H_5F_2NO_2$...173.11
CAS RN® [126674-78-0]

01499-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥23,500
01499-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

3-アミノ-2,6-ジフルオロ安息香酸
3-Amino-2,6-difluorobenzoic acid

$C_7H_5F_2NO_2$...173.11
CAS RN® [83141-11-1]

01834-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥28,500
01834-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

4-アミノ-2,3-ジフルオロベンゾニトリル
4-Amino-2,3-difluorobenzonitrile

$C_7H_4F_2N_2$...154.11 [劇] III
CAS RN® [112279-71-7]

01939-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥12,500

4-アミノ-2,5-ジフルオロベンゾニトリル
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile

$C_7H_4F_2N_2$...154.11 [劇] III
CAS RN® [112279-61-5]

01938-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥10,000
01938-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,100

4-アミノ-2,6-ジフルオロベンゾニトリル
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile

$C_7H_4F_2N_2$...154.11 [劇] III
CAS RN® [207297-92-5]

01944-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥12,500

6-アミノ-2,3-ジヒドロインドール二塩酸塩 → 6-アミノインドリン二塩酸塩

6-アミノ-1,3-ジヒドロイソベンゾフラン-1-オン
6-Amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one

$C_8H_7NO_2$...149.14
CAS RN® [57319-65-0] mp183℃～185℃▲

49241-47	TFS（KM08380EA）	95%		10g	￥74,900
49241-48	TFS（KM08380DA）	95%		1g	￥19,700

5-アミノ-2,3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオン → ルミノール

2-アミノ-4,5-ジヒドロ-1,3-チアゾール-4-オン塩酸塩
2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride

$C_3H_4N_2OS \cdot HCl$...152.60
CAS RN® [2192-06-5]

49241-49	TFS（RH00879EA）			10g	￥33,200
49241-50	TFS（RH00879DA）			1g	￥4,400

2-アミノ-4,6-ジヒドロキシピリミジン
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine

$C_4H_5N_3O_2$...127.10
CAS RN® [56-09-7] mp>300℃▲

01606-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01606-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000
10351-1A	TFS（10351-0250）			25g	￥3,900
10351-2A	TFS（10351-1000）			100g	￥13,900

4-アミノ-2,6-ジヒドロキシピリミジン
4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine

$C_4H_5N_3O_2$...127.10
CAS RN® [873-83-6] mp>300℃▲

10352-1A	TFS（10352-1000）			100g	￥6,300
10352-2A	TFS（10352-0250）			25g	￥2,900
10352-3A	TFS（10352-5000）			500g	￥28,900

2-アミノ-4,5-ジメトキシ安息香酸
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid

$C_9H_{11}NO_4$...197.18
CAS RN® [5653-40-7] mp155℃～160℃▲

33501-1A	TFS（33501-0050）	5g	￥5,100
33501-2A	TFS（33501-0250）	25g	￥19,100

3-アミノ-2,6-ジメトキシピリジン一塩酸塩
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine monohydrochloride

$C_7H_{10}N_2O_2$･HCl...190.62
CAS RN® [80789-72-6] mp212℃▲

16232-1A	TFS（16232-5000）	500mg	￥9,600

2-アミノ-4,6-ジメトキシ-d_6-ピリミジン
2-Amino-4,6-dimethoxy-d_6-pyrimidine

$C_7H_4D_6N_2O_2$...160.20
CAS RN® [1219803-92-5]

49145-39	CDN（D-7135）	99 atom% D	50mg	￥44,000

2-アミノ-4,6-ジメトキシピリミジン
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine

警告

$C_6H_9N_3O_2$...155.15
CAS RN® [36315-01-2]

01731-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥5,700
01731-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥3,400

3-アミノ-7-ジメチルアミノ-2-メチルフェナジン塩酸塩 → ニュートラルレッド

(*S*)-2-アミノ-3-(ジメチルアミノ)プロパン酸二塩酸塩一水和物
(*S*)-2-Amino-3-(dimethylamino)propanoic acid dihydrochloride monohydrate

$C_5H_{12}N_2O_2$･2HCl･H_2O...223.09

27999-1A	TFS（27999-2500）	250mg	￥46,700

4-アミノ-2′,3-ジメチルアゾベンゼン標準品
4-Amino-2′,3-dimethylazobenzene standard

危険

$C_{14}H_{15}N_3$...225.28 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［97-56-3］

49863-27	DES（C10202000）	環境分析用	250mg	￥19,000

2-アミノ-3,5-ジメチル安息香酸 → 3,5-ジメチルアントラニル酸

2-アミノ-5,6-ジメチルベンゾチアゾール
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole

$C_9H_{10}N_2S$...178.25
CAS RN® ［29927-08-0］ mp185℃～189℃▲

10355-1A	TFS（10355-0050）		5g	￥12,000

2-アミノ-9,9-ジメチル-9*H*-フルオレン
2-Amino-9,9-dimethyl-9*H*-fluorene

$C_{15}H_{15}N$...209.28
CAS RN® ［108714-73-4］

01068-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥12,500
01068-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

3-アミノ-*N*,*N*-ジメチル-4-ニトロアニリン
3-Amino-*N*,*N*-dimethyl-4-nitroaniline

$C_8H_{11}N_3O_2$...181.19
CAS RN® ［2069-71-8］ mp113℃～114℃▲

32622-1A	TFS（32622-0050）		5g	￥26,400

3-アミノ-4,4-ジメチルペンタン酸水和物
3-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate

$C_7H_{15}NO_2 \cdot nH_2O$
CAS RN® ［336185-29-6］ mp223℃～225℃▲

33585-1A	TFS（33585-5000）		500mg	￥29,900

(2*R*)-2-アミノ-3,3-ジメチル-*N*-(フェニルメチル)ブタンアミド
(2*R*)-2-Amino-3,3-dimethyl-*N*-(phenylmethyl)butanamide

$C_{13}H_{20}N_2O$...220.31
CAS RN®［268556-62-3］

49214-88	ダイセル（135564-001G）	1g	￥30,200

(2*S*)-2-アミノ-3,3-ジメチル-*N*-(フェニルメチル)ブタンアミド
(2*S*)-2-Amino-3,3-dimethyl-*N*-(phenylmethyl)butanamide

$C_{13}H_{20}N_2O$...220.31
CAS RN®［207121-91-3］

49214-87	ダイセル（135563-100MG）	100mg	￥24,600

4-アミノ-2,3-ジメチル-1-フェニル-5-ピラゾロン → 4-アミノアンチピリン

(2*R*)-2-アミノ-3,3-ジメチル-*N*-2-ピリジルブタンアミド
(2*R*)-2-Amino-3,3-dimethyl-*N*-2-pyridinylbutanamide

$C_{11}H_{17}N_3O$...207.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1568087-94-4］

49215-91	ダイセル（135891-100MG）	100mg	￥21,200

(2*S*)-2-アミノ-3,3-ジメチル-*N*-2-ピリジルブタンアミド
(2*S*)-2-Amino-3,3-dimethyl-*N*-2-pyridinylbutanamide

$C_{11}H_{17}N_3O$...207.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［171764-07-1］

49215-90	ダイセル（135890-100MG）	100mg	￥21,200

2-アミノ-4,6-ジメチルピリミジン
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine

$C_6H_9N_3$...123.15
CAS RN®［767-15-7］ mp151℃～153℃▲

10359-1A	TFS（10359-1000）	100g	￥10,400
10359-2A	TFS（10359-0250）	25g	￥3,900

2-アミノ-4,6-ジニトロトルエン標準液
2-Amino-4,6-dinitrotoluene standard solution

$C_7H_7N_3O_4$...197.14 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［35572-78-2］

0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液

49810-49	ACC（M-8330-13-0.1X）	爆発物試験用	1mL	￥6,000

4-アミノ-2,6-ジニトロトルエン標準液
4-Amino-2,6-dinitrotoluene standard solution

$C_7H_7N_3O_4$...197.14 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［19406-51-0］

0.1mg/mL アセトニトリル-メタノール(1:1)溶液

49810-50	ACC（M-8330-14-0.1X）	爆発物試験用	1mL	￥6,000

p-アミノジフェニルアミン → *N*-フェニル-*p*-フェニレンジアミン

(1*R*,2*S*)-(-)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエタノール
(1*R*,2*S*)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol

$C_{14}H_{15}NO$...213.27
CAS RN® ［23190-16-1］

01702-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
01702-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,300

(1*R*,2*S*)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエタノール
(1*R*,2*S*)-2-Amino-1,2-diphenylethanol

$C_{14}H_{15}NO$...213.27
CAS RN® ［23190-16-1］

49212-02	ダイセル（100233-025G）		25g	￥48,900

(1*S*,2*R*)-(+)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエタノール
(1*S*,2*R*)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol

$C_{14}H_{15}NO$...213.27
CAS RN® ［23364-44-5］

01704-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
01704-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,400

(1*S*,2*R*)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエタノール
(1*S*,2*R*)-2-Amino-1,2-diphenylethanol

$C_{14}H_{15}NO$...213.27
CAS RN® [23364-44-5]

49212-03　ダイセル（100234-025G）　25g　￥57,400

N-[(1*R*,2*R*)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエチル]-*N*′-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チオウレア塩酸塩
N-[(1*R*,2*R*)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-*N*′-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea Hydrocholoride

$C_{23}H_{19}F_6N_3S$･HCl...519.93

49216-63　ダイセル（200043-100MG）　100mg　￥24,600

N-[(1*S*,2*S*)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエチル]-*N*′-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チオウレア塩酸塩
N-[(1*S*,2*S*)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-*N*′-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea Hydrocholoride

$C_{23}H_{19}F_6N_3S$･HCl...519.93

49216-64　ダイセル（200044-100MG）　100mg　￥24,600

N-[(1*R*,2*R*)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエチル]-*N*′-[(*S*)-1-(1-ナフタレニル)エチル]チオウレア
N-[(1*R*,2*R*)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-*N*′-[(*S*)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]thiourea

$C_{27}H_{27}N_3S$...425.59 ［冷］ 0℃～6℃

49215-37　ダイセル（120919-100MG）　100mg　￥27,800

N-[(1*S*,2*S*)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエチル]-*N*′-[(*R*)-1-(1-ナフタレニル)エチル]チオウレア
N-[(1*S*,2*S*)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-*N*′-[(*R*)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]thiourea

$C_{27}H_{27}N_3S$...425.59 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [313695-70-4]

49215-36　ダイセル（120907-100MG）　100mg　￥27,800

N-[(1 *R*,2 *R*)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエチル]-1,1,1-トリフルオロメタンスルホンアミド
N-[(1*R*,2*R*)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide

$C_{15}H_{15}F_3N_2O_2S$...344.35
CAS RN® [852212-89-6]

49214-28	ダイセル（120975-001G）	1g	￥22,400

N-[(1 *S*,2 *S*)-2-アミノ-1,2-ジフェニルエチル]-1,1,1-トリフルオロメタンスルホンアミド
N-[(1*S*,2*S*)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide

$C_{15}H_{15}F_3N_2O_2S$...344.35
CAS RN® [167316-28-1]

49214-30	ダイセル（120986-001G）	1g	￥22,400

2-アミノ-9,9-ジフェニル-9 *H*-フルオレン
2-Amino-9,9-diphenyl-9*H*-fluoren

$C_{25}H_{19}N$...333.42 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [1268519-74-9]

10866-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥21,000
10866-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥5,200

アミノジフェニルメタン
Aminodiphenylmethane

$(C_6H_5)_2CHNH_2$...183.24 ［危］ 4-3-III
CAS RN® [91-00-9] bp295℃▲ mp12℃▲ d1.063▲

30432-1A	TFS（30432-0250）	25g	￥7,900
30432-2A	TFS（30432-0010）	1g	￥2,700

1-アミノドデカン → *n*-ドデシルアミン

2-アミノエタン-1-スルホン酸 → タウリン

2-アミノエタン-d_4-スルホン酸
2-Aminoethane-d_4-sulfonic acid

$H_2NCD_2CD_2SO_3H$...129.17
CAS RN® [342611-14-7]

49120-71	CDN（D-1971）	99 atom% D	100mg	￥57,200

2-アミノエタン-d_4-チオール塩酸塩
2-Aminoethane-d_4-thiol hydrochloride

$C_2H_3D_4NS$·HCl...117.63 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [1219805-04-5]

49136-19	CDN（D-6501）	99 atom% D	50mg	￥70,400

2-アミノエタンチオール塩酸塩(塩酸2-アミノエタンチオール)
2-Aminoethanethiol hydrochloride

警告

$HSCH_2CH_2NH_2$·HCl...113.61
CAS RN® [156-57-0] mp69℃～70℃ †

25100-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥52,000
25100-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥6,200

2-アミノエタンチオール塩酸塩(塩酸2-アミノエタンチオール)
2-Aminoethanethiol hydrochloride

警告

$HSCH_2CH_2NH_2$·HCl...113.61 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [156-57-0] mp66℃～70℃

15377-1A	TFS（15377-0050）	5g	￥3,500
15377-2A	TFS（15377-0250）	25g	￥6,300
15377-3A	TFS（15377-1000）	100g	￥19,700
15377-4A	TFS（15377-5000）	500g	￥76,800

2-アミノエタノール
2-Aminoethanol

危険

$H_2NCH_2CH_2OH$...61.08 ［劇］III［危］4-3-S-III［労］57,57-2［PRTR］1-20
CAS RN® ［141-43-5］bp171℃† mp10.5℃† d(25/4℃) 1.012† Fp93℃†

14024-00	>99.0%(GC)	特級	G	500mL	￥2,100
14024-70	>99.0%(GC)	特級	G	3L	￥9,500
14024-01	>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥1,600
01143-08	>99.0%(GC)	RoHS2対応用	G	500mL	￥3,400

2-アミノエタノール塩酸塩
2-Aminoethanol hydrochloride

警告

$NH_2CH_2CH_2OH \cdot HCl$...97.54
CAS RN® ［2002-24-6］ mp75℃～77℃†

14025-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,400

2-アミノエタノール塩酸塩
2-Aminoethanol hydrochloride

警告

$NH_2CH_2CH_2OH \cdot HCl$...97.54
CAS RN® ［2002-24-6］ mp75℃～77℃†

21704-1A	TFS（21704-2500）		250g	￥9,200

2-(2-アミノエトキシ)エタノール
2-(2-Aminoethoxy)ethanol

$C_4H_{11}NO_2$...105.13 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［929-06-6］bp218℃～224℃▲ mp-12.5℃▲ d1.05▲

10363-2A	TFS（10363-0010）		1L	￥17,300
10363-3A	TFS（10363-1000）		100mL	￥4,500

2-アミノ-5-エトキシピリミジン
2-Amino-5-ethoxypyrimidine

$C_6H_9N_3O$...139.15 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［39268-74-1］

01851-62	>97.0%(HLC)		G	1g	￥22,000

2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール
2-(2-Aminoethylamino)ethanol

危険

$NH_2CH_2CH_2NHCH_2CH_2OH$...104.15 ［劇］III ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［111-41-1］ bp237℃～243℃† mp-28℃† d(20/20℃) 1.03† Fp135℃†

01218-01	>98.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥3,200
01218-31	>98.0%(T)	鹿1級	G	25mL	￥1,300

3-[2-(2-アミノエチルアミノ)エチルアミノ]プロピルトリメトキシシラン
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl trimethoxysilane

$C_{10}H_{27}N_3O_3Si$...265.42 ［危］4-3-III
CAS RN® ［35141-30-1］ bp114℃～118℃▲ d1.031▲ Fp137℃▲

34617-1A	TFS（34617-0250）	tech.	25mL	￥6,100
34617-2A	TFS（34617-1000）	tech.	100mL	￥11,000
34617-3A	TFS（34617-5000）	tech.	500mL	￥42,800

3-(2-アミノエチル)-6-ベンジルオキシインドール → 6-ベンジルオキシトリプタミン

3-(2-アミノエチル)-7-ベンジルオキシインドール → 7-ベンジルオキシトリプタミン

2-アミノエチルブロミド臭化水素酸塩 → 2-ブロモエチルアミン臭化水素酸塩

3-(2-アミノエチル)-5-ブロモインドール塩酸塩 → 5-ブロモトリプタミン塩酸塩

3-アミノ-9-エチルカルバゾール
3-Amino-9-ethylcarbazole

$C_{14}H_{14}N_2$...210.27
CAS RN® [132-32-1] mp98℃～100℃▲

14787-1A	TFS（14787-0050）	5g	￥4,100
14787-2A	TFS（14787-0250）	25g	￥8,300

3-(2-アミノエチル)-6-クロロインドール → 6-クロロトリプタミン

N-(2-アミノエチル)エタノールアミン → 2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール

3-(2-アミノエチル)-6-フルオロインドール → 6-フルオロトリプタミン

1-アミノ-2-エチルヘキサン → 2-エチルヘキシルアミン

1-(2-アミノエチル)イミダゾリジン-2-オン
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one

$C_5H_{11}N_3O$...129.16
CAS RN® [6281-42-1]

49241-53	TFS（MO07688DA）	1g	￥12,600

3-(2-アミノエチル)-5-メトキシインドール → 5-メトキシトリプタミン

3-(2-アミノエチル)-7-メトキシインドール → 7-メトキシトリプタミン

3-(2-アミノエチル)-7-メチルインドール → 7-メチルトリプタミン

1-(2-アミノエチル)-2-メチル-5-ニトロイミダゾール二塩酸塩一水和物
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate

$C_6H_{10}N_4O_2 \cdot 2HCl \cdot H_2O$...261.10
CAS RN® [49575-10-2] mp195℃▲

21303-1A	TFS（21303-0050）		5g	￥23,300

4-(2-アミノエチル)モルホリン
4-(2-Aminoethyl)morpholine

$C_6H_{14}N_2O$...130.18 [危] 4-3-III
CAS RN® [2038-03-1] mp24℃▲ d0.99▲

40075-1A	TFS（40075-1000）		100g	￥31,800
40075-2A	TFS（40075-0050）		5g	￥3,100

2-アミノフルベンダゾール標準品
2-Aminoflubendazole standard

$C_{14}H_{10}FN_3O$...255.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [82050-13-3] mp250℃～253℃▲

49866-52	DES（C10202370）	食品分析用	10mg	￥34,000

(*R*)-2-(1-アミノエチル)フェノール
(*R*)-2-(1-Aminoethyl)phenol

$C_8H_{11}NO$...137.17
CAS RN® [123983-05-1]

01223-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
01223-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

p-(2-アミノエチル)フェノール塩酸塩 → チラミン塩酸塩(塩酸チラミン)

2-(アミノエチル)ホスホン酸
2-(Aminoethyl)phosphonic acid

$C_2H_8NO_3P$...125.06
CAS RN® [2041-14-7] mp296℃(dec.)▲

29163-1A	TFS（29163-0010）		1g	￥22,200

1-(2-アミノエチル)ピペラジン
1-(2-Aminoethyl)piperazine

$C_6H_{15}N_3$...129.20 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［140-31-8］ bp218℃～222℃▲ d0.98▲

40076-1A	TFS（40076-1000）		100g	￥3,300
40076-2A	TFS（40076-5000）		500g	￥7,200

1-(2-アミノエチル)ピペリジン
1-(2-Aminoethyl)piperidine

$C_7H_{16}N_2$...128.21
CAS RN® ［27578-60-5］

01732-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥16,000
01732-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥5,400

2-アミノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol

$C_5H_{13}NO_2$...119.16
CAS RN® ［115-70-8］ bp152℃～153℃(10mm)▲ mp35℃～37℃▲ d1.099▲

22711-2A	TFS（22711-5000）		500g	￥11,100

2-(2-アミノエチル)ピリジン
2-(2-Aminoethyl)pyridine

警告

$C_7H_{10}N_2$...122.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2706-56-1］ d1.021▲

01444-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥17,000
01444-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥9,500
10369-1A	TFS（10369-0010）		1g	￥4,000
10369-2A	TFS（10369-0100）		10g	￥17,400
10369-3A	TFS（10369-0500）		50g	￥69,900

4-(2-アミノエチル)ピロカテコール塩酸塩 → ドーパミン塩酸塩(塩酸ドーパミン)

N-(2-アミノエチル)ピロリジン
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine

危険

$C_6H_{14}N_2$...114.18 ［危］4-2-III
CAS RN® ［7154-73-6］ bp66℃～70℃(23mm)▲ d0.901▲

01568-32		>98.0%(GC)	G	25mL	￥12,500
01568-52		>98.0%(GC)	G	5mL	￥4,100
10370-1A	TFS（10370-0050）			5mL	￥5,300
10370-2A	TFS（10370-0250）			25mL	￥16,900

2-アミノフルオレン標準品
2-Aminofluorene strandard

$C_{13}H_{11}N$...181.23
CAS RN® ［153-78-6］

49797-52	ACC（R-066N）		環境分析用	10mg	￥3,000

2-アミノフルオレン-d_{11}
2-Aminofluorene-d_{11}

$C_{13}D_{11}N$...192.29
CAS RN® ［347841-44-5］

49120-73	CDN（D-3804）	98 atom% D		50mg	￥83,600

5-アミノフルオレセイン
5-Aminofluorescein

$C_{13}H_6O_2OHC_6H_3NH_2COOH$...347.31
CAS RN® ［3326-34-9］ mp223℃▲

40077-1A	TFS（40077-0050）		二酸化いおう測定用	5g	￥52,500
40077-2A	TFS（40077-0010）		二酸化いおう測定用	1g	￥15,900

4′-アミノ-3′-フルオロアセトフェノン
4′-Amino-3′-fluoroacetophenone

C_8H_8FNO...153.15
CAS RN® ［73792-22-0］

01870-62		>97.0%(HLC)	G	1g	￥10,500

2-アミノ-4-フルオロ安息香酸
2-Amino-4-fluorobenzoic acid

$C_7H_6FNO_2$...155.12
CAS RN® [446-32-2] mp188℃～196℃

29302-2A	TFS（29302-0025）	2.5g	￥8,000
29302-4A	TFS（29302-0100）	10g	￥45,200

2-アミノ-5-フルオロ安息香酸
2-Amino-5-fluorobenzoic acid

$C_7H_6FNO_2$...155.12
CAS RN® [446-08-2] mp182℃～184℃▲

30894-1A	TFS（30894-0010）	1g	￥5,400

2-アミノ-6-フルオロ安息香酸
2-Amino-6-fluorobenzoic acid

$C_7H_6FNO_2$...155.12
CAS RN® [434-76-4] mp165℃～167℃▲

30645-1A	TFS（30645-0010）	1g	￥4,200

2-アミノ-3-フルオロベンゾニトリル
2-Amino-3-fluorobenzonitrile

$C_7H_5FN_2$...136.12 ［劇］III
CAS RN® [115661-37-5]

01240-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥19,500
01240-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,200

2-アミノ-6-フルオロベンゾチアゾール
2-Amino-6-fluorobenzothiazole

$C_7H_5FN_2S$...168.19
CAS RN® [348-40-3] mp183℃～184℃▲

26373-1A	TFS（26373-0100）	10g	￥17,400
26373-2A	TFS（26373-0010）	1g	￥3,600

DL-2-アミノ-3-(4-フルオロインドリル)プロピオン酸 → 4-フルオロ-*DL*-トリプトファン

3-アミノ-5-フルオロピリジン
3-Amino-5-fluoropyridine

$C_5H_5FN_2$...112.10
CAS RN® [210169-05-4]

01110-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥25,000
01110-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥7,500

5-アミノ-2-フルオロピリジン
5-Amino-2-fluoropyridine

警告

$C_5H_5FN_2$...112.10
CAS RN® [1827-27-6]

01559-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥19,500
01559-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥5,200

アミノホルム → ヘキサメチレンテトラミン

アミノホルム標準品 → ヘキサメチレンテトラミン標準品

5-アミノグラミン
5-Aminogramine

$C_{11}H_{15}N_3$...189.25 [凍] -20℃以下
CAS RN® [3414-74-2]

01982-97	>94.0%(T)	G	500mg	￥21,000

アミノグアニジン重炭酸塩(重炭酸アミノグアニジン)
Aminoguanidine bicarbonate

$NH_2NHC(:NH)NH_2 \cdot H_2CO_3$...136.11
CAS RN® [2582-30-1]

01221-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,100
14906-1A	TFS（14906-2500）				250g	￥3,300
14906-2A	TFS（14906-0010）				1kg	￥9,200

(±)-2-アミノヘキサン-1,1,1,2,3,3-d_6
(±)-2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d_6

$C_6H_9D_6N$...107.22
CAS RN® [1219802-28-4]

49136-20	CDN（D-6783）	98 atom% D			100mg	￥68,200

D L-2-アミノ-1,6-ヘキサン二酸-2,5,5-d_3
DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d_3 acid

$C_6H_8D_3O_4N$...164.17 ［冷］ 0℃～6℃

49136-21	CDN（D-6024）	98 atom% D			100mg	￥57,200

6-アミノヘキサン酸
6-Aminohexanoic acid

警告

$NH_2CH_2(CH_2)_4COOH$...131.17
CAS RN® [60-32-2] mp204℃～206℃ †

01678-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,300
10330-1A	TFS（10330-5000）				500g	￥25,900
10330-3A	TFS（10330-1000）				100g	￥8,900

D-2-アミノヘキサン酸-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d_9
D-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d_9 acid

$C_6H_4D_9NO_2$...140.22
CAS RN® [2185812-01-3]

49149-49	CDN（D-7959）				5mg	￥29,700

D L-2-アミノヘキサン酸 → *D L*-ノルロイシン

DL-2-アミノヘキサン酸-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d_9
DL-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d_9 acid

$C_6H_4D_9NO_2$...140.22
CAS RN® [2243004-88-6]

49149-50	CDN（D-7958）				50mg	￥30,800

L-2-アミノヘキサン酸-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d_9
L-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d_9 acid

$C_6H_4D_9NO_2$...140.22
CAS RN® [1331889-36-1]

49149-51	CDN（D-7868）	5mg	￥20,900

6-アミノ-1-ヘキサノール
6-Amino-1-hexanol

$C_6H_{15}NO$...117.18
CAS RN® [4048-33-3] mp52℃～58℃▲

29460-1A	TFS（29460-0100）	10g	￥9,400

(1-アミノヘキシル)ホスホン酸
(1-Aminohexyl)phosphonic acid

$C_6H_{16}NO_3P$...181.17
CAS RN® [63207-60-3] mp265℃～268℃(dec.)▲

34480-1A	TFS（34480-0010）	1g	￥13,700

p-アミノ馬尿酸
p-Aminohippuric acid

$NH_2C_6H_4CONHCH_2COOH$...194.18
CAS RN® [61-78-9] mp198℃～199℃†

15380-1A	TFS（15380-0250）	25g	￥12,100
15380-2A	TFS（15380-0100）	10g	￥7,300
15380-3A	TFS（15380-1000）	100g	￥44,300

1-アミノヒダントイン(2,4,5-$^{13}C_3$)標準液
1-Aminohydantoin(2,4,5-$^{13}C_3$) standard solution

$^{13}C_3H_5N_3O_2$...118.06 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [957509-31-8]

10mg/L アセトニトリル溶液

49833-81	DES（XA10203190AL）	食品分析用	1mL	￥78,000

1-アミノヒダントイン塩酸塩標準品
1-Aminohydantoin hydrochloride standard

$C_3H_5N_3O_2$･HCl...151.55 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2827-56-7］ mp201℃～205℃▲

49831-52	DES（C10203200）	食品分析用	100mg	￥14,000

4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol

警告

$C_2H_6N_6S$...146.17 ［危］5-HY-2-II
CAS RN® ［1750-12-5］ mp228℃～230℃(dec.)†

01882-43	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ測定用	G	10g	￥15,000

2-アミノヒドロキノンジメチルエーテル → 2,5-ジメトキシアニリン

2-アミノ-4′-ヒドロキシアセトフェノン塩酸塩
2-Amino-4′-hydroxyacetophenone hydrochloride

$C_8H_9NO_2$･HCl...187.62
CAS RN® ［19745-72-3］

01083-32	>97.0%	G	25g	￥9,000
01083-52	>97.0%	G	5g	￥3,500

3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid

$C_7H_7NO_3$...153.13
CAS RN® ［1571-72-8］ mp208℃▲

27149-1A	TFS（27149-0050）	5g	￥4,200
27149-2A	TFS（27149-0250）	25g	￥20,100

4-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸 → 4-アミノサリチル酸

5-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸 → 5-アミノサリチル酸

3-アミノ-5-ヒドロキシ安息香酸塩酸塩
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride

$C_7H_7NO_3$･HCl...189.59
CAS RN® [14206-69-0]

49241-54	TFS（MO07975DE）	95%		5g	￥68,000
49241-55	TFS（MO07975DA）	95%		1g	￥38,700

(*S*)-(-)-4-アミノ-2-ヒドロキシ酪酸
(*S*)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid

警告

$C_4H_9NO_3$...119.11
CAS RN® [40371-51-5] mp200℃～203℃▲

01392-32		>95.0%	G	25g	￥10,000
01392-52		>95.0%	G	5g	￥4,000
34243-1A	TFS（34243-0050）			5g	￥5,200
34243-2A	TFS（34243-0250）			25g	￥18,200

DL-4-アミノ-3-ヒドロキシ酪酸
DL-4-Amino-3-hydroxybutyric acid

$C_4H_9NO_3$...119.11
CAS RN® [924-49-2] mp202℃▲

10381-1A	TFS（10381-0050）			5g	￥14,800

4-(2-アミノ-1-ヒドロキシエチル)フェノール塩酸塩 → オクトパミン塩酸塩

3-[(*Z*)-アミノ(ヒドロキシイミノ)メチル]安息香酸
3-[(*Z*)-Amino(hydroxyimino)methyl]benzoic acid

$C_8H_8N_2O_3$...180.16
CAS RN® [199447-10-4] mp196℃～197℃▲

49241-56	TFS（MO07614DA）	90%		1g	￥18,100

2-アミノ-6-ヒドロキシ-8-メルカプトプリン
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine

$C_5H_5N_5OS$...183.19
CAS RN® [28128-40-7] mp>300℃▲

29523-1A	TFS（29523-0050）	5g	￥11,700
29523-2A	TFS（29523-0250）	25g	￥46,700

(*S*)-(+)-2-アミノ-3-ヒドロキシ-3-メチルブタン酸
(*S*)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid

$CH_3C(CH_3)(OH)CH(NH_2)COOH$...133.14
CAS RN® [2280-27-5] mp201℃～203℃▲

29914-1A	TFS（29914-2500）	250mg	￥42,300

2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール
2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

$(HOCH_2)_3CNH_2$...121.13
CAS RN® [77-86-1] mp171℃～172℃†

40326-00	>99.0%(T)	特級	P	500g	￥7,500
40326-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥2,300
40326-80	>99.0%(T)	特級	B	15kg	☆
40326-01	>97.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥6,800
40326-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,100
40326-08	>99.0%(T)	生化学用	P	500g	￥9,500
40326-23	>99.0%(T)	生化学用	G	100g	￥3,200
40326-84	>99.0%(T)	生化学用	B	15kg	☆
40326-09	>99.0%(T)	Biopur	P	500g	￥13,500
40326-24	>99.0%	分子生物学用	P	100g	￥3,200

2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール → トロメタモール(UE-E)

2-アミノ-4-ヒドロキシ-6-メチルピリミジン
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine

$C_5H_7N_3O$...125.12
CAS RN® [3977-29-5] mp>300℃▲

10383-1A	TFS（10383-0250）		25g	￥4,100
10383-2A	TFS（10383-1000）		100g	￥9,000

1-アミノ-2-ヒドロキシ-4-ナフタレンスルホン酸 → 1-アミノ-2-ナフトール-4-スルホン酸

N-((2*S*,3*R*)-3-アミノ-2-ヒドロキシ-4-フェニルブチリル)-*L*-ロイシン
N-((2*S*,3*R*)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl)-*L*-leucine

$C_{16}H_{24}N_2O_4$...308.37
CAS RN® [58970-76-6]

33391-1A	TFS（33391-5000）		500mg	￥39,600

1-(4-アミノ-2-ヒドロキシフェニル)エタン-1-オン
1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one

$C_8H_9NO_2$...151.16
CAS RN® [2476-29-1] mp134℃～135℃▲

49241-57	TFS（BTB10056EA）	97%	10g	￥76,800
49241-58	TFS（BTB10056DA）	97%	1g	￥15,400

L-2-アミノ-3-ヒドロキシプロピオン酸 → *L*-セリン

L-2-アミノ-3-ヒドロキシプロピオン酸 CRM6021-a → *L*-セリン CRM6021-a

L-2-アミノ-3-ヒドロキシプロピオン酸-2,3,3-d_3 → *L*-セリン-2,3,3-d_3

L-2-アミノ-3-ヒドロキシプロピオン酸-d_7 → *L*-セリン-d_7

2-アミノ-6-ヒドロキシプリン → グアニン

3-アミノ-5-ヒドロキシピラゾール
3-Amino-5-hydroxypyrazole

$C_3H_5N_3O$...99.09
CAS RN® [6126-22-3] mp210℃～225℃▲

27172-1A	TFS（27172-0050）	5g	￥4,200
27172-2A	TFS（27172-0250）	25g	￥15,300

2-アミノ-3-ヒドロキシピリジン
2-Amino-3-hydroxypyridine

$HO(C_5H_3N)NH_2$...110.11
CAS RN® [16867-03-1] mp172℃～174℃▲

15357-1A	TFS（15357-0250）	25g	￥5,700
15357-3A	TFS（15357-1000）	100g	￥17,800

4-アミノ-5-カルバモイルイミダゾール塩酸塩
4-Amino-5-carbamoylimidazole hydrochloride

$C_4H_6N_4O \cdot HCl$...126.11
CAS RN® [72-40-2] mp250℃

17309-3A	TFS（17309-0250）	25g	￥26,500

2-アミノイミダゾール硫酸塩
2-Aminoimidazole sulfate

警告

$C_6H_{10}N_6 \cdot H_2SO_4$...264.26
CAS RN® [1450-93-7]

01472-52	>95.0%	G	5g	￥18,000
01472-62	>95.0%	G	1g	￥6,500

アミノイミノメタンスルフィン酸 → アミジノスルフィン酸

o-(6-アミノ-3-イミノ-3*H*-キサンテン-9-イル)安息香酸塩酸塩 → ローダミン110

1-アミノインダン
1-Aminoindan

$C_9H_{11}N$...133.19 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［34698-41-4］ mp1.5℃▲ d1.03▲

10385-1A	TFS（10385-0010）	1g	￥8,600
10385-2A	TFS（10385-0050）	5g	￥37,000

5-アミノインダン
5-Aminoindan

$C_9H_{11}N$...133.19
CAS RN® ［24425-40-9］ bp247℃～249℃(745mm)▲ mp34℃～36℃▲

15735-1A	TFS（15735-0100）	10g	￥10,500
15735-2A	TFS（15735-0500）	50g	￥36,100

2-アミノインダン-2-カルボン酸塩酸塩
2-Aminoindan-2-carboxylic acid hydrochloride

$C_{10}H_{11}NO_2$･HCl...213.65
CAS RN® ［33584-60-0］ mp285℃～289℃▲

37638-1A	TFS（37638-2500）	250mg	￥15,200

(1*R*,2*S*)-(+)-*cis*-1-アミノ-2-インダノール
(1*R*,2*S*)-(+)-*cis*-1-Amino-2-indanol

$C_9H_{11}NO$...149.18
CAS RN® ［136030-00-7］

01809-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥17,500
01809-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,300

(1*R*,2*S*)-1-アミノ-2-インダノール
(1*R*,2*S*)-1-Amino-2-indanol

$C_9H_{11}NO$...149.18
CAS RN® ［136030-00-7］ mp117℃～121℃▲

29753-2A	TFS（29753-0100）	10g	￥23,500
29753-3A	TFS（29753-0010）	1g	￥3,900

(1*R*,2*S*)-1-アミノ-2-インダノール
(1*R*,2*S*)-1-Amino-2-indanol

$C_9H_{11}NO$...149.18
CAS RN® [136030-00-7]

49212-06	ダイセル（100223-025G）		25g	￥43,800

(1*S*,2*R*)-(-)-*cis*-1-アミノ-2-インダノール
(1*S*,2*R*)-(-)-*cis*-1-Amino-2-indanol

$C_9H_{11}NO$...149.18
CAS RN® [126456-43-7] mp117℃～121℃▲

01718-32		>93.0%(HLC)	25g	￥10,000
01718-52		>93.0%(HLC)	5g	￥4,000
31565-1A	TFS（31565-2500）		250mg	￥3,300

(1*S*,2*R*)-1-アミノ-2-インダノール
(1*S*,2*R*)-1-Amino-2-indanol

$C_9H_{11}NO$...149.18
CAS RN® [126456-43-7]

49212-07	ダイセル（100224-025G）		25g	￥46,200

5-アミノインダン-1-オン
5-Aminoindan-1-one

C_9H_9NO...147.17
CAS RN® [3470-54-0] mp184℃～186℃▲

49241-59	TFS（NRB01003EA）	97%	10g	☆
49241-60	TFS（NRB01003DA）	97%	1g	￥47,200

6-アミノインダゾール
6-Aminoindazole

$C_7H_7N_3$...133.15
CAS RN® [6967-12-0]

01821-32		>95.0%(HLC)	25g	￥10,000
01821-52		>95.0%(HLC)	5g	￥4,000

4-アミノインドール
4-Aminoindole

警告

$C_8H_8N_2$...132.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［5192-23-4］ mp106℃～109℃†

01983-62	>99.0%(GC)	G	1g	￥29,000

5-アミノインドール
5-Aminoindole

$C_8H_8N_2$...132.16
CAS RN® ［5192-03-0］ mp131℃～133℃▲

01607-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥18,000
01607-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥6,400
10390-1A	TFS（10390-0010）		1g	￥10,500
10390-2A	TFS（10390-0050）		5g	￥43,700

6-アミノインドリン二塩酸塩
6-Aminoindoline dihydrochloride

$C_8H_{10}N_2$･2HCl...207.09 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［28228-73-1］

01984-62	>98.0%(T)	G	1g	￥8,000

2-アミノ-5-ヨード安息香酸
2-Amino-5-iodobenzoic acid

$C_7H_6INO_2$...263.03 ［労］57,57-2
CAS RN® ［5326-47-6］ mp219℃▲

35544-2A	TFS（35544-0250）		25g	￥13,000

4-アミノ-3-ヨード安息香酸
4-Amino-3-iodobenzoic acid

警告

$C_7H_6INO_2$...263.03 ［労］57,57-2
CAS RN® ［2122-63-6］

01824-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
01824-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

2-アミノ-5-ヨードピリジン
2-Amino-5-iodopyridine

警告

$C_5H_5IN_2$...220.01 ［労］57,57-2
CAS RN® ［20511-12-0］

01441-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥9,000
01441-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,000

2-アミノ-4-ヨードトルエン → 5-ヨード-2-メチルアニリン

2-アミノイソ酪酸
2-Aminoisobutyric acid

$(CH_3)_2C(NH_2)CO_2H$...103.11
CAS RN® ［62-57-7］ mp>300℃†

01376-02		>95.0%	G	500g	￥20,000
01376-32		>95.0%	G	25g	￥3,100
22576-1A	TFS（22576-1000）			100g	￥14,800
22576-2A	TFS（22576-0250）			25g	￥4,300

3-アミノイソニコチン酸
3-Aminoisonicotinic acid

$C_6H_6N_2O_2$...138.12
CAS RN® ［7579-20-6］ mp287℃～291℃▲

49241-62	TFS（SP00054EA）	95%	10g	☆
49241-63	TFS（SP00054DA）	95%	1g	￥15,600

5-アミノイソフタル酸
5-Aminoisophthalic acid

$C_8H_7NO_4$...181.14
CAS RN® ［99-31-0］ mp>300℃▲

18133-1A	TFS（18133-1000）	100g	￥16,600
18133-2A	TFS（18133-0250）	25g	￥5,900

5-アミノイソキノリン
5-Aminoisoquinoline

$C_9H_8N_2$...144.17
CAS RN® [1125-60-6] mp127℃～130℃▲

15942-1A	TFS（15942-0010）		1g	￥5,100
15942-2A	TFS（15942-0050）		5g	￥15,900

3-アミノイソオキサゾール-4-カルボニトリル
3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile

$C_4H_3N_3O$...109.08 ［劇］III
CAS RN® [258518-65-9] mp140℃(dec.)▲

49241-64	TFS（SEW04524DE）	97%	5g	☆
49241-65	TFS（SEW04524DA）	97%	1g	￥56,800
49241-66	TFS（SEW04524CB）	97%	250mg	￥28,500

5-アミノレブリン酸塩酸塩
5-Aminolevulinic acid hydrochloride

$H_2NCH_2COCH_2CH_2COOH \cdot HCl$...167.58 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® [5451-09-2] mp156℃～158℃(dec.)†

10392-2A	TFS（10392-5000）		500mg	￥20,300

4-アミノ-2-メルカプトピリミジン
4-Amino-2-mercaptopyrimidine

$C_4H_5N_3S$...127.17
CAS RN® [333-49-3] mp285℃▲

21477-1A	TFS（21477-0010）		1g	￥10,200
21477-2A	TFS（21477-0050）		5g	￥40,600

25%アミノメタン溶液 → 25%メチルアミン溶液

40%アミノメタン溶液 → 40%メチルアミン溶液

アミノメタン塩酸塩 → メチルアミン塩酸塩

アミノメタンスルホン酸
Aminomethanesulfonic acid

$NH_2CH_2SO_3H$...111.12
CAS RN® [13881-91-9] mp184℃～185℃(dec.)†

15574-1A	TFS（15574-0500）		50g	￥7,700

2-アミノ-6-メトキシ安息香酸
2-Amino-6-methoxybenzoic acid

$C_8H_9NO_3$...167.16
CAS RN® [53600-33-2]

01111-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥26,000
01111-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

2-アミノ-6-メトキシベンゾチアゾール
2-Amino-6-methoxybenzothiazole

$C_8H_8N_2OS$...180.22 [変]
CAS RN® [1747-60-0] mp163℃～168℃▲

17202-1A	TFS（17202-0500）	50g	￥8,100
17202-2A	TFS（17202-0050）	5g	￥4,200

(2*S*,3*S*)-2-アミノ-3-メトキシブタン酸
(2*S*,3*S*)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid

$CH_3CH(OCH_3)CH(NH_2)COOH$...133.14
CAS RN® [104195-80-4] mp220℃～224℃†

29003-1A	TFS（29003-2500）	250mg	￥76,600

DL-2-アミノ-3-(5-メトキシインドリル)プロピオン酸 → 5-メトキシ-*DL*-トリプトファン

L-2-アミノ-3-(5-メトキシインドリル)プロピオン酸 → 5-メトキシ-*L*-トリプトファン

(*S*)-(-)-アミノ-2-(1′-メトキシ-1′-メチルエチル)ピロリジン
(*S*)-(-)-Amino-2-(1′-methoxy-1′-methylethyl)pyrrolidine (SADP)

$C_8H_{18}N_2O$...158.24 [凍] -20℃以下
CAS RN® [118535-61-8]

29718-1A	TFS（29718-0010）	1g	￥16,100

(*R*)-(+)-1-アミノ-2-(メトキシメチル)ピロリジン
(*R*)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine

$C_6H_{14}N_2O$...130.18 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［72748-99-3］ d0.97▲

27714-1A	TFS（27714-0010）		1g	￥19,600

5-アミノ-2-メトキシピリジン
5-Amino-2-methoxypyridine

警告

$C_6H_8N_2O$...124.14 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6628-77-9］

01537-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,500
01537-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,500

5-アミノ-2-メトキシピリジン
5-Amino-2-methoxypyridine

$C_6H_8N_2O$...124.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［6628-77-9］ bp85℃～90℃ mp29℃～31℃ d1.575 Fp>110℃

10395-1A	TFS（10395-0050）		5g	￥5,800
10395-2A	TFS（10395-0250）		25g	￥19,500
10395-3A	TFS（10395-1000）		100g	￥64,600

4-アミノ-6-メトキシピリミジン
4-Amino-6-methoxypyrimidine

$C_5H_7N_3O$...125.12
CAS RN® ［696-45-7］ mp154℃～159℃▲

33745-1A	TFS（33745-0050）		5g	￥10,600
33745-2A	TFS（33745-0250）		25g	￥39,200

(*S*)-2-アミノ-5-メトキシテトラリン塩酸塩
(*S*)-2-Amino-5-methoxytetralin hydrochloride

$C_{11}H_{16}ClNO$...213.70 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［58349-17-0］

01770-55	不斉合成用	G	5g	￥49,000

(*S*)-2-アミノ-5-メトキシテトラリン(*S*)-マンデル酸塩
(*S*)-2-Amino-5-methoxytetralin (*S*)-mandelate

$C_{19}H_{23}NO_4$...329.38 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［439133-67-2］

01769-55		不斉合成用	G	5g	￥47,000

2′-アミノ-4′-メチルアセトフェノン
2′-Amino-4′-methylacetophenone

$C_9H_{11}NO$...149.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［122710-21-8］

02085-52		>97.0%(HLC)	G	5g	￥39,000
02085-62		>97.0%(HLC)	G	1g	￥11,000

3-アミノ-2-メチルアクリルアルデヒド
3-Amino-2-methylacrylaldehyde

C_4H_7NO...85.10
CAS RN® ［30989-81-2］ mp101℃～103℃▲

49241-68	TFS（RH01431EA）	97%		10g	￥46,400
49241-69	TFS（RH01431DA）	97%		1g	￥12,300

2-アミノ-4-メチルベンズアミド
2-Amino-4-methylbenzamide

$C_8H_{10}N_2O$...150.17
CAS RN® ［39549-79-6］ mp147℃～148℃▲

49241-72	TFS（TL00794EA）	97%		10g	￥42,000
49241-73	TFS（TL00794DA）	97%		1g	￥18,400

3-アミノ-4-メチルベンズアミド
3-Amino-4-methylbenzamide

$C_8H_{10}N_2O$...150.17
CAS RN® ［19406-86-1］ mp128℃～132℃▲

35705-1A	TFS（35705-0050）			5g	￥5,100

2-アミノ-1-メチルベンズイミダゾール
2-Amino-1-methylbenzimidazole

$C_8H_9N_3$...147.17
CAS RN® [1622-57-7] mp203℃～205℃▲

27630-1A	TFS（27630-0025）		2.5g	￥13,200

2-アミノメチル-1,4-ベンゾジオキサン
2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane

警告

$C_9H_{11}NO_2$...165.18
CAS RN® [4442-59-5]

01735-52		>97.0%(GC)	5g	￥30,500
01735-62		>97.0%(GC)	1g	￥9,500

2-アミノ-3-メチル安息香酸
2-Amino-3-methylbenzoic acid

$C_8H_9NO_2$...151.16
CAS RN® [4389-45-1]

02086-32		>97.0%(HLC)	25g	￥14,000
02086-52		>97.0%(HLC)	5g	￥4,800
10397-1A	TFS（10397-0050）		5g	￥4,500
10397-2A	TFS（10397-0100）		10g	￥8,000
10397-3A	TFS（10397-0500）		50g	￥32,200

2-アミノ-4-メチル安息香酸
2-Amino-4-methylbenzoic acid

$C_8H_9NO_2$...151.16
CAS RN® [2305-36-4] mp160℃～161℃▲

49241-74	TFS（TL00555EA）	95%	10g	￥18,100
49241-75	TFS（TL00555DA）	95%	1g	￥5,500

2-アミノ-5-メチル安息香酸
2-Amino-5-methylbenzoic acid

$C_8H_9NO_2$...151.16
CAS RN® [2941-78-8] mp174℃～177℃▲

16020-1A	TFS（16020-0010）		1g	￥3,300
16020-2A	TFS（16020-0050）		5g	￥9,000

3-アミノ-4-メチル安息香酸
3-Amino-4-methylbenzoic acid

警告

$H_2NC_6H_3(CH_3)COOH$...151.16
CAS RN® [2458-12-0] mp163℃～166℃†

01516-02		>95.0%(HLC)	500g	￥15,000
01516-32		>95.0%(HLC)	25g	￥3,100
10398-1A	TFS（10398-0500）		50g	￥5,100
10398-2A	TFS（10398-0050）		5g	￥2,000

4-(アミノメチル)安息香酸
4-(Aminomethyl)benzoic acid

警告

$H_2NCH_2C_6H_4COOH$...151.16
CAS RN® [56-91-7] mp>300℃▲

01569-32		>98.0%(HLC)	25g	￥5,200
01569-52		>98.0%(HLC)	5g	￥2,300
23222-1A	TFS（23222-0250）		25g	￥11,500
23222-2A	TFS（23222-1000）		100g	￥33,500

4-アミノ-3-メチル安息香酸
4-Amino-3-methylbenzoic acid

警告

$H_2NC_6H_3(CH_3)CO_2H$...151.16
CAS RN® [2486-70-6] mp169℃～171℃▲

01517-32		>95.0%(HLC)	25g	￥10,000
01517-52		>95.0%(HLC)	5g	￥3,900
10399-1A	TFS（10399-0010）		1g	￥7,700

3-アミノメチル安息香酸メチルエステル塩酸塩
3-Aminomethylbenzoic acid methyl ester hydrochloride

$C_9H_{11}NO_2$･HCl...201.64
CAS RN® [17841-68-8] mp179℃～181℃▲

49241-76	TFS（MO07352EA）	95%		10g	☆
49241-77	TFS（MO07352DA）	95%		1g	￥33,500
49241-78	TFS（MO07352CB）	95%		250mg	￥10,100

2-アミノ-4-メチルベンゾニトリル
2-Amino-4-methylbenzonitrile

$C_8H_8N_2$...132.16 [劇] III
CAS RN® [26830-96-6] mp92℃～93℃▲

49241-79	TFS（TL00552EA）	97%		10g	￥11,000
49241-80	TFS（TL00552DA）	97%		1g	￥2,700

2-アミノ-5-メチルベンゾニトリル
2-Amino-5-methylbenzonitrile

$C_8H_8N_2$...132.16 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5925-93-9]

02088-52	>97.0%(HLC)	G		5g	￥27,000
02088-62	>97.0%(HLC)	G		1g	￥8,500

3-(アミノメチル)ベンゾニトリル
3-(Aminomethyl)benzonitrile

$C_8H_8N_2$...132.16 [劇] III [危] 4-3-III
CAS RN® [10406-24-3]

02087-52	>97.0%(GC)	G		5g	￥36,000
02087-62	>97.0%(GC)	G		1g	￥11,000

4-アミノ-3-メチルベンゾニトリル
4-Amino-3-methylbenzonitrile

$C_8H_8N_2$...132.16 [劇] III
CAS RN® [78881-21-7]

01941-52	>97.0%(HLC)	G		5g	￥10,000
01941-62	>97.0%(HLC)	G		1g	￥4,100

4-(アミノメチル)ベンゾニトリル塩酸塩
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride

$C_8H_8N_2$･HCl...168.62 ［劇］III
CAS RN® ［15996-76-6］

01112-32	>95.0%	G	25g	￥27,000
01112-52	>95.0%	G	5g	￥8,500

2-アミノ-4-メチルベンゾチアゾール
2-Amino-4-methylbenzothiazole

警告

$C_8H_8N_2S$...164.23
CAS RN® ［1477-42-5］ mp137℃～139℃▲

01473-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01473-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000
18577-1A	TFS（18577-0100）		10g	￥8,000

2-アミノメチル-3-(2-ブロモフェニル)プロピオン酸
2-Aminomethyl-3-(2-bromophenyl)propionic acid

$C_{10}H_{12}BrNO_2$...258.11
CAS RN® ［910443-85-5］

01876-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥14,500

(*S*)-(+)-2-アミノ-2-メチルブタン酸 *n* 水和物
(*S*)-(+)-2-Amino-2-methylbutanoic acid *n*-hydrate

$CH_3CH_2CNH_2(CH_3)COOH \cdot nH_2O$
CAS RN® ［595-40-4］ mp305℃～308℃(dec.)▲

29005-1A	TFS（29005-2500）		250mg	￥52,600

(*R*)-(-)-2-アミノ-3-メチル-1-ブタノール
(*R*)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol

$C_5H_{13}NO$...103.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［4276-09-9］ mp32℃～36℃▲ d0.93▲

42247-2A	TFS（42247-0050）		5g	￥22,700

(*S*)-(+)-2-アミノ-3-メチル-1-ブタノール → *L*-バリノール

ＤＬ-2-アミノ-3-メチル-1-ブタノール
DL-2-Amino-3-methyl-1-butanol

$C_5H_{13}NO$...103.16 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［16369-05-4］ d0.93▲

18042-1A	TFS（18042-0010）			1g	￥7,100
18042-2A	TFS（18042-0050）			5g	￥12,700

(1-アミノ-3-メチルブチル)ホスホン酸
(1-Amino-3-methylbutyl)phosphonic acid

$C_5H_{14}NO_3P$...167.14
CAS RN® ［20459-60-3］ mp274℃～280℃(dec.)▲

34482-1A	TFS（34482-0010）			1g	￥13,600

7-アミノ-4-メチルクマリン
7-Amino-4-methylcoumarin (AMC)

警告

$C_{10}H_9NO_2$...175.18
CAS RN® ［26093-31-2］ mp225℃～229℃△

01791-96		>98.0%(HLC)	けい光分析用	500mg	￥12,000
21806-1A	TFS（21806-0010）			1g	￥24,100
40555-1A	TFS（40555-5000）		laser grade	500mg	￥25,100

ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-4-(アミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid

警告

$C_8H_{15}NO_2$...157.21
CAS RN® ［1197-18-8］ mp>300℃▲

01571-32		>98.0%		25g	￥6,000
01571-52		>98.0%		5g	￥2,400
22804-2A	TFS（22804-0500）			50g	￥15,500

trans-2-アミノメチル-1-シクロヘキサノール
trans-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol

$C_7H_{15}NO$...129.20
CAS RN® [5691-09-8] bp100℃～102℃(2mm)▲

26589-1A	TFS（26589-0010）	1g	￥24,600
26589-2A	TFS（26589-0025）	2.5g	￥59,100

1-アミノメチル-1-シクロヘキサノール塩酸塩
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride

$C_7H_{15}NO \cdot HCl$...165.66
CAS RN® [19968-85-5] mp217℃～219℃▲

18458-2A	TFS（18458-0050）	5g	￥24,400

cis-2-アミノメチル-1-シクロヘキサノール塩酸塩
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride

$C_7H_{15}NO \cdot HCl$...165.66
CAS RN® [24947-68-0] mp182℃～185℃▲

26588-1A	TFS（26588-2500）	250mg	￥21,200
26588-2A	TFS（26588-0010）	1g	￥52,100

アミノメチルシクロプロパン
Aminomethylcyclopropane

C_4H_9N...71.12 ［危］4-1-II
CAS RN® [2516-47-4] bp84℃～85℃▲ d0.82▲

25872-2A	TFS（25872-0050）	5g	￥14,900
25872-3A	TFS（25872-0100）	10g	￥26,400

(*R*)-2-アミノ-3-メチル-1,1-ジフェニル-1-ブタノール
(*R*)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol

$C_{17}H_{21}NO$...255.35
CAS RN® [86695-06-9]

49212-08	ダイセル（110471-001G）	1g	￥18,000

(*S*)-2-アミノ-3-メチル-1,1-ジフェニル-1-ブタノール
(*S*)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol

$C_{17}H_{21}NO$...255.35
CAS RN® [78603-95-9]

49212-09	ダイセル（110472-001G）	1g	￥18,000

(*R*)-2-(アミノメチル)-1-エチルピロリジン
(*R*)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

$C_7H_{16}N_2$...128.21 ［危］4-2-III
CAS RN® [22795-97-7]

35700-1A	TFS（35700-0010）	1g	￥8,400
35700-2A	TFS（35700-0050）	5g	￥29,700

(*S*)-(-)-2-アミノメチル-1-エチルピロリジン
(*S*)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine

危険

$C_7H_{16}N_2$...128.21 ［危］4-2-III
CAS RN® [22795-99-9]

01442-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥9,000
01442-62	>97.0%(GC)	G	1g	￥6,300

(*S*)-(-)-2-アミノメチル-1-エチルピロリジン
(*S*)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine

$C_7H_{16}N_2$...128.21 ［危］4-2-III
CAS RN® [22795-99-9] d0.919 Fp57℃

36775-1A	TFS（36775-0010）	1g	￥6,200
36775-2A	TFS（36775-0050）	5g	￥18,400

2-(アミノメチル)-1-エチルピロリジン
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

$C_7H_{16}N_2$...128.21
CAS RN® [26116-12-1] bp58℃～60℃(16mm)▲ d0.887▲

17948-1A	TFS（17948-0100）	10g	￥35,900
17948-2A	TFS（17948-0500）	50g	￥137,000

3-アミノ-5-メチルヘキサン酸
3-Amino-5-methylhexanoic acid

$C_7H_{15}NO_2$...145.19
CAS RN®［3653-34-7］ mp249℃～250℃▲

33587-1A	TFS（33587-5000）			500mg	￥12,100

(*S*)-(+)-2-アミノ-2-メチル-3-ヒドロキシプロパン酸
(*S*)-(+)-2-Amino-2-methyl-3-hydroxypropanoic acid

$HOCH_2C(CH_3)NH_2COOH$...119.11
CAS RN®［16820-18-1］ mp286℃～288℃▲

29001-1A	TFS（29001-2500）			250mg	￥55,800

アミノメチリジントリメタノール → 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール

アミノメチリジントリメタノール → トロメタモール(UE-E)

3-(アミノメチル)インドールしゅう酸塩
3-(Aminomethyl)indole oxalate

$C_9H_{10}N_2 \cdot C_2H_2O_4$...236.22 ［劇］III
CAS RN®［296775-93-4］ mp203℃～205℃▲

33073-1A	TFS（33073-5000）			500mg	￥105,800

D L-2-アミノ-3-(6-メチルインドリル)プロピオン酸 → 6-メチル-*D L*-トリプトファン

D L-2-アミノ-3-(7-メチルインドリル)プロピオン酸 → 7-メチル-*D L*-トリプトファン

3-アミノ-5-メチルイソオキサゾール
3-Amino-5-methylisoxazole

$C_3HCH_3(NH_2)NO$...98.10
CAS RN®［1072-67-9］ mp60℃～63℃△

01563-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥11,000

5-アミノ-3-メチルイソオキサゾール
5-Amino-3-methylisoxazole

$C_4H_6N_2O$...98.10
CAS RN® [14678-02-5] mp78℃～80℃▲

30587-1A	TFS（30587-0010）		1g	￥5,100

2-アミノ-4-メチル-3-ニトロピリジン
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine

$C_6H_7N_3O_2$...153.13
CAS RN® [6635-86-5] mp139℃～141℃†

01538-52		>97.0%(HLC)	5g	￥8,000
01538-62		>97.0%(HLC)	1g	￥4,100
31955-1A	TFS（31955-0050）		5g	￥5,600

2-アミノ-4-メチル-5-ニトロピリジン
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine

警告

$C_6H_7N_3O_2$...153.13
CAS RN® [21901-40-6] mp223℃～225℃▲

31956-1A	TFS（31956-0010）		1g	￥4,000

5-アミノ-1-メチル-2-オキソインドリン
5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline

$C_9H_{10}N_2O$...162.18
CAS RN® [20870-91-1] mp109℃～111.5℃▲

49241-83	TFS（CC63014DA）	97%	1g	￥91,100
49241-84	TFS（CC63014CB）	97%	250mg	￥36,800

(*S*)-3-アミノ-4-メチルペンタン酸
(*S*)-3-Amino-4-methylpentanoic acid

$C_6H_{13}NO_2$...131.17
CAS RN® [40469-85-0]

01878-97		>97.0%(T)	500mg	￥14,000

2-アミノ-4-メチルフェノール → 2-アミノ-*p*-クレゾール

4-(アミノメチル)フェノール
4-(Aminomethyl)phenol

警告

C_7H_9NO...123.15
CAS RN® [696-60-6]

01573-52	>95.0%(GC)		G	5g	￥13,500
01573-62	>95.0%(GC)		G	1g	￥5,300

5-アミノ-2-メチルフェノール
5-Amino-2-methylphenol

警告

C_7H_9NO...123.15
CAS RN® [2835-95-2] mp127℃～133℃†

33630-1A	TFS（33630-0050）			5g	￥9,200

*N*1-(4-アミノ-2-メチルフェニル)アセトアミド
*N*1-(4-Amino-2-methylphenyl)acetamide

$C_9H_{12}N_2O$...164.20
CAS RN® [56891-59-9] mp141℃～142℃▲

49241-85	TFS（BTB06485EA）	97%		10g	￥51,000
49241-86	TFS（BTB06485DA）	97%		1g	￥14,300

*N*1-(5-アミノ-2-メチルフェニル)アセトアミド
*N*1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide

$C_9H_{12}N_2O$...164.20
CAS RN® [5434-30-0] mp141℃～142℃▲

49241-87	TFS（BTB00549DA）	97%		1g	￥41,400

3-アミノ-4-メチルフェニルボロン酸
3-Amino-4-methylphenylboronic acid

$C_7H_{10}BNO_2$...150.97 [PRTR] 1-405
CAS RN® [22237-12-3]

02052-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥25,000
02052-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥7,500

4-アミノメチルフェニルボロン酸塩酸塩
4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride

$C_7H_{10}BNO_2$･HCl...187.43 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［75705-21-4］

35884-1A	TFS（35884-2500）		250mg	￥13,500

5-アミノ-2-メチルフェニルボロン酸ピナコールエステル
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester

$C_{13}H_{20}BNO_2$...233.11 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［882670-69-1］

01776-65	>97.0%(GC)	G	1g	￥11,000

(アミノメチル)ホスホン酸
(Aminomethyl)phosphonic acid

$NH_2CH_2P(O)(OH)_2$...111.03
CAS RN® ［1066-51-9］ mp>300℃ †

29164-1A	TFS（29164-0010）		1g	￥19,800

アミノメチルりん酸標準品
Aminomethyl phosphonic acid standard

CH_6NO_3P...111.03 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1066-51-9］

49832-20	DES（C10205000）	残留農薬試験用	100mg	￥19,000

アミノメチルりん酸標準液
Aminomethyl phosphonic acid standard solution

CH_6NO_3P...111.03 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1066-51-9］

10mg/L 水溶液

49863-15	DES（L10205000WA）	残留農薬試験用	10mL	￥14,000

アミノメチルりん酸-^{13}C, ^{15}N標準液
Aminomethyl phosphonic acid-^{13}C, ^{15}N standard solution

$^{13}CH_6{}^{15}NO_3P$...113.02 ［冷］ 0℃～6℃

100mg/L 水溶液

49836-22	DES（XA10205100WA）	残留農薬試験用	1mL	￥145,000

アミノメチルりん酸-FMOC標準品
Aminomethyl phosphonic acid-FMOC standard

$C_{16}H_{16}NO_5P$...333.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［195306-88-8］

49837-49	DES（C10205800）	残留農薬試験用	10mg	￥72,000

1-アミノ-4-メチルピペラジン
1-Amino-4-methylpiperazine

$C_5H_{13}N_3$...115.17 ［危］4-2-III
CAS RN®［6928-85-4］bp172℃～175℃▲ d0.95▲

25139-1A	TFS（25139-0250）	25g	￥7,300
25139-2A	TFS（25139-1000）	100g	￥23,000

アミノメチルポリスチレンレジンHL
Aminomethyl polystyrene resin HL

100mesh～200mesh

49925-35	NBC（8.55020.0005）	5g	￥7,900
49925-36	NBC（8.55020.0025）	25g	￥31,600

1-アミノ-2-メチルプロパン → イソブチルアミン

2-アミノ-2-メチル-d_3-プロパン-1,1,1,3,3,3-d_6
2-Amino-2-methyl-d_3-propane-1,1,1,3,3,3-d_6

$(CD_3)_3CNH_2$...82.19 ［危］4-1-S-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［6045-08-5］

49120-76	CDN（D-355）	99 atom% D	1g	￥83,600

2-アミノ-2-メチルプロパン → ｔｅｒｔ-ブチルアミン

2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオール
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol

警告

$HOCH_2C(NH_2)(CH_3)CH_2OH$...105.13
CAS RN® [115-69-5] mp109℃～111℃†

01226-00		>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥18,500
01226-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,300
10405-1A	TFS（10405-1000）				100g	￥8,300
10405-3A	TFS（10405-5000）				500g	￥27,400

2-アミノ-2-メチル-d_3-プロパン臭化水素酸塩-1,1,1,3,3,3-d_6
2-Amino-2-methyl-d_3-propane-1,1,1,3,3,3-d_6 hydrobromide

$(CD_3)_3CNH_2$・HBr...163.10
CAS RN® [134071-63-9]

49136-22	CDN（D-6886）	99 atom% D			1g	￥39,600

1-アミノ-2-メチル-2-プロパノール
1-Amino-2-methyl-2-propanol

$C_4H_{11}NO$...89.13 ［危］4-2-III
CAS RN® [2854-16-2]

01114-52		>95.0%(GC)		G	5g	￥27,000
01114-62		>95.0%(GC)		G	1g	￥7,500

2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール
2-Amino-2-methyl-1-propanol

危険

$(CH_3)_2C(NH_2)CH_2OH$...89.13
CAS RN® [124-68-5] bp165℃† mp31℃† d0.930† Fp75℃†

01227-10		>97.0%(T)	鹿特級	G	250g	￥4,500
01227-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,900

2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール
2-Amino-2-methyl-1-propanol

危険

$(CH_3)_2C(NH_2)CH_2OH$...89.13
CAS RN® [124-68-5] bp165℃ mp31℃～32℃ d0.93 Fp67℃

10406-1A	TFS（10406-0010）		1L	￥9,600
10406-2A	TFS（10406-0050）		5L	￥38,600
10406-3A	TFS（10406-5000）		500mL	￥5,700

3-アミノ-5-メチルピラゾール
3-Amino-5-methylpyrazole

$C_4H_7N_3$...97.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [31230-17-8]

01716-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01716-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

3-アミノ-5-メチルピラゾール
3-Amino-5-methylpyrazole

$C_4H_7N_3$...97.11
CAS RN® [31230-17-8] mp41℃～43℃ Fp>110℃

36803-1A	TFS（36803-0050）		5g	￥3,900
36803-2A	TFS（36803-0250）		25g	￥12,600
36803-3A	TFS（36803-1000）		100g	￥39,100

3-アミノ-1-メチル-1*H*-ピラゾール-4-カルバルデヒド
3-Amino-1-methyl-1*H*-pyrazole-4-carbaldehyde

$C_5H_7N_3O$...125.12
CAS RN® [886851-66-7] mp133℃～134℃▲

49241-88	TFS（MO07854DA）	97%	1g	￥97,400
49241-89	TFS（MO07854CB）	97%	250mg	￥44,400

5-アミノ-1-メチル-1*H*-ピラゾール-4-カルボキサミド
5-Amino-1-methyl-1*H*-pyrazole-4-carboxamide

$C_5H_8N_4O$...140.14
CAS RN® [18213-75-7] mp231℃～232℃▲

49241-90	TFS（KM00775DA）	95%		1g	￥16,500
49241-91	TFS（KM00775CB）	95%		250mg	￥6,000

2-(アミノメチル)ピリジン
2-(Aminomethyl)pyridine

$C_6H_8N_2$...108.14 [危] 4-3-III
CAS RN® [3731-51-9] d1.049†

10407-1A	TFS（10407-1000）			100mL	￥21,800
10407-2A	TFS（10407-0250）			25mL	￥7,000

2-アミノ-5-メチルピリジン
2-Amino-5-methylpyridine

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN® [1603-41-4]

02090-02	>97.0%(GC)		G	500g	￥32,000
02090-32	>97.0%(GC)		G	25g	￥4,200

2-アミノ-6-メチルピリジン
2-Amino-6-methylpyridine

危険

$NH_2(CH_3)C_5H_3N$...108.14
CAS RN® [1824-81-3] bp214.4℃† mp43.7℃†

01575-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥4,600

3-アミノ-4-メチルピリジン
3-Amino-4-methylpyridine

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN® [3430-27-1]

01521-32	>98.0%(GC)		G	25g	￥10,500
01521-52	>98.0%(GC)		G	5g	￥4,800

4-アミノ-2-メチルピリジン
4-Amino-2-methylpyridine

警告

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN® [18437-58-6]

01578-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥13,500
01578-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥5,300

4-アミノ-3-メチルピリジン
4-Amino-3-methylpyridine

警告

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN® [1990-90-5]

01546-52	>96.0%(GC)	G	5g	￥8,000
01546-62	>96.0%(GC)	G	1g	￥4,100

5-アミノ-2-メチルピリジン
5-Amino-2-methylpyridine

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN® [3430-14-6]

01520-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥10,500
01520-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥4,600

(2 *R*)-2-アミノ-3-メチル-*N*-2-ピリジニルブタンアミド
(2*R*)-2-Amino-3-methyl-*N*-2-pyridinylbutanamide

$C_{10}H_{15}N_3O$...193.24
CAS RN® [1568043-19-5]

49212-10	ダイセル（135893-250MG）	250mg	￥37,900

(2 *S*)-2-アミノ-3-メチル-*N*-2-ピリジニルブタンアミド
(2*S*)-2-Amino-3-methyl-*N*-2-pyridinylbutanamide

$C_{10}H_{15}N_3O$...193.24
CAS RN® [167261-43-0]

49212-11	ダイセル（135892-250MG）	250mg	￥37,900

2-アミノ-4-メチルピリミジン
2-Amino-4-methylpyrimidine

$C_5H_7N_3$...109.12
CAS RN® [108-52-1] mp155℃～160℃▲

10409-1A	TFS（10409-0100）		10g	￥4,700
10409-2A	TFS（10409-1000）		100g	￥36,600

8-アミノ-2-メチルキノリン
8-Amino-2-methylquinoline

警告

$C_{10}H_{10}N_2$...158.19
CAS RN® [18978-78-4]

01495-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥13,500
01495-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥5,100

7-アミノメチルスピロ[3.5]ノナン
7-Aminomethylspiro[3.5]nonane

$C_{10}H_{19}N$...153.26 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [877125-98-9]

01192-97	>97.0%(GC)	G	500mg	￥11,500

5-アミノ-2-メチル-2*H*-テトラゾール
5-Amino-2-methyl-2*H*-tetrazole

$C_2H_5N_5$...99.09
CAS RN® [6154-04-7]

01612-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,000
01612-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,000

2-アミノ-5-メチル-1,3,4-チアジアゾール
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole

$C_3H_5N_3S$...115.16
CAS RN® [108-33-8] mp224℃～225℃(dec.)▲

15837-1A	TFS（15837-0050）		5g	￥5,400

5-アミノ-3-メチル-1,2,4-チアジアゾール
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole

$C_3H_5N_3S$...115.16
CAS RN® [17467-35-5]

01619-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥18,000
01619-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥6,300

2-アミノ-4-メチルチアゾール
2-Amino-4-methylthiazole

$C_4H_6N_2S$...114.17 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1603-91-4] mp42℃～47℃▲

10410-1A	TFS（10410-0250）	25g	￥14,000

4-アミノ-2-(メチルチオ)ピリミジン-5-カルボニトリル
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile

$C_6H_6N_4S$...166.20 [劇] III
CAS RN® [770-30-9] mp240℃～243℃▲

35431-1A	TFS（35431-0010）	1g	￥5,900

N-アミノモルホリン
N-Aminomorpholine

$C_4H_{10}N_2O$...102.13 [危] 4-2-III
CAS RN® [4319-49-7] bp168℃▲ d1.05▲

10411-1A	TFS（10411-0250）	25g	￥23,600
10411-2A	TFS（10411-0050）	5g	￥6,100

3-アミノ-5-モルホリノメチル-2-オキサゾリジノン標準品(AMOZ)
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone standard (AMOZ)

$C_8H_{15}N_3O_3$...201.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [43056-63-9]

49836-16	DES（C10206300）	食品分析用	50mg	￥72,000

3-アミノ-5-モルホリノメチル-2-オキサゾリジノン標準液(AMOZ)
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone standard solution (AMOZ)

危険

$C_8H_{15}N_3O_3$...201.22 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［43056-63-9］

10mg/L アセトニトリル溶液

49831-67	DES（L10206300AL）	食品分析用	10mL	￥27,000

3-アミノ-5-モルホリノメチル-2-オキサゾリジノン-d_5標準品(AMOZ-d_5)
3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone-d_5 standard (AMOZ-d_5)

$C_8H_{10}N_3O_3D_5$...206.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1017793-94-0］

49833-04	DES（C10206310）	食品分析用	10mg	￥42,000

1-アミノナフタレン標準品
1-Aminonaphthalene standard

$C_{10}H_9N$...143.18 ［労］特-1,57,57-2
CAS RN®［134-32-7］

49797-53	ACC（R-067N）	環境分析用	50mg	￥3,000

1-アミノナフタレン-d_7
1-Aminonaphthalene-d_7

$C_{10}D_7NH_2$...150.22 ［労］特-1
CAS RN®［78832-53-8］

49120-77	CDN（D-5835）	98 atom% D	100mg	￥88,000

1-アミノナフタレン-d_9
1-Aminonaphthalene-d_9

$C_{10}D_9N$...152.23 ［労］特-1
CAS RN®［78832-56-1］

49136-23	CDN（D-6685）	98 atom% D	50mg	￥47,300

2-アミノナフタレン標準液
2-Aminonaphthalene standard solution

$C_{10}H_9N$...143.18 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［91-59-8］

10mg/L アセトニトリル溶液

49863-25	DES（L10206355AL）	環境分析用	10mL	￥17,000

7-アミノ-1,3-ナフタレンジスルホン酸
7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid

$C_{10}H_9NO_6S_2$...303.31
CAS RN®［86-65-7］ mp>300℃▲

16396-1A	TFS（16396-1000）	tech.	100g	￥10,500
16396-2A	TFS（16396-5000）	tech.	500g	￥22,100

7-アミノ-1,3-ナフタレンジスルホン酸一カリウム → 2-ナフチルアミン-6,8-ジスルホン酸一カリウム

2-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸 → 2-ナフチルアミン-1-スルホン酸

4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸 → 1-ナフチルアミン-4-スルホン酸

5-アミノ-2-ナフタレンスルホン酸 → 1-ナフチルアミン-6-スルホン酸

8-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸 → 1-ナフチルアミン-8-スルホン酸

4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウム・0.5水 → 1-ナフチルアミン-4-スルホン酸ナトリウム・0.5水

3-アミノ-2-ナフトエ酸
3-Amino-2-naphthoic acid

$C_{11}H_9NO_2$...187.19
CAS RN® [5959-52-4] mp210℃▲

10414-2A	TFS（10414-0050）	tech.	5g	￥20,500
10414-3A	TFS（10414-0250）	tech.	25g	￥68,200

6-アミノ-2-ナフトエ酸
6-Amino-2-naphthoic acid

$C_{11}H_9NO_2$...187.19
CAS RN® [116668-47-4] mp222℃～227℃▲

34450-2A	TFS（34450-0050）	5g	￥25,200

8-アミノ-2-ナフトール
8-Amino-2-naphthol

$NH_2C_{10}H_6OH$...159.18
CAS RN® [118-46-7] mp204℃～207℃†

01229-31	>94.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥19,500
34639-1A	TFS（34639-0050）			5g	￥4,200
34639-2A	TFS（34639-0250）			25g	￥15,700

8-アミノ-1-ナフトール-3,6-ジスルホン酸一ナトリウム *n* 水和物
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt *n*-hydrate (H acid)

$NH_2C_{10}H_4(OH)(SO_3H)SO_3Na \cdot nH_2O$
CAS RN® [5460-09-3]

01231-02	G	500g	￥17,500

8-アミノ-1-ナフトール-3,6-ジスルホン酸一ナトリウムn水和物
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt *n*-hydrate (H acid)

警告

$NH_2C_{10}H_4(OH)(SO_3H)SO_3Na \cdot nH_2O$
CAS RN® [5460-09-3]

40084-1A	TFS（40084-0050）	5g	￥5,300
40084-2A	TFS（40084-1000）	100g	￥21,400
40084-3A	TFS（40084-5000）	500g	￥90,900

1-アミノ-2-ナフトール-4-スルホン酸
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid

$H_2NC_{10}H_5(OH)SO_3H$...239.25
CAS RN® [116-63-2] mp295℃(dec.)†

01234-30	>97.0%(T)	特級	G	25g	￥2,900

1-アミノ-2-(α-ナフチルアミノ)エタン二塩酸塩 → *N*-1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩
(二塩酸 *N*-1-ナフチルエチレンジアミン)

2-アミノニコチン酸
2-Aminonicotinic acid

$H_2N(C_5H_3N)COOH$...138.12
CAS RN® [5345-47-1] mp295℃～297℃▲

10416-1A	TFS（10416-0050）	5g	￥5,000
10416-2A	TFS（10416-0250）	25g	￥16,900

4-アミノニコチン酸 → 4-アミノ-3-ピリジンカルボン酸

5-アミノニコチン酸
5-Aminonicotinic acid

$C_6H_6N_2O_2$...138.12
CAS RN® [24242-19-1]

36114-1A	TFS（36114-0010）	1g	￥9,800

6-アミノニコチン酸
6-Aminonicotinic acid

警告

$H_2N(C_5H_3N)COOH$...138.12
CAS RN® [3167-49-5] mp>300℃▲

01583-32		>97.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
01583-52		>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,300
20254-1A	TFS（20254-0050）			5g	￥11,200
20254-2A	TFS（20254-0250）			25g	￥37,500

6-アミノニコチン酸メチルエステル
6-Aminonicotinic acid methyl ester

$C_7H_8N_2O_2$...152.15
CAS RN® [36052-24-1] mp154℃～156℃▲

36681-2A	TFS（36681-0050）		5g	￥19,200

2-アミノ-3-ニトロアニソール
2-Amino-3-nitroanisole

$C_7H_8N_2O_3$...168.15
CAS RN® [16554-45-3]

01942-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥11,000
01942-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,100

2-アミノ-3-ニトロ安息香酸
2-Amino-3-nitrobenzoic acid

$C_7H_6N_2O_4$...182.13
CAS RN® [606-18-8]

01477-32	>94.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01477-52	>94.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

2-アミノ-4-ニトロ安息香酸
2-Amino-4-nitrobenzoic acid

$C_7H_6N_2O_4$...182.13
CAS RN® [619-17-0]

01478-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01478-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

2-アミノ-5-ニトロ安息香酸
2-Amino-5-nitrobenzoic acid

$C_7H_6N_2O_4$...182.13
CAS RN® [616-79-5] mp278℃▲

24595-1A	TFS（24595-0050）		5g	￥4,900
24595-2A	TFS（24595-0250）		25g	￥14,200

5-アミノ-2-ニトロ安息香酸
5-Amino-2-nitrobenzoic acid

警告

$C_7H_6N_2O_4$...182.13
CAS RN® [13280-60-9] mp234℃～242℃▲

01761-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥28,500
01761-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥8,500
33074-1A TFS（33074-0010）			1g	￥4,100

2-アミノ-4-ニトロベンゾニトリル
2-Amino-4-nitrobenzonitrile

$C_7H_5N_3O_2$...163.13 [劇] III
CAS RN® [87376-25-8]

01826-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
01826-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥4,800

2-アミノ-5-ニトロベンゾトリフルオリド
2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride

$C_7H_5F_3N_2O_2$...206.12
CAS RN® [121-01-7] mp90℃～93℃▲

18823-1A TFS（18823-0050）			5g	￥3,300

2-アミノ-5-ニトロ-6-メチルピリジン
2-Amino-5-nitro-6-methylpyridine

$C_6H_7N_3O_2$...153.13
CAS RN® [22280-62-2]

01686-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥14,000
01686-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,700

1-アミノ-4-ニトロナフタレン標準品
1-Amino-4-nitronaphthalene standard

$C_{10}H_8N_2O_2$...188.18
CAS RN® [776-34-1]

49804-34 ACC（R-001N）		環境分析用	100mg	￥5,100

2-アミノ-3-ニトロフェノール
2-Amino-3-nitrophenol

$C_6H_6N_2O_3$...154.12
CAS RN® [603-85-0]

01596-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01596-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

2-アミノ-4-ニトロフェノール
2-Amino-4-nitrophenol

$C_6H_6N_2O_3$...154.12
CAS RN® [99-57-0] mp143℃▲

40089-1A	TFS（40089-0500）	50g	￥30,100
40089-2A	TFS（40089-0250）	25g	￥15,000

4-アミノ-2-ニトロフェノール
4-Amino-2-nitrophenol

$H_2NC_6H_3(NO_2)OH$...154.12
CAS RN® [119-34-6] mp125℃～127℃▲

16423-1A	TFS（16423-0050）	5g	￥5,000

4-アミノ-3-ニトロフェノール
4-Amino-3-nitrophenol

警告

$C_6H_6N_2O_3$...154.12
CAS RN® [610-81-1] mp151℃～153℃▲

01574-02	>95.0%(HLC)	G	500g	￥14,000
01574-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥2,500
33522-1A	TFS（33522-0050）		5g	￥3,100
33522-2A	TFS（33522-0250）		25g	￥9,700

(1*R*,2*R*)-2-アミノ-1-(4-ニトロフェノール)プロパン-1,3-ジオール
(1*R*,2*R*)-2-Amino-1-(4-nitrophenol)propane-1,3-diol

$C_9H_{12}N_2O_4$...212.20
CAS RN® [716-61-0] mp163℃～165℃▲

33479-1A	TFS（33479-0050）	5g	￥6,500
33479-2A	TFS（33479-0250）	25g	￥16,300

(1*S*,2*S*)-2-アミノ-1-(4-ニトロフェニル)プロパン-1,3-ジオール
(1*S*,2*S*)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol

$C_9H_{12}N_2O_4$...212.20
CAS RN® [2964-48-9] mp162℃～168℃▲

33480-1A	TFS（33480-0050）	5g	￥3,600
33480-2A	TFS（33480-0250）	25g	￥11,800

2-アミノ-5-ニトロ-6-メチルピリジン
2-Amino-5-nitro-6-methylpyridine

$C_6H_7N_3O_2$...153.13
CAS RN® [22280-62-2] mp185℃～189℃

36077-2A	TFS（36077-0050）	5g	￥51,300

6-アミノ-5-ニトロ-2-ピコリン
6-Amino-5-nitro-2-picoline

警告

$C_6H_7N_3O_2$...153.13
CAS RN® [21901-29-1] mp147℃～157℃

36078-1A	TFS（36078-0010）	1g	￥8,600

6-アミノ-5-ニトロ-3-ピコリン
6-Amino-5-nitro-3-picoline

$C_6H_7N_3O_2$...153.13
CAS RN® [7598-26-7] mp189℃～193℃▲

37965-1A	TFS（37965-0010）	1g	￥7,900

2-アミノ-3-ニトロピリジン
2-Amino-3-nitropyridine

$NH_2(C_5H_3N)NO_2$...139.11
CAS RN® [4214-75-9] mp165℃～167℃†

15112-1A	TFS（15112-0050）	5g	￥5,300

2-アミノ-5-ニトロピリジン
2-Amino-5-nitropyridine

警告

$C_5H_5N_3O_2$...139.11
CAS RN® [4214-76-0] mp186℃～190℃†

01534-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥7,500
01534-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100
10423-1A	TFS（10423-0250）		25g	￥10,500
10423-2A	TFS（10423-0050）		5g	￥3,100
10423-3A	TFS（10423-1000）		100g	￥54,500

5-アミノ-6-ニトロキノリン
5-Amino-6-nitroquinoline

$C_9H_7N_3O_2$...189.17
CAS RN® [35975-00-9] mp272℃～273℃▲

16330-1A	TFS（16330-0010）	1g	￥8,000

2-アミノ-4-ニトロトルエン標準品
2-Amino-4-nitrotoluene standard

危険

$C_7H_8N_2O_2$...152.15 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-92 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [99-55-8]

49863-28	DES（C10207500）	環境分析用	250mg	￥13,000

1-アミノノナン → *n*-ノニルアミン

1-アミノオクタデカン → *n*-オクタデシルアミン

1-アミノオクタン → *n*-オクチルアミン

3-アミノ-2-オキサゾリジノン標準品(AOZ)
3-Amino-2-oxazolidinone standard (AOZ)

$C_3H_6N_2O_2$...102.09 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［80-65-9］

49833-14	DES（C10209000）	食品分析用	50mg	￥83,000

3-アミノ-2-オキサゾリジノン標準液(AOZ)
3-Amino-2-oxazolidinone standard solution (AOZ)

危険

$C_3H_6N_2O_2$...102.09 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［80-65-9］

10mg/L アセトニトリル溶液

49831-66	DES（L10209000AL）	食品分析用	10mL	￥27,000

3-アミノ-2-オキサゾリジノン-d_4標準品(AOZ-d_4)
3-Amino-2-oxazolidinone-d_4 standard (AOZ-d_4)

$C_3H_2N_2O_2D_4$...106.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1188331-23-8］

49833-03	DES（C10209010）	食品分析用	10mg	￥84,000

アミノPEGA樹脂
Amino PEGA resin

［冷］ 2℃～8℃

49925-17	NBC（8.55015.0005）	5g	￥62,400

6-アミノペニシラン酸
6-Aminopenicillanic acid

$C_8H_{12}N_2O_3S$...216.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［551-16-6］ mp198℃～200℃(dec.)▲

10425-1A	TFS（10425-0250）	25g	￥9,700
10425-2A	TFS（10425-0100）	10g	￥4,900
10425-3A	TFS（10425-1000）	100g	￥29,700

4-アミノ-1,2,2,6,6-ペンタメチルピペリジン
4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine

$C_{10}H_{22}N_2$...170.29
CAS RN® [40327-96-6] bp215℃～218℃▲

33594-1A	TFS（33594-0010）	1g	￥11,800
33594-2A	TFS（33594-0050）	5g	￥39,300

1-アミノペンタン → *n*-ペンチルアミン

3-アミノペンタン-2,2,3,4,4-d_5
3-Aminopentane-2,2,3,4,4-d_5

$C_5H_8D_5N$...92.19 [危] 4-1-II
CAS RN® [1219802-43-3]

49136-25	CDN（D-6017）	98 atom% D	100mg	￥70,400

L-2-アミノペンタン酸-4,4,5,5,5-d_5
L-2-Aminopentanoic-4,4,5,5,5-d_5 acid

$C_5H_6D_5NO_2$...122.17
CAS RN® [1202936-50-2]

49136-26	CDN（D-6568）	98 atom% D	50mg	￥88,000

(*S*)-(-)-2-アミノ-4-ペンテン酸
(*S*)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid

警告

$H_2C{:}CHCH_2CH(NH_2)CO_2H$...115.13
CAS RN® [16338-48-0] mp283℃(dec.)†

01381-52		>95.0%	G	5g	￥18,000
01381-62		>95.0%	G	1g	￥6,300
27541-1A	TFS（27541-2500）			250mg	￥13,500

DL-2-アミノ-4-ペンテン酸
DL-2-Amino-4-pentenoic acid

$C_5H_9NO_2$...115.13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7685-44-1] mp251℃～253℃▲

17422-1A	TFS（17422-0010）	1g	￥8,100

p-アミノフェネチルアルコール
p-Aminophenethyl alcohol

警告

$H_2NC_6H_4CH_2CH_2OH$...137.17
CAS RN® [104-10-9] mp111℃～113℃†

01252-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥15,000

p-アミノフェネチルアルコール
p-Aminophenethyl alcohol

警告

$H_2NC_6H_4CH_2CH_2OH$...137.17
CAS RN® [104-10-9] mp104℃～108℃

40093-2A	TFS（40093-0250）			25g	￥9,600
40093-3A	TFS（40093-1000）			100g	￥33,300

4-アミノフェノール-d_7
4-Aminophenol-d_7

$D_2NC_6D_4OD$...116.16 [PRTR] 1-23 [変]
CAS RN® [285132-88-9]

49120-78	CDN（D-5022）	97 atom% D		1g	￥96,800

m-アミノフェノール
m-Aminophenol

警告

$H_2NC_6H_4OH$...109.12 [PRTR] 1-24
CAS RN® [591-27-5] mp121℃～123℃†

01244-00	>97.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥11,000
01244-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,300

o-アミノフェノール
o-Aminophenol

警告

$H_2NC_6H_4OH$...109.12 ［変］
CAS RN® ［95-55-6］ mp177℃ †

01243-31		>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,300
10426-1A	TFS（10426-1000）				100g	￥4,800
10426-2A	TFS（10426-0050）				5g	￥4,000
10426-3A	TFS（10426-5000）				500g	￥14,500

p-アミノフェノール
p-Aminophenol

危険

$H_2NC_6H_4OH$...109.12 ［PRTR］1-23 ［変］
CAS RN® ［123-30-8］ mp186℃ †

01245-01		>97.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥11,000
01245-31		>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,400

p-アミノフェノール
p-Aminophenol

危険

$H_2NC_6H_4OH$...109.12 ［PRTR］1-23 ［変］
CAS RN® ［123-30-8］ bp284℃ mp187℃～191℃ Fp189℃

10427-1A	TFS（10427-0010）				1kg	￥11,800
10427-2A	TFS（10427-0050）				5g	￥3,500
10427-3A	TFS（10427-2500）				250g	￥4,600

p-アミノフェノール塩酸塩(塩酸 *p*-アミノフェノール)
p-Aminophenol hydrochloride

危険

$H_2NC_6H_4OH \cdot HCl$...145.58
CAS RN® ［51-78-5］

01248-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥9,500

N-[2-(4-アミノフェノキシ)エチル]-*N*,*N*-ジメチルアミン
N-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]-*N*,*N*-dimethylamine

$C_{10}H_{16}N_2O$...180.24
CAS RN® [62345-76-0] mp55℃～57℃▲

49241-94	TFS（CC51514DA）	97%		1g	￥48,500
49241-95	TFS（CC51514CB）	97%		250mg	￥17,300

p-アミノフェニル酢酸
p-Aminophenylacetic acid

警告

$NH_2C_6H_4CH_2COOH$...151.16
CAS RN® [1197-55-3] mp199℃～200℃†(dec.)▲

01588-50	>97.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥4,300

p-アミノフェニル酢酸
p-Aminophenylacetic acid

警告

$NH_2C_6H_4CH_2COOH$...151.16
CAS RN® [1197-55-3] mp196℃～201℃

10428-1A	TFS（10428-0050）			5g	￥3,200
10428-2A	TFS（10428-0250）			25g	￥9,800
10428-3A	TFS（10428-1000）			100g	￥31,100

4-アミノ-*L*-フェニルアラニン塩酸塩0.5水
4-Amino-*L*-phenylalanine hydrochloride hemihydrate

$C_9H_{12}N_2O_2 \cdot HCl \cdot 1/2H_2O$...225.67
CAS RN® [24286-13-3] mp247℃～249℃▲

22794-1A	TFS（22794-2500）			250mg	￥11,600

3-アミノフェニルボロン酸
3-Aminophenylboronic acid

警告

$C_6H_8BNO_2$...136.94 [PRTR] 1-405
CAS RN® [30418-59-8]

01109-55	>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥11,000
01109-65	>98.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,200

3-アミノフェニルボロン酸ヘミ硫酸塩
3-Aminophenylboronic acid hemisulfate

$C_6H_8NO_2B \cdot 1/2H_2SO_4$...185.98 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［66472-86-4］ mp>300℃▲

10430-2A	TFS（10430-0050）			5g	￥14,500
10430-1A	TFS（10430-0010）			1g	￥4,800

3-アミノフェニルボロン酸塩酸塩
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride

警告

$C_6H_9BClNO_2$...173.40 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［85006-23-1］

02001-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥12,000
02001-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,100

3-アミノフェニルボロン酸一水和物
3-Aminophenylboronic acid monohydrate

警告

$C_6H_8BNO_2 \cdot H_2O$...154.96 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［206658-89-1］ mp94℃～97℃†

02000-55	>97.0%(HLC)	Organics		5g	￥14,000
02000-65	>97.0%(HLC)	Organics		1g	￥10,000
35276-1A	TFS（35276-0010）			1g	￥7,100

3-アミノフェニルボロン酸ピナコールエステル
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester

$C_{12}H_{18}BNO_2$...219.09 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［210907-84-9］

01777-65	>97.0%(GC)	Organics	G	1g	￥7,000

4-アミノフェニルボロン酸ピナコールエステル → 4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)アニリン

(±)-2-アミノ-1-フェニルエタノール
(±)-2-Amino-1-phenylethanol

$C_8H_{11}NO$...137.17
CAS RN® [7568-93-6] mp56℃～60℃▲

10432-1A	TFS（10432-0100）	10g	￥16,200
10432-2A	TFS（10432-0500）	50g	￥71,900

4-アミノフェニルエーテル → 4,4′-ジアミノジフェニルエーテル

4-アミノフェニルエーテル標準品
4-Aminophenyl ether standard

危険

$C_{12}H_{12}N_2O$...200.23 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-143 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [101-80-4] mp189℃～190℃▲

49863-38	DES（C10215000）	環境分析用	250mg	￥13,000

p-アミノフェニルエチルアルコール → *p*-アミノフェネチルアルコール

2-(4-アミノフェニル)エチルアミン
2-(4-Aminophenyl)ethylamine

$C_8H_{12}N_2$...136.19 [危] 4-3-III
CAS RN® [13472-00-9] mp28℃▲ d1.057▲

15384-1A	TFS（15384-0100）	10g	￥24,400
15384-2A	TFS（15384-0050）	5g	￥13,300

2-アミノ-5-フェニル-3-フロニトリル
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile

$C_{11}H_8N_2O$...184.19 [劇] III
CAS RN® [14742-32-6] mp196℃～197℃▲

49241-96	TFS（AW01254EB）	95%	25g	￥74,900
49241-97	TFS（AW01254EA）	95%	10g	￥33,700
49242-00	TFS（AW01254DA）	95%	1g	￥9,100

2-(4-アミノフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol

$C_9H_7F_6NO$...259.14 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［722-92-9］ mp155℃～156℃▲

36781-1A	TFS（36781-0010）		1g	￥7,900
36781-2A	TFS（36781-0050）		5g	￥22,500

*N*1-(4-アミノフェニル)-*N*1-メチルアセトアミド
*N*1-(4-Aminophenyl)-*N*1-methylacetamide

$C_9H_{12}N_2O$...164.20
CAS RN® ［119-63-1］ mp70℃～71℃▲

49242-01	TFS（BTB13402DA）		1g	￥12,100
49242-02	TFS（BTB13402CB）		250mg	￥10,100

(1-アミノ-1-フェニルメチル)ホスホン酸
(1-Amino-1-phenylmethyl)phosphonic acid

$C_7H_{10}NO_3P$...187.13
CAS RN® ［18108-22-0］ mp279℃～284℃(dec.)▲

34491-1A	TFS（34491-0010）		1g	￥21,000

5-(3-アミノフェニル)オキサゾール
5-(3-Aminophenyl)oxazole

警告

$C_9H_8N_2O$...160.17
CAS RN® ［157837-31-5］ mp92℃～95℃†

01222-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥51,000
01222-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥13,000

5-(4-アミノフェニル)オキサゾール
5-(4-Aminophenyl)oxazole

警告

$C_9H_8N_2O$...160.17
CAS RN® ［1008-95-3］ mp150℃～151℃†

01220-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥41,000
01220-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥10,500
49271-05	TFS（DFP00120DA）	97%	1g	￥17,300
49271-06	TFS（DFP00120CB）	97%	250mg	￥8,800

(1*S*,2*S*)-(+)-2-アミノ-1-フェニル-1,3-プロパンジオール
(1*S*,2*S*)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol

$C_9H_{13}NO_2$...167.20
CAS RN® [28143-91-1] mp112℃～115℃▲

18149-2A	TFS（18149-0050）	5g	￥15,300

(*R*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン酸エチルエステル塩酸塩
(*R*)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride

$C_{11}H_{15}NO_2$·HCl...229.70
CAS RN® [340188-50-3] mp119℃▲

光学純度:98% ee

36299-1A	TFS（36299-0010）	1g	￥54,400
36299-2A	TFS（36299-0050）	5g	￥228,500

(*S*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン酸エチルエステル塩酸塩
(*S*)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride

$C_{11}H_{15}NO_2$·HCl...229.70
CAS RN® [167834-24-4] mp117℃▲

光学純度:98% ee

36204-1A	TFS（36204-0010）	1g	￥54,400

(*R*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン-1-オール
(*R*)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol

$C_9H_{13}NO$...151.20
CAS RN® [170564-98-4]

光学純度:98% ee

36312-2A	TFS（36312-0010）	1g	￥72,500

(*S*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン-1-オール
(*S*)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol

$C_9H_{13}NO$...151.20
CAS RN® [82769-76-4]

光学純度:98% ee

36217-1A	TFS（36217-2500）	250mg	￥23,300
36217-2A	TFS（36217-0010）	1g	￥71,200

D(+)-2-アミノ-3-フェニル-1-プロパノール
D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol

$C_9H_{13}NO$...151.20
CAS RN® [5267-64-1] mp90℃～94℃▲

41734-2A	TFS（41734-0010）	1g	￥3,900
41734-3A	TFS（41734-0100）	10g	￥26,500

D-2-アミノ-3-フェニル-1-プロパノール
D-2-Amino-3-phenyl-1-propanol

$C_9H_{13}NO$...151.20
CAS RN® [5267-64-1]

49212-12	ダイセル（100831-025G）	25g	￥46,200

L(-)-2-アミノ-3-フェニル-1-プロパノール
L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol

$C_9H_{13}NO$...151.20
CAS RN® [3182-95-4] mp92℃～94℃▲

18387-1A	TFS（18387-0010）	1g	￥4,900
18387-2A	TFS（18387-0050）	5g	￥17,200

L-2-アミノ-3-フェニル-1-プロパノール
L-2-Amino-3-phenyl-1-propanol

$C_9H_{13}NO$...151.20
CAS RN® [3182-95-4]

49212-13	ダイセル（100832-025G）	25g	￥49,900

3-(3-アミノフェニル)プロピオン酸
3-(3-Aminophenyl)propionic acid

$C_9H_{11}NO_2$...165.18
CAS RN® [1664-54-6]

01505-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥18,000
01505-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥6,400

3-アミノ-5-フェニルピラゾール
3-Amino-5-phenylpyrazole

$C_9H_9N_3$...159.18
CAS RN® [1572-10-7] mp124℃～127℃▲

36802-1A	TFS（36802-0010）		1g	￥7,600
36802-2A	TFS（36802-0050）		5g	￥28,000

5-アミノ-1-フェニル-1*H*-ピラゾール-4-カルボニトリル
5-Amino-1-phenyl-1*H*-pyrazole-4-carbonitrile

警告

$C_{10}H_8N_4$...184.19 ［劇］III
CAS RN® [5334-43-0]

01741-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥29,500
01741-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥9,000

1-(2-アミノフェニル)ピロール
1-(2-Aminophenyl)pyrrole

$C_{10}H_{10}N_2$...158.19
CAS RN® [6025-60-1] mp96℃～98℃▲

18850-1A	TFS（18850-0050）		5g	￥17,600

3-アミノフェニルスルホン
3-Aminophenyl sulfone

危険

$(H_2NC_6H_4)_2SO_2$...248.30
CAS RN® [599-61-1] mp167℃～170℃†

01584-02	>97.0%	G	500g	￥6,600

N-[(4-アミノフェニル)スルホニル]アセタミド標準品 → スルファセタミド標準品

2-(4-アミノフェニルチオ)酢酸
2-(4-Aminophenylthio)acetic acid

$C_8H_9NO_2S$...183.23
CAS RN® [104-18-7] mp193℃～203℃▲

38203-1A	TFS（38203-0010）		1g	￥8,100

4-アミノフェニルチオエーテル標準品
4-Aminophenylthioether standard

警告

$C_{12}H_{12}N_2S$...216.30 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [139-65-1]

49863-39	DES（C10215500）	環境分析用	250mg	￥13,000

3-アミノ-4-フェニル-5-(トリフルオロメチル)チオフェン-2-カルボン酸
3-Amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid

$C_{12}H_8F_3NO_2S$...287.25
CAS RN® [849066-52-0] mp134℃(dec.)▲

49242-03	TFS（SEW03132DA）	95%	1g	￥57,900

L(+)-2-アミノ-3-ホスホノプロピオン酸
L(+)-2-Amino-3-phosphonopropionic acid

$C_3H_8NO_5P$...169.07 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23052-80-4] mp227℃～229℃▲

32897-1A	TFS（32897-0050）		5mg	￥22,900

3-アミノフタルヒドラジド → ルミノール

3-アミノフタル酸
3-Aminophthalic acid

$C_8H_7NO_4$...181.14
CAS RN® [5434-20-8]

37575-1A	TFS（37575-0010）		1g	￥8,000
37575-2A	TFS（37575-0050）		5g	￥33,500

4-アミノフタルイミド
4-Aminophthalimide

$C_8H_6N_2O_2$...162.14
CAS RN®［3676-85-5］ mp290℃▲

40101-1A	TFS（40101-0010）		1g	￥8,800

4-アミノフタロニトリル
4-Aminophthalonitrile

$C_8H_5N_3$...143.14 ［劇］III
CAS RN®［56765-79-8］ mp177℃～182℃▲

40102-1A	TFS（40102-0100）		10g	￥32,600
40102-2A	TFS（40102-0050）		5g	￥18,300
40102-3A	TFS（40102-0250）		25g	￥72,700

2-アミノ-3-ピコリン
2-Amino-3-picoline

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN®［1603-40-3］ mp32℃～34℃▲ d1.07▲

01685-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥2,800
01685-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥2,000
10438-1A	TFS（10438-1000）		100g	￥6,200
10438-2A	TFS（10438-0050）		5g	￥3,500
10438-3A	TFS（10438-5000）		500g	￥28,000

2-アミノ-4-ピコリン
2-Amino-4-picoline

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN®［695-34-1］ mp96℃～101℃▲

15386-1A	TFS（15386-1000）		100g	￥3,700

2-アミノ-5-ピコリン
2-Amino-5-picoline

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN®［1603-41-4］ mp76℃～77℃▲

10439-1A	TFS（10439-0100）		10g	￥3,700
10439-2A	TFS（10439-0500）		50g	￥10,000

2-アミノ-6-ピコリン
2-Amino-6-picoline

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN®［1824-81-3］ mp40℃～45℃▲

10440-1A	TFS（10440-1000）	100g	￥4,700
10440-2A	TFS（10440-0050）	5g	￥3,900
10440-3A	TFS（10440-5000）	500g	￥17,400

4-アミノ-2-メチルピリジン
4-Amino-2-methylpyridine

警告

$C_6H_8N_2$...108.14
CAS RN®［18437-58-6］ mp92℃～95℃

39365-1A	TFS（39365-0010）	1g	￥28,100
39365-2A	TFS（39365-0050）	5g	￥99,900

6-アミノ-α-ピコリン → 2-アミノ-6-メチルピリジン

1-アミノピペリジン
1-Aminopiperidine

$C_5H_{12}N_2$...100.16 ［危］4-2-S-III
CAS RN®［2213-43-6］ d0.928▲

10441-1A	TFS（10441-0100）	10g	￥12,300
10441-2A	TFS（10441-0250）	25g	￥29,400

4-アミノピペリジン-3,3,4,5,5-d_5
4-Aminopiperidine-3,3,4,5,5-d_5

$C_5H_7D_5N_2$...105.19 ［危］4-2-III
CAS RN®［1219803-60-7］

49136-27	CDN（D-6062）	98 atom% D	100mg	￥83,600

(*R*)-3-アミノピペリジン二塩酸塩
(*R*)-3-Aminopiperidine dihydrochloride

$C_5H_{12}N_2 \cdot 2HCl$...173.08
CAS RN® [334618-23-4]

01885-32	>97.0%(T)	G	25g	￥25,000
01885-52	>97.0%(T)	G	5g	￥8,000

2-アミノ-1,3-プロパンジオール
2-Amino-1,3-propanediol

$NH_2CH(CH_2OH)_2$...91.10
CAS RN® [534-03-2] bp115℃～116℃▲ mp53℃▲

40103-1A	TFS（40103-0010）		1g	￥3,500

2-アミノ-1,3-プロパンジオール-1,1,2,3,3-d_5
2-Amino-1,3-propanediol-1,1,2,3,3-d_5

$C_3H_4D_5NO_2$...96.13

49149-52	CDN（D-8004）		50mg	￥26,400

3-アミノ-1,2-プロパンジオール
3-Amino-1,2-propanediol

危険

$C_3H_9NO_2$...91.10 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [616-30-8] d1.17▲

01225-32	>98.0%	G	25mL	￥4,400
10442-1A	TFS（10442-0250）		25g	￥7,600
10442-2A	TFS（10442-0050）		5g	￥4,100
10442-3A	TFS（10442-1000）		100g	￥25,900

3-アミノ-1-プロパンスルホン酸
3-Amino-1-propanesulfonic acid

警告

$C_3H_9NO_3S$...139.17
CAS RN® [3687-18-1] mp>270℃▲

01604-32	>95.0%	G	25g	￥10,000
01604-52	>95.0%	G	5g	￥4,000
10443-1A	TFS（10443-0010）		1g	￥7,400

3-アミノプロパン-d_6-スルホン酸
3-Aminopropane-d_6-sulfonic acid

$H_2NCD_2CD_2CD_2SO_3H$...145.21
CAS RN® [1131576-06-1]

49120-79	CDN（D-5159）	98 atom% D	100mg	￥66,000

(±)-1-アミノ-2-プロパノール-1,1,2,3,3,3-d_6
(±)-1-Amino-2-propanol-1,1,2,3,3,3-d_6

$C_3H_3D_6NO$...81.14 ［劇］III［危］4-3-III
CAS RN® [1219795-13-7]

49136-28	CDN（D-6277）	98 atom% D	100mg	￥140,800

(*R*)-(-)-1-アミノ-2-プロパノール
(*R*)-(-)-1-Amino-2-propanol

$CH_3CH(OH)CH_2NH_2$...75.10 ［危］4-3-III
CAS RN® [2799-16-8] mp23℃～26℃▲ d0.95▲

21897-1A	TFS（21897-0010）		1g	￥3,900
21897-2A	TFS（21897-0050）		5g	￥13,400

(*R*)-(-)-2-アミノ-1-プロパノール
(*R*)-(-)-2-Amino-1-propanol

危険

$CH_3CH(NH_2)CH_2OH$...75.10 ［危］4-3-III
CAS RN® [35320-23-1] bp173℃～176℃† d0.965†

01820-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,000
01820-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,100
40044-1A	TFS（40044-0010）		1g	￥4,400

(*S*)-(+)-1-アミノ-2-プロパノール
(*S*)-(+)-1-Amino-2-propanol

$CH_3CH(OH)CH_2NH_2$...75.10 ［危］4-3-III
CAS RN® [2799-17-9] mp19℃～21℃▲ d0.95▲

21898-1A	TFS（21898-0010）		1g	￥7,700

(*S*)-(+)-2-アミノ-1-プロパノール
(*S*)-(+)-2-Amino-1-propanol

$CH_3CH(NH_2)CH_2OH$...75.10 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2749-11-3］ bp173℃～176℃†

10445-1A	TFS（10445-0100）	10g	￥22,600
10445-2A	TFS（10445-0010）	1g	￥3,900

1-アミノ-2-プロパノール
1-Amino-2-propanol

危険

$CH_3CH(OH)CH_2NH_2$...75.10 ［劇］III ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［78-96-6］ bp159.9℃† mp1.4℃† d(20/20℃) 0.962† Fp77.2℃†

01254-02	>90.0%(GC)		G	500g	￥3,200
01254-32	>90.0%(GC)		G	25g	￥1,400

3-アミノ-1-プロパノール
3-Amino-1-propanol

危険

$NH_2(CH_2)_3OH$...75.10 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［156-87-6］ bp188℃† mp10℃～12℃† d(20/20℃) 0.99† Fp101.5℃†

01255-00	>97.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥15,000
01255-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,100

3-アミノ-1-プロパノール
3-Amino-1-propanol

危険

$NH_2(CH_2)_3OH$...75.10 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［156-87-6］ bp187℃～188℃ mp10℃～12℃ d0.982 Fp101℃

10446-1A	TFS（10446-0025）	2.5L	￥28,500
10446-2A	TFS（10446-0050）	5mL	￥3,000
10446-3A	TFS（10446-5000）	500mL	￥8,200

3-アミノ-1-プロパノール-1,1,2,2,3,3-d_6
3-Amino-1-propanol-1,1,2,2,3,3-d_6

$C_3H_3D_6NO$...81.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［59720-07-9］

49149-53	CDN（D-8080）		50mg	￥47,300

D L-1-アミノ-2-プロパノール
DL-1-Amino-2-propanol

危険

$CH_3CH(OH)CH_2NH_2$...75.10 ［劇］III［危］4-3-III
CAS RN® ［78-96-6］ mp-2℃▲ d0.97▲

14965-2A	TFS（14965-0010）		1kg	￥6,100

S(+)-2-アミノ-1-プロパノール-3,3,3-d_3
S(+)-2-Amino-1-propanol-3,3,3-d_3

$CD_3CH(NH_2)CH_2OH$...78.12 ［危］4-3-III
CAS RN® ［352438-84-7］

49120-80	CDN（D-5164）	99 atom% D	100mg	￥74,800

3-アミノ-1-プロペン → アリルアミン

3-アミノ-1-プロペン塩酸塩 → アリルアミン塩酸塩(塩酸アリルアミン)

3-アミノプロピオンアミド-2,2,3,3-d_4塩酸塩
3-Aminopropionamide-2,2,3,3-d_4 hydrochloride

$H_2NCD_2CD_2CONH_2$･HCl...76.13

49145-40	CDN（D-7282）	98 atom% D	10mg	￥35,200

3-アミノプロピオニトリルフマル酸塩
3-Aminopropionitrile fumarate

$C_3H_6N_2 \cdot 0.5C_4H_4O_4$...128.12 ［劇］III
CAS RN® ［2079-89-2］ mp170℃～173℃▲

10447-1A	TFS（10447-0250）			25g	￥18,500
10447-2A	TFS（10447-0050）			5g	￥5,200
10447-3A	TFS（10447-1000）			100g	￥64,900

3-アミノプロピオノニトリル
3-Aminopropiononitrile (3=β)

危険

$H_2NCH_2CH_2CN$...70.09 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［151-18-8］ bp185℃† d0.951～0.956△

01688-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25mL	￥11,000

p-アミノプロピオフェノン
p-Aminopropiophenone

危険

$NH_2C_6H_4COCH_2CH_3$...149.18
CAS RN® ［70-69-9］ mp139℃～145℃△

01593-60	>96.0%(HLC)	鹿特級	G	1g	￥6,700

p-アミノプロピオフェノン
p-Aminopropiophenone

危険

$NH_2C_6H_4COCH_2CH_3$...149.18
CAS RN® ［70-69-9］ mp135℃～140℃

40104-1A	TFS（40104-0100）			10g	￥59,500

4-(3-アミノプロピル)-2,4-ジヒドロ-3*H*-ピラゾール-3-オン
4-(3-Aminopropyl)-2,4-dihydro-3*H*-pyrazol-3-one

$C_6H_{11}N_3O$...141.17
CAS RN® ［7032-17-9］ mp216℃▲

49242-05	TFS（CD02877DA）	90%		1g	￥43,900
49242-06	TFS（CD02877CB）	90%		250mg	￥28,500

3-アミノプロピルジメチルメトキシシラン
3-Aminopropyldimethylmethoxysilane

$C_6H_{17}NOSi$...147.29
CAS RN®［31024-26-7］ d0.87▲

33660-1A	TFS（33660-0010）		1g	￥36,200
33660-2A	TFS（33660-0050）		5g	￥99,800

N-(3-アミノプロピル)モルホリン
N-(3-Aminopropyl)morpholine

$C_7H_{16}N_2O$...144.21 ［危］4-3-S-III
CAS RN®［123-00-2］

02094-02	>95.0%(GC)	G	500g	￥17,000
02094-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥3,200

3-アミノプロピルホスホン酸
3-Aminopropylphosphonic acid

$C_3H_{10}NO_3P$...139.09
CAS RN®［13138-33-5］ mp290℃～294℃(dec.)▲

34494-1A	TFS（34494-0010）		1g	￥21,700

N-(3′-アミノプロピル)-2-ピロリジノン
N-(3′-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone

$C_7H_{14}N_2O$...142.19 ［危］4-3-III
CAS RN®［7663-77-6］bp120℃～123℃(1mm)▲ d1.014▲

15960-1A	TFS（15960-0050）		5g	￥8,200
15960-2A	TFS（15960-0500）		50g	￥54,400

3-アミノプロピルトリエトキシシラン
3-Aminopropyltriethoxysilane

$H_2N(CH_2)_3Si(OC_2H_5)_3$...221.36 ［危］4-3-S-III
CAS RN®［919-30-2］bp217℃▲ d0.942▲

15108-1A	TFS（15108-1000）		100g	￥9,400
15108-2A	TFS（15108-0050）		5g	￥7,500
15108-3A	TFS（15108-5000）		500g	￥32,800

3-アミノプロピルトリエトキシシラン, AcroSeal[R]
3-Aminopropyltriethoxysilane, AcroSeal[R]

$C_9H_{23}NO_3Si$...221.36 ［危］4-3-S-III
CAS RN[®]［919-30-2］bp217℃ mp70℃ d0.942 Fp96℃

43094-1A	TFS（43094-1000）		100mL	￥7,400
43094-2A	TFS（43094-8000）		800mL	￥39,000

3-アミノプロピルトリメトキシシラン
3-Aminopropyltrimethoxysilane

$C_6H_{17}NO_3Si$...179.28 ［危］4-3-III
CAS RN[®]［13822-56-5］bp194℃▲ d1.01▲

31325-1A	TFS（31325-1000）		100mL	￥7,300

2-アミノプリン
2-Aminopurine

$C_5H_5N_5$...135.12
CAS RN[®]［452-06-2］ mp280℃～284℃▲

27656-1A	TFS（27656-2500）		250mg	￥28,500

6-アミノプリン → アデニン

2-アミノ-6-プリンチオール → 6-チオグアニン

2-アミノ-6-プリンチオール
2-Amino-6-purinethiol

$C_5H_5N_5S$...167.19
CAS RN[®]［154-42-7］ mp>360℃▲

10448-1A	TFS（10448-0010）		1g	￥19,700

アミノピラリド標準品
Aminopyralid standard

$C_6H_4Cl_2N_2O_2$...207.01 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN[®]［150114-71-9］

49833-84	DES（C10218000）	食品分析用	100mg	￥30,000

アミノピラジン
Aminopyrazine

$C_4H_5N_3$...95.10 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［5049-61-6］ mp117℃～120℃▲

10449-1A	TFS（10449-0100）		10g	￥7,800

3-アミノピラジン-2-カルボン酸
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid

警告

$C_5H_5N_3O_2$...139.11
CAS RN® ［5424-01-1］ mp205℃(dec.)▲

10450-1A	TFS（10450-0050）		5g	￥5,800
10450-2A	TFS（10450-0250）		25g	￥21,900

3-アミノピラゾール
3-Aminopyrazole

$C_3H_5N_3$...83.09 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1820-80-0］ bp218℃(122mm)▲ mp37℃～39℃▲

01440-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥11,000
01440-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥8,000
17103-1A	TFS（17103-0025）		2.5g	￥8,200

3-アミノ-4-ピラゾールカルボニトリル
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile

$C_4H_4N_4$...108.10 ［劇］III
CAS RN® ［16617-46-2］ mp172℃～174℃▲

01439-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥4,500
01439-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥4,000
16685-1A	TFS（16685-0010）		1g	￥4,600
16685-2A	TFS（16685-0050）		5g	￥12,300

1-アミノピレン
1-Aminopyrene

$C_{16}H_{11}N$...217.26
CAS RN® ［1606-67-3］ mp114℃～118℃▲

10453-1A	TFS（10453-2500）		250mg	￥4,500

3-アミノピリダジン
3-Aminopyridazine

警告

$C_4H_5N_3$...95.10
CAS RN® [5469-70-5]

01581-52		>95.0%		5g	￥17,000
01581-62		>95.0%		1g	￥5,300

2-アミノピリジン
2-Aminopyridine (2=α)

危険

$NH_2C_5H_4N$...94.11 [労] 57,57-2
CAS RN® [504-29-0] bp210.6℃† mp58.1℃†

01256-00		>99.0%(GC)	鹿特級	500g	￥15,500
01256-30		>99.0%(GC)	鹿特級	25g	￥3,000
10454-1A	TFS（10454-1000）			100g	￥12,200
10454-2A	TFS（10454-5000）			500g	￥39,900

2-アミノピリジン-d_6
2-Aminopyridine-d_6

$D_2NC_5D_4N$...100.15 [労] 57,57-2
CAS RN® [203784-57-0]

49120-81	CDN（D-3508）	98 atom% D		500mg	￥44,000

3-アミノピリジン
3-Aminopyridine (3=β)

警告

$NH_2C_5H_4N$...94.11
CAS RN® [462-08-8] bp250℃～252℃† mp64℃†

01257-30		>98.0%(GC)	鹿特級	25g	￥6,000
10456-1A	TFS（10456-1000）			100g	￥7,800
10456-2A	TFS（10456-0250）			25g	￥3,800
10456-3A	TFS（10456-5000）			500g	￥30,600

3-アミノピリジン-d_6
3-Aminopyridine-d_6

$D_2NC_5D_4N$...100.15
CAS RN® [1219805-61-4]

49136-30	CDN（D-5702）	98 atom% D		500mg	￥34,100

4-アミノピリジン
4-Aminopyridine (4=γ)

危険

$NH_2C_5H_4N$...94.11
CAS RN® [504-24-5] bp273℃† mp158℃†

01258-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,600
01258-50	>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥2,600

4-アミノピリジン (4= γ)
4-Aminopyridine (4=γ)

危険

$NH_2C_5H_4N$...94.11
CAS RN® [504-24-5] bp273℃ mp157℃～161℃ Fp156℃

10457-1A	TFS（10457-0050）		5g	￥2,400
10457-2A	TFS（10457-0250）		25g	￥4,000
10457-3A	TFS（10457-1000）		100g	￥12,100

4-アミノピリジン標準品
4-Aminopyridine standard

$NH_2C_5H_4N$...94.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [504-24-5]

49830-88	DES（C10222000）	環境分析用	500mg	￥7,500

4-アミノピリジン-d_6
4-Aminopyridine-d_6

$D_2NC_5D_4N$...100.15
CAS RN® [45498-20-2]

49120-82	CDN（D-5114）	98 atom% D	100mg	￥79,200

2-アミノピリジン-5-ボロン酸ピナコールエステル
2-Aminopyridine-5-boronic acid, pinacol ester

$C_{11}H_{17}BN_2O_2$...220.07 ［PRTR］1-405
CAS RN®［827614-64-2］ mp132℃～135℃▲

49242-07	TFS（MAY00018DA）	97%	1g	￥22,200

2-アミノ-4-ピリジンカルボニトリル
2-Amino-4-pyridinecarbonitrile

$C_6H_5N_3$...119.12 ［劇］III
CAS RN®［42182-27-4］

02095-52		>97.0%(GC)	5g	￥34,000
02095-62		>97.0%(GC)	1g	￥9,500

4-アミノ-3-ピリジンカルボン酸
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid

警告

$C_6H_6N_2O_2$...138.12
CAS RN®［7418-65-7］

01565-52		>95.0%(HLC)	5g	￥19,500
01565-62		>95.0%(HLC)	1g	￥5,300
36113-1A	TFS（36113-0010）		1g	￥4,200

5-アミノピリジン-2-カルボン酸
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid

警告

$C_6H_6N_2O_2$...138.12
CAS RN®［24242-20-4］

01582-52		>95.0%(HLC)	5g	￥20,500
01582-62		>95.0%(HLC)	1g	￥5,100

6-アミノ-3-ピリジンカルボン酸 → 6-アミノニコチン酸

3-アミノ-2-ピリドン
3-Amino-2-pyridone

$C_5H_6N_2O$...110.11
CAS RN® [33630-99-8] mp118℃～130℃

36071-1A	TFS（36071-0010）			1g	￥18,600
36071-2A	TFS（36071-0050）			5g	￥51,300

(6-アミノ-3-ピリジニル)メタノール
(6-Amino-3-pyridinyl)methanol

$C_6H_8N_2O$...124.14
CAS RN® [113293-71-3] mp120℃▲

49242-09	TFS（MO07396DE）	97%		5g	☆
49242-10	TFS（MO07396DA）	97%		1g	￥32,600
49242-11	TFS（MO07396CB）	97%		250mg	￥16,500

3-アミノ-2-ピリドン
3-Amino-2-pyridone

$C_5H_6N_2O$...110.11
CAS RN® [33630-99-8]

01710-52	>93.0%		G	5g	￥17,500
01710-62	>93.0%		G	1g	￥6,400

2-アミノピリミジン
2-Aminopyrimidine

警告

$C_4H_5N_3$...95.10
CAS RN® [109-12-6] mp127℃～128℃†

01259-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥6,000

2-アミノピリジン
2-Aminopyrimidine

警告

$C_4H_5N_3$...95.10
CAS RN® [109-12-6] bp158℃ mp124℃～127℃ Fp103℃

10458-1A	TFS（10458-0050）			5g	￥2,600
10458-2A	TFS（10458-1000）			100g	￥5,000
10458-3A	TFS（10458-5000）			500g	￥21,300

4-アミノピリミジン
4-Aminopyrimidine

警告

$C_4H_5N_3$...95.10
CAS RN® [591-54-8] mp152℃～156℃▲

01476-52	>95.0%(HLC)		G	5g	￥25,500
01476-62	>95.0%(HLC)		G	1g	￥6,300
34507-1A TFS（34507-0010）				1g	￥19,000

2-アミノピリミジン-5-ボロン酸ピナコールエステル
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester

$C_{10}H_{16}BN_3O_2$...221.06 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [402960-38-7]

01778-55	>97.0%(GC)	Organics	G	5g	￥31,000
01778-65	>97.0%(GC)	Organics	G	1g	￥10,000

4-アミノキナルジン標準品
4-Aminoquinaldine standard

$C_{10}H_{10}N_2$...158.19 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6628-04-2]

49867-41 DES（C10225000）	環境分析用		100mg	￥12,000

3-アミノキノリン
3-Aminoquinoline

警告

$C_9H_8N_2$...144.17
CAS RN® [580-17-6] mp93℃†

01260-50	>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥10,500

6-アミノキノリン
6-Aminoquinoline

警告

$C_9H_8N_2$...144.17
CAS RN® [580-15-4]

01746-52	>97.0%(HLC)		G	5g	￥11,500
01746-62	>97.0%(HLC)		G	1g	￥4,700

8-アミノキノリン
8-Aminoquinoline

警告

$C_9H_8N_2$...144.17
CAS RN® [578-66-5] mp65℃†

01591-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥10,500
01591-50	>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥5,000
12371-2A	TFS（12371-0050）			5g	￥3,900
12371-3A	TFS（12371-0100）			10g	￥7,300

3-アミノキヌクリジン二塩酸塩
3-Aminoquinuclidine dihydrochloride

$C_7H_{14}N_2$･2HCl...199.11
CAS RN® [6530-09-2] mp321℃～323℃▲

14615-1A	TFS（14615-0050）			5g	￥12,100
14615-2A	TFS（14615-0250）			25g	￥39,100

3-アミノサリチル酸
3-Aminosalicylic acid

$NH_2C_6H_3(OH)COOH$...153.13
CAS RN® [570-23-0] mp240℃▲

22526-1A	TFS（22526-2500）			250mg	￥13,200

4-アミノサリチル酸
4-Aminosalicylic acid

警告

$NH_2C_6H_3(OH)COOH$...153.13
CAS RN® [65-49-6] mp150℃～151℃†

01261-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,700
10462-1A	TFS（10462-1000）				100g	￥6,200
10462-2A	TFS（10462-0050）				5g	￥2,800
10462-3A	TFS（10462-5000）				500g	￥20,900

5-アミノサリチル酸
5-Aminosalicylic acid

警告

$NH_2C_6H_3(OH)COOH$...153.13
CAS RN® [89-57-6] mp280℃(dec.)†

01262-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,000
13433-1A	TFS（13433-0250）		purified		25g	￥3,900
13433-2A	TFS（13433-0050）		purified		5g	￥2,700
13433-3A	TFS（13433-1000）		purified		100g	￥10,800

2-アミノテレフタル酸
2-Aminoterephthalic acid

$C_8H_7NO_4$...181.14
CAS RN® [10312-55-7] mp>260℃▲

27803-1A	TFS（27803-0250）	25g	￥10,400

3-アミノテトラヒドロチオフェン1,1-ジオキシド塩酸塩
3-Aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride

$C_4H_9NO_2S \cdot HCl$...171.64
CAS RN® [51642-03-6] mp208℃～209℃▲

49242-18	TFS（RJC02399DA）	1g	￥27,700
49242-19	TFS（RJC02399CB）	250mg	￥11,000

D L-2-アミノテトラリン-2-カルボン酸 *n*水和物
DL-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid *n*-hydrate

$C_{11}H_{13}NO_2 \cdot nH_2O$
mp303℃～313℃▲

34205-1A	TFS（34205-2500）	250mg	￥9,300

4-アミノ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-d_{17};^{15}N-1-オキシル
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d_{17};^{15}N-1-oxyl

$C_9H_2D_{17}N^{15}NO$...189.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［97461-87-5］

49120-84	CDN（M-2782）	50mg	￥132,000

4-アミノ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-d_{17}-2-オキシル
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d_{17}-1-oxyl

$C_9H_2D_{17}N_2O$...188.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［70588-04-4］

49120-83	CDN（D-2781）	10mg	￥35,200

4-アミノ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジノオキシ,フリーラジカル
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, free radical

$C_9H_{19}N_2O$...171.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［14691-88-4］

17273-1A	TFS（17273-0010）	1g	￥11,100
17273-2A	TFS（17273-0050）	5g	￥32,500
17273-3A	TFS（17273-2500）	250mg	￥4,500

3-アミノ-2,2,5,5-テトラメチル-1-ピロリジニルオキシ
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy

$C_8H_{17}N_2O$...157.23 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［34272-83-8］ mp45℃▲

40110-1A	TFS（40110-5000）	500mg	￥45,100

5-アミノ-1*H*-テトラゾール一水和物
5-Amino-1*H*-tetrazole monohydrate

警告

NHN:NN:$CNH_2 \cdot H_2O$...103.08 ［危］5-HY-1-I
CAS RN® ［4418-61-5］ mp200℃～204℃(dec.)†

01551-32	90.0%～103.0%(T)		G	25g	￥8,000

5-アミノ-1,3,4-チアジアゾール-2-チオール
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol

$C_2N_2S(NH_2)SH$...133.20
CAS RN® ［2349-67-9］

15597-1A	TFS（15597-0250）			25g	￥3,600
15597-2A	TFS（15597-0500）			50g	￥5,800
15597-3A	TFS（15597-2500）			250g	￥20,600

2-アミノチアゾール
2-Aminothiazole

警告

$C_3H_4N_2S$...100.14
CAS RN® ［96-50-4］ mp88℃～92℃△

01557-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,300
15389-1A	TFS（15389-5000）			500g	￥14,200
15389-3A	TFS（15389-1000）			100g	￥3,800

2-アミノ-2-チアゾリン
2-Amino-2-thiazoline

警告

$C_3H_4NSNH_2$...102.16
CAS RN® ［1779-81-3］ mp76℃～82℃△

01558-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥11,500

3-アミノチエノ[2,3-*b*]ピリジン-2-カルボン酸
3-Aminothieno[2,3-*b*]pyridine-2-carboxylic acid

$C_8H_6N_2O_2S$...194.21
CAS RN® [58327-75-6] mp202℃～204℃▲

49242-20	TFS（MO00759EA）	97%		10g	☆
49242-21	TFS（MO00759DA）	97%		1g	￥24,700

2-アミノチオフェン-3-カルボニトリル
2-Aminothiophene-3-carbonitrile

$C_5H_4N_2S$...124.16 ［劇］III
CAS RN® [4651-82-5] mp103℃～106℃▲

49242-22	TFS（GK01096EA）	97%		10g	￥21,100
49242-23	TFS（GK01096DA）	97%		1g	￥3,300

4-アミノチオフェノール
4-Aminothiophenol

C_6H_7NS...125.19
CAS RN® [1193-02-8] mp38℃～43℃▲

10468-1A	TFS（10468-0050）			5g	￥4,900
10468-2A	TFS（10468-0250）			25g	￥15,000

o-アミノチオフェノール
o-Aminothiophenol (*o*=2)

警告

$NH_2C_6H_4SH$...125.19 ［危］4-3-III ［変］
CAS RN® [137-07-5] bp234℃† mp23℃～26℃† d1.169～1.175△

01207-32		>95.0%(GC)	G	25mL	￥2,700
15390-1A	TFS（15390-5000）			500g	￥26,100
15390-3A	TFS（15390-1000）			100g	￥7,100

m-アミノトルエン → *m*-トルイジン

o-アミノトルエン → *o*-トルイジン

o-アミノトルエン標準品 → *o*-トルイジン標準品

p-アミノトルエン → *p*-トルイジン

α-アミノトルエン → ベンジルアミン

3-アミノ-*p*-トルイル酸 → 3-アミノ-4-メチル安息香酸

p-アミノ-*α*-トルイル酸 → *p*-アミノフェニル酢酸

3-アミノ-1,2,4-トリアジン
3-Amino-1,2,4-triazine

$C_3H_4N_4$...96.09
CAS RN® [1120-99-6] mp173℃～178℃▲

14623-1A	TFS（14623-0100）				10g	￥10,500

3-アミノ-1*H*-1,2,4-トリアゾール
3-Amino-1*H*-1,2,4-triazole

危険

$C_2H_4N_4$...84.08 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-4
CAS RN® [61-82-5] mpabt 150℃†

01263-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,900

3-アミノ-1*H*-1,2,4-トリアゾール
3-Amino-1*H*-1,2,4-triazole

危険

$C_2H_4N_4$...84.08 [労] 57,57-2 [PRTR] 2-4
CAS RN® [61-82-5] mp149℃～156℃

26457-1A	TFS（26457-0100）				10g	￥3,700
26457-2A	TFS（26457-1000）				100g	￥11,500

4-アミノ-4*H*-1,2,4-トリアゾール
4-Amino-4*H*-1,2,4-triazole

$C_2H_4N_4$...84.08
CAS RN® [584-13-4] mp84℃†

10470-1A	TFS（10470-0250）		25g	￥12,000

3-アミノ-1*H*-1,2,4-トリアゾール-5-チオール
3-Amino-1*H*-1,2,4-triazole-5-thiol

$C_2H_4N_4S$...116.14
CAS RN® [16691-43-3]

02066-32	>95.0%(T)	G	25g	￥12,000
02066-52	>95.0%(T)	G	5g	￥4,800

3-アミノ-1,2,4-トリアゾール-5-オン標準液
3-Amino-1,2,4-triazol-5-one standard solution

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［凍］ -20℃以下

100μg/mL アセトニトリル-メタノール (70:30)溶液

49879-19	ACC（M-8330-ADD-55）	爆発物試験用	1mL	￥35,000

4-アミノ-3-(トリフルオロメトキシ)安息香酸
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid

$C_8H_6F_3NO_3$...221.13
CAS RN® [175278-22-5] mp168℃～169℃▲

01825-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥10,000
01825-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,100
49242-26	TFS（TL00679EE）	95%	50g	￥98,700
49242-27	TFS（TL00679EA）	95%	10g	￥49,400
49242-28	TFS（TL00679DA）	95%	1g	￥6,900

2-アミノ-3-(トリフルオロメチル)安息香酸
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid

$C_8H_6F_3NO_2$...205.13
CAS RN® [313-12-2]

01366-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥18,000
01366-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,600

4-アミノ-2-(トリフルオロメチル)安息香酸
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid

$C_8H_6F_3NO_2$...205.13
CAS RN® [393-06-6]

01898-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥24,500
01898-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

2-アミノ-3-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile

$C_8H_5F_3N_2$...186.13 [劇] III
CAS RN® [58458-14-3]

01899-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥29,000
01899-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥10,000

2-アミノ-3-(トリフルオロメチル)ピリジン
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine

$C_6H_5F_3N_2$...162.11
CAS RN® [183610-70-0]

01813-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01813-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

2-アミノ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine

$C_6H_5F_3N_2$...162.11
CAS RN® [74784-70-6]

01527-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥12,500
01527-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥7,000

5-アミノ-2-(トリフルオロメチル)ピリジン
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine

$C_6H_5F_3N_2$...162.11
CAS RN® [106877-33-2]

01121-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥25,000
01121-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥7,500

(2*R*)-2-アミノ-*N*,3,3-トリメチル-*N*-(フェニルメチル)ブタンアミド
(2*R*)-2-Amino-*N*,3,3-trimethyl-*N*-(phenylmethyl)butanamide

$C_{14}H_{22}N_2O$...234.33

49214-75	ダイセル（135397-100MG）			100mg	￥25,400

(2*S*)-2-アミノ-*N*,3,3-トリメチル-*N*-(フェニルメチル)ブタンアミド
(2*S*)-2-Amino-*N*,3,3-trimethyl-*N*-(phenylmethyl)butanamide

$C_{14}H_{22}N_2O$...234.33
CAS RN® [947383-62-2]

49214-26	ダイセル（120322-100MG）			100mg	￥25,400

5-アミノ-2-[(トリメチルシリル)メチル]-2*H*-テトラゾール
5-Amino-2-[(trimethylsilyl)methyl]-2*H*-tetrazole

$C_5H_{13}N_5Si$...171.27

01251-55	>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥15,500
01251-65	>98.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥5,400

(*R*)-2-アミノ-1,1,2-トリフェニルエタノール
(*R*)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol

$C_{20}H_{19}NO$...289.36
CAS RN® [79868-79-4]

49212-14	ダイセル（110491-001G）			1g	￥19,400

(*S*)-2-アミノ-1,1,2-トリフェニルエタノール
(*S*)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol

$C_{20}H_{19}NO$...289.36
CAS RN® [129704-13-8]

49212-15	ダイセル（110492-001G）			1g	￥19,900

(*R*)-2-アミノ-1,1,3-トリフェニル-1-プロパノール
(*R*)-2-Amino-1,1,3-triphenyl-1-propanol

$C_{21}H_{21}NO$...303.39
CAS RN® [86906-05-0]

49212-16	ダイセル（110461-001G）			1g	￥18,400

(*S*)-2-アミノ-1,1,3-トリフェニル-1-プロパノール
(*S*)-2-Amino-1,1,3-triphenyl-1-propanol

$C_{21}H_{21}NO$...303.39
CAS RN® [79868-78-3]

49212-17	ダイセル（110462-001G）	1g	￥19,200

11-アミノウンデカン酸
11-Aminoundecanoic acid

$C_{11}H_{23}NO_2$...201.30
CAS RN® [2432-99-7] mp187℃～190℃▲

10471-1A	TFS（10471-0050）	5g	￥5,600
10471-2A	TFS（10471-1000）	100g	￥6,600
10471-3A	TFS（10471-2500）	250g	￥14,400

5-アミノウラシル
5-Aminouracil

$C_4H_5N_3O_2$...127.10
CAS RN® [932-52-5] mp>300℃▲

22682-1A	TFS（22682-0250）	25g	￥15,300
22682-2A	TFS（22682-0025）	2.5g	￥5,100

アミノ尿素塩酸塩 → セミカルバジド塩酸塩(塩酸セミカルバジド)

5-アミノ吉草酸
5-Aminovaleric acid

$H_2N(CH_2)_4CO_2H$...117.14
CAS RN® [660-88-8] mp158℃～161℃▲

15391-1A	TFS（15391-0050）	5g	￥5,600
15391-2A	TFS（15391-0250）	25g	￥19,000

4-アミノベラトロール
4-Aminoveratrole

$C_8H_{11}NO_2$...153.17 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [6315-89-5] mp86℃～88℃▲

10472-1A	TFS（10472-0100）	10g	￥6,100
10472-2A	TFS（10472-0250）	25g	￥13,300

アミスルブロム標準品
Amisulbrom standard

警告

$C_{13}H_{13}BrFN_5O_4S_2$...466.31 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［348635-87-0］

01350-96	>98.0%(HLC)	残留農薬試験用		100mg	￥25,000

アミトラズ標準品
Amitraz standard

警告

$C_{19}H_{23}N_3$...293.40 ［PRTR］1-432 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［33089-61-1］

49801-02	DES（C10230000）		残留農薬試験用	250mg	￥14,000

アミトリプチリン-d_3塩酸塩(*N*-メチル-d_3)
Amitriptyline-d_3 hydrochloride (*N*-methyl-d_3)

$C_{20}H_{20}D_3N$･HCl...316.88
CAS RN® ［342611-00-1］

49120-85	CDN（D-1830）	98 atom% D		50mg	￥83,600

アミトリプチリン-d_6塩酸塩(*N*, *N*-ジメチル-d_6)
Amitriptyline-d_6 hydrochloride (*N*,*N*-dimethyl-d_6)

$C_{20}H_{17}D_6N$･HCl...319.89
CAS RN® ［203645-63-0］

49120-86	CDN（D-3577）	99 atom% D		50mg	￥79,200

アミトロール標準品
Amitrole standard

$C_2H_4N_4$...84.08 ［労］57,57-2［PRTR］2-4 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［61-82-5］

49801-03	DES（C10240000）		残留農薬試験用	250mg	￥15,000

アンメリド標準品
Ammelide standard

$C_3H_4N_4O_2$...128.09 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［645-93-2］

49834-15	DES（C10241000）	残留農薬試験用		100mg	￥35,000

アンメリン標準品 → アトラジン-デスエチル-デスイソプロピル-2-ヒドロキシ標準品

アンモニア水
Ammonia solution

危険

NH_3...17.03 ［劇］III ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［1336-21-6］

01266-00		28.0%～30.0%(as NH_3)(T)	特級	P	500mL	￥950
01266-86		28.0%～30.0%(as NH_3)(T)	特級	P	5L	￥5,800
01266-80		28.0%～30.0%(as NH_3)(T)	特級	P	18kg	☆
01266-02			特級(医薬品試験用)	P	500mL	￥1,800
01266-01		28.0%～30.0%(as NH_3)(T)	鹿1級	P	500mL	￥800
01266-88		28.0%～30.0%(as NH_3)(T)	鹿1級	P	5L	￥5,000
01266-81		28.0%～30.0%(as NH_3)(T)	鹿1級	P	18kg	☆
01132-08		28.0%～30.0%(as NH3)(T)	RoHS2対応用	P	500mL	￥2,000
01266-3B		28.0%～30.0%(as NH_3)(T)	Ultrapur™	T	250mL	￥19,000
01266-09		25.0%～27.9%(as NH_3)(T)	金属分析用	P	500mL	￥3,500
5428-1M	M（1.05428.0250）	>25.0%(as NH_3)(T)	Suprapur®		250mL	￥14,000
5423-1M	M（1.05423.1000）	28.0%～30.0%(as NH_3)(T)	EMSURE®		1L	￥4,780

0.1mol/Lアンモニア水(*N*/10)
0.1mol/L Ammonia solution (*N*/10)

警告

NH_3...17.03 ［労］57,57-2
CAS RN® ［1336-21-6］

01794-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥2,400

1mol/Lアンモニア水(1 *N*)
1mol/L Ammonia solution (1*N*)

危険

NH_3...17.03 ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［1336-21-6］

01793-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥2,500
01793-89	容量分析用滴定液		5L	￥11,000

アンモニア溶液(メタノール性)
Ammonia solution in methanol

危険

NH_3...17.03 ［劇］III［危］4-AL-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7664-41-7］ d0.77▲

abt 7mol/L

13371-1A	TFS（13371-0250）	25mL	￥7,800
13371-2A	TFS（13371-0010）	1L	￥60,500
13371-3A	TFS（13371-0025）	2.5L	￥128,100

アンモニア性塩化アンモニウム緩衝液
Ammoniacal ammonium chloride buffer solution

危険

［劇］III ［労］特-3,57,57-2

70g/L ammonium chloride 57% ammonia water

01814-08		P	500mL	￥5,500

アンモニウムみょうばん → 硫酸アンモニウムアルミニウム・12水(アンモニウムみょうばん)

アミド硫酸アンモニウム
Ammonium amidosulfate

警告

$NH_4OSO_2NH_2$...114.12 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7773-06-0］ mp131℃†

01320-00	>98.5%(T)	特級	P	500g	￥5,400
01320-20	>98.5%(T)	特級	G	100g	￥2,300
01320-30	>98.5%(T)	特級	G	25g	￥1,700
01320-80	>98.5%(T)	特級		20kg	☆
01320-01	>97.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥4,100

アウリントリカルボン酸アンモニウム → アルミノン

安息香酸アンモニウム
Ammonium benzoate

警告

$C_6H_5COONH_4$...139.15
CAS RN® ［1863-63-4］ mp197℃～198℃(dec.)†

01273-00	95.0%～103.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥16,500
01273-30	95.0%～103.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,600
01273-01	95.0%～103.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥10,500

亜硫酸水素アンモニウム溶液
Ammonium hydrogen sulfite solution

危険

NH_4HSO_3...99.11
CAS RN® ［10192-30-0］

in water

01280-01	50.0%～55.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥15,000

アンモニウムイオン標準液
Ammonium ion standard solution

CAS RN®［12125-02-9］

NH_4Cl水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

01852-23	NH_4^+:1000mg/L	JCSS化学分析用(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用)	P	100mL	￥6,200

アンモニア性窒素標準液(NH_4-N 1000)
Ammonium-nitrogen standard solution (NH_4-N 1000)

CAS RN®［12125-02-9］

NH_4Cl水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

01802-96	NH_4-N:1000mg/L	JCSS化学分析用(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用)	P	100mL	￥7,500

アンモニウムライネッケ塩一水和物 → ライネッケ塩一水和物

亜硫酸アンモニウム一水和物
Ammonium sulfite monohydrate

警告

$(NH_4)_2SO_3 \cdot H_2O$...134.15
CAS RN®［10196-04-0］

01325-01	>90.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥11,000

亜硫酸アンモニウム溶液
Ammonium sulfite solution

$(NH_4)_2SO_3 \cdot H_2O$...134.15
CAS RN®［10196-04-0］

01326-01	48.0%～52.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥11,500

アモキシシリン標準品
Amoxicillin standard

$C_{16}H_{19}N_3O_5S$...365.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［26787-78-0］

01927-96	>98.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥10,000

アムホテリシンB (250 μg/mL)
Amphotericin B (250 μg/mL)

［凍］ -15℃以下

49433-02	BIOCO（4-05F00-H）			100mL	￥15,000

アンピシリン三水和物標準品
Ampicillin trihydrate standard

$C_{16}H_{19}N_3O_4S \cdot 3H_2O$...403.45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［7177-48-2］

49828-93	DES（C10243080）		食品分析用	100mg	￥13,000

アンプロリウム塩酸塩標準品
Amprolium hydrochloride standard

$C_{14}H_{19}ClN_4 \cdot HCl$...315.23 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［137-88-2］

01692-96	>98.5%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥8,000

アミグダリン
Amygdalin

$C_{20}H_{27}NO_{11} \cdot nH_2O$ ［劇］III
CAS RN®［29883-15-6］ mp223℃～226℃†

10473-1A	TFS（10473-0050）			5g	￥15,600
49870-49	PHY（89559）		天然物化学研究用	100mg	￥40,000

アミルアルコール → *n*-ペンチルアルコール

t e r t-アミルアルコール → *t e r t*-ペンチルアルコール

n-アミルアミン → *n*-ペンチルアミン

安息香酸 *n*-アミル → 安息香酸 *n*-ペンチル

n-アミルクロリド → 1-クロロペンタン

α-アミルシンナマール標準品
α-Amylcinnamal standard

$C_{14}H_{18}O$...202.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［122-40-7］ bp287℃～290℃▲ Fp113℃▲

49866-57	DES（C10246000）	環境分析用	250mg	￥18,000

α-アミルシンナムアルデヒド標準品 → α-アミルシンナマール標準品

α-アミルシンナミルアルコール標準品
α-Amylcinnamyl alcohol standard

$C_{14}H_{20}O$...204.30 ［危］ 4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［101-85-9］ bp141℃～143℃▲

49866-61	DES（C10246200）	環境分析用	100mg	￥14,000

アミレン → ペンテン

n-アミルメルカプタン → 1-ペンタンチオール

n-アミルメチルケトン → 2-ヘプタノン

アミロデキストリン → でんぷん(溶性)

アミロース,とうもろこしでんぷん製
Amylose

CAS RN® ［9005-82-7］

from corn starch

01700-60	鹿特級	G	1g	￥9,500

アミロース・マグネティック・ビーズ
Amylose Magnetic Beads

［冷］ 0℃～6℃

10mg/mL

49884-30	NEB（E8035S）		25mg	￥41,400

アミロースレジン
Amylose Resin

［冷］ 0℃～6℃

49884-19	NEB（E8021S）		15mL	￥34,600
49884-20	NEB（E8021L）		100mL	￥176,400

アミロースレジン(HPLC用)
Amylose Resin High Flow

［冷］ 0℃～6℃

49884-21	NEB（E8022S）		15mL	￥45,200
49884-22	NEB（E8022L）		100mL	￥252,100

4-ｔｅｒｔ-アミルフェノール
4-*tert*-Amylphenol

$C_2H_5C(CH_3)_2C_6H_4OH$...164.24
CAS RN® ［80-46-6］ bp255℃▲ mp91℃～94℃▲

16733-1A	TFS（16733-0050）		5g	￥2,900
16733-2A	TFS（16733-1000）		100g	￥3,100
16733-3A	TFS（16733-2500）		250g	￥6,300
16733-4A	TFS（16733-5000）		500g	￥11,100

α-アミリン
α-Amyrin

$C_{30}H_{50}O$...426.71
CAS RN® ［638-95-9］

49871-62	PHY（80705）	天然物化学研究用	10mg	￥37,500

β-アミリン
β-Amyrin

$C_{30}H_{50}O$...426.71
CAS RN®［559-70-6］

49868-95	PHY（80292）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アナリスライド^{R} ペトリディシュ
Analyslide^{R} Petri Dish

97002-24	PALL（7231）	微生物検査用	1pack(100個)	￥14,400

アナトキシン-a標準液
Anatoxin-a standard solution

$C_{10}H_{15}NO$...165.23 ［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［64285-06-9］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。メタノール/水(9:91,v/v)混合溶液(0.01%酢酸添加)

49915-21	NRC（NRC-CRM-ATX）		0.5mL	☆

プルフード用アンカープレート
ANCHOR PLATE FOR PULL HOOD

49785-50	興研（900494）		1ｾｯﾄ	☆

アンドログラパニン
Andrograpanin

$C_{20}H_{30}O_{3}$...318.44
CAS RN®［82209-74-3］

49060-30	PHY（89560）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

アンドログラホリド
Andrographolide

$C_{20}H_{30}O_{5}$...350.44
CAS RN®［5508-58-7］

49060-31	PHY（89561）	天然物化学研究用	20mg	￥55,000

アンドロシン
Androsin

$C_{15}H_{20}O_8$...328.31
CAS RN® [531-28-2]

49870-50	PHY（83477）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

1,4-アンドロスタジエン-3,17-ジオン-6-メチレン-16,16-d_2
1,4-Androstadien-3,17-dione-6-methylene-16,16-d_2

49145-44	CDN（D-7050）	98 atom% D	10mg	￥83,600

5β-アンドロスタン-3α,17β-ジオール-16,16,17-d_3
5β-Androstan-3α,17β-diol-16,16,17-d_3

49145-49	CDN（D-7007）	98 atom% D	10mg	￥39,600

5β-アンドロスタン-3α-オール-11,17-ジオン-9,12,12,16,16-d_5
5β-Androstan-3α-ol-11,17-dione-9,12,12,16,16-d_5

49145-50	CDN（D-5626）	91 atom% D	5mg	￥127,600

5β-アンドロスタン-3α-オール-17-オン-16,16-d_2
5β-Androstan-3α-ol-17-one-16,16-d_2

49145-51	CDN（D-5627）	98 atom% D	10mg	￥66,000

アンドロステンジオン
Androstenedione

$C_{19}H_{26}O_2$...286.40
CAS RN® [63-05-8]

49060-32	PHY（89562）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

4-アンドロステン-11β-オール-3,17-ジオン-2,2,4,6,6,16,16-d_7
4-Androsten-11β-ol-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d_7

49145-45	CDN（D-6128）	98 atom% D	10mg	￥132,000

4-アンドロステン-17α-オール-3-オン-2,2,4,6,6-d_5
4-Androsten-17α-ol-3-one-2,2,4,6,6-d_5

CAS RN®［165195-35-7］

49145-46	CDN（D-6535）	98 atom% D	10mg	￥61,600

アンドロステロン
Androsterone

$C_{19}H_{30}O_2$...290.43
CAS RN®［53-41-8］ mp180℃～185℃▲

20419-1A	TFS（20419-0050）		5g	￥73,600
20419-2A	TFS（20419-0010）		1g	￥18,300

アネモニン
Anemonin

$C_{10}H_8O_4$...192.16 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［508-44-1］

49060-33	PHY（80346）	天然物化学研究用	10mg	￥71,000

アネモサポゲニン
Anemosapogenin

$C_{30}H_{48}O_4$...472.69 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85999-40-2］

49868-97	PHY（83307）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

アネトール
Anethole

警告

$CH_3CH{:}CHC_6H_4OCH_3$...148.20 ［危］4-3-III
CAS RN®［104-46-1］ bp231℃～237℃† mp21℃～22℃† d(20/4℃) 0.9883† Fp92℃†

01383-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥4,200

ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-アネトール
trans-Anethole

$CH_3CH:CHC_6H_4OCH_3$...148.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［4180-23-8］ bp234℃～237℃† mp23℃† d0.988†

15253-1A	TFS（15253-1000）		100mL	￥22,700
15253-2A	TFS（15253-0050）		5mL	￥3,600
15253-3A	TFS（15253-5000）		500mL	￥65,600
49870-51	PHY（89158）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

アンゲリシン
Angelicin

$C_{11}H_6O_3$...186.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［523-50-2］

49060-34	PHY（89874）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アンゴロシドC
Angoroside C

$C_{36}H_{48}O_{19}$...784.75 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［115909-22-3］

49871-63	PHY（80358）	天然物化学研究用	10mg	￥49,000

1,6-アンヒドロ-β-*D*-グルコピラノース
1,6-Anhydro-β-*D*-glucopyranose

$C_6H_{10}O_5$...162.14
CAS RN® ［498-07-7］ mp170℃～180℃▲

27095-1A	TFS（27095-0010）		1g	￥7,000

アンヒドロン → 過塩素酸マグネシウム

アンヒドロテトラサイクリン塩酸塩
Anhydrotetracycline hydrochloride

$C_{22}H_{22}N_2O_7$･HCl...462.87
CAS RN® ［13803-65-1］ mp223℃(dec.)▲

23313-1A	TFS（23313-1000）		100mg	￥54,500
23313-2A	TFS（23313-5000）		500mg	￥193,400

アニラジン標準品
Anilazine standard

$C_9H_5Cl_3N_4$...275.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［101-05-3］ mp159℃～160℃▲ d1.7▲

49865-18	DES（C10260000）	残留農薬試験用	250mg	￥16,000

アニラジン-d_4
Anilazine-d_4

$C_9HCl_3D_4N_4$...279.54
CAS RN® ［1219802-20-6］

49145-52	CDN（D-6807）	99 atom% D	10mg	￥88,000

アニリン
Aniline

危険

$C_6H_5NH_2$...93.12 ［劇］II ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-18
CAS RN® ［62-53-3］ bp184.7℃† mp-6℃† d(20/20℃) 1.022† Fp70℃†

01384-00	>99.0%(T)	特級	G	500mL	￥2,600
01384-01	>99.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥2,100

アニリン
Aniline

危険

$C_6H_5NH_2$...93.12 ［劇］II ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-18
CAS RN® ［62-53-3］ bp181℃～185℃ mp6.2℃ d1.0213 Fp76℃

22173-1A	TFS（22173-0010）		1L	￥7,100
22173-2A	TFS（22173-0025）		2.5L	￥14,900
22173-3A	TFS（22173-2500）		250mL	￥3,400

アニリン標準品
Aniline standard

危険

$C_6H_5NH_2$...93.12 ［劇］II ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-18 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［62-53-3］ bp184.7℃▲ mp-6℃▲ d(20/20℃) 1.022▲ Fp70℃▲

49863-20	DES（CA10262500）	環境分析用	1mL	￥13,000

アニリン標準液
Aniline standard solution

C_6H_7N...93.12 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［62-53-3］bp81℃(dec.)▲ mp6.4℃(dec.)▲ Fp-18℃(dec.)▲

100mg/L シクロヘキサン溶液

49865-00	DES（XA10262500CY）	環境分析用	1mL	￥13,000

アニリン-2,3,4,5,6-d_5
Aniline-2,3,4,5,6-d_5

$C_6D_5NH_2$...98.15 ［劇］II［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-18
CAS RN® ［4165-61-1］

49136-32	CDN（D-2039）	98 atom% D	5g	￥44,000

アニリン-d_5標準液
Aniline-d_5 standard solution

$C_6H_2D_5N$...98.15 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［4165-61-1］bp55℃(dec.)▲ mp-108.6℃(dec.)▲ Fp-30℃(dec.)▲

2000mg/L *tert*-ブチルメチルエーテル溶液

49865-02	DES（YA10262600MB）	環境分析用	1.1mL	￥12,000

アニリン-d_7
Aniline-d_7

C_6D_7N...100.16 ［劇］II［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-18
CAS RN® ［14545-23-4］

49136-33	CDN（D-291）	98 atom% D	1g	￥17,600

アニリン-*N*,*N*-d_2
Aniline-*N*,*N*-d_2

$C_6H_5ND_2$...95.13 ［劇］II［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-18
CAS RN® ［1122-59-4］

49121-09	CDN（D-131）	99 atom% D	1g	￥45,100

アニリンブルー
Aniline blue

$C_{32}H_{25}N_3O_9S_3Na_2$...737.73
CAS RN® [28631-66-5]

high purity biological stain

22966-1A	TFS（22966-0250）			25g	￥9,000
22966-2A	TFS（22966-1000）			100g	￥24,900

アニリンブルー(アルコール溶性)
Aniline blue, spirit soluble

$C_{32}H_{25}N_3Na_2O_9S_3$...737.73

31033-32			G	25g	￥8,500

アニリンブルー(水溶性)
Aniline blue, water soluble

$C_{32}H_{25}N_3Na_2O_9S_3$...737.73
CAS RN® [28631-66-5]

07448-32			G	25g	￥4,600

アニリン臭化水素酸塩
Aniline hydrobromide

$C_6H_5NH_2$･HBr...174.03 [劇] III
CAS RN® [542-11-0] mp286℃▲

49007-04	昭化（0010-0150）	98%		500g	￥135,400
49007-05	昭化（0010-0282）	98%		15kg	☆

アニリン塩酸塩(塩酸アニリン)
Aniline hydrochloride

危険

$C_6H_5NH_2$･HCl...129.58 [劇] III
CAS RN® [142-04-1] mp198℃†

01389-11		>97.5%(T)	鹿1級	G	250g	￥8,000

アニリン塩酸塩(塩酸アニリン)
Aniline hydrochloride

警告

$C_6H_5NH_2$･HCl...129.58 ［劇］III
CAS RN® ［142-04-1］ bp245℃ mp196℃～199℃ Fp193℃

15841-2A	TFS（15841-1000）	100g	￥3,700
15841-3A	TFS（15841-5000）	500g	￥9,800

アニリン塩酸塩(塩酸アニリン)
Aniline hydrochloride

$C_6H_5NH_2$･HCl...129.58 ［劇］III
CAS RN® ［142-04-1］

49009-37	昭化（0150-4350）	500g	￥30,000
49009-38	昭化（0010-0180）	15kg	☆

アニリン/1,4-フェニレンジアミン混合標準液
Aniline/1,4-Phenylenediamine standard solution

危険

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2 ［凍］ -20℃以下

各100mg/L アセトニトリル溶液.アニリン,1,4-フェニレンジアミン.

01889-96		環境分析用		2mL×5	￥9,000

アニリン硫酸塩(硫酸アニリン)
Aniline sulfate

危険

$(C_6H_5NH_2)_2$･H_2SO_4...284.33 ［劇］III
CAS RN® ［542-16-5］ mp198℃ †

01394-11	>97.5%(T)	鹿1級		250g	￥14,500

アニリン-*m*-スルホン酸 → *m*-アミノベンゼンスルホン酸

アニリン-*o*-スルホン酸 → *o*-アミノベンゼンスルホン酸

アニリノ酢酸 → *N*-フェニルグリシン

2-アニリノジエタノール → 2,2′-(フェニルイミノ)ジエタノール

2-アニリノエタノール
2-Anilinoethanol (2=β)

危険

$C_6H_5NHCH_2CH_2OH$...137.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［122-98-5］ d1.094～1.099△

01395-31	>98.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥1,300

8-アニリノ-1-ナフタレンスルホン酸 → *N*-フェニル-1-ナフチルアミン-8-スルホン酸

4-アニリノフェノール
4-Anilinophenol

危険

$C_6H_5NHC_6H_4OH$...185.22
CAS RN® ［122-37-2］ mp73℃†

18353-32	>85.0%(T)		G	25g	￥5,000

p-(*p*-アニリノフェニルアゾ)ベンゼンスルホン酸ナトリウム → トロペオリンOO

2-アニリノピリミジン-5-カルバルデヒド
2-Anilinopyrimidine-5-carbaldehyde

$C_{11}H_9N_3O$...199.20
CAS RN® ［1080028-75-6］ mp183.5℃～186℃▲

49242-33	TFS（CC69204DA）	97%	1g	￥36,500
49242-34	TFS（CC69204CB）	97%	250mg	￥10,700

2-アニリノピリミジン-5-カルボン酸
2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid

$C_{11}H_9N_3O_2$...215.20
CAS RN® [450368-25-9] mp275.5℃～280℃▲

49242-35	TFS（CC69201DA）	97%		1g	￥27,400
49242-36	TFS（CC69201CB）	97%		250mg	￥20,600

アニロホス標準品
Anilofos standard

$C_{13}H_{19}ClNO_3PS_2$...367.85 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [64249-01-0]

49826-71	DES（CA10264000）	残留農薬試験用		100mg	￥14,000

アニロホス標準液
Anilofos standard solution

$C_{13}H_{19}ClNO_3PS_2$...367.85 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [64249-01-0]

10mg/L イソオクタン溶液

49864-42	DES（L10264000IO）	残留農薬試験用		10mL	￥16,000

m-アニスアルデヒド
m-Anisaldehyde

$C_8H_8O_2$...136.14 ［危］4-3-III
CAS RN® [591-31-1] d1.119▲

15676-1A	TFS（15676-0250）			25mL	￥5,000
15676-2A	TFS（15676-1000）			100mL	￥14,800

o-アニスアルデヒド
o-Anisaldehyde

警告

$CH_3OC_6H_4CHO$...136.14
CAS RN® [135-02-4] bp238℃† mp38℃～39℃† d(20/20℃) 1.13▲

01397-30		>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥4,000
14922-1A	TFS（14922-5000）				500g	￥24,000
14922-2A	TFS（14922-0050）				5g	￥5,100
14922-3A	TFS（14922-1000）				100g	￥6,500

p-アニスアルデヒド
p-Anisaldehyde

警告

$CH_3OC_6H_4CHO$...136.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［123-11-5］ bp248℃† mp0℃† d(20/4℃) 1.123† Fp117.8℃†

01398-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥8,500
01398-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,900

p-アニスアルデヒド
p-Anisaldehyde

警告

$CH_3OC_6H_4CHO$...136.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［123-11-5］ bp248℃～249℃ mp1℃ d1.121 Fp116℃

10480-1A	TFS（10480-0050）			5mL	￥4,300
10480-2A	TFS（10480-1000）			100mL	￥6,100
10480-3A	TFS（10480-5000）			500mL	￥12,000

アニサチン
Anisatin

$C_{15}H_{20}O_8$...328.31 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［5230-87-5］

49060-36	PHY（89345）	天然物化学研究用		5mg	￥60,000

p-アニスアルコール → *p*-アニシルアルコール

m-アニス酸
m-Anisic acid

警告

$CH_3OC_6H_4COOH$...152.14
CAS RN® ［586-38-9］ mp103℃～108℃†

25241-32	>95.0%(HLC)		G	25g	￥3,600
25241-02	>95.0%(HLC)		G	500g	￥15,500
15247-1A	TFS（15247-1000）			100g	￥16,500
15247-2A	TFS（15247-0250）			25g	￥4,900

o-アニス酸
o-Anisic acid

警告

$CH_3OC_6H_4COOH$...152.14
CAS RN® [579-75-9] mp101℃～105℃△

01400-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,300

p-アニス酸
p-Anisic acid

警告

$CH_3OC_6H_4COOH$...152.14
CAS RN® [100-09-4] mp184℃†

01401-10	>99.0%(T)	鹿特級	G	250g	￥2,600
01401-30	>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,600

p-アニス酸
p-Anisic acid

警告

$CH_3OC_6H_4COOH$...152.14
CAS RN® [100-09-4] bp275℃ mp181℃～186℃ Fp185℃

15237-1A	TFS（15237-0010）		1kg	￥20,400
15237-3A	TFS（15237-1000）		100g	￥3,700
15237-4A	TFS（15237-2500）		250g	￥6,400

p-アニス酸-2,3,5,6-d_4
p-Anisic-2,3,5,6-d_4 acid

$CH_3OC_6D_4COOH$...156.17
CAS RN® [152404-46-1]

49145-53	CDN（D-6232）	98 atom% D	250mg	￥61,600

2-アニシジン標準品
2-Anisidine standard

$CH_3OC_6H_4NH_2$...123.15 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-17 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［90-04-0］ bp225℃▲ mp5℃▲ d1.091～1.096▲

49863-43	DES（C10266000）	環境分析用		250mg	￥12,000

3-アニシジン(3-メトキシアニリン)標準品
3-Anisidine(3-Methoxyaniline) standard

警告

C_7H_9NO...123.15 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［536-90-3］ bp251℃(dec.)▲ mp-1℃(dec.)▲ Fp126℃(dec.)▲

49865-03	DES（C10266010）	環境分析用		250mg	￥12,000

4-アニシジン(4-メトキシアニリン)標準品
4-Anisidine(4-Methoxyaniline) standard

C_7H_9NO...123.15 ［労］57,57-2 ［PRTR］2-2 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［104-94-9］ bp243℃(dec.)▲ mp57℃(dec.)▲ Fp122℃(dec.)▲

49865-04	DES（C10266020）	環境分析用		250mg	￥12,000

m-アニシジン
m-Anisidine

警告

$CH_3OC_6H_4NH_2$...123.15 ［危］4-3-III
CAS RN® ［536-90-3］ bp251℃† mp-2℃～0℃† d1.100～1.105△ Fp126℃†

01403-31		>97.0%(GC)	鹿1級	25g	￥5,200
10482-1A	TFS（10482-0050）			5mL	￥4,100
10482-2A	TFS（10482-1000）			100mL	￥9,600
10482-3A	TFS（10482-2500）			250mL	￥17,700

m-アニシジン標準品 → 3-アニシジン(3-メトキシアニリン)標準品

o-アニシジン
o-Anisidine

警告

$CH_3OC_6H_4NH_2$...123.15 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-17 ［変］
CAS RN® ［90-04-0］ bp225℃† mp5℃† d1.091～1.096△

01402-01	>97.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥10,500
01402-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25mL	￥2,100

o-アニシジン
o-Anisidine

警告

$CH_3OC_6H_4NH_2$...123.15 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-17 ［変］
CAS RN® ［90-04-0］ bp225℃ mp3℃～6℃ d1.092 Fp100℃

10481-1A	TFS（10481-0010）			1L	￥19,300
10481-2A	TFS（10481-0050）			5mL	￥3,300
10481-3A	TFS（10481-2500）			250mL	￥5,800

o-アニシジン標準品 → 2-アニシジン標準品

p-アニシジン
p-Anisidine

危険

$CH_3OC_6H_4NH_2$...123.15 ［労］57,57-2 ［PRTR］2-2
CAS RN® ［104-94-9］ bp246℃† mp57℃†

01404-01	>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥4,100
01404-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,200
10483-1A	TFS（10483-2500）			250g	￥5,500
10483-2A	TFS（10483-0010）			1kg	￥15,500
10483-3A	TFS（10483-0050）			5g	￥3,900

p-アニシジン標準品 → 4-アニシジン(4-メトキシアニリン)標準品

アニソダミン臭化水素酸塩
Anisodamine hydrobromide

$C_{17}H_{23}NO_4$･HBr...386.28
CAS RN®［55449-49-5］

49060-37	PHY（89563）		天然物化学研究用	10mg	￥65,000

アニソジン臭化水素酸塩
Anisodine hydrobromide

$C_{17}H_{21}NO_5$･HBr...400.26
CAS RN®［76822-34-9］

49060-38	PHY（89564）		天然物化学研究用	10mg	￥65,000

p-アニソイン
p-Anisoin

$(CH_3O)C_6H_4CH(OH)COC_6H_4(OCH_3)$...272.29
CAS RN®［119-52-8］ mp112℃～117℃△

01719-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,000

アニソール
Anisole

警告

$CH_3OC_6H_5$...108.13 ［危］4-2-III
CAS RN®［100-66-3］bp153.8℃† mp-37℃† d(18/4℃) 0.996† Fp51.7℃†

01408-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥3,800
01408-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,600

アニソール
Anisole

危険

$CH_3OC_6H_5$...108.13 ［危］4-2-III
CAS RN®［100-66-3］bp154℃ mp37℃ d0.99 Fp43℃

15392-1A	TFS（15392-0010）		1L	￥14,700
15392-2A	TFS（15392-0050）		5mL	￥3,200
15392-3A	TFS（15392-2500）		250mL	￥9,400

アニソール-2,3,4,5,6-d_5
Anisole-2,3,4,5,6-d_5

$C_6D_5OCH_3$...113.16 ［危］4-2-III
CAS RN® ［50629-14-6］

49121-13	CDN（D-1039）	98 atom% D	1g	￥36,300

アニソール-2,4,6-d_3
Anisole-2,4,6-d_3

$C_6H_2D_3OCH_3$...111.15 ［危］4-2-III
CAS RN® ［2567-25-1］

49121-12	CDN（D-1199）	98 atom% D	1g	￥63,800

アニソール-d_3(メチル-d_3)
Anisole-d_3 (methyl-d_3)

$C_7H_5D_3O$...111.15 ［危］4-2-III
CAS RN® ［4019-63-0］

49136-34	CDN（D-2219）	99 atom% D	1g	￥17,600

アニソール-d_8
Anisole-d_8

C_7D_8O...116.18 ［危］4-2-III
CAS RN® ［54887-54-6］

49121-14	CDN（D-1024）	98 atom% D	1g	￥48,400

アニソニトリル
Anisonitrile

C_8H_7NO...133.14 ［劇］III
CAS RN® ［874-90-8］ mp57℃～60℃▲

15805-1A	TFS（15805-0250）		25g	￥9,900
15805-2A	TFS（15805-1000）		100g	￥33,400

アニシルアルコール標準品
Anisyl alcohol standard

$C_8H_{10}O_2$...138.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［105-13-5］ bp259℃▲ mp23℃～25.5℃▲ d1.113▲ Fp113℃▲

49866-67	DES（C10265500）	環境分析用	250mg	￥12,000

p-アニシルアルコール
p-Anisyl alcohol

警告

$CH_3OC_6H_4CH_2OH$...138.16
CAS RN® [105-13-5] bp259℃† mp25℃† d1.112†

01590-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥9,500
01590-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,300

p-アニシルクロロジフェニルメタン
p-Anisylchlorodiphenylmethane

$C_{20}H_{17}OCl$...308.79 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [14470-28-1] mp122℃～124℃▲

15656-1A	TFS（15656-0250）	25g	￥9,200
15656-3A	TFS（15656-1000）	100g	￥28,300

アンテイソヘプタデカン酸 → 14-メチルヘキサデカン酸

アンテイソヘプタデカン酸メチル → 14-メチルヘキサデカン酸メチル

アンテイソパルミチン酸メチル → 13-メチルペンタデカン酸メチル

アンテイソペンタデカン酸 → 12-メチルテトラデカン酸

アンテイソペンタデカン酸メチル → 12-メチルテトラデカン酸メチル

アンタントレン標準品
Anthanthrene standard

$C_{22}H_{12}$...276.32
CAS RN® [191-26-4]

49796-69	ACC（H-109N）	環境分析用	10mg	￥23,100

アントラセン
Anthracene

$C_{14}H_{10}$...178.22 ［PRTR］1-32
CAS RN® ［120-12-7］ bp342℃† mp218℃†

01410-02		>95.0%(GC)		500g	￥8,500
01410-32		>95.0%(GC)		25g	￥2,300
10486-1A	TFS（10486-0050）			5g	￥5,100
10486-2A	TFS（10486-1000）			100g	￥7,100
10486-3A	TFS（10486-5000）			500g	￥22,700

アントラセン標準品
Anthracene standard

$C_{14}H_{10}$...178.22 ［PRTR］1-32
CAS RN® ［120-12-7］ bp342℃†

49804-02	ACC（H-110N）		環境分析用	100mg	￥3,900

アントラセン-d_{10}
Anthracene-d_{10}

$C_{14}D_{10}$...188.28 ［PRTR］1-32
CAS RN® ［1719-06-8］

01892-96		>99.0%(GC)	環境分析用	100mg	￥8,500

9-アントラセンカルバルデヒド
9-Anthracenecarbaldehyde

$C_{15}H_{10}O$...206.23
CAS RN® ［642-31-9］ mp103℃～107℃△

01752-41		>95.0%(GC)	鹿1級	10g	￥4,400
15393-1A	TFS（15393-1000）			100g	￥16,600
15393-2A	TFS（15393-0250）			25g	￥6,300

9-アントラセンカルボン酸
9-Anthracenecarboxylic acid

$C_{14}H_9COOH$...222.23
CAS RN® [723-62-6] mp214℃～218℃†

01764-61	>97.0%(T)	鹿1級	G	1g	￥3,400

9-アントラセン-d_9-カルボン酸
9-Anthracene-d_9-carboxylic acid

$C_{14}D_9COOH$...231.29
CAS RN® [1219803-78-7]

49136-35	CDN（D-6063）	98 atom% D	100mg	￥74,800

アントラセン-9-カルボン酸
Anthracene-9-carboxylic acid

$C_{14}H_9COOH$...222.23
CAS RN® [723-62-6] mp214℃～218℃▲

10488-1A	TFS（10488-0100）	10g	￥8,200

9-アントラセンメタノール
9-Anthracenemethanol

$C_{15}H_{12}O$...208.25 [変]
CAS RN® [1468-95-7] mp152℃～158℃▲

18187-1A	TFS（18187-0250）	25g	￥18,000
18187-2A	TFS（18187-0050）	5g	￥5,500

9-アントラアルデヒド → 9-アントラセンカルバルデヒド

アントラニルアミド
Anthranilamide

$C_7H_8N_2O$...136.15
CAS RN® [88-68-6] mp111℃～114℃▲

10490-1A	TFS（10490-1000）	100g	￥4,300
10490-2A	TFS（10490-0050）	5g	￥2,600

アントラニル酸
Anthranilic acid

警告

$NH_2C_6H_4COOH$...137.13 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［118-92-3］ mp144℃～146℃ †

01412-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥11,500
01412-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,400

アントラニロニトリル
Anthranilonitrile

$NH_2C_6H_4CN$...118.13 ［劇］III
CAS RN® ［1885-29-6］ bp267℃～268℃ † mp47℃～49℃ †

10492-1A	TFS（10492-0100）			10g	￥3,900
10492-2A	TFS（10492-1000）			100g	￥15,500

アントラキノン
Anthraquinone

警告

$C_{14}H_8O_2$...208.21
CAS RN® ［84-65-1］ mp286℃ †

01414-02			G	500g	￥4,400
01414-32			G	25g	￥1,700

アントラキノン
Anthraquinone

警告

$C_{14}H_8O_2$...208.21
CAS RN® ［84-65-1］

49871-64	PHY（82729）	天然物化学研究用		100mg	￥22,500

アントラキノン標準品
Anthraquinone standard

$C_{14}H_8O_2$...208.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［84-65-1］

49863-52	DES（C10281000）		環境分析用	250mg	￥12,000

アントラキノン-d_8
Anthraquinone-d_8

$C_{14}D_8O_2$...216.26
CAS RN® ［10439-39-1］

49121-17	CDN（D-1958）	98 atom% D		100mg	￥79,200

アントラキノン-1-スルホン酸ナトリウム
Anthraquinone-1-sulfonic acid sodium salt (1=α)

警告

$C_{14}H_7O_2SO_3Na$...310.25
CAS RN® ［128-56-3］

37438-31			鹿1級	25g	￥14,500

アントラキノン-2-スルホン酸ナトリウム一水和物
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate (2=β)

警告

$C_{14}H_7O_2SO_3Na \cdot H_2O$...328.27
CAS RN® ［131-08-8］

37106-32				25g	￥3,000

9-アントロン酸 → 9-アントラセンカルボン酸

アントロン
Anthrone

$C_{14}H_{10}O$...194.22
CAS RN® ［90-44-8］ mp156℃ †

01418-30			鹿特級	25g	￥12,500
01418-60			鹿特級	1g	￥2,800

アントロン
Anthrone

$C_{14}H_{10}O$...194.22
CAS RN®［90-44-8］bp721℃ mp152℃～157℃

10496-1A	TFS（10496-0250）	25g	￥9,000
10496-2A	TFS（10496-1000）	100g	￥27,400

アンチホルミン(有効塩素:5.0%以上) → 次亜塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素5.0%以上)

アンチモン標準液(Sb 100)
Antimony standard solution (Sb 100)

危険

［劇］II ［労］特-3,57,57-2

Sb_2O_3・HCl(2.5mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

01804-1B	Sb:100mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	P	100mL	￥5,700

アンチモン標準液(Sb 1000)
Antimony standard solution (Sb 1000)

危険

［劇］II ［労］特-3,57,57-2

Sb_2O_3・HCl(2.5mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

01803-1B	Sb:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	P	100mL	￥4,000

アンチモン(塊状)
Antimony, lump

警告

Sb...121.76 ［労］57-2［PRTR］1-31
CAS RN®［7440-36-0］ mp630℃†

01419-02			G	500g	￥5,900

アンチモン(塊状),5N
Antimony, lump, 5N

警告

Sb...121.76 ［労］57-2 ［PRTR］1-31
CAS RN® ［7440-36-0］

01421-33	99.999%(Im.S.)	素材研究用		25g	￥8,500
01421-53	99.999%(Im.S.)	素材研究用		5g	￥5,200

アンチモン(粉末)
Antimony, powder

警告

Sb...121.76 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-31
CAS RN® ［7440-36-0］

01420-02			P	500g	￥5,800
01420-32			G	25g	￥1,800

アンチピリン
Antipyrine

警告

$C_{11}H_{12}N_2O$...188.22
CAS RN® ［60-80-0］ mp111℃～113℃†

01433-31		>98.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥3,000
10497-1A	TFS（10497-5000）				500g	￥12,900
10497-2A	TFS（10497-1000）				100g	￥5,800

アンチピリン-d_3(*N*-メチル-d_3)
Antipyrine-d_3 (*N*-methyl-d_3)

$C_{11}H_9D_3N_2O$...191.24
CAS RN® ［65566-62-3］

49121-18	CDN（D-3965）	99 atom% D		100mg	￥79,200

(-)-アントファイン
(-)-Antofine

$C_{23}H_{25}NO_3$...363.44 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［32671-82-2］

49871-65	PHY（85707）	天然物化学研究用	10mg	￥62,500

アンツー標準品
Antu standard

危険

$C_{11}H_{10}N_2S$...202.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［86-88-4］

49837-50	DES（C10290000）	残留農薬試験用	250mg	￥12,000

アピゲニン
Apigenin

$C_{15}H_{10}O_5$...270.23 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［520-36-5］ mp>300℃ †

01886-96		天然物化学研究用	50mg	￥10,000

アピゲニン
Apigenin

$C_{15}H_{10}O_5$...270.23
CAS RN® ［520-36-5］

49871-66	PHY（89159）	天然物化学研究用	25mg	￥30,000

アピゲニン7-グルコシド
Apigenin 7-glucoside

$C_{21}H_{20}O_{10}$...432.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［578-74-5］

49060-39	PHY（89160）	天然物化学研究用	20mg	￥56,000

アピゲニン 7-グルクロニド
Apigenin 7-glucuronide

$C_{21}H_{18}O_{11}$...446.35
CAS RN® ［29741-09-1］

49870-53	PHY（83471）	天然物化学研究用	5mg	￥60,000

アピイン
Apiin

$C_{26}H_{28}O_{14}$...564.49
CAS RN®［26544-34-3］

49060-40	PHY（89161）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

アポアトロピン塩酸塩
Apoatropine hydrochloride

$C_{17}H_{21}NO_2$･HCl...307.81 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［5978-81-4］

49871-67	PHY（84088）	天然物化学研究用	10mg	￥35,000

アポシニン → アセトバニロン

α-アポ-オキシテトラサイクリン
α-Apo-oxytetracycline

$C_{22}H_{22}N_2O_8$...442.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［18695-01-7］ mp200℃▲

can be used as secondary standard

25772-1A	TFS（25772-1000）		100mg	￥53,200

β-アポ-オキシテトラサイクリン
β-Apo-oxytetracycline

$C_{22}H_{22}N_2O_8$...442.41
CAS RN®［18751-99-0］ mp200℃～204℃▲

can be used as secondary standard

25773-1A	TFS（25773-1000）		100mg	￥54,800

アポスコポラミン
Aposcopolamine

$C_{17}H_{19}NO_3$...285.33
CAS RN®［535-26-2］

49871-68	PHY（84104）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

アプラマイシン硫酸塩標準品
Apramycin sulfate salt standard

$C_{21}H_{41}N_5O_{11}\cdot H_2SO_4$...637.65 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［65710-07-8］

01928-96	>92.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥22,000

アプタタックDNAマスター(5倍濃縮)
AptaTaq DNA Master (5×Conc.)

［凍］ -25℃～-20℃

01016-96		分子生物学用		500μL	￥20,000

アピラーゼ
Apyrase

［凍］ -20℃以下

49899-40	NEB（M0398S）			10units	￥16,200
49899-39	NEB（M0398L）			50units	￥65,300

アクア(2,2′-ビピリジン-6,6′-ジオナト)(ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)
Aqua(2,2′-bipyridine-6,6′-dionato)(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)

警告

$C_{20}H_{23}IrN_2O_3$...531.62 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1436571-06-0］

01063-68	>93.0%	Organics	G	100mg	￥12,000
01063-95	>93.0%	Organics	G	500mg	￥38,000

アクア[4,4′-ビス(ジメチルアミノ)-2,2′-ビピリジン-6,6′-ジオナト](ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)
Aqua[4,4′-bis(dimethylamino)-2,2′-bipyridine-6,6′-dionato](pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)

$C_{24}H_{33}N_4O_3Ir$...617.76 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2228980-42-3］

01159-65		Organics		500mg	￥50,000

アクアチェック3(低濃度遊離残留塩素,pH,Mアルカリ度)
Aquacheck 3

Cl^-:0mg/L～10.0mg/L, pH:5.8～8.6, alkalinity:0mg/L～180mg/L

49851-05	日産	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(100枚)	￥3,500

アクアチェックA
Aquacheck A

NH_4-N:0mg/L～10.0mg/L

49851-09	日産（671448）	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(50枚×6)	￥16,500

アクアチェックECO
Aquacheck ECO

NO_3-N:0mg/L～50mg/L, NO_2-N:0mg/L～3.0mg/L, Total hardness:0mg/L～425mg/L, alkalinity:0mg/L～180mg/L, pH:6.4～8.4

49851-11	日産（671496）	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(25枚×6)	￥19,200

アクアチェックFW
Aquacheck FW

Total chlorine residue:0mg/L～60mg/L

49851-15	日産（671481）	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(100枚×6)	￥21,000

アクアチェックHC(高濃度遊離残留塩素)
Aquacheck HC

Cl^-:0mg/L～600mg/L

49851-00	日産	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(100枚)	￥3,500

アクアチェックHP
Aquacheck HP

Hydrogen peroxide:0mg/L～10mg/L

49851-14	日産（671481）	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(100枚×6)	￥21,000

アクアチェックLC(低濃度遊離残留塩素)
Aquacheck LC

Cl^-:0mg/L～1.0mg/L

49851-02	日産	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(100枚)	￥3,500

アクアチェックN
Aquacheck N

NO_3-N:0mg/L～50mg/L, NO_2-N:0mg/L～3.0mg/L

49851-07	日産（671433）	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(50枚×6)	￥19,200

アクアチェックP
Aquacheck P

PO_4-P:0mg/L～15mg/L

49851-10	日産（671471）	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(50枚×6)	￥16,500

アクアチェックSP(低濃度遊離残留塩素、低濃度総残留塩素、pH)
Aquacheck SP

Cl^-(Free):0mg/L～3.0mg/L,Cl^-(Total):0mg/L～2.0mg/L,pH:5.8～8.6

49851-16	日産	簡易分析ｷｯﾄ	1pack(100枚)	￥3,500

アクアチェックTC(低濃度総残留塩素)
Aquacheck TC

Cl^-:0mg/L～3.0mg/L

49851-04	日産	簡易分析ｷｯﾄ		1pack(100枚)	￥4,000

アクア(6,6′-ジヒドロキシ-2,2′-ビピリジン)(ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)ビス(トリフラート)
Aqua(6,6′-dihydroxy-2,2′-bipyridine)(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) bis(triflate)

警告

$C_{22}H_{25}F_6IrN_2O_9S_2$...831.78 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1360870-69-4］

01062-68	>94.0%	Organics	G	100mg	￥11,000
01062-95	>94.0%	Organics	G	500mg	￥30,000

アクアライトCN(対極液)
Aqualyte CN, counter electrolyte

危険

［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2

49300-30	平沼	平沼ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ微量水分測定装置用	15mL×10	￥16,000

アクアライトCX(対極液)
Aqualyte CX, counter electrolyte

危険

［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2

49300-65	平沼	平沼ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ微量水分測定装置用	5mL×10	￥13,000

アクアライトG(発生液)
Aqualyte G, generator electrolyte

危険

［危］4-2-S-III［労］特-3,57,57-2［PRTR］1-342 ［冷］ 0℃～6℃

49300-01	平沼	平沼ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ微量水分測定装置用	20mL×10	￥12,000

アクアライトGRO-A
Aqualyte GRO-A

危険

［危］4-1-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2

49300-43	平沼（D311173-A02）	水分測定用	500mL×2	￥26,000
49300-44	平沼（D311173-A12）	水分測定用	500mL×12	￥140,000

アクアライトKF1
Aqualyte KF 1

危険

［危］4-3-S-III［労］特-3,57,57-2

Titer 0.7mg～1.5mg H_2O/mL

49300-54	平沼（D312131-1）	水分測定用	500mL	￥12,000

アクアライトKF3
Aqualyte KF 3

危険

［危］4-3-S-III［労］特-3,57,57-2

Titer 2.0mg～4.0mg H_2O/mL

49300-53	平沼（D312132-1）	水分測定用	500mL	￥12,000

アクアライトKF5
Aqualyte KF 5

危険

［危］4-3-S-III［労］特-3,57,57-2

Titer 4.0mg～6.0mg H_2O/mL

49300-52	平沼（D312133-1）	水分測定用	500mL	￥12,000

アクアライトKF5K
Aqualyte KF 5K

危険

［危］4-3-S-III［労］特-3,57,57-2

Titer 4.0mg～6.0mg H_2O/mL

49300-55	平沼（D312134-1）	水分測定用	500mL	￥12,000

アクアライトRO
Aqualyte RO

危険

［危］4-2-III［労］特-2(特有),特-3,有-2,57,57-2［PRTR］1-127

49300-39	平沼（E327338-A）	水分測定用	500mL×2	￥26,000
49300-40	平沼（E327338-B）	水分測定用	500mL×12	￥140,000

アクアライトRS
Aqualyte RS

危険

［危］4-1-II［労］特-2(特有),特-3,有-2,57,57-2［PRTR］1-127

49300-37	平沼（E327337-A）	水分測定用	500mL×2	￥25,000
49300-38	平沼（E327337-B）	水分測定用	500mL×12	￥134,000

アクアライトRS-A
Aqualyte RS-A

危険

［危］4-1-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2

49300-41	平沼（D327660-A02）	水分測定用	500mL×2	￥25,000
49300-42	平沼（D327660-A12）	水分測定用	500mL×12	￥134,000

アクアライト水・メタノール標準液 力価2
Aqualyte Standard Water-Methanol Solution Factor 2

危険

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

2mg H_2O/mL メタノール溶液

49300-61	平沼（D312141-1）	水分測定用	500mL	￥6,800

アクアライト水・標準品0.02
Aqualyte Water Standard 0.02

危険

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

Titer 0.02mg H_2O/mL, Include Methylcyclohexane.

49300-64	平沼（D312143-1）	水分測定用	8mL×5	￥9,500

アクアライト水・標準品0.1
Aqualyte Water Standard 0.1

危険

［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-297 ［冷］ 0℃～6℃

Titer 0.1mg H_2O/mL

49300-62	平沼（D312138-1）	水分測定用	8mL×5	￥7,500

アクアライト水・標準品1
Aqualyte Water Standard 1

警告

［危］4-2-III

Titer 0.95mg～1.05mg H_2O/mL

49300-59	平沼（D312139-1）	水分測定用	8mL×5	￥7,500

アクアライト水・標準品10
Aqualyte Water Standard 10

警告

［危］4-2-S-III

Titer 9.5mg～10.5mg H_2O/mL

49300-60	平沼（D312140-1）	水分測定用	8mL×5	￥7,500

アクアミクロン™AKX(ディジタル微量水分測定用陽極液ケトン用)
AQUAMICRON™ AKX

［危］4-3-S-III［労］特-3,57,57-2

49200-30	三菱（AKX）	500mL	☆

アクアミクロン™AS(ディジタル微量水分測定用陽極液汎用)
AQUAMICRON™ AS

［危］4-1-II［労］特-2(特有),特-3,有-2,57,57-2［PRTR］1-127

49200-11	三菱（SAMA）	500mL	☆

アクアミクロン™AX(ディジタル微量水分測定用陽極液汎用)
AQUAMICRON™ AX

［危］4-1-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2

49200-28	三菱（XAMA）	500mL	☆

アクアミクロン™AX01
AQUAMICRON™ AX01

［危］4-1-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2

49200-37	三菱（XAMA01）	100mL	☆

アクアミクロン™AXI
AQUAMICRON™ AXI

［労］57-2

49200-42	三菱（XAMI）	500mL	☆

アクアミクロン™チェック液P
AQUAMICRON™ Check solution P

［危］4-3-III

49240-00	三菱（GCHP）	100mL	☆

アクアミクロン™CXU(ディジタル微量水分測定用陰極液汎用,ケトン用)
AQUAMICRON™ CXU

［危］4-2-S-III［労］有-2,57,57-2

49201-00	三菱（CXU）	5mL×10	☆

アクアミクロン™脱水溶剤CM
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent CM

［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-127

49200-00	三菱（GCM）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤CP
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent CP

［労］特-2(特有),特-3,57,57-2［PRTR］1-127,1-342

49200-23	三菱（GCP）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤FM
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent FM

［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2

49200-01	三菱（GFM）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤GEX
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent GEX

［危］4-AL-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2

49200-18	三菱（GEX）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤KTX
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent KTX

［危］4-3-S-III

49200-35	三菱（KTX）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤ME
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent ME

［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2

49200-02	三菱（GME）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤ML
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent ML

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

49200-03	三菱（GML）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤MS
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent MS

［危］4-1-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2［PRTR］1-342

49200-04	三菱（GMS）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤OLII
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent OL II

［危］4-2-S-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-127

49200-19	三菱（OL2）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤OLX
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent OLX

［危］4-2-III［労］57-2

49200-34	三菱（OLX）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤PE
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent PE

［危］4-2-S-III［労］57-2［PRTR］1-342

49200-05	三菱（GPE）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤PP
AQUAMICRON™ Dehydrated solvent PP

［危］4-2-S-III［労］57-2［PRTR］1-342

49200-06	三菱（GPP）	500mL	☆

アクアミクロン™脱水溶剤SU
AQUAMICRON™ Dehydrated Solvent SU

［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2

49200-07	三菱（SSU）	500mL	☆

アクアミクロン™FLS
AQUAMICRON™ FLS

［危］4-1-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2

49200-38	三菱（FLS）	500mL	☆

アクアミクロン™固体水標準試料
AQUAMICRON™ Solid water standard

49200-39	三菱（SWS）	10g	☆

アクアミクロン™標準水・メタノール 2mg
AQUAMICRON™ Standard water-methanol 2mg

［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

49200-21	三菱（GMW20）	250mL	☆

アクアミクロン™滴定剤SS 10mg
AQUAMICRON™ Titrant SS 10mg

［労］特-2(特有),特-3,57,57-2［PRTR］1-127,1-342

49200-40	三菱（GKS100M）	500mL	☆

アクアミクロン™滴定剤SS 1mg
AQUAMICRON™ Titrant SS 1mg

［労］特-2(特有),特-3,57,57-2［PRTR］1-127,1-342

49240-01	三菱（GKS10M）	500mL	☆

アクアミクロン™滴定剤SS 3mg
AQUAMICRON™ Titrant SS 3mg

［労］特-2(特有),特-3,57,57-2［PRTR］1-127,1-342

49200-17	三菱（GKS30M）	500mL	☆

アクアミクロン™滴定剤SS-Z 1mg
AQUAMICRON™ Titrant SS-Z 1mg

［危］4-3-S-III［労］特-3,57,57-2

49200-33	三菱（SSZ10M）	500mL	☆

アクアミクロン™滴定剤SS-Z 3mg
AQUAMICRON™ Titrant SS-Z 3mg

［危］4-3-S-III［労］特-3,57,57-2

49200-32	三菱（SSZ30M）	500mL	☆
49200-43	三菱（SSZ30L）	1L	☆

アクアミクロン™滴定剤SS-Z 5mg
AQUAMICRON™ Titrant SS-Z 5mg

［危］4-3-S-III［労］特-3,57,57-2

49200-31	三菱（SSZ50M）	500mL	☆
49200-36	三菱（SSZ50L）	1L	☆

アクアミクロン™水標準液 0.1mg
AQUAMICRON™ Water standard 0.1mg

［危］4-3-III

49200-41	三菱（AWS01）	5mL×10	☆

アクアミクロン™水標準液 0.2mg
AQUAMICRON™ Water standard 0.2mg

［危］4-3-III

49200-12	三菱（AWS02）	5mL×10	☆

アクアミクロン™水標準液 10mg
AQUAMICRON™ Water standard 10mg

［危］4-3-III

49200-14	三菱（AWS100）	8mL×10	☆

アクアミクロン™水標準液 1mg
AQUAMICRON™ Water standard 1mg

［危］4-3-III

49200-13	三菱（AWS10）	5mL×10	☆

アクアテックス
Aquatex®

保存 15℃～25℃

aqueous mounting agent

8562-1M	M（1.08562.0050）	顕微鏡用	50mL	￥4,000

D(-)-アラビノース
D(-)-Arabinose

$C_5H_{10}O_5$...150.12
CAS RN®［10323-20-3, 28697-53-2］ mpabt 160℃†

01703-50		鹿特級	5g	￥9,500
16145-1A	TFS（16145-0250）		25g	￥9,100
16145-2A	TFS（16145-1000）		100g	￥20,000

L(+)-アラビノース
L(+)-Arabinose

$C_5H_{10}O_5$...150.12
CAS RN® [87-72-9] mp156℃～160℃△

01482-30		鹿特級	G	25g	￥8,500
1492-2M	M（1.01492.0100）	微生物学用		100g	￥41,400
10498-1A	TFS（10498-0250）			25g	￥10,000
10498-2A	TFS（10498-1000）			100g	￥28,600

D-アラビトール
D-Arabitol

$C_5H_{12}O_5$...152.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [488-82-4] mp102℃～103℃▲

30287-1A	TFS（30287-0050）		5g	￥9,000

L(-)-アラビトール
L(-)-Arabitol

$C_5H_{12}O_5$...152.14 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7643-75-6] mp102℃†

22586-1A	TFS（22586-0250）		25g	￥28,400
22586-2A	TFS（22586-0050）		5g	￥7,800

アラキジン酸 → エイコサン酸

アラキジン酸 → エイコサン酸

アラキジン酸標準品 → エイコサン酸標準品

アラキドン酸
Arachidonic acid

$C_{20}H_{32}O_2$...304.46 [危] 4-4-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [506-32-1]

49050-35	MTR（1042）	99%		100mg	☆

アラロシドA
Araloside A

$C_{47}H_{74}O_{18}$...927.07 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7518-22-1］

49871-69	PHY（84201）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

アラマイト標準品
Aramite standard

警告

$C_{15}H_{23}ClO_4S$...334.86 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［140-57-8］

49830-59	DES（C10300000）	残留農薬試験用	10mg	￥82,000

アルブチン
Arbutin

$C_{12}H_{16}O_7$...272.25
CAS RN® ［497-76-7］

49060-41	PHY（89510）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

アルクチゲニン
Arctigenin

$C_{21}H_{24}O_6$...372.41
CAS RN® ［7770-78-7］

49060-42	PHY（80354）	天然物化学研究用	10mg	￥49,000

アルクチイン
Arctiin

$C_{27}H_{34}O_{11}$...534.55
CAS RN® ［20362-31-6］

49060-43	PHY（89531）	天然物化学研究用	10mg	￥49,000

アレカイジン塩酸塩
Arecaidine hydrochloride

$C_7H_{11}NO_2$･HCl...177.62
CAS RN® ［6018-28-6］

49871-70	PHY（85878）	天然物化学研究用	25mg	￥25,000

アレコリン臭化水素酸塩
Arecoline hydrobromide

$C_8H_{13}NO_2$･HBr...236.10
CAS RN® [300-08-3] mp171℃～174℃†

25013-1A	TFS（25013-0250）			25g	￥26,400
25013-2A	TFS（25013-0050）			5g	￥6,600
49870-54	PHY（82470）		天然物化学研究用	25mg	￥43,000

D-アルギニン
D-Arginine

$C_6H_{14}N_4O_2$...174.20
CAS RN® [157-06-2]

02099-52		>95.0%		5g	￥17,000
02099-62		>95.0%		1g	￥5,500

L(+)-アルギニン
L(+)-Arginine

$H_2NC(:NH)NH(CH_2)_3CH(NH_2)COOH$...174.20
CAS RN® [74-79-3] mp244℃(dec.)†

01434-30		>98.0%(T)	鹿特級	25g	￥3,400
01434-60		>98.0%(T)	鹿特級	1g	￥2,200
10499-1A	TFS（10499-5000）			500g	￥20,600
10499-2A	TFS（10499-0025）			2.5kg	￥85,600
10499-3A	TFS（10499-1000）			100g	￥6,300

L-アルギニン
L-Arginine

$H_2NC(:NH)NH(CH_2)_3CH(NH_2)COOH$...174.20
CAS RN® [74-79-3] mp244℃(dec.)†

58050-17		98.0%～102.0%(T)	食品添加物	500g	￥14,500

L-アルギニン
L-Arginine

49433-72	BIOCO（CN-9003-O）			100g	￥11,000
49433-73	BIOCO（CN-9003-R）			500g	￥38,000

L-アルギニン
L-Arginine

$C_6H_{14}N_4O_2$...174.20
CAS RN® [74-79-3]

49871-71	PHY（82307）	天然物化学研究用		100mg	￥22,500

L-アルギニン CRM6017-b
L-Arginine, CRM6017-b

$C_6H_{14}N_4O_2$...174.20 保存 15℃
CAS RN® [74-79-3]

Certified value:99.8±0.2%

49004-59	NMI（CRM6017-b）	認証標準物質		0.5g	☆

L(+)-アルギニン塩酸塩(一塩酸 *L*-アルギニン)
L(+)-Arginine hydrochloride

$H_2NC(:NH)NH(CH_2)_3CH(NH_2)COOH \cdot HCl$...210.66
CAS RN® [1119-34-2] mp235℃(dec.)†

01435-30		>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,700
10500-1A	TFS（10500-1000）				100g	￥4,800
10500-2A	TFS（10500-0250）				25g	￥2,900

L-アルギニンメチルエステル二塩酸塩
L-Arginine methyl ester dihydrochloride

$C_7H_{16}N_4O_2 \cdot 2HCl$...261.14
CAS RN® [26340-89-6]

02118-32	>97.0%(T)		G	25g	￥12,000
02118-52	>97.0%(T)		G	5g	￥4,200

アリピプラゾール-d$_8$(ブチル-d$_8$)
Aripiprazole-d$_8$ (butyl-d$_8$)

$C_{23}H_{19}Cl_2D_8N_3O_2$...456.43
CAS RN® [1089115-04-7]

49136-36	CDN（D-6833）	99 atom% D	50mg	￥132,000

アリストロラクタム
Aristolactam

$C_{17}H_{11}NO_4$...293.27
CAS RN® [13395-02-3]

49060-44	PHY（82471）	天然物化学研究用	10mg	￥71,000

アリストロキン酸
Aristolochic acid

$C_{17}H_{11}NO_7$...341.27
CAS RN® [313-67-7] mp260℃～265℃ †

22609-1A	TFS（22609-1000）		100mg	￥24,000
49870-55	PHY（89565）	天然物化学研究用	10mg	￥43,000

アリストロク酸C
Aristolochic acid C

$C_{16}H_9NO_7$...327.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4849-90-5]

49060-45	PHY（80355）	天然物化学研究用	5mg	￥105,000

アリストロク酸D
Aristolochic acid D

$C_{17}H_{11}NO_8$...357.27
CAS RN® [17413-38-6]

49870-56	PHY（83478）	天然物化学研究用	5mg	￥105,000

アリストロク酸II
Aristolochic acid II

$C_{16}H_9NO_6$...311.24 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [475-80-9]

49060-46	PHY（89566）	天然物化学研究用	10mg	￥46,000

アルジュネチン
Arjunetin

$C_{36}H_{58}O_{10}$...650.83
CAS RN®［31297-79-7］

49060-47	PHY（82472）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

アルジュンゲニン
Arjungenin

$C_{30}H_{48}O_{6}$...504.69
CAS RN®［58880-25-4］

49060-48	PHY（82473）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

アルジュン酸
Arjunic acid

$C_{30}H_{48}O_{5}$...488.69
CAS RN®［31298-06-3］

49060-49	PHY（82474）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

アルメパビン
Armepavine

$C_{19}H_{23}NO_{3}$...313.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［524-20-9］

49871-72	PHY（85720）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アルセメート → *N*,*N*-ジエチルジチオカルバミド酸銀

アルセナゾI → ネオトリン

アルセナゾIII
Arsenazo III

危険

$C_{22}H_{18}As_{2}N_{4}O_{14}S_{2}$...776.37 ［毒］II ［労］特-2,57,57-2
CAS RN®［1668-00-4］

04633-52	>93.0%(T)	G	5g	￥15,500
04633-62	>93.0%(T)	G	1g	￥5,700

アルセノベタイン水溶液 CRM7901-a
Arsenobetaine solution, CRM7901-a

［毒］II ［労］57-2

Certified value:19.98±0.47(mg/kg)

49002-39	NMI（CRM7901-a）	認証標準物質	10mL	☆

亜ひ酸 → 三酸化二ひ素

アルテメチン
Artemetin

$C_{20}H_{20}O_8$...388.36
CAS RN®［479-90-3］

49871-73	PHY（83719）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

アルテミカプインC
Artemicapin C

$C_{10}H_6O_5$...206.15
CAS RN®［334007-19-1］

49870-57	PHY（83419）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

アルテミシニン
Artemisinin

$C_{15}H_{22}O_5$...282.33 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［63968-64-9］

49060-52	PHY（89484）	天然物化学研究用	25mg	￥46,000

アルテピリンC
Artepillin C

$C_{19}H_{24}O_3$...300.39 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［72944-19-5］

49871-74	PHY（84053）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

(-)-アサリニン
(-)-Asarinin

$C_{20}H_{18}O_6$...354.35
CAS RN®［133-04-0］

49871-75	PHY（80564）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

α-アサロン
α-Asarone

$C_{12}H_{16}O_3$...354.35
CAS RN®［2883-98-9］

49060-54	PHY（89567）	天然物化学研究用	50mg	￥66,000

β-アサロン
β-Asarone

$C_{12}H_{16}O_3$...208.25 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［5273-86-9］

49060-55	PHY（89568）	天然物化学研究用	50mg	￥66,000

アサリルアルデヒド → 2,4,5-トリメトキシベンズアルデヒド

アスベスト(クリソタイル型)
Asbestos

危険

［PRTR］特1-33
CAS RN®［1332-21-4］

本品は、労働安全衛生法により、「石綿分析用試料」としての用途以外には使用できません。

01449-97		G	200mg	￥13,000

アスベスト検出キット
Asbestos detection kit

49356-02	共立理（DK-ASB）		1pack(20回分)	￥12,000

アスベスト簡易判定キット-プロ(基本セット)
Asbestos detection kit PRO (Basic set)

［毒］II ［労］特-2［PRTR］1-374

49002-62	UNC	1kit(10回分)	￥50,000

アスベスト簡易判定キット-プロ(追加試薬セット)
Asbestos detection kit PRO (Reagent set)

［毒］II ［労］特-2［PRTR］1-374

49002-63	UNC	1kit(10回分)	￥13,000

アスカライト(II)
Ascarite(II)^{R}, CO_2 absorbent, 8 to 20 mesh

［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［81133-20-2］

20808-1A	TFS（20808-5000）	500g	￥68,100

アスコルビン酸オキシダーゼ
Ascorbate oxidase

［凍］ -20℃

49811-08	TYB（ASO-301）	10mg	￥12,000
49811-09	TYB（ASO-311）	10mg	￥45,000

L(+)-アスコルビン酸
L(+)-Ascorbic acid

$C_6H_8O_6$...176.12
CAS RN® ［50-81-7］ mp190℃～192℃(dec.)†

01452-00	>99.6%(T)	特級	P	500g	￥6,200
01452-30	>99.6%(T)	特級	G	25g	￥1,500
01452-80	>99.6%(T)	特級		15kg	☆
01019-08	>99.6%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥7,000

L-アスコルビン酸
L-Ascorbic acid

$C_6H_8O_6$...176.12
CAS RN® [50-81-7] mp190℃～192℃(dec.)†

58817-30	>99.0%(T)	食品添加物	C	1kg	￥9,500

L(+)-アスコルビン酸
L(+)-Ascorbic acid

$C_6H_8O_6$...176.12
CAS RN® [50-81-7] mp190℃～192℃

10502-1A	TFS（10502-0025）		2.5kg	￥32,000
10502-2A	TFS（10502-1000）		100g	￥4,000
10502-3A	TFS（10502-5000）		500g	￥9,700

L(+)-アスコルビン酸標準品
L(+)-Ascorbic acid standard

$C_6H_8O_6$...176.12 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [50-81-7] mp190℃～192℃(dec.)†

01691-96	>98.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥3,500

L-アスコルビン酸2-モノリン酸トリスシクロヘキシルアンモニウム標準品
L-Ascorbic acid 2-monophosphate tris(cyclohexylammonium) standard

$3C_6H_{13}N \cdot C_6H_9O_9P$...553.62 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [82134-96-1]

49911-04	DES（C10303750）	食品分析用	100mg	￥28,000

L-アスコルビン酸ナトリウム, 99%
L-Ascorbic acid sodium salt, 99%

$C_6H_7NaO_6$...198.10
CAS RN® [134-03-2] mp219℃～221℃

35268-1A	TFS（35268-0050）		5g	￥3,000
35268-2A	TFS（35268-1000）		100g	￥7,500
35268-3A	TFS（35268-5000）		500g	￥14,400

アシアト酸
Asiatic acid

$C_{30}H_{48}O_5$...488.69
CAS RN® [464-92-6]

49060-57	PHY（89569）		天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アシアチコシド
Asiaticoside

$C_{48}H_{78}O_{19}$...959.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [16830-15-2]

49060-58	PHY（89570）		天然物化学研究用	20mg	￥49,000

アスパラチン
Aspalathin

$C_{21}H_{24}O_{11}$...452.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [6027-43-6]

49060-59	PHY（89571）		天然物化学研究用	10mg	￥85,000

DL-アスパラギン一水和物
DL-Asparagine monohydrate

$H_2NCOCH_2CH(NH_2)COOH \cdot H_2O$...150.13
CAS RN® [3130-87-8] mp234℃～235℃ †

01706-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,700
16712-1A	TFS（16712-5000）				500g	￥29,500
16712-2A	TFS（16712-0250）				25g	￥3,100
16712-3A	TFS（16712-1000）				100g	￥8,200

L-アスパラギン
L-Asparagine

$C_4H_8N_2O_3$...132.11
CAS RN® [70-47-3]

37160-2A	TFS（37160-1000）			100g	￥9,800
37160-3A	TFS（37160-5000）			500g	￥36,500
49870-59	PHY（80905）		天然物化学研究用	100mg	￥40,000

L-アスパラギン一水和物
L-Asparagine monohydrate

$H_2NCOCH_2CH(NH_2)COOH \cdot H_2O$...150.13
CAS RN® [5794-13-8] mp234℃～235℃†

01454-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥3,100
17527-1A	TFS（17527-2500）			250g	￥18,200
17527-2A	TFS（17527-1000）			100g	￥9,300

L-アスパラギン一水和物
L-Asparagine Monohydrate

［冷］ 2℃～8℃

49433-74	BIOCO（CN-9006-O）			100g	￥19,000
49433-75	BIOCO（CN-9006-R）			500g	￥65,000

L-アスパラギン-2,3,3,-d_3一水和物
L-Asparagine-2,3,3,-d_3 hydrate

$C_4H_6D_3NO_4$...138.13

49149-54	CDN（D-7867）			10mg	￥30,800

アスパルテーム標準品
Aspartame standard

$C_{14}H_{18}N_2O_5$...294.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [22839-47-0] mp246℃～247℃†

01693-96	>99.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥5,600

D(-)-アスパラギン酸
D(-)-Aspartic acid

$HO_2CCH_2CH(NH_2)CO_2H$...133.10
CAS RN® [1783-96-6] mp>300℃▲

01507-02	>95.0%		G	500g	￥15,000
01507-32	>95.0%		G	25g	￥4,300
20426-1A	TFS（20426-0250）			25g	￥11,900

D L-アスパラギン酸
DL-Aspartic acid

$HOOCCH_2CH(NH_2)COOH$...133.10
CAS RN® [617-45-8] mp270℃(dec.)†

01707-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,800
10503-1A	TFS（10503-2500）				250g	￥11,000
10503-2A	TFS（10503-0050）				5g	￥6,200

D L-アスパラギン酸-2,3,3-d_3
DL-Aspartic-2,3,3-d_3 acid

$HOOCCD_2CD(NH_2)COOH$...136.12
CAS RN® [14341-75-4]

49121-19	CDN（D-1953）	98 atom% D			500mg	￥66,000

L-アスパラギン酸
L-Aspartic acid

$HOOCCH_2CH(NH_2)COOH$...133.10
CAS RN® [56-84-8] mp270℃～271℃†

01453-00		>99.0%(T)	特級	G	500g	￥6,200
01453-30		>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,900

L-アスパラギン酸
L-Aspartic Acid

49433-76	BIOCO（CN-9007-O）				100g	￥6,300
49433-77	BIOCO（CN-9007-R）				500g	￥24,000

L-アスパラギン酸
L-Aspartic acid

$HOOCCH_2CH(NH_2)COOH$...133.10
CAS RN® [56-84-8] mp230℃

10504-1A	TFS（10504-0025）				2.5kg	￥24,600
10504-2A	TFS（10504-1000）				100g	￥3,000
10504-3A	TFS（10504-5000）				500g	￥6,600

L-アスパラギン酸
L-Aspartic acid

$C_4H_7NO_4$...133.10
CAS RN® [56-84-8]

49871-76	PHY（80666）		天然物化学研究用	100mg	￥22,500

L-アスパラギン酸 CRM6027-a
L-Aspartic acid, CRM6027-a

$HOOCCH_2CH(NH_2)COOH$...133.10
CAS RN® [56-84-8]

Certified value:0.999±0.002(kg/kg)

49004-83	NMI（CRM6027-a）		認証標準物質	0.5g	☆

L-アスパラギン酸-2,3,3-d_3
L-Aspartic-2,3,3-d_3 acid

$HOOCCD_2CD(NH_2)COOH$...136.12
CAS RN® [3842-25-9]

49121-21	CDN（D-898）	98 atom% D		100mg	￥39,600

L-アスパラギン酸1-ベンジルエステル
L-Aspartic acid 1-benzyl ester

$C_{11}H_{13}NO_4$...223.22
CAS RN® [7362-93-8]

02115-52		>95.0%	G	5g	￥15,000
02115-62		>95.0%	G	1g	￥5,000

L-アスパラギン酸4-ベンジルエステル
L-Aspartic acid 4-benzyl ester

$C_{11}H_{13}NO_4$...223.22
CAS RN® [2177-63-1]

02100-32		>97.0%(HLC)	G	25g	￥17,000
02100-52		>97.0%(HLC)	G	5g	￥5,500

L-アスパラギン酸4-ｔｅｒｔ-ブチルエステル
L-Aspartic acid 4-*tert*-butyl ester

$C_8H_{15}NO_4$...189.20
CAS RN® [3057-74-7]

02113-52	>97.0%(T)	G	5g	￥18,000
02113-62	>97.0%(T)	G	1g	￥5,800

L-アスパラギン酸ジメチルエステル塩酸塩
L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride

$C_6H_{11}NO_4 \cdot HCl$...197.61
CAS RN® [32213-95-9]

02114-32	>97.0%(T)	G	25g	￥16,000
02114-52	>97.0%(T)	G	5g	￥5,500

L-アスパルチル-*L*-フェニルアラニン
L-Aspartyl-*L*-phenylalanine

$C_{13}H_{16}N_2O_5$...280.27
CAS RN® [13433-09-5] mp236℃～239℃▲

31002-1A	TFS（31002-1000）	100mg	￥12,200

L-アスパルチル-*L*-フェニルアラニンメチルエステル
L-Aspartyl-*L*-phenylalanine methyl ester

$C_{14}H_{18}N_2O_5$...294.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [22839-47-0] mp248℃～250℃†

22865-1A	TFS（22865-0010）	1g	￥6,800

アスペルギルス抽出物
Aspergillus Fumigatus Extract

[冷] 0℃～6℃

49906-63	ITEA（10118）	1mL	￥21,000

アスペロサポニン VI
Asperosaponin VI

$C_{47}H_{76}O_{18}$...929.09
CAS RN® [39524-08-8]

49869-01	PHY（83275）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

アスペルロシド
Asperuloside

$C_{18}H_{22}O_{11}$...414.35
CAS RN®［14259-45-1］

49871-77	PHY（83229）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

アスペルロシド酸
Asperulosidic acid

$C_{18}H_{24}O_{12}$...432.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［25368-11-0］

49871-78	PHY（84202）	天然物化学研究用	10mg	￥52,000

アスポキシシリン標準品
Aspoxicillin standard

$C_{21}H_{27}N_5O_7S$...493.53 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［63358-49-6］

49866-54	DES（C10305500）	食品分析用	50mg	￥28,000

アスタキサンチン標準品
Astaxanthin standard

$C_{40}H_{52}O_4$...596.83 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［472-61-7］

49838-90	DES（CA10307000）	食品分析用	100mg	￥29,000

アスチルビン
Astilbin

$C_{21}H_{22}O_{11}$...450.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［29838-67-3］

49060-60	PHY（80356）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

アストラガロシドI
Astragaloside I

$C_{45}H_{72}O_{16}$...869.04 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［84680-75-1］

49060-61	PHY（89572）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

アストラガロシドII
Astragaloside II

$C_{43}H_{70}O_{15}$...827.00 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［84676-89-1］

49060-62	PHY（89573）	天然物化学研究用	10mg	￥86,000

アストラガロシドIII
Astragaloside III

$C_{41}H_{68}O_{14}$...784.96 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［84687-42-3］

49060-63	PHY（80357）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

アストラガロシドIV
Astragaloside IV

$C_{41}H_{68}O_{14}$...784.96 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［84687-43-4］

49060-64	PHY（89377）	天然物化学研究用	10mg	￥75,000

アストリンギン
Astringin

$C_{20}H_{22}O_9$...406.38 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［29884-49-9］

49871-79	PHY（80736）	天然物化学研究用	10mg	￥48,000

アシュラム標準品
Asulam standard

$C_8H_{10}N_2O_4S$...230.24 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3337-71-1］ mp142℃～144℃(dec.)†

49826-00	DES（C10310000）	残留農薬試験用	250mg	￥8,000

アシュラム標準液
Asulam standard solution

危険

$C_8H_{10}N_2O_4S$...230.24 ［劇］II ［危］4-1-S-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3337-71-1］

10mg/L アセトニトリル溶液

49828-07	DES（L10310000AL）	残留農薬試験用	10mL	￥9,000

(±)-アテノロール-d_7(*iso*-プロピル-d_7)
(±)-Atenolol-d_7 (*iso*-propyl-d_7)

$C_{14}H_{15}D_7N_2O_3$...273.37
CAS RN® [29122-68-7]

49136-37	CDN（D-6202）	98 atom% D	50mg	￥68,200

アテノロール標準品
Atenolol standard

$C_{14}H_{22}N_2O_3$...266.33 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [29122-68-7]

49836-09	DES（C10313000）	環境分析用	100mg	￥20,000

アトラクチレノリドI
Atractylenolide I

$C_{15}H_{18}O_2$...230.30 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [73069-13-3]

49060-65	PHY（82479）	天然物化学研究用	10mg	￥86,000

アトラクチレノリドII
Atractylenolide II

$C_{15}H_{20}O_2$...232.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [73069-14-4]

49871-80	PHY（82480）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

アトラクチレノリドIII
Atractylenolide III

$C_{15}H_{20}O_3$...248.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [73030-71-4]

49060-67	PHY（80359）	天然物化学研究用	10mg	￥86,000

アトラクチロシド
Atractyloside

$C_{30}H_{44}O_{16}S_2K_2$...802.99 [凍] -20℃以下
CAS RN® [17754-44-8]

49871-81	PHY（84195）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

アトラノリン
Atranorin

$C_{19}H_{18}O_8$...374.34 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［479-20-9］

49871-82	PHY（84203）	天然物化学研究用		10mg	￥50,000

アトラトン標準品
Atraton standard

$C_9H_{17}N_5O$...211.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1610-17-9］

49827-12	DES（C10320000）	残留農薬試験用		250mg	￥16,000

アトラジン標準品
Atrazine standard

$C_8H_{14}ClN_5$...215.68 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-90 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1912-24-9］ mp173℃～175℃†

01720-96	>99.0%(GC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥9,000

アトラジン標準品
Atrazine standard

$C_8H_{14}ClN_5$...215.68 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-90 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1912-24-9］

49865-38	DES（CR10330000）	残留農薬試験用		50mg	￥15,000

アトラジン標準液
Atrazine standard solution

$C_8H_{14}ClN_5$...215.68 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1912-24-9］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49833-45	DES（L10330000CY）	残留農薬試験用		10mL	￥12,000

アトラジン-d_5
Atrazine-d_5

$C_8H_9D_5ClN_5$...220.71 ［労］57,57-2［PRTR］1-90
CAS RN®［163165-75-1］

49144-41	CDN（D-4389）	99 atom% D	50mg	￥92,400

アトラジン-d_5標準液
Atrazine-d_5 standard solution

$C_8H_9D_5ClN_5$...220.71 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［163165-75-1］

100mg/L アセトン溶液

49802-64	DES（XA10330100AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥31,000

アトラジン-デスエチル-d_6標準液
Atrazine-desethyl-d_6 standard solution

$C_6H_4ClD_6N_5$...193.66 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃

100mg/L アセトン溶液

49836-23	DES（XA10331100AC）	残留農薬試験用	1mL	￥39,000

アトラジン-デスエチル-デスイソプロピル-2-ヒドロキシ標準品
Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy standard

$C_3H_5N_5O$...127.10 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［645-92-1］

49834-14	DES（C10331700）	残留農薬試験用	250mg	￥16,000

アトラジン-デスエチル-2-ヒドロキシ標準品
Atrazine-desethyl-2-hydroxy standard

$C_6H_{11}N_5O$...169.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［19988-24-0］

49837-52	DES（C10331300）	残留農薬試験用	100mg	￥33,000

アトラジン-デスイソプロピル標準品
Atrazine-desisopropyl standard

$C_5H_8ClN_5$...173.60 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1007-28-9］

49837-53	DES（C10332000）	残留農薬試験用	250mg	￥29,000

アトラジン-デスイソプロピル-d_5
Atrazine-desisopropyl-d_5

$C_5H_3ClD_5N_5$...178.63
CAS RN® ［1189961-78-1］

49138-31	CDN（D-6456）	99 atom% D	50mg	￥74,800

アトラジン-デスイソプロピル-d_5標準品
Atrazine-desisopropyl-d_5 standard

$C_5H_3ClD_5N_5$...178.63 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1189961-78-1］

49836-24	DES（C10332100）	残留農薬試験用	10mg	￥105,000

アトラジン-デスイソプロピル-2-ヒドロキシ標準品
Atrazine-desisopropyl-2-hydroxy standard

$C_5H_9N_5O$...155.15 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7313-54-4］

49837-54	DES（C10332300）	残留農薬試験用	100mg	￥30,000

アトラジン-2-ヒドロキシ標準品
Atrazine-2-hydroxy standard

$C_8H_{15}N_5O$...197.23 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2163-68-0］

49837-55	DES（C10333000）	残留農薬試験用	100mg	￥18,000

アトラジン-2-ヒドロキシ-d_5標準液
Atrazine-2-hydroxy-d_5 standard solution

$C_8H_{10}D_5N_5O$...202.26 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1276197-25-1］

100mg/L メタノール溶液

49835-24	DES（XA10333100ME）	残留農薬試験用	1.1mL	￥40,000

(±)-アトロピン-d_3(*N*-メチル-d_3)
(±)-Atropine-d_3 (*N*-methyl-d_3)

$C_{17}H_{20}D_3NO_3$...292.38

49145-54	CDN（D-1861）	99 atom% D	10mg	￥58,300

アトロピン標準液
Atropine standard solution

［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

49160-52	B.P.（10001831）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥89,000

アトロピン *N*-オキシド塩酸塩
Atropine *N*-oxide hydrochloride

$C_{17}H_{23}NO_4$･HCl...341.82
CAS RN® ［4574-60-1］

49871-83	PHY（84121）	天然物化学研究用	10mg	￥35,000

アトロピン硫酸塩一水和物
Atropine sulfate monohydrate

$C_{34}H_{46}N_2O_6$･H_2SO_4･H_2O...694.83
CAS RN® ［5908-99-6］ mp>187℃▲

22668-1A	TFS（22668-0100）		10g	￥17,600
22668-2A	TFS（22668-0250）		25g	￥27,300

アウクビン
Aucubine

$C_{15}H_{22}O_9$...346.32 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［479-98-1］

49060-70	PHY（89163）	天然物化学研究用	20mg	￥60,000

アウランチオ-オブツシン
Aurantio-obtusin

$C_{17}H_{14}O_7$...330.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［67979-25-3］

49869-03	PHY（83276）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

アウラプテン
Aurapten

$C_{19}H_{22}O_3$...298.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［495-02-3］

49060-71	PHY（82481）	天然物化学研究用	20mg	￥55,000

アウリン → *p*-ロゾール酸

アウリントリカルボン酸
Aurintricarboxylic acid

$C_{22}H_{14}O_9$...422.33
CAS RN® ［4431-00-9］

01757-52		G	5g	￥5,100

アベナンスラミドD
Avenanthramide D

$C_{16}H_{13}NO_4$...283.27
CAS RN® ［115610-36-1］

49871-84	PHY（85721）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

アベルメクチン標準品 → アバメクチン標準品

アビクラリン
Avicularin

$C_{20}H_{18}O_{11}$...434.34
CAS RN® ［572-30-5］

49060-72	PHY（80361）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

O-(7-アザベンゾトリアゾール-1-イル)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチルウロニウムヘキサフルオロりん酸塩
O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetramethyluronium hexafluorophosphate

警告

$C_{10}H_{15}N_6O\cdot PF_6$...380.23 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［148893-10-1］

01542-32	>90.0%(HLC)	G	25g	￥24,500
01542-52	>90.0%(HLC)	G	5g	￥10,500
49941-69 NBC（8.51013.0025）			25g	￥14,300

(1*S*,4*R*)-2-アザビシクロ[2.2.1]ヘプタン-3-オン
(1*S*,4*R*)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one

C_6H_9NO...111.14
CAS RN® ［134003-03-5］ mp76.2℃▲

光学純度:98% ee

36222-1A TFS（36222-2500）		250mg	￥20,700

6-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン-7-オン
6-Azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one

C_6H_9NO...111.14
CAS RN® ［22031-52-3］ mp41℃～42℃▲

33583-1A TFS（33583-5000）		500mg	￥25,800

(-)-2-アザビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-3-オン
(-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one

C_6H_7NO...109.12
CAS RN® ［79200-56-9］ mp92℃～100℃†

29704-1A TFS（29704-0010）		1g	￥14,200

(±)-2-アザビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-3-オン
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one

C_6H_7NO...109.12
CAS RN® ［49805-30-3］ mp55℃～59℃▲

29706-2A TFS（29706-0100）		10g	￥23,400

2-アザビシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-3-オン
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one

警告

C_6H_7NO...109.12
CAS RN® [49805-30-3]

01448-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01448-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100

アザコナゾール標準品
Azaconazole standard

$C_{12}H_{11}Cl_2N_3O_2$...300.13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [60207-31-0]

49828-91	DES（C10339000）	残留農薬試験用	100mg	￥14,000

アザ-12-クラウン-4
Aza-12-crown-4

$C_8H_{17}NO_3$...175.22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [41775-76-2] mp52℃～54℃†

27738-1A	TFS（27738-2500）		250mg	￥14,400

5-アザシチジン
5-Azacytidine

$C_8H_{12}N_4O_5$...244.20 [凍] -20℃以下
CAS RN® [320-67-2] mp228℃～230℃(dec.)▲

22662-1A	TFS（22662-0500）		50mg	￥5,100

アザジラクチン
Azadirachtin

$C_{35}H_{44}O_{16}$...720.71 [凍] -20℃以下
CAS RN® [11141-17-6]

49060-73	PHY（89574）	天然物化学研究用	5mg	☆

7-アザインドール
7-Azaindole

$C_7H_6N_2$...118.13
CAS RN® [271-63-6] mp103℃～107℃▲

01445-32		>97.0%(HLC)	G	25g	￥14,500
01445-52		>97.0%(HLC)	G	5g	￥8,000
10510-1A	TFS（10510-0050）			5g	￥12,000
10510-2A	TFS（10510-0010）			1g	￥3,100

アザメチホス標準品
Azamethiphos standard

$C_9H_{10}ClN_2O_5PS$...324.67 [凍] -20℃以下
CAS RN® [35575-96-3]

49827-13	DES（C10340000）	残留農薬試験用	250mg	￥15,000

アザペロール標準品
Azaperol standard

$C_{19}H_{24}FN_3O$...329.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [2804-05-9]

49864-53	DES（C10340500）	食品分析用	10mg	￥20,000

アザペロン標準品
Azaperone standard

$C_{19}H_{22}FN_3O$...327.39 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1649-18-9]

49827-81	DES（C10340510）	食品分析用	50mg	￥48,000

アザペロン-d_4標準品
Azaperone-d_4 standard

$C_{19}H_{18}D_4FN_3O$...331.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1173021-72-1]

49836-25	DES（C10340512）	食品分析用	10mg	￥105,000

アザスピラシド-1標準液(アザスピロ酸-1標準液)
Azaspiracid-1 standard solution

$C_{47}H_{71}NO_{12}$...842.06 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［214899-21-5］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49915-00	NRC（NRC-CRM-AZA1）	0.5mL	☆
49917-00	CIF（CRM-02-AZA1）	0.5mL	☆

アザスピラシド-2標準液(アザスピロ酸-2標準液)
Azaspiracid-2 standard solution

危険

$C_{48}H_{73}NO_{12}$...856.09 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［265996-92-7］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49915-01	NRC（NRC-CRM-AZA2）	0.5mL	☆
49917-01	CIF（CRM-02-AZA2）	0.5mL	☆

アザスピラシド-3標準液(アザスピロ酸-3標準液)
Azaspiracid-3 standard solution

危険

$C_{46}H_{69}NO_{12}$...828.03 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［265996-93-8］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49915-02	NRC（NRC-CRM-AZA3）	0.5mL	☆
49917-02	CIF（CRM-02-AZA3）	0.5mL	☆

アザスピラシド-4標準液(アザスピロ酸-4標準液)
Azaspiracid-4 standard solution

$C_{46}H_{69}NO_{13}$...844.03 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［344422-49-7］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。1.01 μg/mL メタノール溶液

49917-12	CIF（02-AZA4）	0.5mL	☆

アザスピラシド-5標準液(アザスピロ酸-5標準液)
Azaspiracid-5 standard solution

$C_{46}H_{69}NO_{13}$...844.03 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［344422-51-1］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。1.00μg/mL メタノール溶液

49917-13	CIF（02-AZA5）			0.5mL	☆

6-アザウラシル
6-Azauracil

$C_3H_3N_3O_2$...113.07
CAS RN®［461-89-2］ mp274℃～275℃†

01620-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
01620-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000
15397-1A	TFS（15397-0050）		5g	￥12,600

8-アザキサンチン一水和物
8-Azaxanthine monohydrate

$C_4H_3N_5O_2 \cdot H_2O$...171.11
CAS RN®［19344-24-2］ mp>230℃▲

24174-1A	TFS（24174-0050）		5g	￥51,800

アゼライン酸
Azelaic acid

警告

$HOOC(CH_2)_7COOH$...188.22
CAS RN®［123-99-9］ mp107℃～108℃†

01458-32	>95.0%(T)	G	25g	￥2,300

アゼパン-2-オンオキシム
Azepan-2-one oxime

$C_6H_{12}N_2O$...128.17
CAS RN®［19214-08-5］ mp168℃～170℃▲

49242-38	TFS（CD11194DA）	97%	1g	￥20,300

1-アゼパニル(4-ピペリジニル)メタノン
1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanone

$C_{12}H_{22}N_2O$...210.31
CAS RN® [86542-89-4] mp41℃～47℃▲

49242-39	TFS（MO01173EA）	97%		10g	☆
49242-40	TFS（MO01173DA）	97%		1g	￥19,500
49242-41	TFS（MO01173CB）	97%		250mg	￥5,800

アゼチジン
Azetidine

C_3H_7N...57.09 [危] 4-1-II [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [503-29-7] bp61℃～62℃▲ d0.847▲

29673-1A	TFS（29673-2500）	250mg		￥16,500
29673-2A	TFS（29673-0010）	1g		￥49,600

(*S*)-(-)-2-アゼチジンカルボン酸
(*S*)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid

$C_4H_7NO_2$...101.10 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2133-34-8] mp206℃～207℃▲

10514-1A	TFS（10514-0500）	50mg		￥5,700
10514-2A	TFS（10514-1000）	100mg		￥7,100
10514-3A	TFS（10514-2500）	250mg		￥12,900

アゼチジン-3-カルボン酸
Azetidine-3-carboxylic acid

警告

$C_4H_7NO_2$...101.10
CAS RN® [36476-78-5] mp250℃～292℃▲

01457-52	>94.0%		G	5g	￥13,500
01457-62	>94.0%		G	1g	￥5,300

アジジチオン標準品
Azidithion standard

$C_6H_{12}N_5O_2PS_2$...281.30 [凍] -20℃以下
CAS RN® [78-57-9]

49863-13	DES（C10350000）	残留農薬試験用	10mg	￥70,000

アジミドベンゼン → ベンゾトリアゾール

アジムスルフロン標準品
Azimsulfuron standard

$C_{13}H_{16}N_{10}O_5S$...424.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［120162-55-2］

49830-45	DES（C10355000）	残留農薬試験用	10mg	￥58,000

アジンホスエチル標準品
Azinphos-ethyl standard

$C_{12}H_{16}N_3O_3PS_2$...345.38 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［2642-71-9］

49826-07	DES（C10360000）	残留農薬試験用	250mg	￥17,000

アジンホス-エチル-d_{10}(ジエチル-d_{10})
Azinphos-ethyl-d_{10} (diethyl-d_{10})

$C_{12}H_6D_{10}N_3O_3PS_2$...355.44 ［冷］ 0℃～6℃

49149-55	CDN（D-8067）		5mg	￥61,600

アジンホスエチル-d_{10}標準液
Azinphos-ethyl-d_{10} standard solution

$C_{12}H_6D_{10}N_3O_3PS_2$...355.44 ［危］4-1-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃

100mg/L アセトン溶液

49835-25	DES（XA10360100AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥54,000

アジンホスメチル標準品
Azinphos-methyl standard

危険

$C_{10}H_{12}N_3O_3PS_2$...317.33 ［労］57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［86-50-0］

49803-14	DES（C10365000）	残留農薬試験用	250mg	￥11,000

アジンホス-メチル-d$_6$(ジメチル-d$_6$)
Azinphos-methyl-d$_6$ (dimethyl-d$_6$)

$C_{10}H_6D_6N_3O_3PS_2$...323.36 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2118245-28-4］

49149-56	CDN（D-8066）		5mg	￥44,000

アジンホスメチル-d$_6$標準液
Azinphos-methyl-d$_6$ standard solution

$C_{10}H_6D_6N_3O_3PS_2$...323.36 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃

100mg/L アセトン溶液

49836-26	DES（XA10365100AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥54,000

アジプロトリン標準品
Aziprotryne standard

$C_7H_{11}N_7S$...225.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［4658-28-0］

49860-94	DES（C10380000）	残留農薬試験用	250mg	￥21,000

アジスロマイシン二水和物標準品
Azithromycin dihydrate standard

$C_{38}H_{72}N_2O_{12}$...748.98 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［117772-70-0］

49860-80	DES（C10386000）	環境分析用	50mg	￥38,000

アゾベンゼン
Azobenzene

警告

$C_6H_5N{:}NC_6H_5$...182.22
CAS RN® ［103-33-3］ bp293℃† mp68℃†

01460-31		>96.0%(GC)	鹿1級	25g	￥10,500
40154-2A	TFS（40154-0500）			50g	￥21,300

アゾベンゼン標準品
Azobenzene standard

$C_{12}H_{10}N_2$...182.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［103-33-3］

49860-95	DES（C10390000）	残留農薬試験用	500mg	￥6,500

α,α′-アゾビスイソブチロニトリル
α,α′-Azobisisobutyronitrile

危険

$(CH_3)_2C(CN)N{:}NC(CH_3)_2CN$...164.20 ［劇］III ［危］5-AZ-2-II ［PRTR］1-16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［78-67-1］ mp103℃(dec.)†

01467-00	>97.0%(UV-VIS)	鹿特級	G	500g	￥5,000
01467-30	>97.0%(UV-VIS)	鹿特級	G	25g	￥1,600

アゾカルミンG
Azocarmine G

$C_{28}H_{18}N_3O_6S_2Na$...579.58
CAS RN® ［25641-18-3］

01466-32		G	25g	￥9,500

アゾシクロチン標準品
Azocyclotin standard

$C_{20}H_{35}N_3Sn$...436.22 ［労］57-2 ［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［41083-11-8］

49803-56	DES（C10400000）	残留農薬試験用	250mg	￥16,000

4,4′-アゾジアニリン
4,4′-Azodianiline

$NH_2C_6H_4N{:}NC_6H_4NH_2$...212.25
CAS RN® ［538-41-0］ mp238℃～241℃(dec.)†

40158-1A	TFS（40158-0050）	5g	￥39,400
40158-2A	TFS（40158-0250）	25g	￥128,800

1,1′-(アゾジカルボニル)ジピペリジン
1,1′-(Azodicarbonyl)dipiperidine

警告

$C_{12}H_{20}N_4O_2$...252.31
CAS RN® [10465-81-3]

01747-32	>96.0%(HLC)	G	25g	￥19,500
01747-52	>96.0%(HLC)	G	5g	￥6,400

アゾラミド標準品 → イソカルバミド標準品

アゾメチンH
Azomethine H

警告

$C_{17}H_{12}NNaO_8S_2$...445.40 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5941-07-1]

01496-32	>90.0%(as anhydrous)(T)	G	25g	￥19,000
01496-52	>90.0%(as anhydrous)(T)	G	5g	￥6,200

アゾフェニレン → フェナジン

アゾバイオレット溶液(2g/L *N*,*N*-ジメチルホルムアミド溶液)
Azo violet solution, 2g/L in *N*,*N*-dimethylformamide

危険

$NO_2C_6H_4N{:}NC_6H_3(OH)_2$...259.21 [危] 4-2-S-III [労] 有-2,57,57-2 [PRTR] 1-232
CAS RN® [74-39-5] Fp57.8℃†

01807-96	非水滴定用	G	50mL	￥5,500

p-アゾキシアニソール-d_6(*O*,*O*-ジメチル-d_6)
p-Azoxyanisole-d_6 (*O*,*O*-dimethyl-d_6)

$CD_3OC_6H_4N{:}N(O)C_6H_4OCD_3$...264.30
CAS RN® [34172-21-9]

49121-22 CDN（D-1701）	98 atom% D		500mg	￥79,200

アゾキシストロビン標準品
Azoxystrobin standard

危険

$C_{22}H_{17}N_3O_5$...403.38 ［劇］III ［PRTR］1-431 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［131860-33-8］

49826-37	DES（C10413000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

アズレン
Azulene

$C_{10}H_8$...128.16
CAS RN® ［275-51-4］ bp242℃† mp99℃～100.5℃†

10518-1A	TFS（10518-1000）		100mg	￥9,000
10518-2A	TFS（10518-0010）		1g	￥48,900

アズレン標準品
Azulene standard

$C_{10}H_8$...128.16
CAS RN® ［275-51-4］

49796-70	ACC（H-127N）	環境分析用	10mg	￥5,400

アズールII
Azure II

危険

CAS RN® ［37247-10-2］

01475-30		鹿特級	25g	￥23,000
9211-1M	M（1.09211.0010）	顕微鏡用	10g	￥8,220

アズールエオシンメチレンブルー溶液
Azur eosin methyleneblue solution

［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［51811-82-6］ d0.9900▲

29559-1A	TFS（29559-5000）		500mL	￥9,600
29559-2A	TFS（29559-1000）		100mL	￥3,000

アルミン酸バリウム
Barium aluminate

危険

approx.2BaO･Al_2O_3･$5H_2O$ ［劇］III
CAS RN® ［12004-04-5］

04008-01	56.0%～67.0%(as BaO)(G)/17.0%～24.0%(as Al_2O_3)(T)	鹿1級	P	500g	￥54,000

亜硫酸バリウム
Barium sulfite

危険

$BaSO_3$...217.39 ［劇］III
CAS RN® ［7787-39-5］

04053-01	>85.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥16,500

安息香酸
Benzoic acid

危険

C_6H_5COOH...122.12
CAS RN® ［65-85-0］ bp250℃† mp122℃†

04115-10	>99.5%(T)	特級	P	250g	￥5,000
04115-30	>99.5%(T)	特級	G	25g	￥1,600
04115-01	>99.5%(T)	鹿1級	P	500g	￥4,900
04115-33 JQA		発熱量測定用(JCSS)	G	25g	☆

安息香酸
Benzoic acid

危険

C_6H_5COOH...122.12
CAS RN® ［65-85-0］ bp250℃† mp121℃～124℃△

04115-13	>99.3%(T)	医薬部外品原料規格	P	250g	￥5,200

安息香酸
Benzoic acid

警告

C_6H_5COOH...122.12
CAS RN® [65-85-0] bp249℃ mp121℃～123℃ Fp121℃

42347-1A	TFS（42347-0020）	2kg	￥34,200
42347-2A	TFS（42347-0250）	25g	￥3,000
42347-3A	TFS（42347-5000）	500g	￥11,100

安息香酸
Benzoic acid

警告

C_6H_5COOH...122.12
CAS RN® [65-85-0] bp249℃ mp121℃～123℃ Fp121℃

22180-1A	TFS（22180-0010）	1kg	￥19,600
22180-2A	TFS（22180-0050）	5kg	￥71,500
22180-3A	TFS（22180-2500）	250g	￥7,200

安息香酸
Benzoic acid

危険

$C_7H_6O_2$...122.12
CAS RN® [65-85-0]

49871-87	PHY（80021）	天然物化学研究用	100mg	￥22,500

安息香酸-3,5-d_2
Benzoic-3,5-d_2 acid

$C_7H_4D_2O_2$...124.13
CAS RN® [37960-84-2]

49136-48	CDN（D-6472）	98 atom% D	500mg	￥83,600

安息香酸-d_5
Benzoic-d_5 acid

$C_7HD_5O_2$...127.15
CAS RN® [1079-02-3]

49136-49	CDN（D-168）	99 atom% D	5g	￥41,800

安息香酸ナトリウム塩 → 安息香酸ナトリウム

4-[アミノ(チオカルボニル)]ピペリジン-1-カルボン酸ベンジル
Benzyl 4-[amino(thiocarbonyl)]piperidine-1-carboxylate

$C_{14}H_{18}N_2O_2S$...278.37
CAS RN® [167757-46-2] mp128℃～129.5℃▲

49244-11	TFS（MO08071CB）	97%	250mg	￥11,000

安息香酸ベンジル
Benzyl benzoate

警告

$C_6H_5COOCH_2C_6H_5$...212.24 ［危］4-3-III
CAS RN® [120-51-4] bp323℃～324℃† mp21℃† d1.116～1.121△ Fp148℃†

04149-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥5,200

安息香酸ベンジル
Benzyl benzoate

警告

$C_6H_5COOCH_2C_6H_5$...212.24 ［危］4-3-III
CAS RN® [120-51-4] bp323℃ mp18℃～20℃ d1.118 Fp147℃

10586-1A	TFS（10586-0010）	1L	￥10,100
10586-3A	TFS（10586-0051）	5L	￥35,300
10586-4A	TFS（10586-2500）	250mL	￥4,100

安息香酸ベンジル-d$_{12}$
Benzyl benzoate-d$_{12}$

$C_6D_5COOCD_2C_6D_5$...224.31 ［危］4-3-III
CAS RN® ［352431-26-6］

49121-61	CDN（D-5347）	98 atom% D		250mg	￥74,800

安息香酸ベンジル-d$_5$
Benzyl-d$_5$ benzoate

$C_6H_5COOCH_2C_6D_5$...217.27 ［危］4-3-III
CAS RN® ［347840-01-1］

49121-60	CDN（D-3479）	98 atom% D		500mg	￥66,000

安息香酸ベンジル標準品
Benzyl benzoic acid standard

$C_{14}H_{12}O_2$...212.24 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［120-51-4］ bp323℃▲ mp17℃～20℃▲ d1.12▲ Fp148℃▲

49866-72	DES（C10537700）	環境分析用		500mg	￥12,000

アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)
Bis(2-ethylhexyl) adipate

$C_{22}H_{42}O_4$...370.56 ［危］4-4-III
CAS RN® ［103-23-1］ bp417℃† d0.92†

04826-02		>98.0%(GC)	G	500mL	￥2,800
04826-32		>98.0%(GC)	G	25mL	￥1,600
40246-1A	TFS（40246-2500）			250g	￥2,500
40246-2A	TFS（40246-0010）			1kg	￥4,700

アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)標準品 → アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル標準品

アゼライン酸ビス(2-エチルヘキシル)
Bis(2-ethylhexyl) azelate

$C_{25}H_{48}O_4$...412.64 ［危］4-4-III
CAS RN® ［103-24-2］

04827-02		>75.0%(GC)	G	500mL	￥4,100
04827-32		>75.0%(GC)	G	25mL	￥1,400

亜硫酸ビスマス寒天培地
Bismuth sulphite agar (modified Wilson & Blair medium)

711201-5	Oxd（CM0201B）			500g	￥26,000

アセト酢酸 *t e r t*-ブチル
tert-Butyl acetoacetate

警告

$C_8H_{14}O_3$...158.19 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1694-31-1］ bp190℃▲ d0.97▲

04465-02		>97.0%(GC)		500mL	￥11,000
10778-1A	TFS（10778-1000）			100mL	￥3,600
10778-3A	TFS（10778-5000）			500mL	￥15,700

アクリル酸 *n*-ブチル
n-Butyl acrylate

危険

CH_2:$CHCOO(CH_2)_3CH_3$...128.16 ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-7 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［141-32-2］ bp148℃† d(20/4℃) 0.900† Fp36.5℃†

stabilized with *p*-methoxyphenol

04353-00		>99.0%(GC)	鹿特級	500mL	￥3,200
04353-30		>99.0%(GC)	鹿特級	25mL	￥2,100

4-(3-アミノベンジル)ピペラジン-1-カルボン酸 *t e r t*-ブチル
tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate

$C_{16}H_{25}N_3O_2$...291.38
CAS RN® ［361345-40-6］ mp107℃～108℃▲

49249-55	TFS（CC30414DE）	97%	5g	￥99,000
49249-56	TFS（CC30414DA）	97%	1g	￥31,300
49249-57	TFS（CC30414CB）	97%	250mg	￥11,800

(3*R*)-3-アミノブタン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl (3*R*)-3-aminobutanoate

$C_8H_{17}NO_2$...159.22
CAS RN® [158849-23-1] bp50℃(0.7mm)▲

33795-2A	TFS（33795-5000）		500mg	￥52,200

(3*S*)-3-アミノブタン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl (3*S*)-3-aminobutanoate

$C_8H_{17}NO_2$...159.22
CAS RN® [161105-54-0]

33794-1A	TFS（33794-1000）		100mg	￥18,600
33794-2A	TFS（33794-2500）		250mg	￥37,500

4-(アミノカルボニル)テトラヒドロピリジン-1(2*H*)-カルボン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridine-1(2*H*)-carboxylate

$C_{11}H_{20}N_2O_3$...228.28
CAS RN® [91419-48-6] mp163℃～164℃▲

49249-58	TFS（TL00951EB）	97%	25g	￥59,800
49249-59	TFS（TL00951EA）	97%	10g	￥33,500
49249-60	TFS（TL00951DA）	97%	1g	￥5,500

4-(アミノカルボチオイル)テトラヒドロピリジン-1(2*H*)-カルボン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2*H*)-carboxylate

$C_{11}H_{20}N_2O_2S$...244.35
CAS RN® [214834-18-1] mp122℃～124℃▲

49249-61	TFS（TL00952EB）	95%	25g	☆
49249-62	TFS（TL00952EA）	95%	10g	￥68,600
49249-63	TFS（TL00952DA）	95%	1g	￥13,700

(3*R*)-3-アミノ-5-メチルヘキサン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl (3*R*)-3-amino-5-methylhexanoate

$C_{11}H_{23}NO_2$...201.30 [凍] -20℃以下
CAS RN® [166023-29-6]

33792-1A	TFS（33792-1000）		100mg	￥18,900

(3*S*)-3-アミノ-5-メチルヘキサン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl (3*S*)-3-amino-5-methylhexanoate

$C_{11}H_{23}NO_2$...201.30 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［166023-30-9］

33793-1A	TFS（33793-1000）		100mg	￥18,300

N-[4-(アミノメチル)フェニル]カルバミン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl *N*-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate

$C_{12}H_{18}N_2O_2$...222.28
CAS RN® ［220298-96-4］ mp89℃～94℃▲

49249-64	TFS（MO01028EA）	95%	10g	☆
49249-65	TFS（MO01028DA）	95%	1g	￥38,400
49249-66	TFS（MO01028CB）	95%	250mg	￥13,200

4-[4-(アミノメチル)フェニル]テトラヒドロ-1(2*H*)-ピラジンカルボン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl 4-[4-(aminomethyl)phenyl]tetrahydro-1(2*H*)-pyrazinecarboxylate

$C_{16}H_{25}N_3O_2$...291.38
CAS RN® ［852180-47-3］ mp83℃～87℃▲

49249-67	TFS（CC30013DA）	90%	1g	￥40,600

4-(2-アミノフェノキシ)テトラヒドロ-1(2*H*)-ピリジンカルボン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl 4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2*H*)-pyridinecarboxylate

$C_{16}H_{24}N_2O_3$...292.37
CAS RN® ［690632-14-5］ mp71℃～78℃▲

49249-68	TFS（MO07069DA）	97%	1g	￥58,100

(3*S*)-3-アミノ-4-フェニルブタン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl (3*S*)-3-amino-4-phenylbutanoate

$C_{14}H_{21}NO_2$...235.32
CAS RN® ［120686-17-1］

34446-1A	TFS（34446-1000）		100mg	￥24,100
34446-2A	TFS（34446-5000）		500mg	￥83,600

(3*R*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl (3*R*)-3-amino-3-phenylpropanoate

$C_{13}H_{19}NO_2$...221.29
CAS RN® [161671-34-7]

33788-2A	TFS（33788-2500）		250mg	￥34,100

(3*S*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl (3*S*)-3-amino-3-phenylpropanoate

$C_{13}H_{19}NO_2$...221.29 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® [120686-18-2]

33789-2A	TFS（33789-2500）		250mg	￥36,500

4-(2-アミノフェニル)テトラヒドロ-1(2*H*)-ピラジンカルボン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2*H*)-pyrazinecarboxylate

$C_{15}H_{23}N_3O_2$...277.36
CAS RN® [170017-74-0] mp120℃～122℃▲

49249-70	TFS（CC30714DA）	97%	1g	￥32,100
49249-71	TFS（CC30714CB）	97%	250mg	￥15,400

2-アミノ-2-チオキソエチルカルバミン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate

$C_7H_{14}N_2O_2S$...190.26
CAS RN® [89226-13-1] mp129℃～131℃▲

49249-72	TFS（MO07925EA）	90%	10g	☆
49249-73	TFS（MO07925DA）	90%	1g	￥16,500

N-(3-アミノ-3-チオキソプロピル)カルバミン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl *N*-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate

$C_8H_{16}N_2O_2S$...204.29
CAS RN® [77152-97-7] mp109℃～112℃▲

49249-74	TFS（SPB08402EA）	97%	10g	☆
49249-75	TFS（SPB08402DE）	97%	5g	☆
49249-76	TFS（SPB08402DA）	97%	1g	￥29,600

安息香酸ｉｓｏ-ブチル → 安息香酸イソブチル

安息香酸 *n*-ブチル
n-Butyl benzoate

警告

$C_6H_5COOCH_2(CH_2)_2CH_3$...178.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［136-60-7］ bp250.3℃† mp-22℃† d1.003～1.008△ Fp107℃†

04372-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥5,700

安息香酸カルシウム三水和物
Calcium benzoate trihydrate

$Ca(C_6H_5COO)_2 \cdot 3H_2O$...336.34
CAS RN® ［5743-30-6］

07044-01	95.0%～110.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥10,000

亜硝酸カルシウム一水和物
Calcium nitrite monohydrate

危険

$Ca(NO_2)_2 \cdot H_2O$...150.10 ［劇］III
CAS RN® ［10031-34-2］

07084-01	>90.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥20,000

亜りん酸カルシウム一水和物
Calcium phosphite monohydrate

$CaPHO_3 \cdot H_2O$...138.07
CAS RN® ［21056-98-4］

07094-01	>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥18,000

亜硫酸カルシウム・0.5水
Calcium sulfite 0.5-water

警告

$CaSO_3 \cdot 1/2H_2O$...129.15
CAS RN® ［29501-28-8］

07110-01	>90.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥7,000

亜塩素酸イオン標準液
Chlorite ion standard solution

警告

CAS RN® [7758-19-2]

$NaClO_2$水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

08170-96	ClO_2^-:1000mg/L	JCSS化学分析用(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用)	G	100mL	￥8,500

安息香酸コレステリル
Cholesteryl benzoate

$C_6H_5COOC_{27}H_{45}$...490.75
CAS RN® [604-32-0] mp149℃～151℃ †

07750-51		鹿1級	G	5g	￥5,400
11020-1A	TFS（11020-0250）			25g	￥8,000

亜硝酸コバルト(III)ナトリウム → ヘキサニトロコバルト(III)酸ナトリウム

安息香酸銅(II)(無水)(安息香酸第二銅)
Copper(II) benzoate, anhydrous

警告

$Cu(C_6H_5COO)_2$...305.77 ［労］57,57-2
CAS RN® [533-01-7]

07481-01	>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥15,000

アンゲリカ酸デクルシノール
Decursinol angelate

$C_{19}H_{20}O_5$...328.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [130848-06-5]

49872-54	PHY（84209）	天然物化学研究用		10mg	￥60,000

アゾジカルボン酸ジベンジル
Dibenzyl azodicarboxylate

警告

$C_{16}H_{14}N_2O_4$...298.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2449-05-0］ mp44℃～52℃▲

27027-1A	TFS（27027-0250）		25g	￥21,100
27027-2A	TFS（27027-0050）		5g	￥6,300

アゾジカルボン酸ジ-ｔｅｒｔ-ブチル
Di-*tert*-butyl azodicarboxylate

警告

$C_{10}H_{18}N_2O_4$...230.26 ［危］5-AZ-2-II
CAS RN® ［870-50-8］

10087-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥14,500
10087-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥5,200

亜りん酸ジブチル
Dibutyl phosphite

$[CH_3(CH_2)_3O]_2P(O)H$...194.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1809-19-4］ bp118℃～119℃(11mm)▲ d0.995▲

15506-2A	TFS（15506-1000）		100g	￥5,000
15506-3A	TFS（15506-5000）		500g	￥15,800

アセトアミドマロン酸ジエチル
Diethyl acetamidomalonate

$C_9H_{15}NO_5$...217.21
CAS RN® ［1068-90-2］ mp93℃～96℃†

10644-02	>95.0%(HLC)	G	500g	￥16,000
10644-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥3,400
11393-1A	TFS（11393-1000）		100g	￥5,200
11393-2A	TFS（11393-0250）		25g	￥2,800
11393-3A	TFS（11393-5000）		500g	￥21,300

1,3-アセトンジカルボン酸ジエチル
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate

$C_9H_{14}O_5$...202.20 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［105-50-0］ bp250℃▲ d1.112▲

32563-1A	TFS（32563-0500）	50mL	￥6,300
32563-2A	TFS（32563-2500）	250mL	￥20,000

アセチレンジカルボン酸ジエチル
Diethyl acetylenedicarboxylate

危険

$C_8H_{10}O_4$...170.16 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［762-21-0］ bp107℃～110℃(11mm)▲

29635-1A	TFS（29635-1000）	100g	￥28,800
29635-2A	TFS（29635-0250）	25g	￥9,900

アセチルこはく酸ジエチル
Diethyl acetylsuccinate

$C_{10}H_{16}O_5$...216.23 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1115-30-6］ mp-8℃▲ d1.08▲

11395-1A	TFS（11395-0250）	25g	￥8,000
11395-2A	TFS（11395-1000）	100g	￥25,100

アジピン酸ジエチル
Diethyl adipate

$(CH_2CH_2COOC_2H_5)_2$...202.24 ［危］4-3-III
CAS RN® ［141-28-6］ bp245℃† mp-20℃～-19℃† d1.004～1.009△

10205-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥5,200
10205-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,200

アジピン酸ジエチル
Diethyl adipate

$(CH_2CH_2COOC_2H_5)_2$...202.24 ［危］4-3-III
CAS RN® ［141-28-6］ bp132℃ mp18℃ d1 Fp>110℃

40717-2A	TFS（40717-1000）	100g	￥3,600
40717-3A	TFS（40717-5000）	500g	￥9,900

アリルマロン酸ジエチル
Diethyl allylmalonate

$C_{10}H_{16}O_4$...200.23 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2049-80-1］ bp222℃～223℃▲ d1.015▲

11396-1A	TFS（11396-1000）	100g	￥12,700
11396-2A	TFS（11396-5000）	500g	￥92,400

アリルりん酸ジエチル
Diethyl allylphosphonate

$C_7H_{15}O_3P$...178.16
CAS RN® ［1067-87-4］ bp97℃(0.03mm)▲

33611-1A	TFS（33611-0050）	5g	￥10,100
33611-2A	TFS（33611-0250）	25g	￥36,900

4-アミノベンジルりん酸ジエチル
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate

$C_{11}H_{18}NO_3P$...243.23
CAS RN® ［20074-79-7］ mp90℃～94℃▲

11401-1A	TFS（11401-0050）	5g	￥9,500
11401-2A	TFS（11401-0250）	25g	￥42,400

アミノマロン酸ジエチル塩酸塩
Diethyl aminomalonate hydrochloride

警告

$(H_5C_2OOC)_2CHNH_2 \cdot HCl$...211.64
CAS RN® ［13433-00-6］ mp166℃(dec.)†

10226-02	>95.0%	G	500g	￥21,500
10226-32	>95.0%	G	25g	￥3,100
11404-1A	TFS（11404-0250）		25g	￥7,900

5-アミノ-3-メチル-2,4-チオフェンジカルボン酸ジエチル
Diethyl 5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate

$C_{11}H_{15}NO_4S$...257.30
CAS RN® ［4815-30-9］ mp103℃～108℃▲

17023-1A	TFS（17023-0100）	10g	￥6,000

アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル → アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)

アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル標準品
Di-2-ethylhexyl adipate standard

$C_{22}H_{42}O_4$...370.56 ［危］4-4-III
CAS RN® ［103-23-1］ mp<-70℃† d0.925†

11382-96	>99.0%(GC)	環境分析用	G	500mg	￥2,700

アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル-d_8
Di-2-ethylhexyl adipate-d_8

$(CD_2CD_2COOC_8H_{17})_2$...378.61 ［危］4-4-III ［冷］ 0℃～6℃

11431-96	>90.0%(GC)	環境分析用	G	50mg	￥30,000

亜りん酸ジエチル
Diethyl phosphite

警告

$(C_2H_5O)_2P(O)H$...138.10 ［危］4-3-S-III ［化兵］-2
CAS RN® ［762-04-9］ d(20/4℃) 1.074† Fp92℃†

air/moisture sensitive

11263-25	>95.0%(GC)	Organics	G	100mL	￥9,500
11450-1A	TFS（11450-2500）			250g	￥5,300
11450-2A	TFS（11450-0010）			1kg	￥15,900

亜硫酸ジエチル
Diethyl sulfite

$C_4H_{10}O_3S$...138.18 ［危］4-2-III
CAS RN® ［623-81-4］ bp158℃～160℃▲ d1.88▲

20993-1A	TFS（20993-0100）			10g	￥2,400

アジピン酸ジイソデシル
Diisodecyl adipate

$C_{26}H_{50}O_4$...426.67 ［危］4-4-III
CAS RN® ［27178-16-1］

10203-02			G	500mL	￥4,100
10203-32			G	25mL	￥1,600

アジピン酸ジイソノニル
Diisononyl adipate

$C_{24}H_{46}O_4$...398.61 ［危］4-4-III
CAS RN® ［33703-08-1］

10204-02		G	500mL	￥5,100
10204-32		G	25mL	￥1,500

アゾジカルボン酸ジイソプロピル
Diisopropyl azodicarboxylate

$C_8H_{14}N_2O_4$...202.20 ［危］5-AZ-2-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2446-83-5］ d1.0200▲

32756-1A	TFS（32756-1000）		100g	￥23,000
32756-2A	TFS（32756-0250）		25g	￥8,100
32756-3A	TFS（32756-0050）		5g	￥6,300

亜りん酸ジイソプロピル
Diisopropyl phosphite

$[(CH_3)_2CHO]_2P(O)H$...166.15 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1809-20-7］ bp71℃(8mm)▲ d0.997▲

11247-52		>98.0%(GC)	G	5g	￥4,300
11247-62		>98.0%(GC)	G	1g	￥3,500
11526-1A	TFS（11526-1000）			100g	￥16,500

1,3-アセトンジカルボン酸ジメチル
Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate

警告

$C_7H_{10}O_5$...174.15 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1830-54-2］ d1.18▲

11570-1A	TFS（11570-0250）		25g	￥4,200
11570-2A	TFS（11570-1000）		100g	￥11,500

アセチレンジカルボン酸ジメチル
Dimethyl acetylenedicarboxylate

危険

$C_6H_6O_4$...142.10 ［危］4-3-III
CAS RN® ［762-42-5］ bp95℃～98℃(19mm)▲ d1.16▲

10492-32		>96.0%(GC)		25mL	￥5,300
11571-1A	TFS（11571-0250）			25g	￥7,000
11571-2A	TFS（11571-0050）			5g	￥2,800
11571-3A	TFS（11571-1000）			100g	￥20,700

アジピン酸ジメチル
Dimethyl adipate

$(CH_2CH_2COOCH_3)_2$...174.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［627-93-0］ mp7℃～9℃▲ d(20/20℃) 1.06† Fp102℃†

10308-30		>98.0%(GC)	鹿特級	25g	￥2,800
18131-1A	TFS（18131-1000）			100g	￥2,600
18131-2A	TFS（18131-5000）			500g	￥8,000

アジピン酸ジメチル-2,2,5,5-d_4
Dimethyl adipate-2,2,5,5-d_4

$C_8H_{10}D_4O_4$...178.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［76785-05-2］

49138-91	CDN（D-6812）	99 atom% D	500mg	￥66,000

アリルホスホン酸ジメチル
Dimethyl allylphosphonate

$C_5H_{11}O_3P$...150.11
CAS RN® ［757-54-0］ bp41℃～42℃(0.5mm)▲

33068-1A	TFS（33068-0010）	1g	￥7,300

アミノテレフタル酸ジメチル
Dimethyl aminoterephthalate

$C_{10}H_{11}NO_4$...209.19
CAS RN® ［5372-81-6］ mp131℃～134℃▲

19478-1A	TFS（19478-0250）	25g	￥6,600
19478-2A	TFS（19478-0500）	50g	￥13,300

亜硫酸ジメチル
Dimethyl sulfite

警告

$(CH_3O)_2SO$...110.13 ［危］4-2-III
CAS RN® ［616-42-2］ bp126℃～127℃† d(20/20℃) 1.21† Fp31℃†

11010-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥8,500

亜りん酸ジフェニル
Diphenyl phosphite

$(C_6H_5O)_2P(:O)H$...234.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［4712-55-4］ mp12℃† d1.223†

contains varying amounts of phenol and triphenyl phosphite

11739-1A	TFS（11739-5000）		500g	￥7,900
11739-2A	TFS（11739-0010）		1kg	￥12,800
11739-3A	TFS（11739-0050）		5g	￥5,100

アクリル酸ドデシル
Dodecyl acrylate

警告

$C_{15}H_{28}O_2$...240.38 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2156-97-0］

polymerization inhibited with 4-Methoxyphenol

10818-02	>96.0%(GC)	G	500mL	￥8,500
10818-32	>96.0%(GC)	G	25mL	￥1,800

l-アドレナリン
l-Adrenaline

危険

$(OH)_2C_6H_3CH(OH)CH_2NHCH_3$...183.20 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［51-43-4］ mp208℃～211℃

20440-2A	TFS（20440-0010）	1g	￥5,800
20440-3A	TFS（20440-0050）	5g	￥13,900
20440-4A	TFS（20440-0250）	25g	￥54,300

3-安息香酸17β-エストラジオール-16,16,17-d_3
17β-Estradiol-16,16,17-d_3 3-benzoate

CAS RN®［1192354-74-7］

49146-28	CDN（D-7054）	98 atom% D	5mg	￥52,800

2-アミノエタノール
2-Aminoethanol

危険

$H_2NCH_2CH_2OH$...61.08 ［劇］III［危］4-3-S-III［労］57,57-2［PRTR］1-20
CAS RN®［141-43-5］bp170℃ mp10.3℃ d1.012 Fp92℃

14958-1A	TFS（14958-0010）	1L	￥6,900
14958-2A	TFS（14958-0025）	2.5L	￥11,400
14958-3A	TFS（14958-0250）	25L	￥49,700
14958-4A	TFS（14958-2500）	250mL	￥2,800

アクリル酸2-(2-エトキシエトキシ)エチル
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate

警告

$C_9H_{16}O_4$...188.22 ［危］4-3-III
CAS RN®［7328-17-8］

polymerization inhibited with 4-Methoxyphenol

14146-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥9,500
14146-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥2,200

アセト酢酸エチル → 3-オキソブタン酸エチル

アクリル酸エチル
Ethyl acrylate

危険

CH_2:$CHCOOC_2H_5$...100.11 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］1-3
CAS RN®［140-88-5］bp99.5℃† mp-71℃† d(20/20℃) 0.923† Fp10℃†

14031-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,200

アクリル酸エチル-d_5
Ethyl-d_5 acrylate

$C_5H_3D_5O_2$...105.14 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-3 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［35717-06-7］

49139-41	CDN（D-6793）	99 atom% D	100mg	￥61,600

4-アミノ安息香酸エチルエステル標準品
4-Aminobenzoic acid ethyl ester standard (Benzocaine)

$C_9H_{11}NO_2$...165.18
CAS RN® ［94-09-7］ bp172℃ mp89℃～92℃ Fp>100℃

15078-2A	TFS（15078-1000）	100g	￥4,700
15078-3A	TFS（15078-5000）	500g	￥16,700

4-アミノ安息香酸-2,3,5,6-d_4エチル
Ethyl 4-aminobenzoate-2,3,5,6-d_4

$H_2NC_6D_4COOCH_2CH_3$...169.21
CAS RN® ［342611-08-9］

49144-61	CDN（D-1952）	98 atom% D	100mg	￥61,600

m-アミノ安息香酸エチル
Ethyl *m*-aminobenzoate

$NH_2C_6H_4COOC_2H_5$...165.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［582-33-2］ d(20/20℃) 1.13▲

11799-1A	TFS（11799-0250）	25g	￥15,000
11799-2A	TFS（11799-0050）	5g	￥4,300

o-アミノ安息香酸エチル → アントラニル酸エチル

p-アミノ安息香酸エチル
Ethyl *p*-aminobenzoate

危険

$H_2NC_6H_4COOC_2H_5$...165.18
CAS RN® ［94-09-7］ mp88℃～90℃†

14046-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥7,000
14046-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,800

4-アミノ安息香酸エチル-d_5
Ethyl-d_5 4-aminobenzoate

$C_9H_6D_5NO_2$...170.21
CAS RN® [1219803-76-5]

49144-62	CDN（D-6864）	99 atom% D	100mg	￥52,800

3-アミノ安息香酸エチルエステルメタンスルホン酸塩
Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonic acid salt

$NH_2C_6H_4COOC_2H_5 \cdot CH_3SO_3H$...261.29
CAS RN® [886-86-2] mp149℃～150℃†

11800-1A	TFS（11800-0500）		50g	￥20,000
11800-2A	TFS（11800-0100）		10g	￥5,900

3-*exo*-アミノビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2-*exo*-カルボン酸エチル塩酸塩
Ethyl 3-*exo*-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-*exo*-carboxylate hydrochloride

$C_{10}H_{15}NO_2 \cdot HCl$...217.69
CAS RN® [104770-18-5] mp129℃～132℃▲

26573-1A	TFS（26573-2500）		250mg	￥56,900

2-アミノ-4-(4-ブロモフェニル)-3-チオフェンカルボン酸エチル
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)-3-thiophenecarboxylate

$C_{13}H_{12}BrNO_2S$...326.21
CAS RN® [306934-99-6] mp120℃～122℃▲

49257-01	TFS（CC00243EA）	97%	10g	￥61,700
49257-02	TFS（CC00243DA）	97%	1g	￥8,000

3-アミノ-2-ブテン酸エチル
Ethyl 3-amino-2-butenoate

警告

$C_6H_{11}NO_2$...129.15 ［危］4-3-III
CAS RN® [7318-00-5] mp33℃～35℃▲

11803-1A	TFS（11803-1000）		100g	￥7,700
11803-2A	TFS（11803-5000）		500g	￥29,400

2-アミノ-4-(4-クロロフェニル)-3-チオフェンカルボン酸エチル
Ethyl 2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate

$C_{13}H_{12}ClNO_2S$...281.75
CAS RN® [65234-09-5] mp111℃～112℃▲

49257-03	TFS（MO07018EA）	97%	10g	￥57,600
49257-04	TFS（MO07018DA）	97%	1g	￥8,200

3-アミノクロトン酸エチル → 3-アミノ-2-ブテン酸エチル

c i s-2-アミノ-1-シクロヘキサンカルボン酸エチル塩酸塩
Ethyl *cis*-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride

$C_9H_{17}NO_2 \cdot HCl$...207.69
CAS RN® [1127-99-7] mp128℃～135℃▲

26564-1A	TFS（26564-0010）	1g	￥41,300
26564-2A	TFS（26564-0025）	2.5g	￥83,000

t r a n s-2-アミノ-1-シクロヘキサンカルボン酸エチル塩酸塩
Ethyl *trans*-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride

$C_9H_{17}NO_2 \cdot HCl$...207.69
CAS RN® [28250-14-8] mp151℃～155℃▲

26565-2A	TFS（26565-0010）	1g	￥55,300

2-アミノ-1-シクロヘキセン-1-カルボン酸エチル
Ethyl 2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate

$C_9H_{15}NO_2$...169.22
CAS RN® [1128-00-3] mp70℃～73℃▲

33426-1A	TFS（33426-0010）	1g	￥31,400

c i s-2-アミノ-4-シクロヘキセン-1-カルボン酸エチル塩酸塩
Ethyl *cis*-2-amino-4-cyclohexene-1-carboxylate hydrochloride

$C_9H_{15}NO_2 \cdot HCl$...205.68
CAS RN® [57266-61-2] mp99℃～103℃▲

27779-1A	TFS（27779-2500）	250mg	￥29,300

ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-2-アミノ-4-シクロヘキセン-1-カルボン酸エチル塩酸塩
Ethyl *trans*-2-amino-4-cyclohexene-1-carboxylate hydrochloride

$C_9H_{16}ClNO_2$...205.68
CAS RN® [142547-16-8] mp107℃～109℃▲

33441-1A	TFS（33441-0010）		1g	￥67,200

ｃ ｉ ｓ-2-アミノ-1-シクロペンタンカルボン酸エチル塩酸塩
Ethyl *cis*-2-amino-1-cyclopentanecarboxylate hydrochloride

$C_8H_{15}NO_2$･HCl...193.67
CAS RN® [142547-15-7] mp97℃～100℃▲

29839-1A	TFS（29839-2500）		250mg	￥12,300

2-アミノ-6-フルオロ-3-ニトロ安息香酸エチル
Ethyl 2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate

$C_9H_9FN_2O_4$...228.17
CAS RN® [150368-37-9]

14199-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥15,000
14199-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,500

5-アミノ-1-(4-フルオロフェニル)-1*H*-ピラゾール-4-カルボン酸エチル
Ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1*H*-pyrazole-4-carboxylate

$C_{12}H_{12}FN_3O_2$...249.24
CAS RN® [138907-68-3] mp153℃～154℃▲

49257-08	TFS（RH00119EB）	97%	25g	☆
49257-09	TFS（RH00119EA）	97%	10g	￥46,900
49257-10	TFS（RH00119DA）	97%	1g	￥6,300

5-アミノ-3-メチルイソチアゾール-4-カルボン酸エチル
Ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate

$C_7H_{10}N_2O_2S$...186.23
CAS RN® [34859-65-9] mp111℃～113℃▲

49257-14	TFS（KM04205DE）	97%	5g	☆
49257-15	TFS（KM04205DA）	97%	1g	￥51,800
49257-16	TFS（KM04205CB）	97%	250mg	￥20,800

2-アミノ-5-メチル-4-フェニルチオフェン-3-カルボン酸エチル
Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate

$C_{14}H_{15}NO_2S$...261.34
CAS RN®［4815-37-6］ mp92℃～93℃▲

49257-17	TFS（AW00937DA）	97%		1g	￥7,100

5-アミノ-1-メチルピラゾール-4-カルボン酸エチル
Ethyl 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate

$C_7H_{11}N_3O_2$...169.18
CAS RN®［31037-02-2］ mp98℃～102℃▲

35518-1A	TFS（35518-0010）			1g	￥4,500

2-アミノ-4-メチルチオフェン-3-カルボン酸エチル
Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate

$C_8H_{11}NO_2S$...185.24
CAS RN®［43088-42-2］ mp80℃～86℃▲

49257-19	TFS（GK00116DA）	97%		1g	￥4,700

4-アミノ-2-ニトロ安息香酸エチル
Ethyl 4-amino-2-nitrobenzoate

$C_9H_{10}N_2O_4$...210.18
CAS RN®［84228-46-6］

14207-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥26,500
14207-62		>95.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

(*R*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン酸エチル塩酸塩 → (*R*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン酸エチルエステル塩酸塩

(*S*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン酸エチル塩酸塩 → (*S*)-3-アミノ-3-フェニルプロパン酸エチルエステル塩酸塩

2-アミノ-4-フェニル-5-チアゾールカルボン酸エチル
Ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate

$C_{12}H_{12}N_2O_2S$...248.30
CAS RN® [64399-23-1] mp166℃～169℃▲

16222-1A	TFS（16222-0025）		2.5g	￥10,700

2-アミノ-4-チアゾール酢酸エチル
Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate

$C_7H_{10}N_2O_2S$...186.23
CAS RN® [53266-94-7] mp92℃～95℃▲

20530-1A	TFS（20530-0500）		50g	￥5,600
20530-2A	TFS（20530-0050）		5g	￥4,900

2-アミノ-1,3-チアゾール-4-カルボン酸エチル
Ethyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate

$C_6H_8N_2O_2S$...172.20
CAS RN® [5398-36-7] mp177℃～178℃▲

14105-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
14105-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

7-アミノチエノ[2,3-*b*]ピラジン-6-カルボン酸エチル
Ethyl 7-aminothieno[2,3-*b*]pyrazine-6-carboxylate

$C_9H_9N_3O_2S$...223.25
CAS RN® [56881-21-1] mp119.5℃～120℃▲

49257-23	TFS（KM04925DA）	>97.0%	1g	￥34,800

2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)ピリミジン-5-カルボン酸エチル
Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate

警告

$C_8H_8F_3N_3O_2$...235.16
CAS RN® [149771-09-5]

14223-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥22,000
14223-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,500

アントラニル酸エチル
Ethyl anthranilate

警告

$NH_2C_6H_4COOC_2H_5$...165.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［87-25-2］ bp260℃† mp13℃～15℃† d(20/20℃) 1.12▲

14045-31		>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,200
22223-1A	TFS（22223-1000）				100g	￥6,100
22223-3A	TFS（22223-5000）				500g	￥15,700

安息香酸エチル
Ethyl benzoate

警告

$C_6H_5COOC_2H_5$...150.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［93-89-0］ bp213.2℃† mp-34℃† d(20/20℃) 1.051†

14055-00		>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥3,300

安息香酸エチル
Ethyl benzoate

警告

$C_6H_5COOC_2H_5$...150.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［93-89-0］ bp212℃ mp34℃ d1.045 Fp84℃

11809-1A	TFS（11809-0025）				2.5kg	￥15,700
11809-3A	TFS（11809-5000）				500g	￥3,500

アクリル酸エチレングリコールメチルエーテル
Ethylene glycol methyl ether acrylate

$C_6H_{10}O_3$...130.14 ［危］4-2-III
CAS RN® ［3121-61-7］ d1.01▲

33516-1A	TFS（33516-2500）				250mL	￥4,800
33516-2A	TFS（33516-0010）				1L	￥16,600

アクリル酸2-エチルヘキシル
2-Ethylhexyl acrylate

警告

CH_2:$CHCOOCH_2CH(C_2H_5)CH_2(CH_2)_2CH_3$...184.27 ［危］4-3-III
CAS RN® ［103-11-7］ bp214℃† d0.882～0.887△ Fp91℃†

monomer

14524-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,600
14524-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,800

アラビアゴム末
Gum arabic, powder

警告

CAS RN® ［9000-01-5］

17060-01		鹿1級	P	500g	￥5,100

アラビアゴム末
Gum arabic, powder

警告

CAS RN® ［9000-01-5］ d1.35

25885-1A	TFS（25885-0010）			1kg	￥12,900
25885-2A	TFS（25885-0025）			2.5kg	￥26,600
25885-3A	TFS（25885-2500）			250g	￥4,900

アクリル酸1 *H*,1 *H*,2 *H*,2 *H*-ヘプタデカフルオロデシル
1*H*,1*H*,2*H*,2*H*-Heptadecafluorodecyl acrylate

警告

$C_{13}H_7F_{17}O_2$...518.16 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［27905-45-9］ bp100℃(4mm)▲

18233-32		>97.0%(GC)	G	25mL	￥11,000
34861-1A	TFS（34861-0050）			5g	￥9,300

アクリル酸4-ヒドロキシブチル
4-Hydroxybutyl acrylate

警告

$C_7H_{12}O_3$...144.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2478-10-6］

polymerization inhibited with 4-Methoxyphenol

18022-02	>97.0%(GC)		G	500mL	￥14,000
18022-32	>97.0%(GC)		G	25mL	￥2,300

アクリル酸2-ヒドロキシエチル
2-Hydroxyethyl acrylate

危険

CH_2:$CHCOOCH_2CH_2OH$...116.11 ［毒］II ［危］4-3-III ［PRTR］1-6 ［変］
CAS RN® ［818-61-1］ d1.011† Fp104℃†

18695-01	>93.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥3,000

安息香酸 *m*-ヒドロキシフェニル
m-Hydroxyphenyl benzoate

警告

$C_6H_5COOC_6H_4OH$...214.21
CAS RN® ［136-36-7］ mp135℃†

36008-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,000

47mmアルミニウム製インラインフィルターホルダー
47mm In-line filter holder, aluminium

97006-86	PALL（1235）	濾過用		1pack	￥95,900

アイオキシニル標準品
Ioxynil standard

危険

$C_7H_3I_2NO$...370.91 ［劇］III ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1689-83-4］

49803-35	DES（C14350000）	残留農薬試験用		100mg	￥11,000

アイオキシニルオクタノエート標準品
Ioxynil octanoate standard

警告

$C_{15}H_{17}I_2NO_2$...497.10 ［労］57,57-2［PRTR］1-236 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［3861-47-0］ mp59℃～60℃†

49835-14	DES（C14360000）	残留農薬試験用		100mg	￥16,000

アクリル酸イソボルニル
Isobornyl acrylate

警告

$C_{13}H_{20}O_2$...208.29 ［危］4-3-III
CAS RN®［5888-33-5］

polymerization inhibited with 4-Methoxyphenol

20009-02	>93.0%(GC)		G	500mL	￥8,000
20009-32	>93.0%(GC)		G	25mL	￥1,600

安息香酸イソブチル
Isobutyl benzoate

警告

$C_6H_5COOCH_2CH(CH_3)_2$...178.22 ［危］4-3-III
CAS RN®［120-50-3］bp237℃† d0.996～1.001△ Fp120℃†

04373-30	>98.0%(HLC)	鹿特級	G	25g	￥4,600

アイソナノチューブ-M 70%
IsoNanotubes-M™ 70% powder

49104-82	NI			1mg	☆

アイソナノチューブ-M 95%
IsoNanotubes-M™ 95% powder

49104-83	NI			1mg	☆

アイソナノチューブ-M 98%
IsoNanotubes-M™ 98% powder

49104-84	NI	1mg	☆

アイソナノチューブ-M 99%
IsoNanotubes-M™ 99% powder

49104-85	NI	1mg	☆

アイソナノチューブ-M 70%溶液
IsoNanotubes-M™ 70% solution

Nanotube concentration:0.01mg/mL

49104-78	NI	100mL	☆

アイソナノチューブ-M 95%溶液
IsoNanotubes-M™ 95% solution

Nanotube concentration:0.01mg/mL

49104-79	NI	100mL	☆

アイソナノチューブ-M 98%溶液
IsoNanotubes-M™ 98% solution

Nanotube concentration:0.01mg/mL

49104-80	NI	100mL	☆

アイソナノチューブ-M 99%溶液
IsoNanotubes-M™ 99% solution

Nanotube concentration:0.01mg/mL

49104-81	NI	100mL	☆

アイソナノチューブ-S 90%
IsoNanotubes-S™ 90% powder

49104-74	NI	1mg	☆

アイソナノチューブ-S 95%
IsoNanotubes-S™ 95% powder

49104-75	NI	1mg	☆

アイソナノチューブ-S 98%
IsoNanotubes-S™ 98% powder

49104-76	NI	1mg	☆

アイソナノチューブ-S 99%
IsoNanotubes-S™ 99% powder

49104-77	NI	1mg	☆

アイソナノチューブ-S 90%溶液
IsoNanotubes-S™ 90% solution

Nanotube concentration:0.01mg/mL

49104-70	NI	100mL	☆

アイソナノチューブ-S 95%溶液
IsoNanotubes-S™ 95% solution

Nanotube concentration:0.01mg/mL

49104-71	NI	100mL	☆

アイソナノチューブ-S 98%溶液
IsoNanotubes-S™ 98% solution

Nanotube concentration:0.01mg/mL

49104-72	NI			100mL	☆

アイソナノチューブ-S 99%溶液
IsoNanotubes-S™ 99% solution

Nanotube concentration:0.01mg/mL

49104-73	NI			100mL	☆

安息香酸イソプロピル
Isopropyl benzoate

警告

$C_6H_5COOCH(CH_3)_2$...164.20 ［危］4-3-III
CAS RN®［939-48-0］ d(25℃) 1.01† Fp102℃†

32442-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥9,000
32442-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,600

アイソサーマル増幅用バッファーIIパック
Isothermal Amplification Buffer II Pack

［凍］ -20℃以下

49899-75	NEB（B0374S）	6mL	￥5,300

アカマツ花粉
Japanese Red Pine Pollen

［凍］ -20℃以下

49906-32	ITEA（10923）	1g	￥7,000
49906-33	ITEA（10924）	2g	￥13,800
49906-34	ITEA（10925）	4g	￥27,000

亜麻仁油
Linseed oil

警告

CAS RN® [8001-26-1] d0.925～0.935†

24110-02			G	500mL	￥2,100

アジ化リチウム,20%溶液
Lithium azide, 20% in water

LiN_3...48.98
CAS RN® [19597-69-4] bp103℃▲

33536-1A	TFS（33536-0250）			25g	￥15,600
33536-2A	TFS（33536-1000）			100g	￥45,300

安息香酸マグネシウム三水和物
Magnesium benzoate trihydrate

警告

$Mg(C_6H_5COO)_2 \cdot 3H_2O$...320.57
CAS RN® [553-70-8(anhydr)] mpabt 200℃†

25816-31	>90.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,900

安息香酸マンガン(II)四水和物
Manganese(II) benzoate tetrahydrate

危険

$Mn(C_6H_5COO)_2 \cdot 4H_2O$...369.22 ［労］特-2 ［PRTR］1-412
CAS RN® [636-13-5(anhydr)]

25055-01	>90.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥62,000

p-アニシルアルコール
p-Anisyl alcohol

警告

$CH_3OC_6H_4CH_2OH$...138.16
CAS RN® [105-13-5] bp259℃ mp23℃～25.5℃ d1.1125 Fp146℃

15973-2A	TFS（15973-1000）			100g	￥3,600
15973-3A	TFS（15973-5000）			500g	￥11,900

4-アセトアミド-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸メチル
Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate

$C_{11}H_{12}ClNO_4$...257.66
CAS RN®［4093-31-6］ mp153℃～155℃▲

27061-1A	TFS（27061-0100）			10g	￥3,200

アセト酢酸メチル
Methyl acetoacetate

警告

$CH_3COCH_2COOCH_3$...116.11 ［危］4-3-III ［変］
CAS RN®［105-45-3］ bp169℃～171℃† mp-80℃† d(20/4℃) 1.078† Fp82℃†

25391-01		>97.0%(GC)	鹿1級	500g	￥2,800
25391-31		>97.0%(GC)	鹿1級	25g	￥1,300

アセト酢酸メチル
Methyl acetoacetate

警告

$CH_3COCH_2COOCH_3$...116.11 ［危］4-3-III ［変］
CAS RN®［105-45-3］ bp169℃～170℃ mp28℃ d1.077 Fp67℃

12615-1A	TFS（12615-0010）			1L	￥5,800
12615-2A	TFS（12615-0025）			2.5L	￥13,900
12615-3A	TFS（12615-0100）			10L	￥42,900
12615-4A	TFS（12615-1000）			100mL	￥2,200

4-アセチル安息香酸メチル
Methyl 4-acetylbenzoate

$CH_3OOCC_6H_4COCH_3$...178.18
CAS RN®［3609-53-8］ mp81℃～90℃▲

25078-32		>95.0%(HLC)		25g	￥13,000
25078-52		>95.0%(HLC)		5g	￥5,000
42477-1A	TFS（42477-0010）			1g	￥5,200

アクリル酸メチル
Methyl acrylate

危険

CH_2:$CHCOOCH_3$...86.08 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］1-8
CAS RN® ［96-33-3］ bp80.7℃† mp-75℃† d(20/4℃) 0.954† Fp-3℃†

25181-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥3,300

アクリル酸メチル-d_6
Methyl acrylate-d_6

$C_4D_6O_2$...92.12 ［危］4-1-II［労］57,57-2［PRTR］1-8 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［71016-31-4］

49141-28	CDN（D-6101）	99 atom% D	100mg	￥70,400

3-アミノ安息香酸メチル-2,4,5,6-d_4
Methyl 3-aminobenzoate-2,4,5,6-d_4

$C_8H_5D_4NO_2$...155.18
CAS RN® ［911132-57-5］

49147-09	CDN（D-7179）	98 atom% D	100mg	￥31,900

4-アミノ安息香酸メチル
Methyl 4-aminobenzoate

$C_8H_9NO_2$...151.16
CAS RN® ［619-45-4］ mp110℃～113℃▲

23528-1A	TFS（23528-0250）		25g	￥12,000

o-アミノ安息香酸メチル → アントラニル酸メチル

5-アミノ-1-ベンゾチオフェン-2-カルボン酸メチル
Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate

$C_{10}H_9NO_2S$...207.25
CAS RN® ［20699-85-8］ mp178℃～179℃▲

49261-84	TFS（MO00936DE）	97%	5g	￥92,700
49261-85	TFS（MO00936DA）	97%	1g	￥44,200
49261-86	TFS（MO00936CB）	97%	250mg	￥22,500

4-アミノ-1-ベンジル-1,2,5,6-テトラヒドロピリジン-3-カルボン酸メチル
Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate

$C_{14}H_{18}N_2O_2$...246.30
CAS RN® [159660-85-2] mp87℃～89℃▲

29278-1A	TFS（29278-0010）		1g	￥14,300

3-アミノ-4-ブロモ安息香酸メチル
Methyl 3-amino-4-bromobenzoate

$C_8H_8BrNO_2$...230.05
CAS RN® [46064-79-3]

25888-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥10,000
25888-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,100

4-アミノ-3-ブロモ安息香酸メチル
Methyl 4-amino-3-bromobenzoate

$C_8H_8BrNO_2$...230.05
CAS RN® [106896-49-5] mp104℃～108℃▲

35022-1A	TFS（35022-0010）		1g	￥7,700

3-アミノ-5-(ｔｅｒｔ-ブチル)チオフェン-2-カルボン酸メチル
Methyl 3-amino-5-(*tert*-butyl)thiophene-2-carboxylate

$C_{10}H_{15}NO_2S$...213.29
CAS RN® [175137-03-8] mp94℃～95℃▲

49261-88	TFS（GK00671EA）	97%	10g	￥28,300
49261-89	TFS（GK00671DA）	97%	1g	￥3,800

2-アミノ-3-カルボキシ安息香酸メチル
Methyl 2-amino-3-carboxybenzoate

$C_9H_9NO_4$...195.17
CAS RN® [253120-47-7] mp160℃～167℃▲

49261-90	TFS（MO07276DA）	97%	1g	￥38,400
49261-91	TFS（MO07276CB）	97%	250mg	￥19,200

2-アミノ-3-クロロ安息香酸メチル
Methyl 2-amino-3-chlorobenzoate

$C_8H_8ClNO_2$...185.60
CAS RN® [77820-58-7]

25756-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
25756-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

3-アミノ-4-クロロ安息香酸メチル
Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate

$C_8H_8ClNO_2$...185.60
CAS RN® [40872-87-5]

25637-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
25637-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,000

4-アミノ-3-クロロ安息香酸メチル
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate

$C_8H_8ClNO_2$...185.60
CAS RN® [84228-44-4] mp106℃～110℃▲

32639-1A	TFS（32639-0050）		5g	￥16,600

3-アミノ-5-(4-クロロフェニル)チオフェン-2-カルボン酸メチル
Methyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate

$C_{12}H_{10}ClNO_2S$...267.73
CAS RN® [91076-93-6] mp140℃～141℃▲

49261-92	TFS（GK00598EB）	97%	25g	￥85,000
49261-93	TFS（GK00598EA）	97%	10g	￥62,500
49261-94	TFS（GK00598DA）	97%	1g	￥8,000

3-アミノクロトン酸メチル
Methyl 3-aminocrotonate

$C_5H_9NO_2$...115.13
CAS RN® [14205-39-1] mp81℃～83℃▲

15679-1A	TFS（15679-0050）		5g	￥3,400
15679-2A	TFS（15679-1000）		100g	￥4,200
15679-3A	TFS（15679-5000）		500g	￥14,800

3-アミノ-4-シアノチオフェン-2-カルボン酸メチル
Methyl 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate

$C_7H_6N_2O_2S$...182.20 ［劇］III
CAS RN®［102123-28-4］ mp149℃～150℃▲

49261-96	TFS（KM00977EA）	97%		10g	￥37,300

3-アミノ-4-フルオロ安息香酸メチル
Methyl 3-amino-4-fluorobenzoate

$C_8H_8FNO_2$...169.15
CAS RN®［369-26-6］

26095-52		>97.0%(HLC)	G	5g	￥38,000
26095-62		>97.0%(HLC)	G	1g	￥12,000

3-アミノ-5-ヒドロキシ安息香酸メチル
Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate

$C_8H_9NO_3$...167.16
CAS RN®［67973-80-2］ mp124.5℃～125.5℃▲

49262-02	TFS（MO08016DE）	97%		5g	☆
49262-03	TFS（MO08016DA）	97%		1g	￥24,700

6-アミノ-1*H*-インドール-4-カルボン酸メチル
Methyl 6-amino-1*H*-indole-4-carboxylate

$C_{10}H_{10}N_2O_2$...190.19
CAS RN®［103956-00-9］

25288-52		>97.0%(HLC)	G	5g	￥23,000
25288-62		>97.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

3-アミノ-4-ヨード安息香酸メチル
Methyl 3-amino-4-iodobenzoate

$C_8H_8INO_2$...277.05 ［労］57,57-2
CAS RN®［412947-54-7］

26096-62		>97.0%(HLC)	G	1g	￥10,500

α-アミノイソ酪酸メチル塩酸塩
Methyl α-aminoisobutyrate hydrochloride

警告

$C_5H_{11}NO_2$･HCl...117.14
CAS RN® [15028-41-8]

25711-32	>97.0%	G	25g	￥16,000
25711-52	>97.0%	G	5g	￥5,200

アミノメタンイミドチオ酸メチルよう化水素酸塩
Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide

$C_2H_6N_2S$･HI...218.06 [労] 57,57-2
CAS RN® [4338-95-8] mp82℃～85℃▲

49262-04	TFS（KM00619EE）	95%		50g	☆
49262-05	TFS（KM00619EA）	95%		10g	￥71,300
49262-06	TFS（KM00619DA）	95%		1g	￥13,700

3-アミノ-4-メトキシ安息香酸メチル
Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate

$C_9H_{11}NO_3$...181.18
CAS RN® [24812-90-6]

25632-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
25632-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

3-アミノ-2-メチル安息香酸メチル
Methyl 3-amino-2-methylbenzoate

$C_9H_{11}NO$...149.18 [危] 4-3-III
CAS RN® [18583-89-6]

25583-32	>95.0%(GC)	G	25mL	￥10,500
25583-52	>95.0%(GC)	G	5mL	￥4,100

3-アミノ-4-メチルチオフェン-2-カルボン酸メチル
Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate

$C_7H_9NO_2S$...171.21
CAS RN® [85006-31-1] mp86℃～87℃▲

49262-11	TFS（SB01297DA）	97%	1g	￥2,700

2-アミノニコチン酸メチル
Methyl 2-aminonicotinate

$C_7H_8N_2O_2$...152.15
CAS RN® [14667-47-1] mp84℃～86℃▲

49262-12	TFS（KM07908DE）	97%	5g	￥18,400
49262-13	TFS（KM07908DA）	97%	1g	￥4,400

6-アミノニコチン酸メチル → 6-アミノニコチン酸メチルエステル

4-アミノ-3-ニトロ安息香酸メチル
Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate

$C_8H_8N_2O_4$...196.16
CAS RN® [3987-92-6]

25985-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥10,000
25985-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥4,100

3-アミノプロピオン酸メチル塩酸塩 → β-アラニンメチルエステル塩酸塩

3-アミノ-2-ピラジンカルボン酸メチル
Methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate

警告

$C_6H_7N_3O_2$...153.13
CAS RN® [16298-03-6]

25315-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥12,000
25315-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥4,500

2-アミノピリジン-4-カルボン酸メチル
Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate

警告

$C_7H_8N_2O_2$...152.15
CAS RN® [6937-03-7]

25316-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥22,000
25316-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

4-アミノサリチル酸メチル
Methyl 4-aminosalicylate

警告

$C_8H_9NO_3$...167.16
CAS RN® [4136-97-4]

25084-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
25084-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥3,900

3-アミノ-2-チオフェンカルボン酸メチル
Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate

$C_6H_7NO_2S$...157.19
CAS RN® [22288-78-4] mp64℃～66℃▲

25599-02	>95.0%(HLC)	G	500g	￥15,000
25599-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥3,100
21430-1A	TFS（21430-0100）		10g	￥8,600
21430-2A	TFS（21430-0500）		50g	￥29,800

4-アミノチオフェン-3-カルボン酸メチル塩酸塩
Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride

$C_6H_7NO_2S$･HCl...193.65
CAS RN® [39978-14-8] mp183.5℃～184.6℃(dec.)▲

49262-19	TFS（GK01904EB）	97%	25g	☆
49262-20	TFS（GK01904EA）	97%	10g	☆
49262-21	TFS（GK01904DA）	97%	1g	￥17,000

2-アミノ-3-(トリフルオロメチル)安息香酸メチル
Methyl 2-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate

$C_9H_8F_3NO_2$...219.16 ［危］4-3-III
CAS RN® [64321-95-5]

25786-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥22,500
25786-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥6,900

p-アニス酸メチル
Methyl *p*-anisate

$CH_3OC_6H_4COOCH_3$...166.17
CAS RN® [121-98-2] bp244℃～245℃† mp48℃～52℃▲

25795-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥4,200

アントラニル酸メチル
Methyl anthranilate

$NH_2C_6H_4COOCH_3$...151.16 [危] 4-3-III
CAS RN® [134-20-3] bp256℃† mp24℃～25℃† d1.165～1.171△ Fp125℃†

25197-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥2,400
12632-1A	TFS（12632-5000）			500g	￥10,100
12632-2A	TFS（12632-0500）			50g	￥2,600
12632-3A	TFS（12632-2500）			250g	￥4,800

アラキジン酸メチル → エイコサン酸メチル

アラキジン酸メチル標準品 → エイコサン酸メチル標準品

アラキドン酸メチル → *cis*-5,8,11,14-エイコサテトラエン酸メチル

アラキドン酸メチル標準品 → *cis*-5,8,11,14-エイコサテトラエン酸メチル標準品

L-アスパラギン酸4-メチル塩酸塩
4-Methyl *L*-aspartate hydrochloride

$C_5H_9NO_4$·HCl...183.58 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [16856-13-6]

25581-32	>95.0%	G	25g	￥10,000
25581-52	>95.0%	G	5g	￥4,000

安息香酸メチル
Methyl benzoate

警告

$C_6H_5COOCH_3$...136.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［93-58-3］ bp199.6℃† mp-12℃† d1.086～1.091△ Fp87.8℃†

25200-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥2,600
25200-08	>99.0%(GC)	水質試験用	G	500mL	￥5,000

安息香酸メチル-2,3,4,5,6-d_5
Methyl benzoate-2,3,4,5,6-d_5

$C_8H_3D_5O_2$...141.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［68661-19-8］

49141-35	CDN（D-6155）	99 atom% D	1g	￥36,300

安息香酸メチル-d_8
Methyl benzoate-d_8

$C_6D_5COOCD_3$...144.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［91929-46-3］

49130-07	CDN（D-5382）	98 atom% D	500mg	￥30,800

アセトバクター アセチ KWIK-STIK™
Acetobacter aceti KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49841-00	MBL（0511P）	ATCC15973	2pack	￥11,500

アシネトバクター バウマニィ KWIK-STIK™
Acinetobacter baumannii KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49821-01	MBL（0357P）	ATCC19606	2pack	￥9,500
49820-30	MBL（01057P）	ATCCBAA-1605	2pack	￥14,500
49841-02	MBL（0119P）	ATCCBAA-747	2pack	￥13,500
49945-87	MBL（01266P）	NCTC13304	2pack	￥11,500
49844-94	MBL（0599P）	NCIMB12457	2pack	￥11,500

アシネトバクター ロウフィ KWIK-STIK™
Acinetobacter lwoffii KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49821-03	MBL（0468P）	ATCC15309	2pack	￥11,500
49821-04	MBL（0973P）	ATCC17925	2pack	￥13,500

アシネトバクター スピーシーズ KWIK-STIK™
Acinetobacter species KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49821-06	MBL（0635P）	ATCC49139	2pack	￥11,500

アクチノマイセス オドントリティクス KWIK-STIK™
Actinomyces odontolyticus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49821-10	MBL（0939P）	ATCC17929	2pack	￥13,500

アクチノマイセス ビスコスス KWIK-STIK™
Actinomyces viscosus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49824-93	MBL（0750P）	ATCC15987	2pack	￥13,500

アグリゲイティバクター KWIK-STIK™
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (b) KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49944-92	MBL（01175P）	ATCC29522	2pack	￥13,500

アグリゲイティバクター アフロフィルス KWIK-STIK™
Aggregatibacter aphrophilus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49841-45	MBL（0184P）	ATCC33389	2pack	￥14,500

アルカリゲネス フェカリス KWIK-STIK™
Alcaligenes faecalis subsp.faecalis KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49821-19	MBL（0402P）	ATCC8750	2pack	￥11,500
49821-20	MBL（0911P）	ATCC35655	2pack	￥11,500

アリシクロバチルス アシドテレストリス KWIK-STIK™
Alicyclobacillus acidoterrestris KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49842-91	MBL（0265P）	ATCC49025	2pack	￥16,500

アルテルナリア スピーシーズ KWIK-STIK™
Alternaria species KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49844-96	MBL（01134P）	ATCC20084	2pack	￥13,500

アニューリニバチルス アニューリノリティクス KWIK-STIK™
Aneurinibacillus aneurinolyticus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49841-06	MBL（0141P）	ATCC11376	2pack	￥11,500

アクアスピリルム スピーシーズ KWIK-STIK™
Aquaspirillum species KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49841-07	MBL（0169P）	ATCC49643	2pack	￥14,500

アルカノバクテリウム ヘモリティクム KWIK-STIK™
Arcanobacterium haemolyticum KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49844-77	MBL（01038P）	ATCCBAA-1784	2pack	￥13,500

アルカノバクテリウム ピオゲネス KWIK-STIK™
Arcanobacterium pyogenes KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49821-11	MBL（0660P）	ATCC19411	2pack	￥13,500

アルスロバクター サイクロラクトフィルス KWIK-STIK™
Arthrobacter psychrolactophilus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49824-96	MBL（0260P）	ATCC700733	2pack	￥16,500

アスペルギルス ブラジリエンシス EZ-Accu Shot™
Aspergillus brasiliensis EZ-Accu Shot™

［冷］ 2℃～8℃

49844-59	MBL（0392A）	ATCC16404	5test	￥51,000

アスペルギルス ブラジリエンシス EZ-CFU™
Aspergillus brasiliensis EZ-CFU™

［冷］ 2℃～8℃

49820-01	MBL（0392C）	ATCC16404	10test	￥99,000

アスペルギルス ブラジリエンシス EZ-CFU™ One Step
Aspergillus brasiliensis EZ-CFU™ One Step

［冷］ 2℃～8℃

49840-83	MBL（0392Z）	ATCC16404	10test	￥100,000

アスペルギルス ブラジリエンシス EZ-PEC™
Aspergillus brasiliensis EZ-PEC™

［冷］ 2℃～8℃

49944-85	MBL（0392-PEC）	ATCC16404	10test	￥125,000

アスペルギルス ブラジリエンシス KWIK-STIK™
Aspergillus brasiliensis KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49821-21	MBL（0392P）	ATCC16404	2pack	￥14,500
49844-97	MBL（01130P）	ATCC9642	2pack	￥14,500

アスペルギルス ブラシリエンシス KWIK-STIK™ Plus
Aspergillus brasiliensis KWIK-STIK™ Plus

［冷］ 2℃～8℃

49840-71	MBL（0392X）	ATCC16404	5pack	￥45,000

アスペルギルス カエシエルス KWIK-STIK™
Aspergillus caesiellus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49944-00	MBL（01140P）	ATCC42693	2pack	￥14,500

アスペルギルス フラブス KWIK-STIK™
Aspergillus flavus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49944-94	MBL（01182P）	ATCC9643	2pack	￥14,500

アスペルギルス フミガタス KWIK-STIK™
Aspergillus fumigatus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49844-51	MBL（01021P）	ATCC204305	2pack	￥14,500

アスペルギルス ニガー KWIK-STIK™
Aspergillus niger KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49841-08	MBL（0500P）	ATCC6275	2pack	￥14,500
49824-97	MBL（0245P）	ATCC16888	2pack	￥14,500

アスペルギルス ニガー KWIK-STIK™ Plus
Aspergillus niger KWIK-STIK™ Plus

［冷］ 2℃～8℃

49842-24	MBL（0500X）	ATCC6275	5pack	￥45,000

アスペルギルス オリゼー KWIK-STIK™
Aspergillus oryzae KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49841-09	MBL（0177P）	ATCC10124	2pack	￥16,500

アスペルギルス テレウス KWIK-STIK™
Aspergillus terreus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49945-88	MBL（01264P）	ATCC1012	2pack	￥13,500

アウレオバシジウム プルランス KWIK-STIK™
Aureobasidium pullulans var.melanigenum KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49944-01	MBL（01081P）	ATCC15233	2pack	￥14,500

アジピン酸モノメチル
Monomethyl adipate

警告

$HOCO(CH_2)_4COOCH_3$...160.16
CAS RN® ［627-91-8］ mp7℃～9℃† d(20/20℃) 1.12▲

25701-50	>93.0%(GC)	鹿特級	G	5g	￥5,000

アジピン酸モノメチル
Monomethyl adipate

警告

$HOCO(CH_2)_4COOCH_3$...160.16
CAS RN® ［627-91-8］ bp162℃ mp8℃～9℃ d1.08 Fp>109℃

10282-2A	TFS（10282-0050）	5g	￥3,000
10282-3A	TFS（10282-0250）	25g	￥10,400

L-アスパラギン酸ナトリウム一水和物
Monosodium *L*-aspartate monohydrate

$HOOCCH_2CH(NH_2)COONa \cdot H_2O$...173.09
CAS RN® [3792-50-5]

37110-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,300

安息香酸2-ナフチル
2-Naphthyl benzoate

$C_{17}H_{12}O_2$...248.27
CAS RN® [93-44-7] mp105℃～109℃▲

33061-1A	TFS（33061-0050）			5g	￥2,800

安息香酸ニッケル(II)
Nickel(II) benzoate

危険

approx.$Ni(C_6H_5COO)_2$ [労] 特-2,57,57-2 [PRTR] 特1-309
CAS RN® [553-71-9]

28111-02	15.0%～25.0%(as Ni)(T)		P	500g	￥120,000

亜硝酸イオン標準液
Nitrite ion standard solution

CAS RN® [7632-00-0]

$NaNO_2$水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

28630-23	NO_2^-:1000mg/L	JCSS化学分析用(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用)	G	100mL	￥6,000

亜硝酸性窒素標準液(NO_2-N 1000)
Nitrite-nitrogen standard solution (NO_2-N 1000)

CAS RN® [7632-00-0]

$NaNO_2$水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

28637-96	NO_2-N:1000mg/L	JCSS化学分析用(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用)	G	100mL	￥7,500

亜硝酸水
Nitrous acid solution

CAS RN® [7782-77-6]

28308-01	>0.2%(as NO_2)(T)	鹿1級	G	500mL	￥6,200

アクリル酸オクチル → アクリル酸2-エチルヘキシル

アセチルアセトン
2,4-Pentanedione

危険

$CH_3COCH_2COCH_3$...100.11 [危] 4-2-III [労] 57,57-2
CAS RN® [123-54-6] bp133℃～135℃ mp23℃ d0.975 Fp35.5℃

12996-1A	TFS（12996-0010）	1kg	￥9,900
12996-2A	TFS（12996-0025）	2.5kg	￥14,000
12996-3A	TFS（12996-0050）	5g	￥2,800
12996-4A	TFS（12996-2500）	250g	￥3,300

安息香酸 *n*-ペンチル
n-Pentyl benzoate

警告

$C_6H_5COO(CH_2)_4CH_3$...192.25 [危] 4-3-III
CAS RN® [2049-96-9] d0.99† Fp130℃▲

32792-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥3,600

アンドレイドペプトン水
Peptone water (Andrade)

警告

711061-5	Oxd（CM0061B）	500g	￥16,000

アクリル酸2-フェノキシエチル
2-Phenoxyethyl acrylate

警告

$C_{11}H_{12}O_3$...192.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［48145-04-6］

polymerization inhibited with 4-Methoxyphenol

32003-02	>93.0%(GC)		500mL	￥10,500
32003-32	>93.0%(GC)		25mL	￥2,100

4-アセチルアミノ安息香酸フェニル
Phenyl 4-acetylaminobenzoate

警告

$C_{15}H_{13}NO_3$...255.26
CAS RN® ［33163-30-3］

32143-52	>95.0%(HLC)		5g	￥30,500
32143-62	>95.0%(HLC)		1g	￥8,500

安息香酸フェニル
Phenyl benzoate

警告

$C_6H_5COOC_6H_5$...198.21
CAS RN® ［93-99-2］ bp314℃ † mp70℃ †

32109-30	>98.0%(GC)	鹿特級	25g	￥3,200

安息香酸フェニル
Phenyl benzoate

警告

$C_6H_5COOC_6H_5$...198.21
CAS RN® ［93-99-2］ bp298℃～299℃ mp68℃～70℃

16206-1A	TFS（16206-0050）	5g	￥2,700
16206-2A	TFS（16206-1000）	100g	￥6,200
16206-3A	TFS（16206-5000）	500g	￥26,200

亜りん酸 → ホスホン酸

亜りん酸標準品 → ホスホン酸標準品

アルミン酸カリウム三水和物
Potassium aluminate trihydrate

危険

$K_2Al_2O_4 \cdot 3H_2O$...250.20 ［労］57,57-2
CAS RN® ［12003-63-3］

32302-01	>30.0%(as Al_2O_3)(T)	鹿1級	P	500g	￥7,500

安息香酸カリウム
Potassium benzoate

C_6H_5COOK...160.21
CAS RN® ［582-25-2］

32305-11	>90.0%(T)	鹿1級	P	250g	￥45,000

亜硫酸水素カリウム
Potassium hydrogen sulfite

危険

CAS RN® ［7773-03-7］

32314-00	53.0%～58.0%(as SO_2)(T)	鹿特級	P	500g	￥2,600
32314-30	53.0%～58.0%(as SO_2)(T)	鹿特級	G	25g	￥1,300

亜硝酸カリウム
Potassium nitrite

危険

KNO_2...85.10 ［劇］III［危］1-NS-1-I
CAS RN® ［7758-09-0］ mp>300℃ †

32366-01	>85.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥5,700

亜硝酸カリウム
Potassium nitrite

危険

KNO_2...85.10 ［劇］III［危］1-NS-1-I
CAS RN® ［7758-09-0］ mp387℃

42306-1A	TFS（42306-0025）	2.5kg	￥47,200
42306-2A	TFS（42306-0050）	5g	￥2,800
42306-3A	TFS（42306-5000）	500g	￥13,100

亜りん酸二カリウム(亜りん酸カリウム,第二)
di-Potassium phosphite

K_2PHO_3...158.17
CAS RN® ［13492-26-7］

32381-01	>90.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥26,000

亜セレン酸カリウム
Potassium selenite

危険

K_2SeO_3...205.16 ［毒］I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-242
CAS RN® ［10431-47-7］

32393-32	>95.0%(T)		G	25g	￥3,400

亜硫酸カリウム(無水)
Potassium sulfite, anhydrous

警告

K_2SO_3...158.26
CAS RN® ［10117-38-1］

32407-01	>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,000

亜テルル酸カリウム
Potassium tellurite

警告

K_2TeO_3...253.79 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7790-58-1］

32410-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,900

亜テルル酸カリウム溶液3.5%
Potassium tellurite solution 3.5%

［労］57,57-2 ［冷］ 2℃～8℃

713030-1	Oxd（SR0030J）		10vial	￥7,000

亜テルル酸カリウム三水和物
Potassium tellurite trihydrate

$K_2TeO_3 \cdot 3H_2O$...307.84 ［労］57,57-2
CAS RN® ［123333-66-4］

5164-2M	M（1.05164.0100）	微生物学用	100g	￥56,900

安息香酸 *i s o*-プロピル → 安息香酸イソプロピル

安息香酸 *n*-プロピル
n-Propyl benzoate

$C_6H_5COOCH_2CH_2CH_3$...164.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2315-68-6］ bp231.2℃† d1.020～1.025△ Fp112℃†

32441-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,600
32441-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,600

亜セレン酸
Selenious acid

危険

H_2SeO_3...128.98 ［毒］I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-242
CAS RN® ［7783-00-8］ mp70℃(dec.)†

37029-00	>97.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥32,000
37029-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,600

アルギン酸ナトリウム
Sodium alginate

CAS RN® ［9005-38-3］

37094-01		鹿1級	P	500g	￥6,200

アリザリンスルホン酸ナトリウム → アリザリンレッドS

アルミン酸ナトリウム
Sodium aluminate

危険

［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［1302-42-7］

37095-01	31.0%～35.0%(as Na_2O)(T)/34.0%～39.0%(as Al_2O_3)(T)	鹿1級	P	500g	￥3,200
37095-81	31.0%～35.0%(as Na_2O)(T)/34.0%～39.0%(as Al_2O_3)(T)	鹿1級	M	15kg	☆

アニリンスルホン酸ナトリウム二水和物 → スルファニル酸ナトリウム二水和物

L-アスコルビン酸ナトリウム
Sodium *L*-ascorbate

$C_6H_7NaO_6$...198.10
CAS RN® ［134-03-2］ mp218℃(dec.)†

37540-00	>98.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥6,000
37540-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,700
58049-17	>99.0%(T)	食品添加物	P	500g	￥6,700

アジ化ナトリウム(ナトリウムアジド)
Sodium azide

危険

NaN_3...65.01 ［毒］II ［危］5-MA-2-II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-11
CAS RN® ［26628-22-8］

moisture/heat sensitive

37975-30	>98.0%(T)	特級	G	25g	￥2,300
37975-00	>98.0%(T)	特級	G	500g	￥7,500
37975-80	>98.0%(T)	特級	M	10kg	☆

アジ化ナトリウム(ナトリウムアジド)
Sodium azide

危険

NaN_3...65.01 ［毒］II［危］5-MA-2-II［労］57,57-2［PRTR］1-11
CAS RN®［26628-22-8］

moisture/heat sensitive

37824-05	>97.0%(T)	Organics	G	500g	￥9,000
37824-25	>97.0%(T)	Organics	G	100g	￥3,500

アジ化ナトリウム(ナトリウムアジド)
Sodium azide

危険

NaN_3...65.01 ［毒］II［危］5-MA-2-II［労］57,57-2［PRTR］1-11
CAS RN®［26628-22-8］bp300℃ mp275℃ d1.85

19038-1A	TFS（19038-0025）			2.5kg	￥67,000
19038-2A	TFS（19038-0050）			5g	￥2,500
19038-3A	TFS（19038-1000）			100g	￥5,500
19038-4A	TFS（19038-5000）			500g	￥22,100

アジ化ナトリウム簡易検出キット
Sodium azide rapid detection kit

危険

［労］57,57-2
CAS RN®［7772-98-7］

37483-96		簡易分析ｷｯﾄ	C	1pack(10回分)	￥13,000

安息香酸ナトリウム
Sodium benzoate

警告

C_6H_5COONa...144.10
CAS RN®［532-32-1］ mp>300℃†

37114-00	>98.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥5,600
37114-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,500
37114-01	>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥4,600

安息香酸ナトリウム-d_5
Sodium benzoate-d_5

C_6D_5COONa...149.13
CAS RN® [62790-26-5]

49133-77	CDN（D-288）	98 atom% D		1g	￥26,400

亜セレン酸水素ナトリウム
Sodium biselenite

危険

$NaHSeO_3$...150.96 ［毒］I ［労］57-2 ［PRTR］1-242

712121-1	Oxd（LP0121A）			100g	☆

亜塩素酸ナトリウム
Sodium chlorite

危険

$NaClO_2$...90.44 ［劇］II ［危］1-HC-1-I
CAS RN® [7758-19-2]

37145-02	>72.0%(T)		P	500g	￥3,500

亜ジチオン酸ナトリウム
Sodium dithionite

危険

$Na_2S_2O_4$...174.11 保存 18℃以下
CAS RN® [7775-14-6] mp100℃(dec.)†

37183-02	>75.0%(T)		P	500g	￥1,800

亜りん酸水素ナトリウム・2.5水(亜りん酸一ナトリウム)(亜りん酸ナトリウム,第一)
Sodium hydrogenphosphite 2.5-water

警告

$NaHPHO_3 \cdot 2.5H_2O$...149.01
CAS RN® [13472-37-2]

37502-01	>90.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥9,500

亜硫酸水素ナトリウム
Sodium hydrogen sulfite

危険

［労］57,57-2 保存 18℃以下
CAS RN® ［7631-90-5］

37125-00	64.0%～67.4%(as SO_2)(T)	特級	P	500g	￥1,700
37125-30	64.0%～67.4%(as SO_2)(T)	特級	G	25g	￥1,200
37125-01	>58.5%(as SO_2)(T)	鹿1級	P	500g	￥1,500
37125-81	>58.5%(as SO_2)(T)	鹿1級	M	20kg	☆
37077-08	64.0%～67.4%(as SO2)(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥4,200

亜硝酸ナトリウム
Sodium nitrite

危険

$NaNO_2$...68.99 ［劇］III［危］1-NS-1-I
CAS RN® ［7632-00-0］ mp271℃†

37402-00	>98.5%(T)	特級	P	500g	￥1,900
37402-20	>98.5%(T)	特級	G	100g	￥1,500
37402-30	>98.5%(T)	特級	G	25g	￥1,300
37402-02		特級(医薬品試験用)	P	500g	￥2,300
37402-01	>97.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥1,800
37402-81	>97.0%(T)	鹿1級	M	20kg	☆
58002-17	>97.0%(T)	食品添加物	P	500g	￥1,800

亜硝酸ナトリウム
Sodium nitrite

危険

$NNaO_2$...68.99 ［劇］III［危］1-NS-1-I
CAS RN® ［7632-00-0］bp320℃ mp271℃

19662-1A	TFS（19662-0010）		1kg	￥8,400
19662-2A	TFS（19662-0025）		2.5kg	￥10,600

亜硝酸ナトリウム
Sodium nitrite

危険

$NNaO_2$...68.99 ［劇］III［危］1-NS-1-I
CAS RN® ［7632-00-0］ bp320℃ mp271℃

42435-1A	TFS（42435-0020）	2kg	￥18,700
42435-2A	TFS（42435-0050）	5g	￥4,400
42435-4A	TFS（42435-5000）	500g	￥8,400

亜セレン酸ナトリウム
Sodium selenite

危険

Na_2SeO_3...172.94 ［毒］I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-242
CAS RN® ［10102-18-8］

37268-01	>96.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥17,500
37268-31	>96.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,600

亜セレン酸ナトリウム(無水)
Sodium selenite, anhydrous

危険

Na_2SeO_3...172.94 ［毒］I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-242
CAS RN® ［10102-18-8］ mp350℃

20073-1A	TFS（20073-0250）	25g	￥4,900
20073-2A	TFS（20073-1000）	100g	￥10,400
20073-3A	TFS（20073-5000）	500g	￥39,500

亜硫酸ナトリウム
Sodium sulfite

警告

Na_2SO_3...126.04
CAS RN®［7757-83-7］

37285-00		>97.0%(T)	特級	P	500g	￥1,200
37285-20		>97.0%(T)	特級	G	100g	￥1,100
37285-30		>97.0%(T)	特級	G	25g	￥1,000
37285-86		>97.0%(T)	特級	P	5kg	￥7,500
37285-93		>97.0%(T)	特級	M	20kg	☆
37285-01		>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥1,000
37285-88		>95.0%(T)	鹿1級	P	5kg	￥6,500
37285-81		>95.0%(T)	鹿1級	M	25kg	☆
37082-08		>97.0%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥1,900
6657-1M	M（1.06657.0500）	97.0%～100.5%(T)	EMSURE®		500g	￥3,080

亜硫酸ナトリウム七水和物
Sodium sulfite heptahydrate

警告

$Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$...252.15 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［10102-15-5］

37284-00		>95.0%(T)	特級	G	500g	￥4,100
37284-30		>95.0%(T)	特級	G	25g	￥1,400

亜硫酸ナトリウム(無水)
Sodium sulfite, anhydrous

警告

Na_2SO_3...126.04
CAS RN®［7757-83-7］ mp500℃ d2.63

21927-1A	TFS（21927-0010）			1kg	￥10,700
21927-2A	TFS（21927-0050）			5kg	￥35,100
21927-3A	TFS（21927-0250）			25g	￥2,700
21927-4A	TFS（21927-2500）			250g	￥4,000

亜テルル酸ナトリウム五水和物
Sodium tellurite pentahydrate

$Na_2TeO_3 \cdot 5H_2O$...311.65 ［労］57,57-2
CAS RN® ［22451-06-5］

37290-32	>95.0%(G)		G	25g	￥5,500

亜硫酸水
Sulfurous acid solution

危険

H_2SO_3...82.08 ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7782-99-2］

37397-00	>5.0%(as SO_2)(T)	鹿特級	G	500mL	￥1,600
37397-01	>5.0%(as SO_2)(T)	鹿1級	G	500mL	￥1,500

亜りん酸トリエチル
Triethyl phosphite

危険

$(C_2H_5O)_3P$...166.14 ［危］4-2-III ［化兵］-2
CAS RN® ［122-52-1］ bp157℃† d0.969† Fp52℃†

air/moisture sensitive

40917-05	>98.0%(GC)	Organics	G	500mL	￥11,000
40917-25	>98.0%(GC)	Organics	G	100mL	￥4,800
40917-85	>98.0%(GC)	Organics	M	15kg	☆

亜りん酸トリエチル
Triethyl phosphite

$(C_2H_5O)_3P$...166.14 ［危］4-2-III ［化兵］-2
CAS RN® ［122-52-1］ bp156℃～158℃ mp112℃ d0.965 Fp44℃

13969-2A	TFS（13969-1000）			100mL	￥3,000
13969-3A	TFS（13969-5000）			500mL	￥6,100

亜りん酸トリイソプロピル
Triisopropyl phosphite

危険

$[(CH_3)_2CHO]_3P$...208.23 ［危］4-2-III
CAS RN® ［116-17-6］ d0.844† Fp67℃†

air/moisture sensitive

40929-35	>95.0%(GC)	Organics		25mL	￥9,500

亜りん酸トリメチル
Trimethyl phosphite

警告

$(CH_3O)_3P$...124.07 ［危］4-2-III［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® ［121-45-9］ bp111℃† mp-78℃† d(20/0℃) 1.052† Fp28℃†

air/moisture sensitive

40940-25	>98.0%(GC)	Organics	G	100mL	￥6,000

亜りん酸トリフェニル
Triphenyl phosphite

警告

$(C_6H_5O)_3P$...310.28 ［危］4-4-III
CAS RN® ［101-02-0］ mp22℃～24℃† d1.182† Fp218℃†

moisture sensitive

40952-05	>96.0%(GC)	Organics	G	500g	￥4,700
40952-25	>96.0%(GC)	Organics	G	100g	￥2,700
40952-85	>96.0%(GC)	Organics	M	20kg	☆

亜りん酸トリフェニル
Triphenyl phosphite

警告

$(C_6H_5O)_3P$...310.28 ［危］4-4-III
CAS RN® ［101-02-0］ bp360℃ mp22℃～24℃ d1.184 Fp146℃

14044-1A	TFS（14044-0010）	1L	￥8,500
14044-2A	TFS（14044-0025）	2.5L	￥13,200

亜りん酸トリス(2,4-ジ-ｔｅｒｔ-ブチルフェニル)
Tris(2,4-di-*tert*-butylphenyl) phosphite

警告

$C_{42}H_{63}O_3P$...646.91
CAS RN® [31570-04-4]

40083-02	>98.0%(GC)	G	500g	￥9,500
40083-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥2,000

2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール
2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

$(HOCH_2)_3CNH_2$...121.13
CAS RN® [77-86-1] bp219℃～220℃ mp168.5℃

16762-1A	TFS（16762-0010）	1kg	￥13,300
16762-3A	TFS（16762-0051）	5kg	￥49,500
16762-4A	TFS（16762-1000）	100g	￥3,700

2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール
2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

$(HOCH_2)_3CNH_2$...121.13
CAS RN® [77-86-1] bp219℃～220℃ mp168.5℃

42457-1A	TFS（42457-1000）	100g	￥4,300
42457-2A	TFS（42457-5000）	500g	￥11,400

2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール
2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol

$(HOCH_2)_3CNH_2$...121.13
CAS RN® [77-86-1] bp219℃～220℃ mp168.5℃

14050-1A	TFS（14050-0010）		1kg	￥11,600
14050-2A	TFS（14050-0025）		2.5kg	￥25,400
14050-3A	TFS（14050-0100）		10kg	￥101,700
14050-4A	TFS（14050-5000）		500g	￥7,700

亜鉛 CRM3009-a
Zinc CRM3009-a

49005-85	NMI（CRM3009-a）	認証標準物質	50g	☆

亜鉛(大粒)
Zinc, big granule

警告

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6]

particle size abt 10mm

48091-01		鹿1級	P	500g	￥5,800

亜鉛(粒状)
Zinc, drops

警告

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6] bp907℃† mp420℃†

48001-00		特級	P	500g	￥5,000
48001-30		特級	G	25g	￥1,800
48001-01		鹿1級	P	500g	￥4,800
48001-08		ひ素分析用	P	500g	￥6,200
48001-96	>99.990%(T)	容量分析用標準物質	G	50g	￥10,000

亜鉛(粒状), 4N
Zinc, drops, 4N

警告

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6] bp907℃▲ mp420℃▲

48002-33	99.99%(Im.S.)	素材研究用	P	25g	￥9,000
48002-53	99.99%(Im.S.)	素材研究用	P	5g	￥4,500

亜鉛
Zinc, dust

警告

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6] bp907℃ mp420℃ d7.14

19834-1A	TFS（19834-0010）	1kg	￥11,000
19834-2A	TFS（19834-0025）	2.5kg	￥22,000
19834-3A	TFS（19834-0100）	10kg	￥66,800
19834-4A	TFS（19834-1000）	100g	￥5,300

亜鉛(粒状)
Zinc, granular, 20 mesh

警告

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6] bp907℃ mp420℃ d7.14

22260-1A	TFS（22260-1000）	100g	￥3,200
22260-2A	TFS（22260-5000）	500g	￥8,900

亜鉛(花状)
Zinc, mossy

警告

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6]

48004-00	特級	P	500g	￥7,000
48004-01	鹿1級	P	500g	￥4,200

亜鉛(粉末)
Zinc, powder

危険

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6]

48005-00	>90.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥2,800
48005-30	>90.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,500
48005-01	>85.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,700
48005-1B	>90.0%(T)	有害金属測定用	G	250g	￥1,900
48005-33	>90.0%(T)	窒素酸化物測定用	G	25g	￥2,300

亜鉛(粉末)
Zinc, powder

警告

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6] bp907℃ mp420℃

19450-1A	TFS（19450-0050）	5g	￥12,900
19450-2A	TFS（19450-0500）	50g	￥72,100

亜鉛(砂状)
Zinc, sand

警告

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6]

48006-00	特級	P	500g	￥3,600
48006-08	ひ素分析用	P	500g	￥4,100

亜鉛(棒状)
Zinc, sticks

警告

Zn...65.38
CAS RN® [7440-66-6]

abt φ8mm×60mm

48007-00	特級	P	500g	￥17,000
48007-01	鹿1級	P	500g	￥11,000

亜鉛標準液(Zn 100)
Zinc standard solution (Zn 100)

危険

Zn・HNO_3(0.1mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

48097-1B	Zn:100mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	P	100mL	￥3,700

亜鉛標準液(Zn 1000)
Zinc standard solution (Zn 1000)

危険

Zn・HNO_3(0.1mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

48096-1B	Zn:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)		250mL	￥8,000
48096-2B	Zn:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)		100mL	￥3,700

亜鉛標準溶液(1L調製用濃縮液)
Zinc standard solution, Titrisol^R

［労］57,57-2［PRTR］1-1

1.000g±0.002g Zn($ZnCl_2$ in 0.06%HCl)

9953-1M	M（1.09953.0001）	原子吸光分析用		1amp	￥5,810

亜鉛標準原液(Zn-1000)
Zinc standard stock solution (Zn-1000)

危険

［労］57,57-2

Zn・HCl酸性溶液

48094-23		医薬品試験用		100mL	￥5,000

0.01mol/L亜鉛溶液
0.01mol/L Zinc solution

危険

Zn...65.38 ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7440-66-6］

48142-08		容量分析用滴定液		500mL	￥4,600

0.05mol/L亜鉛溶液
0.05mol/L Zinc solution

危険

Zn...65.38 ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7440-66-6］

48141-08		容量分析用滴定液	P	500mL	￥4,600

0.1mol/L亜鉛溶液
0.1mol/L Zinc solution

危険

Zn...65.38 ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7440-66-6］

48140-08		容量分析用滴定液	P	500mL	￥4,900

亜鉛アセチルアセトナート
Zinc acetylacetonate

警告

$Zn(CH_3COCHCOCH_3)_2$...263.59
CAS RN® ［14024-63-6］ mp138℃(dec.)†

48082-31	23.0%～26.0%(as Zn)(T)	鹿1級	G	25g	￥4,100

安息香酸亜鉛
Zinc benzoate

警告

$Zn(C_6H_5COO)_2$...307.60 ［PRTR］1-1
CAS RN® ［553-72-0］

48014-31	>90.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,800

亜鉛(II)ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
Zinc(II) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

$Zn[N(SO_2CF_3)_2]_2$
CAS RN® ［168106-25-0］

49210-21	SOLVI（M3008B）	99.5%		10g	￥43,000

亜鉛-銅合金
Zinc-copper couple

Zn-Cu...128.92 ［労］57,57-2
CAS RN® ［12621-78-2］

air sensitive

48102-35	Zn:85.0%～95.0% Cu:5.0%～10.0%	Organics	G	25g	￥16,500

イソシアン酸3-アセチルフェニル
3-Acetylphenyl isocyanate

$CH_3COC_6H_4NCO$...161.15
CAS RN® ［23138-64-9］ bp155℃(4mm)▲ mp33℃～34℃▲ d1.174▲

31410-1A	TFS（31410-0100）		10g	￥16,900

イオンクロマトアクロディスクシリンジフィルター 13mm 0.2μm
Acrodisc® syringe filters with ion chromatography 13mm 0.2μm

97004-28	PALL（4483T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥26,800

イオンクロマトアクロディスクシリンジフィルター 13mm 0.45μm
Acrodisc® syringe filters with ion chromatography 13mm 0.45μm

97004-30	PALL（4485T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥26,800

イオンクロマト(PES)アクロディスクシリンジフィルター 25mm 0.2μm
Acrodisc® syringe filters with ion chromatography(PES) 25mm 0.2μm

97004-31	PALL（4583T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(50個)	￥26,800

イオンクロマト(PES)アクロディスクシリンジフィルター 25mm 0.45μm
Acrodisc[R] syringe filters with ion chromatography(PES) 25mm 0.45μm

97004-32	PALL（4585T）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1pack(50個)	￥26,800

イソシアン酸1-アダマンチル
1-Adamantyl isocyanate

$C_{11}H_{15}NO$...177.24
CAS RN® [4411-25-0] mp144℃～146℃▲

31436-1A	TFS（31436-0050）			5g	￥15,100
31436-2A	TFS（31436-0010）			1g	￥5,100

イソチオシアン酸1-アダマンチル
1-Adamantyl isothiocyanate

$C_{11}H_{15}NS$...193.31
CAS RN® [4411-26-1] mp166℃～168℃▲

01636-52	>98.0%(GC)		G	5g	￥5,400

イソチオシアン酸アリル
Allyl isothiocyanate

危険

CH_2:$CHCH_2NCS$...99.15 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [57-06-7] bp151℃～153℃† mp-80℃† d1.016～1.020△ Fp46.1℃†

01562-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥14,000
01562-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,600
10295-1A	TFS（10295-0050）			5g	￥4,400
10295-2A	TFS（10295-1000）			100g	￥6,400

陰イオン混合標準液I
Anion mixed standard solution I

保存 15℃以下

塩化物イオン(Cl^-):8mg/L,ふっ化物イオン(F^-):4mg/L,りん酸イオン(PO_4^{3-}):20mg/L,硝酸イオン(NO_3^-):10mg/L,亜硝酸イオン(NO_2^-):10mg/L,硫酸イオン(SO_4^{2-}):20mg/L

01849-96		ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	50mL	￥8,500

陰イオン混合標準液II
Anion mixed standard solution II

［労］57-2 保存 15℃以下

塩化物イオン(Cl^-):2000mg/L,ふっ化物イオン(F^-):500mg/L,硝酸性窒素(NO_3-N):200mg/L,亜硝酸性窒素(NO_2-N):100mg/L.

01850-96	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	P	50mL	￥8,500

陰イオン混合標準液III
Anion mixed standard solution III

保存 15℃以下

臭化物イオン(Br^-):500mg/L,塩化物イオン(Cl^-):100mg/L,硝酸イオン(NO_3^-):500mg/L,亜硝酸イオン(NO_2^-):500mg/L,硫酸イオン(SO_4^{2-}):1000mg/L.

01857-96	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	P	50mL	￥8,500

陰イオン混合標準液IV
Anion mixed standard solution IV

保存 15℃以下

ふっ化物イオン(F^-):5mg/L,塩化物イオン(Cl^-):10mg/L,亜硝酸イオン(NO_2^-):15mg/L,臭化物イオン(Br^-):10mg/L,硝酸イオン(NO_3^-):30mg/L,りん酸イオン(PO_4^{3-}):30mg/L,硫酸イオン(SO_4^{2-}):40mg/L.

01856-96	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	50mL	￥8,500

陰イオン混合標準液V
Anion mixed standard solution V

［劇］III ［労］57-2 保存 15℃以下

ふっ化物イオン(F^-):500mg/L, 塩化物イオン(Cl^-):2000mg/L, 亜硝酸性窒素(NO_2-N):100mg/L, 塩素酸イオン(ClO_3^-):1000mg/L, 硝酸性窒素(NO_3-N):200mg/L.

01855-96	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	P	50mL	￥8,500

イーグル基礎培地, 液体, EBS含有, *L*-グルタミン不含
Basal Medium Eagle, Liquid, with EBS, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49430-95 BIOCO（1-06F01-I）		500mL	￥2,000

イーグル基礎培地, 液体, EBS含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
Basal Medium Eagle, Liquid, with EBS, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49430-96	BIOCO（1-06F50-I）	500mL	￥2,500

イーグル基礎培地, 液体, HBSS含有, *L*-グルタミン不含
Basal Medium Eagle, Liquid, with HBSS, without *L*-Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49430-97	BIOCO（1-08F01-I）	500mL	￥2,000

イーグル基礎培地, 液体, HBSS含有, *L*-アラニル-*L*-グルタミン含有
Basal Medium Eagle, Liquid, with HBSS, with stable Glutamine

［冷］ 2℃～8℃

49431-00	BIOCO（1-08F50-I）	500mL	￥2,300

イソシアン酸2,1,3-ベンゾチアジアゾール-4-イル
2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate

$C_7H_3N_3OS$...177.18 ［冷］ 4℃以下
CAS RN®［342411-14-7］ mp81℃～82℃▲

49243-19	TFS（CC09106DE）	97%	5g	☆
49243-21	TFS（CC09106CB）	97%	250mg	￥16,200

イソシアン酸1-ベンゾチオフェン-5-イル
1-Benzothiophen-5-yl isocyanate

C_9H_5NOS...175.20 ［冷］ 4℃以下
CAS RN®［239097-78-0］ mp58℃▲

49243-80	TFS（CC24806DE）	97%	5g	☆
49243-81	TFS（CC24806DA）	97%	1g	￥52,100
49243-82	TFS（CC24806CB）	97%	250mg	￥21,100

イソシアン酸ベンゾイル
Benzoyl isocyanate

C_6H_5CONCO...147.13 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［4461-33-0］ bp94℃～96℃(21mm)▲ d1.171▲

31428-1A	TFS（31428-0050）	tech.	5g	￥16,800
31428-2A	TFS（31428-0010）	tech.	1g	￥4,500

イソチオシアン酸ベンゾイル
Benzoyl isothiocyanate

警告

C_8H_5NOS...163.19 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［532-55-8］ d1.21▲

31463-1A	TFS（31463-0050）			5g	￥4,200

イソシアン酸ベンジル
Benzyl isocyanate

警告

$C_6H_5CH_2NCO$...133.14 ［危］4-2-III
CAS RN® ［3173-56-6］ d1.078†

04997-32		>95.0%(GC)	G	25mL	￥10,000
21076-1A	TFS（21076-0250）			25g	￥23,400
21076-2A	TFS（21076-0050）			5g	￥8,700

イソチオシアン酸ベンジル
Benzyl isothiocyanate

$C_6H_5CH_2NCS$...149.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［622-78-6］ bp243℃† mp41℃† d1.125†

40213-1A	TFS（40213-0250）			25g	￥9,600
40213-2A	TFS（40213-0050）			5g	￥4,600

イソチオシアン酸4-(ベンジルオキシ)フェニル
4-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate

$C_{14}H_{11}NOS$...241.31
CAS RN® ［139768-71-1］ mp62℃～64℃▲

49244-40	TFS（SB01753DA）	97%		1g	￥4,100

イソシアン酸2-ビフェニリル
2-Biphenylyl isocyanate

$C_6H_5C_6H_4NCO$...195.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［17337-13-2］ bp92℃～94℃(1mm)▲ d1.138▲

31411-1A	TFS（31411-0050）			5g	￥18,400

イソシアン酸3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate

$(CF_3)_2C_6H_3NCO$...255.11 ［危］4-2-III
CAS RN® ［16588-74-2］bp62℃(2mm)▲ d1.476▲

31417-1A	TFS（31417-0050）	5g	￥17,300

イソチオシアン酸3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate

$(CF_3)_2C_6H_3NCS$...271.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［23165-29-9］bp63℃(1.5mm)▲

31952-1A	TFS（31952-0010）	1g	￥3,700

イソシアン酸3-ブロモフェニル
3-Bromophenyl isocyanate

BrC_6H_4NCO...198.01 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［23138-55-8］bp220℃▲ d1.586▲

31413-1A	TFS（31413-0050）	5g	￥10,300
31413-2A	TFS（31413-0010）	1g	￥4,300

イソシアン酸4-ブロモフェニル
4-Bromophenyl isocyanate

BrC_6H_4NCO...198.01 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2493-02-9］bp158℃† mp42℃†

22113-1A	TFS（22113-0100）	10g	￥14,100

イソチオシアン酸2-ブロモフェニル
2-Bromophenyl isothiocyanate

BrC_6H_4NCS...214.08 ［危］4-3-III
CAS RN® ［13037-60-0］bp257℃(770mm)▲ d1.591▲

30526-1A	TFS（30526-0050）	5g	￥9,900

イソシアン酸4-(ｔｅｒｔ-ブチル)フェニル
4-(*tert*-Butyl)phenyl isocyanate

$C_{11}H_{13}NO$...175.22 ［危］4-3-III ［冷］ 4℃以下
CAS RN® ［1943-67-5］ d0.986▲

49250-60	TFS（SB01802EB）	97%	25g	￥46,900
49250-61	TFS（SB01802EA）	97%	10g	￥74,100
49250-62	TFS（SB01802DA）	97%	1g	￥12,600

イソシアン酸クロロアセチル
Chloroacetyl isocyanate

$ClCH_2CONCO$...119.50 ［危］4-2-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［4461-30-7］ bp50℃～55℃(20mm)▲ d1.403▲

31430-1A	TFS（31430-0050）	tech.	5g	￥15,700
31430-2A	TFS（31430-0010）	tech.	1g	￥4,800

イソシアン酸2-クロロエチル
2-Chloroethyl isocyanate

警告

$ClCH_2CH_2NCO$...105.52 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1943-83-5］ bp141℃～142℃† d1.228～1.245△ Fp56℃†

07908-31		>97.0%(GC)	鹿1級	25g	￥26,000
22119-1A	TFS（22119-0050）			5mL	￥5,500
22119-2A	TFS（22119-0010）			1mL	￥4,000
22119-3A	TFS（22119-0250）			25mL	￥13,400

イソシアン酸3-クロロ-4-フルオロフェニル
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate

C_7H_3ClFNO...171.55 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［50529-33-4］ bp44℃(17mm)▲ d1.3770▲

36679-1A	TFS（36679-0010）	1g	￥3,800

イソチオシアン酸3-クロロ-4-フルオロフェニル
3-Chloro-4-fluorophenyl isothiocyanate

C_7H_3ClFNS...187.62
CAS RN® ［137724-66-4］ bp115℃～117℃(11mm)▲

35552-1A	TFS（35552-0010）	1g	￥9,300

イソシアン酸4-クロロフェニル
4-Chlorophenyl isocyanate

ClC_6H_4NCO...153.56
CAS RN® [104-12-1] bp203℃～204℃▲ mp29℃～31℃▲ d1.200▲

16656-1A	TFS（16656-0250）	25g	￥5,500
16656-2A	TFS（16656-1000）	100g	￥9,000

イソチオシアン酸2-クロロフェニル
2-Chlorophenyl isothiocyanate

$NCSC_6H_4Cl$...169.63 ［危］4-3-III
CAS RN® [2740-81-0] bp260℃～262℃▲ d1.299▲

29224-1A	TFS（29224-0250）	25g	￥25,600
29224-2A	TFS（29224-0050）	5g	￥6,800

イソシアン酸3-クロロプロピル
3-Chloropropyl isocyanate

$Cl(CH_2)_3NCO$...119.54 ［危］4-2-III
CAS RN® [13010-19-0] bp152℃～154℃▲ d1.165▲

31459-1A	TFS（31459-0050）	5g	￥16,300
31459-2A	TFS（31459-0010）	1g	￥4,300

イソシアン酸クロロスルホニル
Chlorosulfonyl isocyanate

危険

$ClSO_2NCO$...141.53 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [1189-71-5] bp107℃▲ d1.626▲

16204-1A	TFS（16204-0500）	50mL	￥15,300
16204-2A	TFS（16204-0010）	1L	￥161,700
16204-3A	TFS（16204-0050）	5mL	￥3,800
16204-4A	TFS（16204-2500）	250mL	￥50,300

イソシアン酸4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate

$ClC_6H_3(CF_3)NCO$...221.56
CAS RN® [327-78-6] bp86℃～90℃(14mm)▲ mp40℃～42℃▲

30913-1A	TFS（30913-0050）	5g	￥11,900

イソシアン酸3-シアノフェニル
3-Cyanophenyl isocyanate

CNC_6H_4NCO...144.12 ［劇］III
CAS RN® ［16413-26-6］ mp51℃～54℃▲

31418-1A	TFS（31418-0050）	5g	￥17,600
31418-2A	TFS（31418-0010）	1g	￥6,600

イソシアン酸4-シアノフェニル
4-Cyanophenyl isocyanate

$C_8H_4N_2O$...144.12 ［劇］III
CAS RN® ［40465-45-0］ mp102℃▲

40597-2A	TFS（40597-0050）	5g	￥19,100

イソシアン酸シクロヘキシル
Cyclohexyl isocyanate

危険

$C_6H_{11}NCO$...125.16 ［危］4-2-III
CAS RN® ［3173-53-3］ bp168℃～170℃† mp-80℃† d(20/4℃) 0.96† Fp48℃†

07795-31	>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥4,300

一般用水分測定溶媒S(一般試料用)
Dehydrated solvent for determination of water in ordinary samples S

危険

［劇］III［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2

water:0.1mg/mL max

49300-02	平沼	平沼ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ微量水分測定装置用	500mL×2	￥6,900

イミノジカルボン酸ジ-ｔｅｒｔ-ブチル
Di-*tert*-butyl iminodicarboxylate

警告

$C_{10}H_{19}NO_4$...217.26
CAS RN® ［51779-32-9］

10088-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥23,000
10088-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥8,500

イソシアン酸3,4-ジクロロベンジル
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate

$C_8H_5Cl_2NO$...202.03 ［危］4-3-III
CAS RN® ［19752-09-1］ bp102℃(1mm)▲

31922-1A	TFS（31922-0010）	1g	￥10,600

イソシアン酸2,4-ジクロロフェニル
2,4-Dichlorophenyl isocyanate

$Cl_2C_6H_3NCO$...188.00
CAS RN® ［2612-57-9］ mp60℃～62℃▲

24651-1A	TFS（24651-0250）	25g	￥18,300

イソシアン酸2,6-ジクロロフェニル
2,6-Dichlorophenyl isocyanate

$C_7H_3Cl_2NO$...188.00
CAS RN® ［39920-37-1］ mp42℃～44℃▲

33497-1A	TFS（33497-0010）	1g	￥5,100

イソシアン酸3,5-ジクロロフェニル
3,5-Dichlorophenyl isocyanate

$Cl_2C_6H_3NCO$...188.00
CAS RN® ［34893-92-0］ bp243℃▲ mp32℃～34℃▲ d1.38▲

31414-1A	TFS（31414-0050）	5g	￥9,000
31414-2A	TFS（31414-0010）	1g	￥4,500

イソチオシアン酸2,4-ジクロロフェニル
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate

$Cl_2C_6H_3NCS$...204.07 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6590-96-1］ bp260℃▲ mp36℃～40℃▲ d1.41▲

30528-1A	TFS（30528-0250）	25g	￥32,400

2,2′-イミノジエタノール
2,2′-Iminodiethanol

$HN(CH_2CH_2OH)_2$...105.13 ［危］4-3-S-III［労］57,57-2
CAS RN®［111-42-2］bp268℃ mp27℃～30℃ d1.0955 Fp179℃

11392-1A	TFS（11392-0010）	1kg	￥5,300
11392-2A	TFS（11392-0025）	2.5kg	￥8,400
11392-4A	TFS（11392-0250）	25kg	￥52,300

イミノ二酢酸ジエチル
Diethyl iminodiacetate

$C_8H_{15}NO_4$...189.20 ［危］4-2-III
CAS RN®［6290-05-7］ d1.08▲

40732-1A	TFS（40732-0250）	25g	￥10,300
40732-2A	TFS（40732-0050）	5g	￥3,000
40732-3A	TFS（40732-1000）	100g	￥29,800

イソプロピルマロン酸ジエチル
Diethyl isopropylmalonate

警告

$C_{10}H_{18}O_4$...202.24 ［危］4-3-III
CAS RN®［759-36-4］

10227-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥14,000
10227-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥2,100

イソチオシアン酸ジメチルアミノ-1-ナフチル
Dimethylamino-1-naphthyl isothiocyanate

$(CH_3)_2NC_{10}H_6NCS$...228.31
CAS RN®［29711-79-3］ mp67℃～69℃▲

20996-1A	TFS（20996-2500）	250mg	￥20,800

4,5-イミダゾールジカルボン酸ジメチル
Dimethyl 4,5-imidazoledicarboxylate

$C_7H_8N_2O_4$...184.14
CAS RN® [3304-70-9] mp203℃▲

10733-32	>95.0%(HLC)		G	25g	￥10,500
10733-52	>95.0%(HLC)		G	5g	￥5,300

インドール-2,3-ジカルボン酸ジメチル
Dimethyl indole-2,3-dicarboxylate

$C_{12}H_{11}NO_4$...233.21
CAS RN® [54781-93-0] mp112℃～115℃▲

40839-1A	TFS（40839-1000）			100mg	￥18,600

イソブチルマロン酸ジメチル
Dimethyl isobutylmalonate

$C_9H_{16}O_4$...188.22
CAS RN® [39520-24-6] bp211℃(763mm)▲

35047-1A	TFS（35047-0050）			5g	￥6,900

イソフタル酸ジメチル
Dimethyl isophthalate

警告

$C_6H_4(COOCH_3)_2$...194.18
CAS RN® [1459-93-4] mp67℃～71℃△

10352-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥10,000
10352-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,800

イソフタル酸ジメチル-2,4,5,6-d_4
Dimethyl isophthalate-2,4,5,6-d_4

$C_{10}H_6D_4O_4$...198.20
CAS RN® [1007509-57-0]

49138-95	CDN（D-6566）	98 atom% D		100mg	￥28,600

イタコン酸ジメチル
Dimethyl itaconate

$H_2C:(COOCH_3)CH_2COOCH_3$...158.15
CAS RN® [617-52-7] bp208℃† mp36℃† d1.124†

10353-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,300

イタコン酸ジメチル
Dimethyl itaconate

$H_2C:(COOCH_3)CH_2COOCH_3$...158.15
CAS RN® [617-52-7] bp208℃ mp34℃～39℃ d1.24 Fp100℃

14916-2A	TFS（14916-1000）			100g	￥3,200
14916-3A	TFS（14916-5000）			500g	￥9,400

イソチオシアン酸2,3-ジメチルフェニル
2,3-Dimethylphenyl isothiocyanate

C_9H_9NS...163.24
CAS RN® [1539-20-4]

49256-13	TFS（SB01617EB）	97%		25g	￥14,800
49256-14	TFS（SB01617EA）	97%		10g	￥7,700

イヌ被毛・上皮粗抽出物
Dog Hair Extract

［冷］ 0℃～6℃

49906-08	ITEA（10105）			1mL	￥13,000

イジェクタークリップ ソフト用 3個セット トランスファーペッテエレクトロニック 50-1000μL用
Ejector-adjustm.clips, set of 3, Transferpette® electronic 50-1000μL

70019-48	BRA（705562）		ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥3,000

イジェクタークリップ ソフト用 3個セット トランスファーペッテエレクトロニック 10-200μL用
Ejector-adjustm.clips, set of 3, Transferpette[R] electronic 10-200μL

70019-47	BRA（705560）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		1pack	￥3,000

イソシアン酸エトキシカルボニル
Ethoxycarbonyl isocyanate

$C_2H_5O_2CNCO$...115.08 ［危］4-2-III
CAS RN® ［19617-43-7］ bp25℃(10mm)▲ d1.115▲

31431-1A	TFS（31431-0010）	tech.		1g	￥17,300

1*H*-イミダゾール-2-カルボン酸エチル
Ethyl 1*H*-imidazole-2-carboxylate

$C_6H_8N_2O_2$...140.13
CAS RN® ［33543-78-1］

14062-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥23,000
14062-62		>95.0%(HLC)	G	1g	￥7,000

インドール-3-酢酸エチル
Ethyl indole-3-acetate

$C_{12}H_{13}NO_2$...203.23 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［778-82-5］ mp41℃～47℃△

20270-42		>99.0%(GC)	G	10g	￥16,000

インドール-2-カルボン酸エチル
Ethyl indole-2-carboxylate

$C_{11}H_{11}NO_2$...189.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3770-50-1］ mp119℃～125℃†

20284-32		>99.0%(GC)	G	25g	￥11,000
11860-1A	TFS（11860-0050）			5g	￥6,700
11860-2A	TFS（11860-0250）			25g	￥23,700

インドール-5-カルボン酸エチル
Ethyl indole-5-carboxylate

$C_{11}H_{11}NO_2$...189.21 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［32996-16-0］

20285-52	>99.0%(GC)	G	5g	￥18,000

イソ酪酸エチル
Ethyl isobutyrate

$(CH_3)_2CHCO_2C_2H_5$...116.15 ［危］4-1-II
CAS RN®［97-62-1］bp112℃～113℃▲ d0.869▲

31051-1A	TFS（31051-5000）		500mL	￥7,200

4-イソシアナト安息香酸エチル-2,3,5,6-d_4
Ethyl 4-isocyanatobenzoate-2,3,5,6-d_4

$C_{10}H_5D_4NO_3$...195.20 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1219802-91-1］

49139-51	CDN（D-5970）	99 atom% D	250mg	￥88,000

3-イソシアナトプロピオン酸エチル
Ethyl 3-isocyanatopropionate

$C_6H_9NO_3$...143.14 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［5100-34-5］bp68℃(2mm)▲

31927-1A	TFS（31927-0010）		1g	￥6,600

イソシアノ酢酸エチル
Ethyl isocyanoacetate

$C_5H_7NO_2$...113.11 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2999-46-4］

14272-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥22,000
14272-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥7,500

イソシアノ酢酸エチル
Ethyl isocyanoacetate

$C_5H_7NO_2$...113.11 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2999-46-4］ bp194℃～196℃▲ d1.03▲

29955-1A	TFS（29955-0050）	5g	￥11,500
29955-3A	TFS（29955-0250）	25g	￥49,100

イソニコチン酸エチル
Ethyl isonicotinate

警告

$C_5H_4NCOOC_2H_5$...151.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1570-45-2］ bp220℃† mp23℃† d1.103～1.108△

14168-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥4,500

イソニコチノイル酢酸エチル
Ethyl isonicotinoylacetate

$C_{10}H_{11}NO_3$...193.19
CAS RN® ［26377-17-3］ mp53℃～59℃▲

42548-1A	TFS（42548-0025）	2.5g	￥19,600

イソニペコチン酸エチル
Ethyl isonipecotate

$C_8H_{15}NO_2$...157.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1126-09-6］ bp204℃▲ d1.02▲

11864-1A	TFS（11864-1000）	100g	￥11,200
11864-2A	TFS（11864-0250）	25g	￥3,900

イソニペコチン酸エチル-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d_9
Ethyl isonipecotate-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d_9

$C_8H_6D_9NO_2$...166.26 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1219803-75-4］

49139-57	CDN（D-6279）	98 atom% D	100mg	￥79,200

イソチオシアン酸エチル
Ethyl isothiocyanate

警告

C_2H_5NCS...87.14 ［危］4-2-III
CAS RN® ［542-85-8］ bp130℃～132℃† mp-5.9℃† d0.996～1.002△ Fp32℃†

14371-31	>95.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥5,500

イソチオシアン酸エチル
Ethyl isothiocyanate

警告

C_2H_5NCS...87.14 ［危］4-2-III
CAS RN® ［542-85-8］ bp130℃～132℃ mp6℃ d0.995 Fp32℃

37686-1A	TFS（37686-0050）	5g	￥3,300
37686-2A	TFS（37686-0250）	25g	￥9,000
37686-3A	TFS（37686-1000）	100g	￥23,400

イソ吉草酸エチル
Ethyl isovalerate

$(CH_3)_2CHCH_2CO_2C_2H_5$...130.18 ［危］4-2-III
CAS RN® ［108-64-5］ bp131℃～133℃▲ d0.868▲

15048-1A	TFS（15048-0050）	5mL	￥2,500
15048-2A	TFS（15048-1000）	100mL	￥4,700
15048-3A	TFS（15048-5000）	500mL	￥20,000

イソチオシアン酸5-フルオレセイン,アイソマーI
5-Fluorescein isothiocyanate, isomer I

$C_{21}H_{11}NO_5S$...389.38 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3326-32-7］ mp>360℃▲

11925-1A	TFS（11925-2500）	250mg	￥9,000
11925-2A	TFS（11925-0010）	1g	￥26,100

5-イソチオシアン酸フルオレセイン
Fluorescein 5-isothiocyanate (FITC)

$C_{21}H_{11}NO_5S$...389.38 ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN®［3326-32-7］

for biochemistry and for fluorescence microscopy

24546-1M	M（1.24546.0250）	顕微鏡用	250mg	￥39,300

イソシアン酸4-フルオロベンジル
4-Fluorobenzyl isocyanate

$FC_6H_4CH_2NCO$...151.13 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［132740-43-3］bp47℃(0.1mm)▲

31930-1A	TFS（31930-0010）	1g	￥14,400

イソシアン酸4-フルオロフェニル
4-Fluorophenyl isocyanate

FC_6H_4NCO...137.11 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1195-45-5］ d1.206▲

11960-1A	TFS（11960-0050）	5mL	￥6,600
11960-2A	TFS（11960-0250）	25mL	￥26,100

イソシアン酸2-フルオロ-5-トリフルオロメチルフェニル
2-Fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate

$FC_6H_3(CF_3)NCO$...205.10 ［危］4-3-III
CAS RN®［69922-27-6］bp53℃(2.5mm)▲

31934-1A	TFS（31934-5000）	500mg	￥7,700

イチョウ花粉
Ginkgo Pollen

［凍］ -20℃以下

49906-40	ITEA（10931）	1g	￥49,000
49906-41	ITEA（10932）	2g	￥97,000
49906-42	ITEA（10933）	4g	￥190,000

イソシアン酸ヘキシル
Hexyl isocyanate

$CH_3(CH_2)_5NCO$...127.18 ［危］4-2-III
CAS RN® ［2525-62-4］ bp162℃～164℃(760mm)▲

41166-1A	TFS（41166-0250）	25g	￥15,700
41166-2A	TFS（41166-0050）	5g	￥6,600
41166-3A	TFS（41166-1000）	100g	￥52,100

イソシアン酸 *n*-ヘキシル
n-Hexyl isocyanate

危険

$CH_3(CH_2)_5NCO$...127.18 ［危］4-2-III
CAS RN® ［2525-62-4］ bp162℃～164℃ † d(20/20℃) 0.88▲

18511-41	>95.0%(GC)	鹿1級	G	10g	￥11,500

一塩化ヒドラジニウム → ヒドラジン一塩酸塩

(±)-イボテン酸一水和物
(±)-Ibotenic acid monohydrate

$C_5H_6N_2O_4 \cdot H_2O$...176.12 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［60573-88-8］ mp144℃～146℃▲

32913-1A	TFS（32913-0010）	1mg	￥49,200

(±)-イブプロフェン-d_3(α-メチル-d_3)
(±)-Ibuprofen-d_3 (α-methyl-d_3)

$C_{13}H_{15}D_3O_2$...209.29
CAS RN® ［121662-14-4］

49140-56	CDN（D-6119）	99 atom% D	50mg	￥68,200

(±)-イブプロフェン-d_3ナトリウム塩
(±)-Ibuprofen-d_3, sodium salt

$C_{13}H_{14}D_3NaO_2$...231.28
CAS RN® ［1219805-09-0］

49140-57	CDN（D-6873）	99 atom% D	50mg	￥61,600

(*S*)-(+)-イブプロフェン
(*S*)-(+)-Ibuprofen

$C_{13}H_{18}O_2$...206.28
CAS RN® [51146-56-6] mp49℃～53℃▲

33320-1A	TFS（33320-0010）		1g	￥5,000
33320-2A	TFS（33320-0050）		5g	￥14,000

イブプロフェン
Ibuprofen

$C_{13}H_{18}O_2$...206.28
CAS RN® [15687-27-1] mp75℃～77℃▲

25861-1A	TFS（25861-0100）		10g	￥29,300

イカリイン
Icariin

$C_{33}H_{40}O_{15}$...676.66 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [489-32-7]

49064-54	PHY（89714）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

イカリシドI
Icariside I

$C_{27}H_{30}O_{11}$...530.51 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [56725-99-6]

49869-52	PHY（83316）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

イカリシドII
Icariside II

$C_{27}H_{30}O_{10}$...514.51 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [113558-15-9]

49869-53	PHY（83286）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

イカリチン
Icaritin

$C_{21}H_{20}O_6$...368.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [118525-40-9]

49064-55	PHY（80478）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

イゲパール^{R}CA-630(ノニデットP40)
IGEPAL^{R} CA-630 (Nonidet P40)

CAS RN®［9002-93-1］

198596-N	MP（198596）	電気泳動用	100mL	￥13,500

イレキサポニンA
Ilexsaponin A

$C_{36}H_{56}O_{11}$...664.82 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［108524-93-2］

49873-56	PHY（84225）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

イマザリル標準品
Imazalil standard

警告

$C_{14}H_{14}Cl_2N_2O$...297.17 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［35554-44-0］

49801-39	DES（C14280000）	残留農薬試験用	100mg	￥12,000

イマザリル-d_5標準液
Imazalil-d_5 standard solution

$C_{14}H_9Cl_2D_5N_2O$...302.20 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1398065-91-2］

100mg/L アセトン溶液

49836-71	DES（XA14280100AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥37,000

イマザメタベンズ-メチル標準品
Imazamethabenz-methyl standard

$C_{16}H_{20}N_2O_3$...288.34 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［81405-85-8］

49828-95	DES（C14281500）	残留農薬試験用	100mg	￥19,000

イマザモックス標準品
Imazamox standard

$C_{15}H_{19}N_3O_4$...305.32 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［114311-32-9］ mp166.0℃～166.7℃ †

20319-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥25,000

イマザモックス標準品
Imazamox standard

$C_{15}H_{19}N_3O_4$...305.32 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［114311-32-9］

49865-48 DES（C14282000）	残留農薬試験用		100mg	￥25,000

イマザピック標準品
Imazapic standard

$C_{14}H_{17}N_3O_3$...275.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［104098-48-8］

49831-24 DES（C14282500）	残留農薬試験用		100mg	￥20,000

イマザピル標準品
Imazapyr standard

$C_{13}H_{15}N_3O_3$...261.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［81334-34-1］

49867-51 DES（C14283000）	残留農薬試験用		100mg	￥17,000

イマザキン標準品
Imazaquin standard

$C_{17}H_{17}N_3O_3$...311.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［81335-37-7］

49865-50 DES（C14283300）	残留農薬試験用		100mg	￥11,000

イマゼタピル標準品
Imazethapyr standard

警告

$C_{15}H_{19}N_3O_3$...289.32 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［81335-77-5］

49829-80 DES（C14283500）	残留農薬試験用		100mg	￥20,000

イマゾスルフロン標準品
Imazosulfuron standard

$C_{14}H_{13}ClN_6O_5S$...412.81 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［122548-33-8］

49830-80	DES（C14283550）		残留農薬試験用	100mg	￥27,000

イミベンコナゾール標準品
Imibenconazole standard

$C_{17}H_{13}Cl_3N_4S$...411.73 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［86598-92-7］ mp89.5℃～90℃ †

49861-52	DES（C14283600）		残留農薬試験用	100mg	￥43,000

イミベンコナゾール-デスベンジルオキソン標準品
Imibenconazole-desbenzyl oxon standard

$C_{10}H_8Cl_2N_4O$...271.10 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［154221-27-9］

49831-54	DES（C14283620）		残留農薬試験用	10mg	￥44,000

イミシアホス標準品
Imicyafos standard

$C_{11}H_{21}N_4O_2PS$...304.35 ［劇］III［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［140163-89-9］ bp392℃▲ Fp190.7℃▲

49865-68	DES（C14283650）		残留農薬試験用	25mg	￥38,000

イミダクロプリド標準品
Imidacloprid standard

危険

$C_9H_{10}ClN_5O_2$...255.66 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［105827-78-9］ mp143.8℃ †

20005-96		>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥11,000

イミダクロプリド-d_4標準品
Imidacloprid-d_4 standard

$C_9H_6ClD_4N_5O_2$...259.68 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1015855-75-0］

49836-72	DES（C14283710）	残留農薬試験用		10mg	￥115,000

イミダゾール
Imidazole

危険

$C_3H_4N_2$...68.07
CAS RN® ［288-32-4］ bp257℃▲ mp90℃†

20000-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥15,000
20000-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,100
20000-23	>99.0%(T)	生化学用	G	100g	￥10,000
20000-33	>99.0%(T)	生化学用	G	25g	￥4,500
20000-24	>98.0%	分子生物学用	P	100g	￥10,000

イミダゾール
Imidazole

危険

$C_3H_4N_2$...68.07
CAS RN® ［288-32-4］ bp255℃～256℃ mp86℃～90℃ Fp145℃

12202-1A	TFS（12202-0020）			2kg	￥58,200
12202-2A	TFS（12202-0050）			5g	￥2,800
12202-3A	TFS（12202-1000）			100g	￥5,900
12202-4A	TFS（12202-5000）			500g	￥20,500

イミダゾール-d_4
Imidazole-d_4

$C_3D_4N_2$...72.10
CAS RN® ［6923-01-9］

49129-13	CDN（D-961）	98 atom% D		1g	￥31,900

4-イミダゾール酢酸塩酸塩
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride

$C_5H_6N_2O_2$·HCl...162.57
CAS RN® [3251-69-2] mp223℃～225℃ †

20496-1A	TFS (20496-0010)		1g	￥16,000

4-イミダゾールアクリル酸 → ウロカニン酸

1*H*-イミダゾール-2-カルボン酸
1*H*-Imidazole-2-carboxylic acid

$C_4H_4N_2O_2$...112.08
CAS RN® [16042-25-4] mp198℃▲

49259-94	TFS (CC08901DE)	97%	5g	￥59,500
49259-95	TFS (CC08901DA)	97%	1g	￥15,400

4-イミダゾールカルボン酸
4-Imidazolecarboxylic acid

警告

$C_4H_4N_2O_2$...112.08 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1072-84-0]

20055-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥9,000
20055-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,900

イミダゾール
Imidazole

危険

$C_3H_4N_2$...68.07
CAS RN® [288-32-4] bp255℃～256℃ mp86℃～90℃ Fp145℃

30187-1A	TFS (30187-0010)	1kg	￥26,300
30187-2A	TFS (30187-0025)	2.5kg	￥46,500
30187-3A	TFS (30187-2500)	250g	￥9,000

1*H*-イミダゾール-4,5-ジカルボン酸
1*H*-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid

警告

$C_5H_4N_2O_4$...156.09
CAS RN® [570-22-9]

20027-32	>95.0%	G	25g	￥10,000
20027-52	>95.0%	G	5g	￥3,900

1*H*-イミダゾール-4,5-ジカルボン酸
1*H*-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid

$C_5H_4N_2O_4$...156.09
CAS RN® [570-22-9] mp265℃

41225-1A TFS（41225-0250）		25g	￥14,500

2,4-イミダゾリジンジオン → ヒダントイン

2-イミダゾリジンチオン
2-Imidazolidinethione

危険

$C_3H_6N_2S$...102.16 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-42
CAS RN® [96-45-7] mp194℃～198℃▲

14132-31	>96.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,400

2-イミダゾリジンチオン標準品 → エチレンチオ尿素標準品

2-イミダゾリジンチオン-d_4 → エチレンチオ尿素-d_4

2-イミダゾリジノン
2-Imidazolidinone

$C_3H_6N_2O$...86.09
CAS RN® [120-93-4] mp131℃†

14133-01	鹿1級	G	500g	￥15,000
14133-31	鹿1級	G	25g	￥2,700

2-イミダゾリドン0.5水和物
2-Imidazolidone hemihydrate

$C_3H_6N_2O \cdot 0.5H_2O$...95.10
CAS RN® [121325-67-5] mp58℃▲

12204-1A	TFS（12204-0250）		25g	￥5,500
12204-2A	TFS（12204-0025）		2.5kg	￥30,100
12204-3A	TFS（12204-5000）		500g	￥8,000

2-(1*H*-イミダゾール-1-イル)アニリン
2-(1*H*-Imidazol-1-yl)aniline

$C_9H_9N_3$...159.18
CAS RN® [26286-54-4] mp106℃～107℃▲

49259-96	TFS（CC32714EA）	97%	10g	☆
49259-97	TFS（CC32714DA）	97%	1g	￥27,400
49260-00	TFS（CC32714CB）	97%	250mg	￥10,100

4-(1*H*-イミダゾール-1-イル)安息香酸
4-(1*H*-Imidazol-1-yl)benzoic acid

$C_{10}H_8N_2O_2$...188.18
CAS RN® [17616-04-5] mp309℃～311℃▲

49260-04	TFS（CC18501DA）	90%	1g	￥11,800

2-(4-イミダゾリル)エチルアミン二塩酸塩 → ヒスタミン二塩酸塩(二塩酸ヒスタミン)

2-(4-イミダゾリル)エチルアミン-α,α,β,β-d_4二塩酸塩 → ヒスタミン-α,α,β,β-d_4二塩酸塩

1*H*-イミダゾール-2-イルメタノール塩酸塩
1*H*-Imidazol-2-ylmethanol hydrochloride

$C_4H_6N_2O \cdot HCl$...134.56
CAS RN® [116177-22-1] mp118℃～120℃▲

49260-05	TFS（CC08909DE）	97%	5g	☆
49260-06	TFS（CC08909DA）	97%	1g	￥57,900

3-(1*H*-イミダゾール-1-イルメチル)アニリン
3-(1*H*-Imidazol-1-ylmethyl)aniline

$C_{10}H_{11}N_3$...173.21
CAS RN® [120107-85-9] mp72℃～74℃▲

49260-07	TFS（CC43214DE）	97%	5g	￥60,100
49260-08	TFS（CC43214DA）	97%	1g	￥20,800
49260-09	TFS（CC43214CB）	97%	250mg	￥7,400

4-(1*H*-イミダゾール-1-イルメチル)アニリン
4-(1*H*-Imidazol-1-ylmethyl)aniline

$C_{10}H_{11}N_3$...173.21
CAS RN® [56643-85-7] mp128℃～130℃▲

49260-11	TFS（CC43314DA）	97%	1g	￥17,000
49260-12	TFS（CC43314CB）	97%	250mg	￥8,200

3-(1*H*-イミダゾール-1-イルメチル)安息香酸塩酸塩
3-(1*H*-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride

$C_{11}H_{10}N_2O_2$･HCl...238.66
CAS RN® [218131-32-9] mp205℃～207℃▲

49260-13	TFS（CC43251DA）	90%	1g	￥33,700
49260-14	TFS（CC43251CB）	90%	250mg	￥10,400

4-(1*H*-イミダゾール-1-イルメチル)安息香酸塩酸塩
4-(1*H*-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride

$C_{11}H_{10}N_2O_2$･HCl...238.66
CAS RN® [135611-32-4] mp249℃～253℃▲

49260-15	TFS（CC43351DA）	95%	1g	￥33,500
49260-16	TFS（CC43351CB）	95%	250mg	￥12,900

4-(1*H*-イミダゾール-1-イルメチル)-*N*-メチルベンジルアミン1.5しゅう酸塩0.5水和物
4-(1*H*-Imidazol-1-ylmethyl)-*N*-methylbenzylamine 1.5 oxalate 0.5 hydrate

$C_{12}H_{15}N_3$･$C_2H_2O_4$･0.5H_2O...300.30 ［劇］III
CAS RN® [910036-84-9] mp162℃～165℃▲

49260-17	TFS（CC43396DA）	97%	1g	￥47,500
49260-18	TFS（CC43396CB）	97%	250mg	￥17,300

3-(1*H*-イミダゾール-1-イル)プロパン酸
3-(1*H*-Imidazol-1-yl)propanoic acid

$C_6H_8N_2O_2$...140.13
CAS RN® [18999-45-6] mp147℃～149℃▲

49260-19	TFS（MO01250DA）	97%		1g	￥36,500
49260-20	TFS（MO01250CB）	97%		250mg	￥14,800

2-(1*H*-イミダゾール-2-イル)ピラジン
2-(1*H*-Imidazol-2-yl)pyrazine

$C_7H_6N_4$...146.14
CAS RN® [119165-68-3]

20181-97		>97.0%(HLC)	G	100mg	￥6,800

イミダゾ[1,2-*a*]ピリジン-2-カルバルデヒド
Imidazo[1,2-*a*]pyridine-2-carbaldehyde

$C_8H_6N_2O$...146.14
CAS RN® [118000-43-4] mp78℃～79℃▲

49260-21	TFS（CC31304DA）	97%		1g	￥24,100
49260-22	TFS（CC31304CB）	97%		250mg	￥8,000

イミダゾ[1,2-*a*]ピリジン-6-カルバルデヒド
Imidazo[1,2-*a*]pyridine-6-carbaldehyde

$C_8H_6N_2O$...146.14
CAS RN® [116355-16-9] mp152℃▲

49260-23	TFS（CC33104DA）	95%		1g	￥76,800
49260-24	TFS（CC33104CB）	95%		250mg	￥26,900

イミダゾ[1,2-*a*]ピリジン-6-カルボニルクロリド塩酸塩
Imidazo[1,2-*a*]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride

$C_8H_5ClN_2O \cdot HCl$...217.04 [冷] 4℃以下
CAS RN® [859833-15-1] mp250℃(dec.)▲

49260-25	TFS（CC33152DA）			1g	￥32,600
49260-26	TFS（CC33152CB）			250mg	￥10,400

イミダゾ[1,2-*a*]ピリジン-3-カルボン酸
Imidazo[1,2-*a*]pyridine-3-carboxylic acid

$C_8H_6N_2O_2$...162.14
CAS RN® [6200-60-8] mp196℃～197℃▲

49260-27	TFS（CC25401DA）	97%	1g	￥46,400
49260-28	TFS（CC25401CB）	97%	250mg	￥24,100

イミダゾ[1,2-*a*]ピリジン-6-カルボン酸
Imidazo[1,2-*a*]pyridine-6-carboxylic acid

$C_8H_6N_2O_2$...162.14
CAS RN® [139022-25-6] mp250℃(dec.)▲

49260-30	TFS（CC33101DE）	90%	5g	￥61,200
49260-31	TFS（CC33101DA）	90%	1g	￥17,300
49260-32	TFS（CC33101CB）	90%	250mg	￥4,400

イミダゾ[1,2-*a*]ピリジン-6-イルメタノール
Imidazo[1,2-*a*]pyridin-6-ylmethanol

$C_8H_8N_2O$...148.16
CAS RN® [132213-07-1] mp106℃～108℃▲

49260-33	TFS（CC33109DE）	97%	5g	☆
49260-34	TFS（CC33109DA）	97%	1g	￥27,200
49260-35	TFS（CC33109CB）	97%	250mg	￥16,700

イミダゾ[2,1-*b*]チアゾール-6-カルバルデヒド
Imidazo[2,1-*b*]thiazole-6-carbaldehyde

$C_6H_4N_2OS$...152.17
CAS RN® [120107-61-1] mp71℃▲

49260-39	TFS（CC32504DA）	97%	1g	￥81,500
49260-40	TFS（CC32504CB）	97%	250mg	￥28,300

イミダゾ[2,1-*b*][1,3]チアゾール-6-カルボン酸
Imidazo[2,1-*b*][1,3]thiazole-6-carboxylic acid

$C_6H_4N_2O_2S$...168.17
CAS RN® [53572-98-8] mp233℃～234℃▲

49260-42	TFS（CC32501DA）	97%	1g	￥28,000
49260-43	TFS（CC32501CB）	97%	250mg	￥8,200

イミジチオン標準品 → ホスメット標準品

イミドカルブ標準品
Imidocarb standard

$C_{19}H_{20}N_6O$...348.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［27885-92-3］

49833-24	DES（C14284500）	残留農薬試験用	50mg	￥65,000

イミド尿素
Imidurea

$C_{11}H_{16}N_8O_8$...388.29
CAS RN® ［39236-46-9］

26%～28%(as N)

26870-1A	TFS（26870-1000）		100g	￥13,100
26870-2A	TFS（26870-2500）		250g	￥26,100

イミノクタジン三酢酸塩標準品
Iminoctadine triacetate standard

危険

$C_{18}H_{41}N_7 \cdot 3CH_3COOH$...535.72 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［57520-17-9］ mp143.0℃～144.2℃ †

49861-49	DES（C14284900）	残留農薬試験用	10mg	￥84,000

イミノクタジンアルベシル酸塩標準品
Iminoctadine tris(albesilate) standard

$C_{72}H_{131}N_7O_9S_3$...1335.05 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［169202-06-6］

49832-70	DES（C14284950）	残留農薬試験用	10mg	￥41,000

イミノ二酢酸
Iminodiacetic acid

警告

$NH(CH_2COOH)_2$...133.10
CAS RN® ［142-73-4］ mp247.5℃(dec.) †

20002-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥7,500
20002-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,000

イミノジベンジル
Iminodibenzyl

警告

$C_{14}H_{13}N$...195.25
CAS RN® [494-19-9] mp106℃～109℃†

20042-02		>98.0%(GC)		500g	￥14,500
20042-32		>98.0%(GC)		25g	￥2,700
12207-1A	TFS（12207-0250）			25g	￥4,600
12207-2A	TFS（12207-1000）			100g	￥11,600

2,2′-イミノジエタノール
2,2′-Iminodiethanol

危険

$HN(CH_2CH_2OH)_2$...105.13 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [111-42-2] bp268.8℃† mp28℃† d(30/4℃) 1.088† Fp138℃†

10197-00		>99.0%(GC)	特級	500mL	￥3,000
10197-01		>99.0%(GC)	鹿1級	500mL	￥2,200

2,2′-イミノジエタノール塩酸塩
2,2′-Iminodiethanol hydrochloride

警告

$(CH_2CH_2OH)_2NH·HCl$...141.59 [危] 4-3-S-III
CAS RN® [14426-21-2] d1.261†

10198-01		>95.0%(T)	鹿1級	500g	￥30,500
10198-31		>95.0%(T)	鹿1級	25g	￥2,700

β-イミノジ(プロピオン酸-2,2,3,3-d_4)
β-Iminodi(propionic-2,2,3,3-d_4 acid)

$C_6H_3D_8NO_4$...169.20
CAS RN® [1219803-81-2]

49140-58	CDN（D-6861）	98 atom% D		100mg	￥57,200

3,3′-イミノジプロピオノニトリル
3,3′-Iminodipropiononitrile

警告

$NH(CH_2CH_2CN)_2$...123.15 ［劇］III［危］4-3-S-III
CAS RN® ［111-94-4］ mp-5.5℃† Fp178℃†

20004-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,400

L-*N*^{5}-(1-イミノエチル)オルニチン二塩酸塩
L-*N*^{5}-(1-Iminoethyl)ornithine dihydrochloride

$C_7H_{15}N_3O_2$･2HCl...246.13 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［36889-13-1］

32869-1A	TFS（32869-0250）			25mg	￥36,400

2-イミノ-1-メチル-4-イミダゾリジノン → クレアチニン

イミノスチルベン
Iminostilbene

警告

$C_{14}H_{11}N$...193.24
CAS RN® ［256-96-2］ mp197℃～199℃▲

20043-32	>98.0%(GC)		G	25g	￥6,000
20043-52	>98.0%(GC)		G	5g	￥2,600
16254-1A	TFS（16254-0100）			10g	￥18,800
16254-2A	TFS（16254-1000）			100g	￥90,000

イミプラミン-2,4,6,8-d_4塩酸塩
Imipramine-2,4,6,8-d_4 hydrochloride

$C_{19}H_{20}D_4N_2$･HCl...320.89
CAS RN® ［61361-33-9］

49129-14	CDN（D-2204）	98 atom% D		10mg	￥83,600

イミプロトリン標準品
Imiprothrin standard

$C_{17}H_{22}N_2O_4$...318.36 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［72963-72-5］ mp25℃▲ d1.1▲ Fp141℃▲

49865-63	DES（C14286000）	環境分析用	50mg	☆

イムノアシスト MG-PP Re
ImmunoAssist MG-PP Re

20352-33		抗体精製用	25g	￥35,000
20352-23		抗体精製用	100g	☆

インペラトリン
Imperatorin

$C_{16}H_{14}O_4$...270.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［482-44-0］

49064-56	PHY（89715）	天然物化学研究用	10mg	￥43,000

イナベンフィド標準品
Inabenfide standard

$C_{19}H_{15}ClN_2O_2$...338.78 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［82211-24-3］

49833-08	DES（C14287000）	残留農薬試験用	50mg	￥30,000

インセンソール
Incensole

$C_{20}H_{34}O_2$...306.48 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［22419-74-5］

49873-57	PHY（83860）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

インセンソールアセテート
Incensole acetate

$C_{22}H_{36}O_3$...348.51 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［34701-53-6］

49873-58	PHY（83861）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

インダン
Indan

警告

C_9H_{10}...118.17 ［危］4-2-III
CAS RN® ［496-11-7］ bp176℃† mp-51℃† d(20/20℃) 0.97▲

20152-31		>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥4,400
29248-1A	TFS（29248-5000）				500g	￥34,400
29248-2A	TFS（29248-0050）				5g	￥7,200
29248-3A	TFS（29248-1000）				100g	￥9,500

インダン標準品
Indan standard

C_9H_{10}...118.17 ［危］4-2-III
CAS RN® ［496-11-7］

49797-05	ACC（H-231N）	環境分析用	100mg	￥6,000

1,3-インダンジオン
1,3-Indanedione

$C_9H_6O_2$...146.14
CAS RN® ［606-23-5］ mp129℃～132℃▲

12209-1A	TFS（12209-0050）		5g	￥5,100
12209-2A	TFS（12209-0250）		25g	￥14,500

インダノファン標準品
Indanofan standard

危険

$C_{20}H_{17}ClO_3$...340.79 ［PRTR］1-114 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［133220-30-1］ mp61.6℃▲

20350-96		>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥19,000

インダノファン標準品
Indanofan standard

危険

$C_{20}H_{17}ClO_3$...340.79 ［PRTR］1-114 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［133220-30-1］ mp60℃～61℃▲ d1.24▲

49864-62	DES（C14288000）	残留農薬試験用	100mg	￥31,000

(*R*)-(-)-1-インダノール
(*R*)-(-)-1-Indanol

警告

C_9H_9OH...134.17 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［697-64-3］

光学純度:>98.0% ee(HLC)

20342-35	>96.0%(HLC)	不斉合成用	G	25g	￥55,000
20342-65	>96.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥7,500

(*S*)-(+)-1-インダノール
(*S*)-(+)-1-Indanol

警告

C_9H_9OH...134.17 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［25501-32-0］

光学純度:>98.0% ee(HLC)

20318-35	>96.0%(HLC)	不斉合成用	G	25g	￥55,000
20318-65	>96.0%(HLC)	不斉合成用	G	1g	￥7,500

1-インダノール
1-Indanol

C_9H_9OH...134.17
CAS RN® ［6351-10-6］ mp50℃～54℃†

18611-1A	TFS（18611-0100）		10g	￥11,700
18611-2A	TFS（18611-0500）		50g	￥56,100

1-インダノン
1-Indanone

C_9H_8O...132.15
CAS RN® ［83-33-0］ mp40℃～42℃†

20014-32		G	25g	￥9,500
20014-52		G	5g	￥3,200
12211-1A	TFS（12211-0250）		25g	￥8,800
12211-3A	TFS（12211-0100）		10g	￥4,900
12211-4A	TFS（12211-1000）		100g	￥27,100

2-インダノン
2-Indanone

C_9H_8O...132.15 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［615-13-4］ mp54℃～56℃▲

20015-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥10,000
20015-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥4,100
16411-1A	TFS（16411-0100）			10g	￥13,300
16411-2A	TFS（16411-0500）			50g	￥50,900

1,2,3-インダントリオン → ニンヒドリン

インダゾール
Indazole

$C_7H_6N_2$...118.13
CAS RN® ［271-44-3］ bp267℃～270℃† mp146.5℃†

12212-1A	TFS（12212-0050）			5g	￥13,600

1*H*-インダゾール-3-カルボン酸
1*H*-Indazole-3-carboxylic acid

$C_8H_6N_2O_2$...162.14
CAS RN® ［4498-67-3］ mp259℃～262℃▲

49260-44	TFS（MO07468DA）	97%		1g	￥3,300

インデン
Indene

危険

C_9H_8...116.15 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［95-13-6］ bp182.6℃† mp-1.6℃† d(0℃) 0.997† Fp58℃†

20011-02		>95.0%(GC)	G	500mL	￥12,500
20011-32		>95.0%(GC)	G	25mL	￥2,200

インデン標準品
Indene standard

C_9H_8...116.15 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN®［95-13-6］

49797-06	ACC（H-230N）		環境分析用	100mg	￥4,500

インデノ[1,2,3-*c*, *d*]ピレン標準品
Indeno[1,2,3-*c*,*d*]pyrene standard

$C_{22}H_{12}$...276.32
CAS RN®［193-39-5］

49804-17	ACC（H-157N）		環境分析用	10mg	￥22,500

インデノ[1,2,3-*c*, *d*]ピレン-d_{12}
Indeno[1,2,3-*c*,*d*]pyrene-d_{12}

$C_{22}D_{12}$...288.40
CAS RN®［203578-33-0］

49129-15	CDN（D-4249）	98 atom% D		10mg	￥79,200

インジシン塩酸塩
Indicine hydrochloride

$C_{15}H_{25}NO_5$·HCl...299.36 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1195140-94-3］

49869-54	PHY（83234）		天然物化学研究用	10mg	￥100,000

インジシン *N*-オキシド
Indicine *N*-oxide

$C_{15}H_{25}NO_6$...315.36 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［41708-76-3］

49869-55	PHY（83235）		天然物化学研究用	10mg	￥100,000

インジゴ
Indigo

警告

$C_{16}H_{10}N_2O_2$...262.26
CAS RN®［482-89-3］ mp>300℃ †

20012-30			鹿特級	25g	￥4,200
20012-31			鹿1級	25g	￥4,100

インジゴ
Indigo

$C_{16}H_{10}N_2O_2$...262.26
CAS RN® [482-89-3] mp300℃

21213-1A	TFS（21213-0250）			25g	￥6,100
21213-2A	TFS（21213-1000）			100g	￥16,400

インジゴブルー → インジゴ

インジゴカルミン
Indigo carmine

$C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$...466.35
CAS RN® [860-22-0]

20013-30		>97.5%(T)	特級	25g	￥6,500
20013-31		>90.0%(T)	鹿1級	25g	￥5,200
15744-1A	TFS（15744-1000）			100g	￥15,900
15744-2A	TFS（15744-0250）			25g	￥5,000

インジゴカルミン溶液
Indigo carmine solution

危険

$C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$...466.35 [労] 57,57-2
CAS RN® [860-22-0]

pH range 11.6(青)-14.0(黄)(2.5g/L)

20240-08	pH試験用指示薬		500mL	￥4,100
20240-23	pH試験用指示薬		100mL	￥3,300

5,5′-インジゴジスルホン酸二ナトリウム → インジゴカルミン

インジゴチン → インジゴ

インジゴチン
Indigotin

$C_{16}H_{10}N_2O_2$...262.26 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［482-89-3］

49873-59	PHY（83294）		天然物化学研究用	10mg	￥37,500

インジルビン
Indirubin

$C_{16}H_{10}N_2O_2$...262.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［479-41-4］

49064-57	PHY（89716）		天然物化学研究用	10mg	￥60,000

インジウム標準液(In 1000)
Indium standard solution (In 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

In・HNO_3(0.2mol/L)溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

20241-1B	In:1000mg/L	JCSS化学分析用(原子吸光分析用、ICP分析用)	(P)	100mL	￥6,700

インジウム(粒状)
Indium, granule

In...114.81 ［労］57-2［PRTR］1-44
CAS RN® ［7440-74-6］ mp155℃～158℃ †

particle size 3mm～4mm

20018-32	>99.5%(T)		(G)	25g	￥12,500

インジウム(粒状), 5N
Indium, granule, 5N

In...114.81 ［労］57-2［PRTR］1-44
CAS RN® ［7440-74-6］ mp155℃ †

particle size abt 2mm

20340-53	99.999%(Im.S.)	素材研究用	(P)	5g	￥9,000

インジウム(粉末)
Indium, powder

In...114.81 ［労］57,57-2［PRTR］1-44
CAS RN® ［7440-74-6］ bp2000℃ mp156℃ d7.3

19318-1A	TFS（19318-0050）		5g	￥19,500
19318-2A	TFS（19318-0250）		25g	￥62,300

インジウム・すず酸化物
Indium tin oxide

危険

In_2O_3:SnO_2...428.34 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-44
CAS RN® ［50926-11-9］

particle size abt. 40nm

49523-75	ILT（NO-0045-UP-0100）	99.99%	100g	☆
49523-74	ILT（NO-0045-UP-0050）	99.99%	50g	￥67,000
49523-73	ILT（NO-0045-UP-0025）	99.99%	25g	￥45,000
49523-72	ILT（NO-0045-UP-0010）	99.99%	10g	￥30,000

インドシアニングリーン → IR-125

インドール
Indole

危険

C_8H_7N...117.14
CAS RN® ［120-72-9］ mp52℃ †

20022-00		>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥23,000
20022-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,900
12215-1A	TFS（12215-5000）				500g	￥32,600
12215-2A	TFS（12215-0100）				10g	￥3,000
12215-3A	TFS（12215-0250）				25g	￥4,200
12215-4A	TFS（12215-1000）				100g	￥9,900

インドール標準品
Indole standard

C_8H_7N...117.14
CAS RN® [120-72-9]

49797-76	ACC（H-236N）		環境分析用	100mg	￥4,500

インドール-d_7
Indole-d_7

C_8D_7N...124.19
CAS RN® [73509-20-3]

49140-59	CDN（D-1897）	98 atom% D		250mg	￥61,600

インドール-2,4,5,6,7-d_5-3-アセトアミド
Indole-2,4,5,6,7-d_5-3-acetamide

$C_{10}H_5D_5N_2O$...179.22
CAS RN® [1204700-53-7]

49140-60	CDN（D-6606）	98 atom% D		50mg	￥66,000

インドール-3-アセトアミド
Indole-3-acetamide

$C_{10}H_{10}N_2O$...174.19 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [879-37-8] mp150℃～156℃△

20269-52	>99.0%(GC)		G	5g	￥15,500

3-インドール酢酸
3-Indoleacetic acid (Indole-3-acetic acid)

警告

$C_8H_6NCH_2COOH$...175.18
CAS RN® [87-51-4] mp168℃～170℃†

20023-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥14,000
20023-50	>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥5,100
20023-60	>98.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥2,300

3-インドール酢酸
3-Indoleacetic acid (Indole-3-acetic acid)

警告

$C_8H_6NCH_2COOH$...175.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［87-51-4］ mp167℃ Fp171℃

12216-1A	TFS（12216-0100）	10g	￥5,100
12216-2A	TFS（12216-0250）	25g	￥8,700
12216-3A	TFS（12216-1000）	100g	￥28,600
12216-4A	TFS（12216-5000）	500g	￥109,500

インドール-2,4,5,6,7-d_5-3-酢酸
Indole-2,4,5,6,7-d_5-3-acetic acid

$C_8D_5NHCH_2COOH$...180.21
CAS RN® ［76937-78-5］

49129-17	CDN（D-2203）	98 atom% D	100mg	￥69,300

インドール-2,4,5,6,7-d_5-酢酸-d_2
Indole-2,4,5,6,7-d_5-acetic-d_2 acid

$C_{10}H_2D_7NO_2$...182.22
CAS RN® ［1173020-21-7］

49140-61	CDN（D-2218）	98 atom% D	50mg	￥40,700

インドール-3-酢酸-α,α-d_2
Indole-3-acetic-α,α-d_2 acid

$C_8H_6NCD_2COOH$...177.19
CAS RN® ［24420-86-8］

49129-16	CDN（D-1709）	98 atom% D	100mg	￥38,500

インドール-3-酢酸エチルエステル → インドール-3-酢酸エチル

インドール-3-酢酸メチルエステル → インドール-3-酢酸メチル

3-インドール酢酸カリウム
3-Indoleacetic acid potassium salt

$C_8H_6NCH_2COOK$...213.27
CAS RN® [2338-19-4]

20024-60	>97.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥4,100

3-インドールアセトニトリル
3-Indoleacetonitrile

警告

$C_{10}H_8N_2$...156.18 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [771-51-7] mp35℃～37℃▲

15665-1A	TFS（15665-0250）			25g	￥20,200

インドール-3-アセチル-*L*-イソロイシン
Indole-3-acetyl-*L*-isoleucine

$C_{16}H_{20}N_2O_3$...288.34 [凍] -20℃以下
CAS RN® [57105-45-0]

20276-62	>99.0%(T)		G	1g	￥25,000

インドール-3-アセチル-*L*-ロイシン
Indole-3-acetyl-*L*-leucine

$C_{16}H_{20}N_2O_3$...288.34 [凍] -20℃以下
CAS RN® [36838-63-8]

20282-62	>99.0%(T)		G	1g	￥20,000

インドール-4-アミン → 4-アミノインドール

3-インドール酪酸
3-Indolebutyric acid

危険

$C_{12}H_{13}NO_2$...203.23 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [133-32-4] mp123℃～129℃△

20158-60	>98.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥3,000
16069-1A	TFS（16069-0050）			5g	￥5,900
16069-2A	TFS（16069-0250）			25g	￥15,600
16069-3A	TFS（16069-1000）			100g	￥53,700

インドール-3-カルビノール水和物
Indole-3-carbinol hydrate

$C_9H_9NO \cdot nH_2O$ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［700-06-1］ mp96℃～101℃▲

12219-1A	TFS（12219-0050）	5g	￥7,900
12219-2A	TFS（12219-0250）	25g	￥29,000

4-インドールカルボニトリル → 4-シアノインドール

5-インドールカルボニトリル → 5-シアノインドール

6-インドールカルボニトリル → 6-シアノインドール

インドール-3-カルボキシアルデヒド
Indole-3-carboxaldehyde

警告

C_9H_7NO...145.15
CAS RN®［487-89-8］ mp193℃～198℃▲

20085-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥7,500
20085-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥3,000
15664-1A	TFS（15664-0250）		25g	￥7,700
15664-2A	TFS（15664-0050）		5g	￥2,700
15664-3A	TFS（15664-1000）		100g	￥24,600

インドール-4-カルボキシアルデヒド
Indole-4-carboxaldehyde

C_9H_7NO...145.15 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［1074-86-8］ mp140℃～146℃△

20267-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥12,500

インドール-7-カルボキシアルデヒド
Indole-7-carboxaldehyde

C_9H_7NO...145.15 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1074-88-0］ mp85℃～91℃△

20268-97	>98.0%(GC)	G	500mg	￥26,000

1*H*-インドール-7-カルボン酸
1*H*-Indole-7-carboxylic acid

$C_9H_7NO_2$...161.15
CAS RN® ［1670-83-3］ mp202℃～204℃▲

49260-45	TFS（BTB12826CB）	90%	250mg	￥3,800

インドール-2-カルボン酸
Indole-2-carboxylic acid

警告

$C_9H_7NO_2$...161.15
CAS RN® ［1477-50-5］ mp205℃～209℃▲

20031-32		>95.0%(HLC)	G 25g	￥10,000
20031-52		>95.0%(HLC)	G 5g	￥3,900
12220-1A	TFS（12220-0100）		10g	￥7,900
12220-2A	TFS（12220-0500）		50g	￥27,800

インドール-3-カルボン酸
Indole-3-carboxylic acid

$C_9H_7NO_2$...161.15
CAS RN® ［771-50-6］ mp232℃～234℃▲

30761-1A	TFS（30761-0010）	1g	￥4,600

インドール-5-カルボン酸
Indole-5-carboxylic acid

$C_9H_7NO_2$...161.15
CAS RN® ［1670-81-1］ mp208℃～210℃▲

12221-1A	TFS（12221-0010）	1g	￥5,200
12221-2A	TFS（12221-0050）	5g	￥17,800

インドール-6-カルボン酸
Indole-6-carboxylic acid

警告

$C_9H_7NO_2$...161.15
CAS RN® [1670-82-2] mp256℃～259℃▲

20032-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥17,500
20032-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,200
42468-1A TFS（42468-0025）			2.5g	￥7,700

インドール-2-カルボン酸エチルエステル → インドール-2-カルボン酸エチル

インドール-5-カルボン酸エチルエステル → インドール-5-カルボン酸エチル

インドール-3-カルボン酸メチルエステル → インドール-3-カルボン酸メチル

インドール-4-カルボン酸メチルエステル → インドール-4-カルボン酸メチル

インドール-5-カルボン酸メチルエステル → インドール-5-カルボン酸メチル

インドール-7-カルボン酸メチルエステル → インドール-7-カルボン酸メチル

インドール-2,3-ジオン → 2,3-インドリンジオン

インドール-3-グリオキシルアミド
Indole-3-glyoxylamide

$C_{10}H_8N_2O_2$...188.18 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [5548-10-7]

20293-62	>98.0%(HLC)	G	1g	￥10,000

インドール-3-グリオキシル酸
Indole-3-glyoxylic acid

$C_{10}H_7NO_3$...189.16 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1477-49-2］ mp209℃～217℃△

20294-52	>98.0%(T)	G	5g	￥16,000

インドール-3-(4′-オキソ)酪酸
Indole-3-(4′-oxo)butyric acid

$C_{12}H_{11}NO_3$...217.22
CAS RN® ［835-45-0］

20182-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥17,500

インドール-3-プロパンアミド → インドール-3-プロピオンアミド

インドール-3-プロパノール
Indole-3-propanol

$C_{11}H_{13}NO$...175.22 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3569-21-9］ d1.13†

20299-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥10,500

インドール-3-プロピオンアミド
Indole-3-propionamide

$C_{11}H_{12}N_2O$...188.22 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［5814-93-7］

20297-62	>99.0%(GC)	G	1g	￥10,500

インドール-3-プロピオン酸
Indole-3-propionic acid

$C_{11}H_{11}NO_2$...189.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［830-96-6］ mp132℃†

20499-1A	TFS（20499-0100）	10g	￥10,200
20499-2A	TFS（20499-0010）	1g	￥3,500

インドリン
Indoline

警告

C_8H_9N...119.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［496-15-1］ bp220℃～221℃† d1.07†

20019-02		>95.0%(GC)		500mL	￥22,000
20019-32		>95.0%(GC)		25mL	￥3,600
12224-1A	TFS（12224-0250）			25g	￥4,600
12224-2A	TFS（12224-1000）			100g	￥11,900

(*S*)-(-)-インドリン-2-カルボン酸
(*S*)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid

$C_9H_9NO_2$...163.17
CAS RN® ［79815-20-6］

34208-2A	TFS（34208-0050）			5g	￥12,200

2,3-インドリンジオン
2,3-Indolinedione

$C_8H_5NO_2$...147.13
CAS RN® ［91-56-5］ mp203.5℃†

20077-30		>97.5%(T)	特級	25g	￥5,300
15149-1A	TFS（15149-5000）			500g	￥20,800
15149-3A	TFS（15149-1000）			100g	￥6,400

4-インドリルアセテート → 4-アセトキシインドール

3-インドリルアセトニトリル → 3-インドールアセトニトリル

N-(3-インドリルアセチル)-*L*-イソロイシン → インドール-3-アセチル-*L*-イソロイシン

N-(3-インドリルアセチル)-*L*-ロイシン → インドール-3-アセチル-*L*-ロイシン

5-インドリルボロン酸
5-Indolylboronic acid

$C_8H_8BNO_2$...160.96 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［144104-59-6］

35946-1A	TFS（35946-5000）		500mg	￥8,600
35946-2A	TFS（35946-1000）		100mg	￥4,300

4-(3-インドリル)酪酸 → 3-インドール酪酸

インドメタシン-d_4(クロロベンゾイル-d_4)
Indomethacin-d_4 (chlorobenzoyl-d_4)

$C_{19}H_{12}ClD_4NO_4$...361.81
CAS RN® ［87377-08-0］

49140-62	CDN（D-6352）	98 atom% D	10mg	￥105,600

インドメタシン標準品
Indomethacine standard

$C_{19}H_{16}ClNO_4$...357.78 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［53-86-1］

49836-11	DES（C14325000）	環境分析用	250mg	￥14,000

インドナフテン → インデン

(*S*)-インドキサカルブ標準品
(*S*)-Indoxacarb standard

$C_{22}H_{17}N_3O_7ClF_3$...527.83 ［PRTR］1-430 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［173584-44-6］

49866-95	DES（C14325520）	残留農薬試験用	10mg	￥46,000

インドキサカルブ標準品
Indoxacarb standard

$C_{22}H_{17}ClF_3N_3O_7$...527.83 ［PRTR］1-430 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［144171-61-9］

49829-81	DES（C14325500）	残留農薬試験用	100mg	￥21,000

インジェクションカラムL 80-26
Injection column L 80-26

49016-02	ダイセル（00M03）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用		1pack(10個)	￥30,000

インジェクションカラムM 75-20
Injection column M 75-20

49016-01	ダイセル（00M02）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用		1pack(10個)	￥20,000

インジェクションカラムS 44-15
Injection column S 44-15

49016-00	ダイセル（00M01）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用		1pack(10個)	￥10,000

インジェクションジョイント(キラルフラッシュ^{R}カラム用)
Injection joint (for CHIRALFLASH^{R} column)

49016-10	ダイセル（00M05）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用		1pack	￥4,500

イノシン
Inosine

$C_{10}H_{12}N_4O_5$...268.22
CAS RN® ［58-63-9］ mp222℃～226℃(dec.)†

20113-60		鹿特級	G	1g	￥2,100
12225-1A	TFS（12225-1000）			100g	￥35,000
12225-2A	TFS（12225-0100）			10g	￥5,700
12225-3A	TFS（12225-0250）			25g	￥12,300

イノシン5′-一りん酸二ナトリウム *n* 水和物
Inosine 5′-monophosphate disodium salt *n*-hydrate

$C_{10}H_{11}N_4Na_2O_8P \cdot nH_2O$
CAS RN® [4691-65-0]

20029-61		>90.0%(as anhydrous)(UV-VIS)	鹿1級	G	1g	￥3,300
22626-1A	TFS（22626-0250）				25g	￥17,200
22626-2A	TFS（22626-0050）				5g	￥6,300

5′-イノシン酸ナトリウム → イノシン5′-一りん酸二ナトリウム *n* 水和物

m y o-イノシトール
myo-Inositol

$C_6H_6(OH)_6$...180.15
CAS RN® [87-89-8] mp225℃～227℃†

20030-00		>99.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥9,500
20030-30		>99.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,000
4728-2M	M（1.04728.0100）		微生物学用		100g	￥22,700

m y o-イノシトール
myo-Inositol

$C_6H_6(OH)_6$...180.15
CAS RN® [87-89-8] mp220℃～228℃

12226-1A	TFS（12226-0010）				1kg	￥47,400
12226-3A	TFS（12226-1000）				100g	￥9,300
12226-4A	TFS（12226-5000）				500g	￥28,600

m y o-イノシトール-1,2,3,4,5,6-d_6
myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d_6

$C_6D_6(OH)_6$...186.19
CAS RN® [68922-44-1]

49129-18	CDN（D-3019）	98 atom% D			100mg	￥70,400

イノシトール六りん酸,40-50%溶液
Inositol hexaphosphoric acid, 40-50% in water

$C_6H_{18}O_{24}P_6$...660.03
CAS RN®［83-86-3］ d1.285▲

23537-2A	TFS（23537-0010）		1L	￥20,400
23537-3A	TFS（23537-2500）		250mL	￥7,500

インピルフルキサム標準品
Inpyrfluxam standard

$C_{18}H_{21}F_2N_3O$...333.37 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1352994-67-2］

49867-65	DES（C14328250）	残留農薬試験用	10mg	￥31,000

インサート及びキャップ/セプタムキットディープウェルコレクションプレート用 350μLインサート及びキャップ/セプタム付
Insert and cap/septa kit, for deep well collection plates, includes 350μL inserts and caps/septa.

95252-43	ATI（5190-2237）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1000個)	￥123,000

インスリン (ヒト) リコンビナント (5 mg/mL)
Insulin Human (rek.) (5 mg/mL)

［凍］ -15℃以下

49433-61	BIOCO（5-79F00-G）		50mL	￥50,000

インテゲリミン
Integerrimine

$C_{18}H_{25}NO_5$...335.39 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［480-79-5］

49871-35	PHY（83968）	天然物化学研究用	5mg	￥95,000

インテゲリミン窒素酸化物
Integerrimine N-oxide

$C_{18}H_{25}NO_6$...351.39 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［85955-28-8］

49871-36	PHY（83969）	天然物化学研究用	5mg	￥105,000

インテルメジン
Intermedine

$C_{15}H_{25}NO_5$...299.36 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［10285-06-0］

49064-58	PHY（82424）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

インテルメジン *N*-オキシド
Intermedine *N*-oxide

$C_{15}H_{25}NO_6$...315.36 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［95462-14-9］

49871-14	PHY（83446）	天然物化学研究用	5mg	￥85,000

イントラエンド 5μL
intraEND 5μL

70036-00	BRA（709107）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	250本	￥4,500

イントラマーク 1/2/3/4/5μL
intraMARK 1/2/3/4/5μL

70025-00	BRA（708707）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	250本	￥5,000

イントラマーク 100μL
intraMARK 100μL

70025-05	BRA（708744）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	250本	￥5,000

イントラマーク 10μL
intraMARK 10μL

70025-01	BRA（708709）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	250本	￥5,000

イントラマーク 20/40μL
intraMARK 20/40μL

70025-08	BRA（708728）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	250本	￥5,000

イントラマーク 200μL
intraMARK 200μL

70025-06	BRA（708757）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	200本	￥8,000

イントラマーク 20μL
intraMARK 20μL

70025-02	BRA（708718）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	250本	￥5,000

イントラマーク 25μL
intraMARK 25μL

70025-03	BRA（708722）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	250本	￥5,000

イントラマーク 40μL
intraMARK 40μL

70025-07	BRA（708727）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	250本	￥5,000

イントラマーク 50/100μL
intraMARK 50/100μL

70025-11	BRA（708745）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	250本	￥5,000

イントラマーク 50μL
intraMARK 50μL

70025-04	BRA（708733）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用		250本	￥5,000

イヌリン
Inulin

$(C_6H_{10}O_5)_n$
CAS RN® ［9005-80-5］

20102-30		鹿特級	G	25g	￥12,500

インベルターゼ
Invertase

［凍］ -20℃

from Candida sp

49811-45	TYB（IVH-101）			200mg	￥20,000

一臭化よう素
Iodine monobromide

危険

IBr...206.80 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7789-33-5］ mp42℃ †

20036-31	>90.0%(T)	鹿1級		25g	￥6,000

一臭化よう素
Iodine monobromide

危険

IBr...206.80 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7789-33-5］ bp116℃ mp42℃～50℃ d4.41

20884-1A	TFS（20884-0500）			50g	￥8,600
20884-2A	TFS（20884-2500）			250g	￥29,400

一塩化よう素
Iodine monochloride

危険

ICl...162.35 ［危］6-HC-I ［労］57,57-2
CAS RN® ［7790-99-0］ bp97.4℃† mp27℃†

20037-31	98.0%～100.0%(T) 鹿1級		25g	￥5,500

一塩化よう素
Iodine monochloride

危険

ICl...162.35 ［危］6-HC-I ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7790-99-0］ bp97℃ mp26℃ d3.2

19696-2A	TFS（19696-1000）	100g	￥12,200
19696-3A	TFS（19696-5000）	500g	￥33,300

一塩化よう素,ジクロロメタン溶液
Iodine monochloride, in dichloromethane

ClI...162.35 ［労］特-2(特有),57,57-2 ［PRTR］1-186
CAS RN® ［7790-99-0］ d1.4200▲

1.0mol/L

37074-1A	TFS（37074-1000）	100mL	￥8,000
37074-2A	TFS（37074-8000）	800mL	￥50,900

4-インドフェニルボロン酸
4-Iodophenylboronic acid

$C_6H_6BIO_2$...247.82 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［5122-99-6］ mp326℃～330℃▲

35948-1A	TFS（35948-0010）	1g	￥4,600
35948-2A	TFS（35948-0050）	5g	￥13,200

イオメプロール標準品
Iomeprol standard

$C_{17}H_{22}I_3N_3O_8$...777.08 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［78649-41-9］

49860-69	DES（C14348000）	環境分析用	100mg	￥110,000

イオンクロマトグラフィー アクロディスク PSF 25mm-0.45μm 1000入
Ion chromatography Acrodisc^{R} PSF Syringe Filters, 25mm-0.45μm 1000/pack

97008-01	PALL（AP-4785）	濾過用	1pack(1000個)	￥442,900

イオンクロマトグラフィー アクロディスク PSF 25mm-0.45μm 50入
Ion chromatography Acrodisc^{R} PSF Syringe Filters, 25mm-0.45μm 50/pack

97008-00	PALL（AP-4585T）	濾過用	1pack(50個)	￥24,700

イオンクロマトグラフ陰イオン分析用溶離液(AS12A)
Ion chromatography eluent (AS12A)

2.7mmol/L Na_2CO_3 / 0.3mmol/L $NaHCO_3$

49101-22	TFS（81140153）	3L×2本	☆

イオンクロマトグラフ陰イオン分析用溶離液(AS14)
Ion chromatography eluent (AS14)

3.5mmol/L Na_2CO_3 / 1.0mmol/L $NaHCO_3$

49101-66	TFS（81140154）	3L×2本	☆

イオンクロマトグラフ陰イオン分析用溶離液(AS4A)
Ion chromatography eluent (AS4A)

1.8mmol/L Na_2CO_3 / 1.7mmol/L $NaHCO_3$

49101-21	TFS（81140155）	3L×2本	☆

イオンクロマトグラフ陽イオン分析用溶離液(CS12/CS12A)
Ion chromatography eluent (CS12/CS12A)

警告

20mmol/L Methanesulfonic acid

49101-67	TFS（81140159）		3L×2本	☆

イオンクロマトグラフ陽イオン分析用溶離液(CS14)
Ion chromatography eluent (CS14)

警告

10mmol/L Methanesulfonic acid

49101-68	TFS（81140160）		3L×2本	☆

イプコナゾール標準品
Ipconazole standard

警告

$C_{18}H_{24}ClN_3O$...333.85 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［125225-28-7］

49834-27	DES（C14365000）	残留農薬試験用	100mg	￥58,000

イプフェンカルバゾン標準品
Ipfencarbazone standard

$C_{18}H_{14}Cl_2F_2N_4O_2$...427.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［212201-70-2］ mp134℃～137℃▲

49865-67	DES（C14366000）	残留農薬試験用	25mg	￥25,000

イプロベンホス標準品
Iprobenfos standard

危険

$C_6H_5CH_2SPO[OCH(CH_3)_2]_2$...288.34 ［PRTR］1-254
CAS RN®［26087-47-8］ d1.103†

20054-96	>95.0%(GC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥12,000
49861-42	DES（CA14368000）	残留農薬試験用		100mg	￥26,000

イプロベンホス標準液
Iprobenfos standard solution

危険

$C_6H_5CH_2SPO[OCH(CH_3)_2]_2$...288.34 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［26087-47-8］

10mg/L アセトニトリル溶液

49828-21	DES（L14368000AL）	残留農薬試験用	10mL	￥9,000

イプロジオン標準品
Iprodione standard

警告

$C_{13}H_{13}Cl_2N_3O_3$...330.16 ［PRTR］1-168 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［36734-19-7］ mp134℃†

49803-07	DES（C14370000）	残留農薬試験用	100mg	￥11,000

イプロジオン-d_5
Iprodione-d_5

$C_{13}H_8Cl_2D_5N_3O_3$...335.19 ［PRTR］1-168
CAS RN®［1215631-57-4］

49140-72	CDN（D-6422）	97 atom% D	10mg	￥39,600

イプロジオン代謝物1標準品
Iprodione metabolite 1 standard

$C_{13}H_{13}Cl_2N_3O_3$...330.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［63637-89-8］

49832-63	DES（C14370500）	残留農薬試験用	100mg	￥54,000

イプロニダゾール標準品
Ipronidazole standard

$C_7H_{11}N_3O_2$...169.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［14885-29-1］ mp58℃(dec.)▲

49864-69	DES（C14370700）	食品分析用	50mg	￥37,000

イプロニダゾール-d_3標準品
Ipronidazole-d_3 standard

$C_7H_8D_3N_3O_2$...172.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1015855-83-0］

49836-73	DES（C14370701）	食品分析用	10mg	￥45,000

イプロニダゾール-ヒドロキシ標準品
Ipronidazole-hydroxy standard

$C_7H_{11}N_3O_3$...185.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［35175-14-5］ mp180℃(dec.)▲

49864-70	DES（C14370720）	食品分析用	10mg	￥55,000

イプロバリカルブ標準品
Iprovalicarb standard

$C_{18}H_{28}N_2O_3$...320.42 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［140923-17-7］

49829-78	DES（C14371000）	残留農薬試験用	100mg	￥21,000

イルガロール1051標準品
Irgarol 1051 standard

$C_{11}H_{19}N_5S$...253.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［28159-98-0］

49862-96	DES（C14374000）	環境分析用	100mg	￥36,000

イルガロール-d_9
Irgarol-d_9

$C_{11}H_{10}D_9N_5S$...262.42
CAS RN® ［1189926-01-9］

49144-70	CDN（D-7147）	99 atom% D	50mg	￥105,600

イリジン
Iridin

$C_{24}H_{26}O_{13}$...522.45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［491-74-7］

49064-59	PHY（82562）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

イリジウム標準原液(Ir 1000)
Iridium standard solution (Ir 1000)

［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［麻］麻薬等原料

Ir 10%～20% HCl溶液, Ir:1000mg/L

19604-1A	TFS（19604-1000）	原子吸光分析用	100mL	☆

イリフロフェノン 3-*C*-グルコシド
Iriflophenone 3-*C*-glucoside

$C_{19}H_{20}O_{10}$...408.35
CAS RN® ［104669-02-5］

49868-21	PHY（83511）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

イリゲニン
Irigenin

$C_{18}H_{16}O_{8}$...360.31
CAS RN® ［548-76-5］

49868-22	PHY（83512）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

イリスフロレンチン
Irisflorentin

$C_{20}H_{18}O_{8}$...386.35
CAS RN® ［41743-73-1］

49064-60	PHY（82563）	天然物化学研究用	10mg	￥75,000

イサチン → 2,3-インドリンジオン

イサゾホス標準品
Isazofos standard

$C_{9}H_{17}ClN_{3}O_{3}PS$...313.74 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［42509-80-8］

49803-78	DES（C14377000）	残留農薬試験用	100mg	￥11,000

イソアラントラクトン
Isoalantolactone

$C_{15}H_{20}O_2$...232.31
CAS RN®［470-17-7］

49064-61	PHY（89228）	天然物化学研究用	10mg	￥90,000

イソアミルアルコール → 3-メチル-1-ブタノール

イソアミルアミン
Isoamylamine

$C_5H_{13}N$...87.16 ［危］4-1-S-II
CAS RN®［107-85-7］bp95℃～97℃▲ d0.75▲

15547-1A	TFS（15547-0250）		25mL	￥6,200
15547-2A	TFS（15547-0050）		5mL	￥2,600

イソアミルブロミド → 1-ブロモ-3-メチルブタン

イソアミルエーテル → ジイソペンチルエーテル

D-イソアスコルビン酸
D-Isoascorbic acid

$C_6H_8O_6$...176.12
CAS RN®［89-65-6］ mp164℃～169℃(dec.)†

01705-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,300
22727-1A	TFS（22727-5000）				500g	￥7,800
22727-2A	TFS（22727-0025）				2.5kg	￥14,800

イソババカルコン
Isobavachalcone

$C_{20}H_{20}O_4$...324.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［20784-50-3］

49869-56	PHY（83317）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

イソベンザン標準品
Isobenzan standard

危険

$C_9H_4Cl_8O$...411.74 ［毒］II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［297-78-9］

49860-50	DES（C14380000）	残留農薬試験用	10mg	￥11,000

イソベルガプテン
Isobergapten

$C_{12}H_8O_4$...216.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［482-48-4］

49873-60	PHY（82564）	天然物化学研究用	10mg	￥40,000

DL-イソボルネオール
DL-Isoborneol

$C_{10}H_{18}O$...154.24
CAS RN® ［124-76-5］ mp212℃～214℃(dec.)▲

12249-1A	TFS（12249-0250）	tech.	25g	￥3,600
12249-2A	TFS（12249-5000）	tech.	500g	￥8,600

イソブメトン標準品 → セクブメトン標準品

イソブタノール → 2-メチル-1-プロパノール

2-イソブトキシエタノール
2-Isobutoxyethanol

危険

$C_6H_{14}O_2$...118.17 ［劇］III ［危］4-2-S-III
CAS RN® ［4439-24-1］

20220-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥3,600
20220-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥1,500

2-(2-イソブトキシエトキシ)エタノール
2-(2-Isobutoxyethoxy)ethanol

警告

$C_8H_{18}O_3$...162.22 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［18912-80-6］

20221-02	>98.0%(GC)		G	500mL	￥2,800
20221-32	>98.0%(GC)		G	25mL	￥1,300

イソブチルアルコール → 2-メチル-1-プロパノール

イソブチルアミン
Isobutylamine

危険

$(CH_3)_2CHCH_2NH_2$...73.13 ［危］4-1-S-II
CAS RN® ［78-81-9］ bp67.5℃† mp-85℃† d0.727～0.733△ Fp-9℃†

04358-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥5,500
04358-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,600

イソブチルアミン臭化水素酸塩
Isobutylamine hydrobromide

49009-74	昭化（0913-5350）			500g	￥140,000
49009-75	昭化（0913-4380）			15kg	☆

3-(イソブチルカルバモイル)フェニルボロン酸
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid

$C_{11}H_{16}BNO_3$...221.06 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［723282-09-5］

20092-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥30,000
20092-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥9,000

2-[(4*R*)-4-イソブチル-4,5-ジヒドロ-2-オキサゾリル]-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
2-[(4*R*)-4-Isobutyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine

$C_{13}H_{15}F_3N_2O$...272.26

49215-11	ダイセル（135903-100MG）		100mg	￥29,400

イソブチレンオキシド
Isobutylene oxide

C_4H_8O...72.10 ［危］4-1-II
CAS RN® ［558-30-5］ bp51℃～52℃▲ d0.808▲

34850-1A	TFS（34850-0250）		25mL	￥13,200
34850-2A	TFS（34850-1000）		100mL	￥34,500

イソチオシアン酸イソブチル
Isobutyl isothiocyanate

C_5H_9NS...115.19 ［危］4-2-III
CAS RN® ［591-82-2］ bp160℃～162℃▲ d0.94▲

49260-75	TFS（SB01703EA）	97%	10g	￥7,400

2-イソブチル-3-メトキシ-d_3-ピラジン
2-Isobutyl-3-methoxy-d_3-pyrazine

$C_9H_{11}D_3N_2O$...169.23 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［588732-63-2］

49140-73	CDN（D-5975）	99 atom% D	50mg	￥114,400

3-イソブチル-1-メチルキサンチン
3-Isobutyl-1-methylxanthine

$C_{10}H_{14}N_4O_2$...222.24 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［28822-58-4］ mp200℃～201℃▲

22842-1A	TFS（22842-0010）		1g	￥26,400

4-イソブチルフェニルボロン酸
4-Isobutylphenylboronic acid

警告

$C_{10}H_{15}BO_2$...178.03 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［153624-38-5］

20336-55	>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥8,500
20336-65	>98.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥3,800

(*R*)-2-イソブチルこはく酸1-メチルエステル
(*R*)-2-Isobutylsuccinic acid 1-methyl ester

$C_9H_{16}O_4$...188.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［130165-76-3］

光学純度:98% ee

36305-1A	TFS（36305-5000）	500mg	￥62,100
36305-2A	TFS（36305-0010）	1g	￥107,100

イソブチルアルデヒド
Isobutyraldehyde

$(CH_3)_2CHCHO$...72.10 ［危］4-1-II ［PRTR］1-35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［78-84-2］ bp64℃† d(20/4℃) 0.794†

12251-1A	TFS（12251-0025）	2.5L	￥12,200
12251-2A	TFS（12251-0010）	1L	￥5,300

イソブチルアルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン(DNPH)標準原液
Isobutyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) standard stock solution

危険

$(CH_3)_2CHCH{:}NNHC_6H_3(NO_2)_2$...252.22 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2057-82-1］ Fp-4℃(as Ethyl acetate)†

0.350mg/mL(イソブチルアルデヒドとして 0.1mg/mL) 酢酸エチル溶液

04440-96	悪臭物質測定用			2mL×5	￥10,000

イソ酪酸
Isobutyric acid

危険

$(CH_3)_2CHCOOH$...88.10 ［危］4-2-III
CAS RN® ［79-31-2］ bp155℃† mp-47℃† d(20℃) 0.948† Fp56℃†

04442-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥3,300
04442-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,900

イソ酪酸
Isobutyric acid

危険

$(CH_3)_2CHCOOH$...88.10 ［危］4-2-III
CAS RN® ［79-31-2］ bp153℃～154℃ mp47℃ d0.95 Fp59℃

12252-1A	TFS（12252-0010）		1kg	￥8,500
12252-2A	TFS（12252-0250）		25g	￥4,600
12252-3A	TFS（12252-5000）		500g	￥6,600

N-イソブチリルグリシン-2,2-d_2
N-Isobutyrylglycine-2,2-d_2

$(CH_3)_2CHCONHCD_2COOH$...147.16
CAS RN® ［1219799-10-6］

49146-81	CDN（D-6229）	98 atom% D	50mg	￥52,800

イソカルバミド標準品
Isocarbamid standard

$C_8H_{15}N_3O_2$...185.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［30979-48-7］

49860-35	DES（C14400000）	残留農薬試験用	100mg	￥23,000

イソカルボホス標準品
Isocarbofos standard

危険

$C_{11}H_{16}NO_4PS$...289.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［24353-61-5］

20316-96	>99.0%(GC)	残留農薬試験用	100mg	￥20,000
49833-44	DES（C14402000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

イソクロマン
Isochroman

$C_9H_{10}O$...134.17 ［危］4-2-III
CAS RN® ［493-05-0］ bp75℃(4mm)▲ d1.067▲

12254-1A	TFS（12254-0250）		25g	￥8,600
12254-2A	TFS（12254-0050）		5g	￥3,200

3-イソクロマノン
3-Isochromanone

警告

$C_9H_8O_2$...148.15
CAS RN® ［4385-35-7］

20083-32	>95.0%(HLC)		G	25g	￥10,000
20083-52	>95.0%(HLC)		G	5g	￥4,100

イソシンコメロン酸
Isocinchomeronic acid

警告

$C_5H_3N(COOH)_2$...167.11
CAS RN® ［100-26-5］ mp254℃ †

32489-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,600
13187-1A	TFS（13187-5000）			500g	￥22,000
13187-2A	TFS（13187-0050）			5g	￥6,900

DL-イソくえん酸三ナトリウム *n* 水和物
DL-Isocitric acid trisodium salt *n*-hydrate

$C_6H_5O_7Na_3 \cdot nH_2O$
CAS RN® ［1637-73-6］

20501-1A	TFS（20501-0010）		1g	￥10,200
20501-2A	TFS（20501-0050）		5g	￥31,300

(+)-イソコリジン塩酸塩
(+)-Isocorydine hydrochloride

$C_{20}H_{23}NO_4$･HCl...377.86
CAS RN® [13552-72-2]

49064-63	PHY（80479）	天然物化学研究用	10mg	￥40,000

2-イソシアナトベンゾニトリル
2-Isocyanatobenzonitrile

$C_8H_4N_2O$...144.12 ［劇］III ［冷］ 4℃以下
CAS RN® [42066-86-4] mp61℃～62℃▲

49260-76	TFS（BTB13667DA）	95%	1g	￥56,000
49260-77	TFS（BTB13667CB）	95%	250mg	￥17,300

2-(4-イソシアナトフェニル)ピリミジン
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine

$C_{11}H_7N_3O$...197.19 ［冷］ 4℃以下
CAS RN® [216059-84-6] mp85.5℃～87.5℃▲

49260-97	TFS（CC56206DA）	90%	1g	￥38,400
49261-00	TFS（CC56206CB）	90%	250mg	￥12,300

1-(3-イソシアナトフェニル)-1 *H*-ピロール
1-(3-Isocyanatophenyl)-1*H*-pyrrole

$C_{11}H_8N_2O$...184.19 ［冷］ 4℃以下
CAS RN® [857283-59-1] mp46℃～47℃▲

49261-01	TFS（CC21906DA）	97%	1g	￥69,400
49261-02	TFS（CC21906CB）	97%	250mg	￥23,900

2-(4-イソシアナトフェニル)-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
2-(4-Isocyanatophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine

$C_{13}H_7F_3N_2O$...264.20 ［冷］ 4℃以下
CAS RN® [906352-73-6] mp79℃～82℃▲

49261-06	TFS（CC53006DA）	97%	1g	￥33,500
49261-07	TFS（CC53006CB）	97%	250mg	￥13,400

4-(4-イソシアナトピリド-2-イル)モルホリン
4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine

$C_{10}H_{11}N_3O_2$...205.21 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［876316-43-7］ mp67℃～69℃▲

49261-08	TFS（CC43106DA）	95%		1g	￥60,100
49261-09	TFS（CC43106CB）	95%		250mg	￥23,900

4-イソシアナト-4-チエン-2-イルテトラヒドロピラン
4-Isocyanato-4-thien-2-yltetrahydropyran

$C_{10}H_{11}NO_2S$...209.26 ［冷］ 4℃以下
CAS RN® ［926921-63-3］ mp49.5℃～52.5℃▲

49261-12	TFS（CC62206DA）	95%		1g	￥38,400
49261-13	TFS（CC62206CB）	95%		250mg	￥12,900

イソドリン標準品
Isodrin standard

$C_{12}H_8Cl_6$...364.90 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［465-73-6］

49860-74	DES（C14410000）		残留農薬試験用	100mg	￥8,000

イソエシンIA
Isoescin IA

$C_{55}H_{86}O_{24}$...1131.25 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［219944-39-5］

49873-61	PHY（83862）		天然物化学研究用	10mg	￥62,000

イソエシンIB
Isoescin IB

$C_{55}H_{86}O_{24}$...1131.25 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［219944-46-4］

49873-62	PHY（83863）		天然物化学研究用	10mg	￥62,000

イソオイゲノール
Isoeugenol

警告

$CH_3CH:CHC_6H_3(OCH_3)OH$...164.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［97-54-1］ bp266℃† mp-10℃† d1.081～1.087△

14219-32		>98.0%(GC)	G	25g	￥6,300
12257-1A	TFS（12257-1000）			100g	￥6,500
12257-2A	TFS（12257-0050）			5g	￥2,300
12257-3A	TFS（12257-5000）			500g	￥16,400

イソオイゲノール標準品
Isoeugenol standard

$C_{10}H_{12}O_2$...164.20 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［97-54-1］

49830-11	DES（C14415000）	残留農薬試験用	250mg	￥8,000

イソフェンホス標準品
Isofenphos standard

危険

$C_{15}H_{24}NO_4PS$...345.39 ［毒］II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［25311-71-1］

49801-40	DES（C14420000）	残留農薬試験用	100mg	￥14,000

イソフェンホス標準液
Isofenphos standard solution

$C_{15}H_{24}NO_4PS$...345.39 ［劇］III［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［25311-71-1］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49833-63	DES（L14420000CY）	残留農薬試験用	10mL	￥9,500

イソフェンホスメチル標準品
Isofenphos-methyl standard

$C_{14}H_{22}NO_4PS$...331.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［99675-03-3］

49833-43	DES（C14421000）	残留農薬試験用	50mg	￥45,000

イソフェンホスオキソン標準品
Isofenphos-oxon standard

$C_{15}H_{24}NO_5P$...329.32 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［31120-85-1］

49833-17	DES（C14423000）	残留農薬試験用	10mg	￥43,000

t r a n s-イソフェルラ酸
trans-Isoferulic acid

$C_{10}H_{10}O_4$...194.18
CAS RN®［25522-33-2］

49064-64	PHY（89717）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

イソフェタミド標準品
Isofetamid standard

$C_{20}H_{25}NO_3S$...359.48 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［875915-78-9］ mp103.5℃～105℃▲

49866-37	DES（C14424000）	残留農薬試験用	25mg	￥35,000

イソホルモノネチン
Isoformononetin

$C_{16}H_{12}O_4$...268.26
CAS RN®［486-63-5］

49869-58	PHY（83257）	天然物化学研究用	10mg	￥145,000

イソフォルスコリン
Isoforskolin

$C_{22}H_{34}O_7$...410.50
CAS RN®［64657-21-2］

49064-65	PHY（82566）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

イソフラキシジン
Isofraxidin

$C_{11}H_{10}O_5$...222.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［486-21-5］

49064-66	PHY（89229）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

イソゲンチシン
Isogentisin

$C_{14}H_{10}O_5$...258.22
CAS RN® [491-64-5]

49869-59	PHY（83239）	天然物化学研究用	10mg	￥49,000

イソギンクゲチン
Isoginkgetin

$C_{32}H_{22}O_{10}$...566.50
CAS RN® [548-19-6]

49868-23	PHY（83513）	天然物化学研究用	5mg	￥60,000

イソヘプタデカン酸 → 15-メチルヘキサデカン酸

イソヘプタデカン酸メチル → 15-メチルヘキサデカン酸メチル

イソヘキサン → 2-メチルペンタン

イソインペラトリン
Isoimperatorin

$C_{16}H_{14}O_4$...270.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [482-45-1]

49064-67	PHY（89323）	天然物化学研究用	10mg	￥46,000

イソインドリン塩酸塩
Isoindoline hydrochloride

$C_8H_9N \cdot HCl$...155.62
CAS RN® [32372-82-0]

20017-52	>95.0%		5g	￥26,000
20017-62	>95.0%		1g	￥7,500

D L-イソロイシン
DL-Isoleucine

$CH_3CH_2CH(CH_3)CH(NH_2)COOH$...131.17
CAS RN® [443-79-8]

24207-40		>98.0%(T)	鹿特級	G	10g	￥13,000

L(+)-イソロイシン
L(+)-Isoleucine

$CH_3CH_2CH(CH_3)CH(NH_2)COOH$...131.17
CAS RN® [73-32-5] mp288℃(dec.)†

24096-30		>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,100
24096-60		>99.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥2,200
58856-30	PRO		食品添加物		1kg	￥27,000

L(+)-イソロイシン
L(+)-Isoleucine

$CH_3CH_2CH(CH_3)CH(NH_2)COOH$...131.17
CAS RN® [73-32-5] mp284℃～286℃

16617-1A	TFS（16617-0050）				5g	￥2,800
16617-2A	TFS（16617-0250）				25g	￥6,000
16617-3A	TFS（16617-1000）				100g	￥17,500
16617-4A	TFS（16617-5000）				500g	￥49,700

L-イソロイシン
L-Isoleucine

49433-87	BIOCO（CN-9019-O）				100g	￥18,000
49433-88	BIOCO（CN-9019-R）				500g	￥70,000

L-イソロイシン CRM6013-a
L-Isoleucine, CRM6013-a

$CH_3CH_2CH(CH_3)CH(NH_2)COOH$...131.17
CAS RN® [73-32-5]

Certified value:99.7±0.2%

49003-76	NMI（CRM6013-a）		認証標準物質		0.5g	☆

L-イソロイシン-2-d_1
L-Isoleucine-2-d_1

$CH_3CH_2CH(CH_3)CD(NH_2)COOH$...132.17
CAS RN® [127290-60-2]

49146-82	CDN（D-6353）	98 atom% D	250mg	￥47,300

L-イソロイシンメチルエステル塩酸塩
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride

$C_7H_{15}NO_2 \cdot HCl$...181.65
CAS RN® [18598-74-8]

20122-32	>97.0%(T)	G	25g	￥11,000
20122-52	>97.0%(T)	G	5g	￥4,200

L(+)-イソロイシノール
L(+)-Isoleucinol

$C_2H_5CH(CH_3)CH(NH_2)CH_2OH$...117.18
CAS RN® [24629-25-2] mp30℃ †

18394-1A	TFS（18394-0050）	5g	￥29,000
18394-2A	TFS（18394-0010）	1g	￥7,800

イソリクイリチゲニン
Isoliquiritigenin

$C_{15}H_{12}O_4$...256.25
CAS RN® [961-29-5]

49868-24	PHY（89544）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

イソリキリチン
Isoliquiritin

$C_{21}H_{22}O_9$...418.39
CAS RN® [5041-81-6]

49064-69	PHY（80481）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

イソマンギフェリン
Isomangiferin

$C_{19}H_{18}O_{11}$...422.33
CAS RN® [24699-16-9]

49868-25	PHY（83514）	天然物化学研究用	10mg	￥81,000

イソマンニド
Isomannide

$C_6H_{10}O_4$...146.14
CAS RN® [641-74-7]

20115-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥11,000
20115-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥4,000

(+)-イソメントール
(+)-Isomenthol

$C_{10}H_{20}O$...156.26 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23283-97-8]

49064-70	PHY（80016）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

イソメントン
Isomenthone

$C_{10}H_{18}O$...154.24 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [491-07-6]

49064-71	PHY（89328）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

イソメチオジン標準品
Isomethiozin standard

$C_{12}H_{20}N_4OS$...268.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [57052-04-7]

49861-00	DES（C14430000）	残留農薬試験用	100mg	￥27,000

α-イソメチルイオノン標準品
α-Isomethyl ionone standard

$C_{14}H_{22}O$...206.32 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [127-51-5] d0.93▲ Fp126℃▲

49866-76	DES（C14433000）	環境分析用	100mg	￥27,000

イソミトラフィリン
Isomitraphylline

$C_{21}H_{24}N_2O_4$...368.42 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［4963-01-3］

49064-72	PHY（89718）		天然物化学研究用	10mg	￥75,000

イソモグロシドV
Isomogroside V

$C_{60}H_{102}O_{29}$...1287.43
CAS RN® ［1126032-65-2］

49873-63	PHY（84226）		天然物化学研究用	10mg	￥50,000

イソニコチンアミド-2,3,5,6-d_4
Isonicotinamide-2,3,5,6-d_4

$C_6H_2D_4N_2O$...126.14
CAS RN® ［1219799-40-2］

49140-76	CDN（D-6004）	98 atom% D		250mg	￥88,000

イソニコチン酸
Isonicotinic acid

警告

C_5H_4NCOOH...123.10
CAS RN® ［55-22-1］ mp314℃～317℃ †

28149-30		>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,400
12259-1A	TFS（12259-5000）				500g	￥16,400
12259-3A	TFS（12259-1000）				100g	￥6,000

イソニコチン酸-d_4
Isonicotinic-d_4 acid

C_5D_4NCOOH...127.13
CAS RN® ［53907-55-4］

49129-38	CDN（D-4348）	98 atom% D		100mg	￥26,400

イソニコチン酸ヒドラジド → イソニコチノヒドラジド

イソニコチノヒドラジド
Isonicotinohydrazide

危険

$C_5H_4NCONHNH_2$...137.13
CAS RN®［54-85-3］ mp173℃▲

20224-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,700
12260-1A	TFS（12260-1000）				100g	￥5,200
12260-2A	TFS（12260-0050）				5g	￥3,800
12260-3A	TFS（12260-5000）				500g	￥19,100

イソニコチノニトリル
Isonicotinonitrile

警告

CNC_5H_4N...104.10 ［劇］III
CAS RN®［100-48-1］ mp83℃†

07783-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥4,100
11087-1A	TFS（11087-5000）				500g	￥10,100
11087-3A	TFS（11087-1000）				100g	￥3,000

イソニコチノイル-d_4-ヒドラジド
Isonicotinoyl-d_4-hydrazide

$C_6H_3D_4N_3O$...141.16
CAS RN®［774596-24-6］

49140-77	CDN（D-6924）	98 atom% D		250mg	￥83,600

イソニペコタミド
Isonipecotamide

$C_5H_{10}NCONH_2$...128.17
CAS RN®［39546-32-2］ mp148℃～151℃†

12261-1A	TFS（12261-1000）			100g	￥14,500

イソニペコチン酸
Isonipecotic acid

$C_6H_{11}NO_2$...129.15
CAS RN® [498-94-2] mp>300℃▲

20076-52	>98.0%(after drying)	G	5g	￥4,300
20076-62	>98.0%(after drying)	G	1g	￥2,600
12262-1A	TFS（12262-1000）		100g	￥14,600
12262-2A	TFS（12262-0250）		25g	￥4,500

イソノナデカン酸メチル → 17-メチルオクタデカン酸メチル

イソオクタン → 2,2,4-トリメチルペンタン

イソオクテン → 2,4,4-トリメチル-1-ペンテン

イソオクテン
Isooctene, mixture

危険

C_8H_{16}...112.21 [危] 4-1-II
CAS RN® [11071-47-9] d(20/20℃) 0.72▲

31010-02	>95.0%(GC)	G	500mL	￥8,500

イソパルミチン酸メチル → 14-メチルペンタデカン酸メチル

イソペンタデカン酸メチル → 13-メチルテトラデカン酸メチル

イソペンタナール → イソ吉草酸アルデヒド

イソペンタン
Isopentane

危険

$(CH_3)_2CHCH_2CH_3$...72.14 ［危］4-SI-I［労］57,57-2
CAS RN® ［78-78-4］ bp27.9℃† d(20/4℃) 0.620† Fp-51℃†

25211-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥3,000
25211-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,800

イソペンタン酸 → イソ吉草酸

イソペンチルアルコール → 3-メチル-1-ブタノール

イソペンチルエーテル → ジイソペンチルエーテル

イソペンチルメチルケトン → 5-メチル-2-ヘキサノン

イソホロン
Isophorone

警告

$C_9H_{14}O$...138.20 ［危］4-3-III［労］57,57-2
CAS RN® ［78-59-1］ bp215.2℃† d(20℃) 0.92† Fp96℃†

20078-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥2,200
20078-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,600

イソホロン-d_8(2,4,4,6,6-d_5;3-メチル-d_3)
Isophorone-d_8 (2,4,4,6,6-d_5;3-methyl-d_3)

$C_9D_8H_6O$...146.25 ［危］4-3-III［労］57,57-2
CAS RN® ［14397-59-2］

49129-39	CDN（D-2304）	98 atom% D		100mg	￥42,900

イソフタルアルデヒド
Isophthalaldehyde

$C_8H_6O_2$...134.13
CAS RN® [626-19-7] mp88℃～90℃▲

15174-1A	TFS（15174-0050）		5g	￥3,800
15174-2A	TFS（15174-0250）		25g	￥12,100

イソフタル酸
Isophthalic acid

警告

$C_6H_4(COOH)_2$...166.13
CAS RN® [121-91-5] mp345℃～348℃†

32210-01	>97.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥2,900
32210-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,600

イソフタル酸-2,4,5,6-d_4
Isophthalic-2,4,5,6-d_4 acid

$C_6D_4(COOH)_2$...170.15
CAS RN® [148472-48-4]

49129-40	CDN（D-2819）	98 atom% D	1g	￥57,200

イソフタル酸ビス-*n*-オクチルエステル標準品
Isophthalic acid, bis-*n*-octhyl ester standard

$C_{24}H_{38}O_4$...390.55 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [4654-18-6]

49860-11	DES（C14447400）	環境分析用	250mg	￥13,000

イソフタロニトリル
Isophthalonitrile

$C_6H_4(CN)_2$...128.13 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN® [626-17-5] mp161℃～162℃†

16366-1A	TFS（16366-2500）		250g	￥16,700
16366-3A	TFS（16366-0050）		5g	￥2,900

イソピムピネリン
Isopimpinellin

$C_{13}H_{10}O_5$...246.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［482-27-9］

49064-73	PHY（89873）	天然物化学研究用	20mg	￥49,000

イソプレン
Isoprene

危険

CH_2:C(CH_3)CH:CH_2...68.11 ［危］4-SI-I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［78-79-5］ bp34.1℃† mp-146℃† d(20/4℃) 0.681† Fp-48℃†

stabilized with 4-*tert*-butylpyrocatechol

20079-01	>98.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥8,500
20079-31	>98.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥2,000

イソプロカルブ標準品
Isoprocarb standard

危険

$C_{11}H_{15}NO_2$...193.24 ［劇］III ［PRTR］1-425 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2631-40-5］

49801-41	DES（C14450000）	残留農薬試験用	100mg	￥13,000

イソプロパリン標準品
Isopropalin standard

$C_{15}H_{23}N_3O_4$...309.36 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［33820-53-0］

49827-55	DES（C14460000）	残留農薬試験用	100mg	￥19,000

イソプロパノール → 2-プロパノール

イソプロパノール
Isopropanol

$(CH_3)_2CHOH$...60.09 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［67-63-0］bp82.5℃† mp-89.5℃† d(20/4℃) 0.785† Fp11.7℃†

20322-09	医薬部外品原料規格	G	500mL	￥1,100
20322-84	医薬部外品原料規格	M	14kg	☆

イソプロパノール
Isopropanol

(CH_3)2CHOH...60.09 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［67-63-0］bp82.5℃† mp-89.5℃† d(20/4℃) 0.785† Fp11.7℃†

20359-76	医薬品製造用	G	3L	￥5,200

イソプロパノール
Isopropanol

$(CH_3)_2CHOH$...60.09 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［67-63-0］bp81℃～83℃ mp89.5℃ d0.785 Fp12℃

41279-1A	TFS（41279-0010）		1L	￥11,800
41279-2A	TFS（41279-0025）		2.5L	￥19,600
41279-3A	TFS（41279-5000）		500mL	￥8,200

イソプロパノール
Isopropanol

$(CH_3)_2CHOH$...60.09 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［67-63-0］bp81℃～83℃ mp89.5℃ d0.785 Fp12℃

16788-1A	TFS（16788-0010）		1L	￥12,500
16788-2A	TFS（16788-0025）		2.5L	￥19,300

イソプロパノール -Plus- → 2-プロパノール -Plus-

イソプロパノール, AcroSeal[R]
Isopropanol, AcroSeal[R]

危険

$(CH_3)_2CHOH$...60.09 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［67-63-0］bp81℃～83℃ mp89.5℃ d0.785 Fp12℃

32696-1A	TFS（32696-0010）		1L	￥17,900
32696-2A	TFS（32696-0025）		2.5L	￥37,500
32696-3A	TFS（32696-1000）		100mL	￥8,800

イソプロパノール(脱水) → 2-プロパノール(脱水)

イソプロパノール-1,1,1,3,3,3-d_6 → 2-プロパノール-1,1,1,3,3,3-d_6

イソプロパノール-d_8 → 2-プロパノール-d_8

イソプロパノール-d_8(重水素化率99%以上) → 2-プロパノール-d_8(重水素化率99%以上)

イソプロパノールアミン → 1-アミノ-2-プロパノール

イソプロパノールアミン *p*-トルエンスルホン酸塩
Isopropanolamine *p*-toluenesulfonate

$CH_3CH(OH)CH_2NH_2 \cdot C_7H_8O_3S$...247.31
mp162℃～166℃▲

49008-62	昭化（0917-5350）	98.0%	500g	￥134,200

イソプロペニルベンゼン → 2-フェニルプロペン

(-)-4-イソプロペニル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド → *L*(-)-ペリルアルデヒド

イソプロペニルメチルエーテル → 2-メトキシプロペン

3-(イソプロポキシカルボニル)フェニルボロン酸
3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid

$C_{10}H_{13}BO_4$...208.02 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［342002-80-6］

20111-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥17,000
20111-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥5,500

4-(イソプロポキシカルボニル)フェニルボロン酸
4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronic acid

$C_{10}H_{13}BO_4$...208.02 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［342002-82-8］

20091-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥20,000
20091-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥6,800

2-イソプロポキシエタノール
2-Isopropoxyethanol

危険

$C_5H_{12}O_2$...104.14 ［危］4-2-S-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［109-59-1］

20223-02	>99.0%(GC)		G	500mL	￥2,900
20223-32	>99.0%(GC)		G	25mL	￥1,600

4-イソプロポキシフェニルボロン酸
4-Isopropoxyphenylboronic acid

警告

$C_9H_{13}BO_3$...180.01 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［153624-46-5］

20337-55	>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥8,000
20337-65	>98.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥3,700

2-イソプロポキシフェニルメチルカルバメート標準品 → プロポキスル標準品

2-イソプロポキシピリジン-5-ボロン酸
2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid

$C_8H_{12}BNO_3$...180.99 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［870521-30-5］

20093-55	>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥38,000
20093-65	>95.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥11,000

2-イソプロポキシ-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

$C_9H_{19}BO_3$...186.05 ［危］4-2-III ［PRTR］1-405
CAS RN® ［61676-62-8］ d0.912▲

20204-35	>95.0%(GC)	Organics	G	25mL	￥10,000

2-イソプロポキシ-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

$C_9H_{19}BO_3$...186.05 ［危］4-2-III ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［61676-62-8］ d0.912▲

35949-2A	TFS（35949-0010）	1g	￥3,000

N-イソプロピルアクリルアミド
N-Isopropylacrylamide

CH_2:CHCONHCH$(CH_3)_2$...113.15 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2210-25-5］ mp64℃～66℃▲

stabilized with 500ppm *p*-methoxyphenol

41278-1A	TFS（41278-1000）	100g	￥31,300
41278-3A	TFS（41278-0250）	25g	￥10,300
41278-4A	TFS（41278-5000）	500g	￥196,400

N-イソプロピル-d_7-アクリルアミド
N-Isopropyl-d_7-acrylamide

$C_6H_4D_7ON$...120.20 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1219803-32-3］

49143-27	CDN（D-6567）	99 atom% D	100mg	￥52,800

イソプロピルアルコール → 2-プロパノール

イソプロピルアルコール → イソプロパノール

イソプロピルアルコール → イソプロパノール

イソプロピルアルコール -Plus- → 2-プロパノール -Plus-

イソプロピルアルコール(脱水) → 2-プロパノール(脱水)

イソプロピルアミン
Isopropylamine

危険

$(CH_3)_2CHNH_2$...59.11 ［危］4-SI-S-I ［労］57,57-2
CAS RN® ［75-31-0］ bp33.0℃† d0.686～0.693△ Fp-37.2℃†

32437-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥3,100
32437-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,100

イソプロピルアミン臭化水素酸塩
Isopropylamine hydrobromide

$(CH_3)_2CHNH_2$･HBr...140.02

49008-65 昭化（0918-1350）	98.5%		500g	￥133,900
49008-66 昭化（0918-0380）	98.5%		15kg	☆

イソプロピルアミン塩酸塩
Isopropylamine hydrochlodide

$(CH_3)_2CHNH_2$･HCl...95.57
CAS RN® ［15572-56-2］ mp135℃～140℃▲

49008-68 昭化（0918-3350）	98.5%		500g	￥11,700
49008-69 昭化（0010-5591）	98.5%		15kg	☆

イソプロピルアミンふっ化水素酸塩
Isopropylamine hydrofluoride

［PRTR］1-374

49009-76	昭化（0917-0350）	500g	￥135,000
49009-77	昭化（0917-0380）	15kg	☆

イソプロピルアミンこはく酸塩 (1:1 mol)
Isopropylamine succinate(1:1 mol)

49009-78	昭化（0917-2150）	500g	￥136,000

4-(イソプロピルアミノカルボニル)フェニルボロン酸
4-(Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid

警告

$C_{10}H_{14}BNO_3$...207.03 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［397843-67-3］

20178-55	>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥26,500
20178-65	>95.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥7,500

4-イソプロピルアニリン
4-Isopropylaniline

$C_9H_{13}N$...135.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［99-88-7］ d0.98▲

17453-1A	TFS（17453-0500）	50g	￥6,900
17453-2A	TFS（17453-0100）	10g	￥3,000

N-イソプロピルアニリン標準品
N-Isopropylaniline standard

$C_9H_{13}N$...135.20 ［劇］III［危］4-3-III［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［768-52-5］

49865-16	DES（C14463100）	残留農薬試験用	250mg	￥8,000

p-イソプロピルベンズアルデヒド → クミンアルデヒド

イソプロピルベンゼン → クメン

p-イソプロピル安息香酸 → クミン酸

3-イソプロピル-1 *H*-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4(3 *H*)-オン2,2-ジオキシド標準品 → ベンタゾン標準品

3-イソプロピル-1 *H*-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4(3 *H*)-オン2,2-ジオキシド標準液 → ベンタゾン標準液

3-イソプロピル-1 *H*-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4(3 *H*)-オン2,2-ジオキシド-d_6標準品 → ベンタゾン-d_6標準品

p-イソプロピルベンジルアルコール
p-Isopropylbenzyl alcohol

$(CH_3)_2CHC_6H_4CH_2OH$...150.21
CAS RN® [536-60-7] bp248.4℃ † d0.973～0.979 △

20153-31	>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥10,500

p-イソプロピルベンジルアルコール
p-Isopropylbenzyl alcohol

$(CH_3)_2CHC_6H_4CH_2OH$...150.21
CAS RN® [536-60-7] bp248℃ mp28℃ d0.98 Fp>112℃

18780-1A	TFS（18780-0250）			25g	￥4,400
18780-2A	TFS（18780-1000）			100g	￥13,100
18780-3A	TFS（18780-5000）			500g	￥55,400

2-イソプロピルボロン酸ピナコールエステル
2-Isopropylboronic acid pinacol ester

$C_9H_{19}BO_2$...170.05 [危] 4-2-III [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [76347-13-2]

20180-55	>94.0%(GC)	Organics	G	5g	￥23,000
20180-65	>94.0%(GC)	Organics	G	1g	￥7,500

p-イソプロピルカリックス[8]アレーン
p-Isopropylcalix[8]arene

$C_{80}H_{96}O_8$...1185.60
CAS RN® [98013-94-6]

29933-1A	TFS（29933-2500）	250mg	￥10,400

イソプロピル3-クロロカルバニレート標準品 → クロルプロファム標準品

6-イソプロピル-*m*-クレゾール → チモール

イソプロピル-*o*-クレゾール → カルバクロール

trans-4-イソプロピルシクロヘキサンカルボン酸
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid

$C_{10}H_{18}O_2$...170.24
CAS RN® [7077-05-6]

20066-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,000
20066-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,000

N-イソプロピルシクロヘキシルアミン
N-Isopropylcyclohexylamine

$C_6H_{11}NHCH(CH_3)_2$...141.25 ［危］4-2-III
CAS RN® [1195-42-2] bp60℃～65℃(12mm)▲ d0.859▲

17176-1A	TFS（17176-0050）	5g	￥4,100
17176-2A	TFS（17176-1000）	100g	￥46,600

2-[(4*R*)-4-イソプロピル-4,5-ジヒドロ-2-オキサゾリル]-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
2-[(4*R*)-4-Isopropyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine

$C_{12}H_{13}F_3N_2O$...258.23

49215-08	ダイセル（135886-100MG）	100mg	￥28,400

イソプロピルエーテル → ジイソプロピルエーテル

イソプロピルエーテル(脱水) → ジイソプロピルエーテル(脱水)

イソプロピルエーテル(脱水) -Super- → ジイソプロピルエーテル(脱水) -Super-

N-イソプロピルヒドロキシルアミン塩酸塩
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride

$C_3H_9NO \cdot HCl$...111.56
CAS RN® [50632-53-6] mp68℃～72℃▲

27626-1A	TFS（27626-0050）		5g	￥24,200
27626-2A	TFS（27626-0010）		1g	￥9,400

2′,3′-*O*-イソプロピリデンアデノシン
2′,3′-*O*-Isopropylideneadenosine

$C_{13}H_{17}N_5O_4$...307.30
CAS RN® [362-75-4] mp221℃～222℃▲

12272-1A	TFS（12272-0050）		5g	￥9,100
12272-2A	TFS（12272-0250）		25g	￥37,700

4,4′-イソプロピリデンジフェノール
4,4′-Isopropylidenediphenol

危険

$(CH_3)_2C(C_6H_4OH)_2$...228.28 [PRTR] 1-37
CAS RN® [80-05-7] mp156℃†

04225-10	>98.0%(GC)	鹿特級	G	250g	￥2,500

4,4′-イソプロピリデンジフェノール
4,4′-Isopropylidenediphenol

危険

$(CH_3)_2C(C_6H_4OH)_2$...228.28 [PRTR] 1-37
CAS RN® [80-05-7] bp220℃ mp155℃～158℃ Fp227℃

15824-1A	TFS（15824-0020）		2kg	￥12,400
15824-2A	TFS（15824-1000）		100g	￥2,000
15824-3A	TFS（15824-5000）		500g	￥3,900

1,2-*O*-イソプロピリデン-α-*D*-キシロフラノース
1,2-*O*-Isopropylidene-α-*D*-xylofuranose

$C_8H_{14}O_5$...190.19 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［20031-21-4］ mp68℃～70℃▲

34888-2A	TFS（34888-0100）		10g	￥17,600
34888-3A	TFS（34888-0250）		25g	￥35,800
34888-4A	TFS（34888-1000）		100g	￥134,900

イソプロピルメルカプタン → 2-プロパンチオール

2-イソプロピル-3-メトキシ-d_3-ピラジン
2-Isopropyl-3-methoxy-d_3-pyrazine

$C_8H_9D_3N_2O$...155.21 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［588732-60-9］

49140-78	CDN（D-6905）	99 atom% D	10mg	￥39,600

イソプロピルメチルケトン → 3-メチル-2-ブタノン

2-イソプロピル-5-メチルフェノール → チモール

4-イソプロピル-3-メチルフェノール標準品
4-Isopropyl-3-methylphenol standard

$C_{10}H_{14}O$...150.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［3228-02-2］

49861-05	DES（C14463650）	環境分析用	100mg	￥26,000

5-イソプロピル-2-メチルフェノール → カルバクロール

(3*R*-*c*ｉ*s*)-(-)-3-イソプロピル-7*a*-メチルテトラヒドロピロロ[2,1-*b*]オキサゾール-5(6*H*)-オン
(3*R*-*cis*)-(-)-3-Isopropyl-7*a*-methyltetrahydropyrrolo[2,1-*b*]oxazol-5(6*H*)-one

$C_{10}H_{17}NO_2$...183.24
CAS RN® [123808-97-9] bp82℃(0.7mm)▲

32649-1A	TFS（32649-2500）	250mg	￥6,700

(*R*)-4-イソプロピル-2-オキサゾリジンチオン
(*R*)-4-Isopropyl-2-oxazolidinethione

$C_6H_{11}NOS$...145.22
CAS RN® [1217463-35-8]

49213-17	ダイセル（120791-001G）	1g	￥30,000

(*S*)-4-イソプロピル-2-オキサゾリジンチオン
(*S*)-4-Isopropyl-2-oxazolidinethione

$C_6H_{11}NOS$...145.22
CAS RN® [104499-08-3]

49213-18	ダイセル（120802-001G）	1g	￥30,000

(4*R*)-(+)-4-イソプロピル-2-オキサゾリジノン
(4*R*)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone

$C_6H_{11}NO_2$...129.15
CAS RN® [95530-58-8] mp70℃～73℃▲

29785-1A	TFS（29785-0010）	1g	￥7,700
29785-2A	TFS（29785-0050）	5g	￥24,800

(4*S*)-(-)-4-イソプロピル-2-オキサゾリジノン
(4*S*)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone

$C_6H_{11}NO_2$...129.15
CAS RN® [17016-83-0] mp70℃～73℃▲

29786-1A	TFS（29786-0010）	1g	￥5,800
29786-2A	TFS（29786-0050）	5g	￥21,000

2-イソプロピルフェノール
2-Isopropylphenol

$C_9H_{12}O$...136.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［88-69-7］bp212℃～213℃▲ mp15℃～16℃▲ d1.012▲

15668-1A	TFS（15668-0050）	5g	￥1,800
15668-2A	TFS（15668-5000）	500g	￥20,400

4-イソプロピルフェノール
4-Isopropylphenol

$C_9H_{12}O$...136.19
CAS RN® ［99-89-8］bp212℃～212.4℃▲ mp59℃～61℃▲

17451-1A	TFS（17451-0050）	5g	￥4,000
17451-2A	TFS（17451-1000）	100g	￥6,600
17451-3A	TFS（17451-2500）	250g	￥13,400

2-イソプロピルフェニルボロン酸
2-Isopropylphenylboronic acid

警告

$C_9H_{13}BO_2$...164.01 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［89787-12-2］

20338-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥13,500

4-イソプロピルフェニルボロン酸
4-Isopropylphenylboronic acid

警告

$C_9H_{13}BO_2$...164.01 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［16152-51-5］

20339-55	>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥15,500
20339-65	>98.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥5,400

2-イソプロピルフェニルメチルカルバメート標準品 → イソプロカルブ標準品

N-イソプロピル-*N*′-フェニル-1,4-フェニレンジアミン
N-Isopropyl-*N*′-phenyl-1,4-phenylenediamine

$C_{15}H_{18}N_2$...226.31 ［変］
CAS RN® ［101-72-4］

20010-02	>95.0%(HLC)	G	500g	￥3,400
20010-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥1,600

N-イソプロピル-1-ピペラジンアセトアミド
N-Isopropyl-1-piperazineacetamide

$C_9H_{19}N_3O$...185.26
CAS RN® ［39890-42-1］ mp86℃～89℃▲

20561-1A	TFS（20561-0050）	5g	￥13,300

(*R*)-3-イソプロピル-2,5-ピペラジンジオン
(*R*)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione

$C_7H_{12}N_2O_2$...156.18
CAS RN® ［143673-66-9］

49213-19	ダイセル（100991-001G）	1g	￥19,600

(*S*)-3-イソプロピル-2,5-ピペラジンジオン
(*S*)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione

$C_7H_{12}N_2O_2$...156.18
CAS RN® ［16944-60-8］

49213-20	ダイセル（100992-001G）	1g	￥19,600

(*R*)-3-(*N*-イソプロピル-*N*-3-ピリジニルアミノメチル)-1,1′-ビ-2-ナフトール
(*R*)-3-(*N*-Isopropyl-*N*-3-pyridinylaminomethyl)-1,1′-bi-2-naphthol

$C_{29}H_{26}N_2O_2$...434.52 ［冷］ 0℃～6℃
mp127℃～130℃▲

光学純度:>99% ee

20331-95	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	200mg	￥12,500

(*S*)-3-(*N*-イソプロピル-*N*-3-ピリジニルアミノメチル)-1,1′-ビ-2-ナフトール
(*S*)-3-(*N*-Isopropyl-*N*-3-pyridinylaminomethyl)-1,1′-bi-2-naphthol

警告

$C_{29}H_{26}N_2O_2$...446.53 ［冷］ 0℃～6℃
mp127℃～130℃▲

光学純度:>99% ee

20332-95	>98.0%(HLC)	不斉合成用	G	200mg	￥12,500

D L-2-イソプロピルセリン
DL-2-Isopropylserine

$C_6H_{13}NO_3$...147.17
CAS RN® ［7522-43-2］ mp262℃▲

33976-1A	TFS（33976-0010）	1g	￥9,000

(*S*)-2-イソプロピルこはく酸1-メチルエステル
(*S*)-2-Isopropylsuccinic acid 1-methyl ester

$C_8H_{14}O_4$...174.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［208113-95-5］

光学純度:98% ee

36211-2A	TFS（36211-0010）	1g	￥167,800

2-(イソプロピルスルホニル)アニリン
2-(Isopropylsulfonyl)aniline

$C_9H_{13}NO_2S$...199.27
CAS RN® ［76697-50-2］

20184-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥14,500

イソプロピル-β-*D*-チオガラクトピラノシド
Isopropyl-β-*D*-thiogalactopyranoside

$C_9H_{18}O_5S$...238.30 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［367-93-1］ mp122℃～126℃▲

ジオキサン含有量(GC)≦0.02%

4-イソプロピルトルエン → *p*-シメン

イソプロチオラン標準品
Isoprothiolane standard

$C_{12}H_{18}O_4S_2$...290.40 ［労］57,57-2［PRTR］1-191 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［50512-35-1］

49828-85	DES（C14467500）		残留農薬試験用	100mg	￥19,000

イソプロチオラン標準液
Isoprothiolane standard solution

$C_{12}H_{18}O_4S_2$...290.40 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［50512-35-1］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49833-64	DES（L14467500CY）		残留農薬試験用	10mL	￥13,000

イソプロツロン標準品
Isoproturon standard

$C_{12}H_{18}N_2O$...206.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［34123-59-6］

20358-96		>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥9,000
49827-56	DES（C14470000）		残留農薬試験用		100mg	￥13,000

イソプロツロン-d_3(*N*-メチル-d_3)
Isoproturon-d_3 (*N*-methyl-d_3)

$C_{12}H_{15}D_3N_2O$...209.30
CAS RN®［352438-80-3］

49129-41	CDN（D-5151）	99 atom% D		50mg	￥70,400

イソピラザム標準品
Isopyrazam standard

$C_{20}H_{23}F_2N_3O$...359.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［881685-58-1］bp261℃～274℃▲ mp130℃～144℃▲ d1.332▲

49866-36	DES（C14473000）		残留農薬試験用	10mg	￥22,000

イソケルシトリン
Isoquercitrin

$C_{21}H_{20}O_{12}$...464.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［482-35-9］

20311-96			天然物化学研究用	50mg	￥17,000

イソキノリン-3-アミン
Isoquinolin-3-amine

$C_9H_8N_2$...144.17
CAS RN® ［25475-67-6］ mp154℃～156℃▲

49261-18	TFS（BTB10019EA）	97%		10g	☆
49261-19	TFS（BTB10019DA）	97%		1g	￥14,300
49261-20	TFS（BTB10019CB）	97%		250mg	￥12,100

イソキノリン-4-アミン
Isoquinolin-4-amine

$C_9H_8N_2$...144.17
CAS RN® ［23687-25-4］

20062-52		>95.0%(HLC)		5g	￥18,000
20062-62		>95.0%(HLC)		1g	￥6,200

イソキノリン
Isoquinoline

警告

C_9H_7N...129.15
CAS RN® ［119-65-3］ bp242℃～243℃† mp26℃～28℃† d1.099† Fp107℃†

20080-01		>97.0%(GC)	鹿1級	500g	￥4,400
20080-31		>97.0%(GC)	鹿1級	25g	￥1,300

イソキノリン標準品
Isoquinoline standard

C_9H_7N...129.15
CAS RN® ［119-65-3］

49797-77	ACC（H-232N）		環境分析用	100mg	￥4,500

イソキノリン-d_7
Isoquinoline-d_7

C_9D_7N...136.20
CAS RN® [17157-12-9]

49129-42	CDN（D-904）	97 atom% D			500mg	￥74,800

イソキノリン-4-ボロン酸
Isoquinoline-4-boronic acid

$C_9H_8BNO_2$...172.97 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [192182-56-2]

20119-55		>95.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥39,000
20119-65		>95.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥11,000

イソキノリン-4-カルバルデヒド
Isoquinoline-4-carbaldehyde

$C_{10}H_7NO$...157.16
CAS RN® [22960-16-3] mp104.5℃～105℃▲

49261-23	TFS（CC04904DA）	97%			1g	￥36,500
49261-24	TFS（CC04904CB）	97%			250mg	￥13,200

イソキノリン-4-カルボン酸
Isoquinoline-4-carboxylic acid

$C_{10}H_7NO_2$...173.16
CAS RN® [7159-36-6] mp265℃～266℃▲

49261-25	TFS（CC04901DA）	97%			1g	￥46,900
49261-26	TFS（CC04901CB）	97%			250mg	￥15,600

イソラムネチン
Isorhamnetin

$C_{16}H_{12}O_7$...316.26
CAS RN® [480-19-3]

49064-75	PHY（89314）		天然物化学研究用		20mg	￥60,000

イソラムネチン3-ネオヘスペリドシド
Isorhamnetin 3-neohesperidoside

$C_{28}H_{32}O_{16}$...624.54
CAS RN®［55033-90-4］

49064-76	PHY（82568）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

イソラムネチン 3-ルチノシド
Isorhamnetin 3-rutinoside

$C_{28}H_{32}O_{16}$...624.54
CAS RN®［604-80-8］

49869-61	PHY（83337）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

イソラポンチゲニン
Isorhapontigenin

$C_{15}H_{14}O_4$...258.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［32507-66-7］

49873-64	PHY（84227）	天然物化学研究用	10mg	￥40,000

イソロイフォリン
Isorhoifolin

$C_{27}H_{30}O_{14}$...578.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［552-57-8］

49873-65	PHY（85751）	天然物化学研究用	10mg	￥47,000

イソリンコフィリン
Isorhynchophylline

$C_{22}H_{28}N_2O_4$...384.46 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［6859-01-4］

49064-77	PHY（80483）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

イソサクラネチン
Isosakuranetin

$C_{16}H_{14}O_5$...286.27
CAS RN®［480-43-3］

49064-78	PHY（82569）	天然物化学研究用	20mg	￥49,000

イソスカフトシド
Isoschaftoside

$C_{26}H_{28}O_{14}$...564.49
CAS RN®［52012-29-0］

49869-63	PHY（83324）	天然物化学研究用	10mg	￥80,000

イソスコポレチン
Isoscopoletin

$C_{10}H_8O_4$...192.16
CAS RN®［776-86-3］

49873-66	PHY（85752）	天然物化学研究用	20mg	￥30,000

イソシリビン(A+B混合物)
Isosilybin (A+B mixture)

$C_{25}H_{22}O_{10}$...482.43
CAS RN®［72581-71-6］

49064-79	PHY（89231）	天然物化学研究用	10mg	￥90,000

イソシリビンA
Isosilybin A

$C_{25}H_{22}O_{10}$...482.43
CAS RN®［142796-21-2］

49064-80	PHY（82570）	天然物化学研究用	5mg	￥60,000

イソシリビンB
Isosilybin B

$C_{25}H_{22}O_{10}$...482.43
CAS RN®［142796-22-3］

49064-81	PHY（82571）	天然物化学研究用	5mg	￥60,000

イソソルビドジメチルエーテル
Isosorbide dimethyl ether

$C_8H_{14}O_4$...174.19 ［危］4-3-S-III
CAS RN®［5306-85-4］ d1.1700▲

36991-1A	TFS（36991-0250）		25g	￥6,400
36991-2A	TFS（36991-1000）		100g	￥19,700

イソステビオール
Isosteviol

$C_{20}H_{30}O_3$...318.44
CAS RN®［27975-19-5］

49064-82	PHY（82395）	天然物化学研究用	20mg	￥43,000

イソテトラデカン酸メチル → 12-メチルトリデカン酸メチル

イソチモール → カルバクロール

イソチアニル標準品
Isotianil standard

$C_{11}H_5Cl_2N_3OS$...440.31 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［224049-04-1］

49312-05	A2S（I175P025）	残留農薬試験用	25mg	￥37,000

イソトリデカン酸メチル → 11-メチルドデカン酸メチル

イソウロン標準品
Isouron standard

$C_{10}H_{17}N_3O_2$...211.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［55861-78-4］

49834-21	DES（C14479000）	残留農薬試験用	100mg	￥27,000

イソ吉草酸アルデヒド
Isovaleraldehyde

危険

$(CH_3)_2CHCH_2CHO$...86.13 ［危］4-1-II
CAS RN®［590-86-3］bp92℃～93℃† d0.797～0.804△ Fp-5℃†

44000-20		>98.0%(GC)	鹿特級	G	100g	￥9,500
44000-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥3,700
16397-1A	TFS（16397-5000）				500mL	￥9,600
16397-2A	TFS（16397-1000）				100mL	￥3,800

イソ吉草酸アルデヒド-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン(DNPH)標準原液
Isovaleraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) standard stock solution

危険

$(CH_3)_2CHCH_2CH:NNHC_6H_3(NO_2)_2$...266.25 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2256-01-1］

0.309mg/mL(イソブチルアルデヒドとして 0.1mg/mL) 酢酸エチル溶液

44003-96		悪臭物質測定用		2mL×5	￥9,500

イソ吉草酸
Isovaleric acid

危険

$(CH_3)_2CHCH_2COOH$...102.13 ［危］4-3-III
CAS RN®［503-74-2］bp175℃～177℃† mp-29℃† d0.923～0.928△ Fp74℃†

44005-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥6,400
44005-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,100

イソバレリル-*DL*-カルニチン-d_9 塩酸塩(*N*,*N*,*N*-トリメチル-d_9)
Isovaleryl-*DL*-carnitine-d_9 hydrochloride (*N*,*N*,*N*-trimethyl-d_9)

$C_{12}H_{15}ClD_9NO_4$...290.83 ［冷］ 0℃～6℃

49140-79	CDN（D-6648）	99 atom% D	10mg	￥41,800

N-イソバレリルグリシン-2,2-d_2
N-Isovalerylglycine-2,2-d_2

$(CH_3)_2CHCH_2CONHCD_2COOH$...161.19
CAS RN®［1219795-09-1］

49146-84	CDN（D-6230）	98 atom% D	50mg	￥59,400

イソベルバスコシド
Isoverbascoside

$C_{29}H_{36}O_{15}$...624.58 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［61303-13-7］

49064-83	PHY（89232）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

イソビオランチン
Isoviolanthin

$C_{27}H_{30}O_{14}$...578.51
CAS RN® [40788-84-9]

49873-67	PHY（85753）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

イソビテキシン
Isovitexin

$C_{21}H_{20}O_{10}$...432.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [38953-85-4]

49064-84	PHY（89233）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

イソキサベン標準品
Isoxaben standard

警告

$C_{18}H_{24}N_2O_4$...332.39 ［PRTR］2-12 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [82558-50-7]

49826-15	DES（C14480000）	残留農薬試験用	100mg	￥8,500

イソキサジフェンエチル標準品
Isoxadifen-ethyl standard

$C_{18}H_{17}NO_3$...295.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [163520-33-0]

49834-19	DES（C14480500）	残留農薬試験用	100mg	￥34,000

イソキサジフェンエチル標準液
Isoxadifen-ethyl standard solution

危険

$C_{18}H_{17}NO_3$...295.33 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [163520-33-0]

10mg/L シクロヘキサン溶液

49831-69	DES（L14480500CY）	残留農薬試験用	10mL	￥35,000

イソキサフルトール標準品
Isoxaflutole standard

$C_{15}H_{12}F_3NO_4S$...359.32 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［141112-29-0］

49828-94	DES（C14481000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

イソキサフルトール-ジケトニトリル標準品
Isoxaflutole-diketonitrile standard

$C_{15}H_{12}NO_4F_3S$...359.32 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［143701-75-1］

49867-15	DES（C14481050）	残留農薬試験用	10mg	￥29,000

イソキサフルトール代謝物B標準品 → イソキサフルトール-ジケトニトリル標準品

イソキサントフモール
Isoxanthohumol

$C_{21}H_{22}O_5$...354.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［70872-29-6］

49064-85	PHY（89234）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

イソキサチオン標準品
Isoxathion standard

危険

$C_{13}H_{16}NO_4PS$...313.31 ［劇］III ［危］4-4-III ［PRTR］1-250 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［18854-01-8］

49861-26	DES（C14483000）	残留農薬試験用	100mg	￥26,000

イソキサチオン標準液
Isoxathion standard solution

$C_{13}H_{16}NO_4PS$...313.31 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［18854-01-8］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49833-65	DES（L14483000CY）	残留農薬試験用	10mL	￥15,000

イソオキサゾール
Isoxazole

危険

C_3H_3NO...69.06 ［危］4-1-II
CAS RN® ［288-14-2］ bp93℃～95℃† d(20/4℃) 1.078† Fp10℃†

20140-50	>97.0%(GC)	鹿特級	G	5g	￥10,000
41293-1A	TFS（41293-0500）			50g	￥32,600
41293-2A	TFS（41293-0100）			10g	￥9,300

5-イソオキサゾール-5-イルチオフェン-2-スルホニルクロリド
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride

$C_7H_4ClNO_3S_2$...249.69
CAS RN® ［551930-53-1］ mp69℃～70℃▲

49261-30	TFS（CC16003DE）			5g	☆
49261-31	TFS（CC16003DA）			1g	￥28,500
49261-32	TFS（CC16003CB）			250mg	￥8,500

イタコン酸
Itaconic acid

危険

$HOCOCH_2C(:CH_2)COOH$...130.09 ［劇］III
CAS RN® ［97-65-4］ mp167℃～168℃(dec.)†

20145-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥3,200
20145-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,600

イベルメクチン標準品
Ivermectine standard

危険

$C_{48}H_{74}O_{14}$...875.09 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［70288-86-7］

49829-79	DES（CA14488000）	食品分析用		100mg	￥22,000

一酸化鉛(黄) → 酸化鉛(II)

一酸化鉛(黄),3N → 酸化鉛(II),3N

イソチオシアン酸4-メトキシベンジル
4-Methoxybenzylisothiocyanate

C_9H_9NOS...179.24 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3694-57-3］ d1.0872▲

41381-1A	TFS（41381-0050）	5g	￥27,800

イソシアン酸3-メトキシフェニル
3-Methoxyphenyl isocyanate

$CH_3OC_6H_4NCO$...149.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［18908-07-1］ d1.138†

22116-1A	TFS（22116-1000）	100g	￥77,900
22116-2A	TFS（22116-0050）	5g	￥6,700
22116-3A	TFS（22116-0250）	25g	￥20,400

イソシアン酸4-メトキシフェニル
4-Methoxyphenyl isocyanate

$CH_3OC_6H_4NCO$...149.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［5416-93-3］ bp106℃～110℃(16mm)▲ d1.151▲

21876-1A	TFS（21876-0050）	5g	￥5,900
21876-2A	TFS（21876-0250）	25g	￥15,400

(*R*)-(+)-イソシアン酸-α-メチルベンジル
(*R*)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate

$C_6H_5CH(CH_3)NCO$...147.17 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［33375-06-3］ d1.050†

20532-1A	TFS（20532-0050）	5mL	￥24,300

(*S*)-(-)-イソシアン酸-α-メチルベンジル
(*S*)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate

$C_6H_5CH(CH_3)NCO$...147.17 ［危］4-2-III ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［14649-03-7］ d1.050†

20531-1A	TFS（20531-0050）	5mL	￥23,900

インドール-2,4,5,6,7-d_5-3-酢酸メチル
Methyl indole-2,4,5,6,7-d_5-3-acetate

$C_{11}H_6D_5NO_2$...194.24
CAS RN® [102415-39-4]

49141-62 CDN（D-6765）	98 atom% D		50mg	￥74,800

インドール-3-酢酸メチル
Methyl indole-3-acetate

$C_{11}H_{11}NO_2$...189.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [1912-33-0]

20273-42	>99.0%(GC)	G	10g	￥19,500

インドール-3-カルボン酸メチル
Methyl indole-3-carboxylate

$C_{10}H_9NO_2$...175.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [942-24-5] mp148℃～154℃△

20288-32	>99.0%(HLC)	G	25g	￥5,500

インドール-4-カルボン酸メチル
Methyl indole-4-carboxylate

$C_{10}H_9NO_2$...175.18
CAS RN® [39830-66-5] mp67℃～73℃△

20290-42	>99.0%(GC)	G	10g	￥19,000
33403-1A TFS（33403-0010）			1g	￥9,200

インドール-5-カルボン酸メチル
Methyl indole-5-carboxylate

$C_{10}H_9NO_2$...175.18 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® [1011-65-0] mp123℃～129℃△

20291-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥16,000

インドール-7-カルボン酸メチル
Methyl indole-7-carboxylate

$C_{10}H_9NO_2$...175.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [93247-78-0] mp44℃～50℃△

20292-97	>99.0%(GC)	G	500mg	￥21,500

イソ酪酸メチル
Methyl isobutyrate

危険

$(CH_3)_2CHCOOCH_3$...102.13 ［危］4-1-II
CAS RN® ［547-63-7］ bp92.5℃† d(20℃) 0.891† Fp14℃†

25217-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥6,900
25217-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,700

イソ酪酸メチル
Methyl isobutyrate

危険

$(CH_3)_2CHCOOCH_3$...102.13 ［危］4-1-II
CAS RN® ［547-63-7］ bp90℃ mp85℃～84℃ d0.89 Fp1℃

16460-2A	TFS（16460-1000）		100g	￥3,700
16460-3A	TFS（16460-5000）		500g	￥14,000

イソシアノ酢酸メチル
Methyl isocyanoacetate

$CNCH_2CO_2CH_3$...99.08 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［39687-95-1］ bp75℃～76℃(10mm)▲ d1.09▲

21900-1A	TFS（21900-0050）	tech.	5g	￥26,800

イソニコチン酸メチル
Methyl isonicotinate

$C_7H_7NO_2$...137.13 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2459-09-8］ bp207℃～209℃▲ mp8.5℃▲ d1.15▲

12706-2A	TFS（12706-1000）	100mL	￥9,500
12706-3A	TFS（12706-5000）	500mL	￥41,500

イソフタル酸メチル → イソフタル酸ジメチル

イソフタル酸メチル-2,4,5,6-d_4 → イソフタル酸ジメチル-2,4,5,6-d_4

3-イソキノリンカルボン酸メチル
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate

$C_{11}H_9NO_2$...187.19
CAS RN® [27104-73-0] mp85℃～86℃▲

30603-1A	TFS（30603-0010）			1g	￥15,700

イソチオシアン酸メチル
Methyl isothiocyanate

危険

CH_3NCS...73.12 [劇] II [危] 4-2-III [PRTR] 1-424
CAS RN® [556-61-6] bp119℃† mp35℃～36℃† Fp32℃†

25280-31	>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥5,600

イソチオシアン酸メチル標準品
Methyl isothiocyanate standard

危険

CH_3NCS...73.12 [劇] II [危] 4-2-III [PRTR] 1-424 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [556-61-6] bp119℃† mp35℃～36℃† Fp32℃†

25279-96	>99.0%(GC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥11,000

2-イソチオシアナト安息香酸メチル
Methyl 2-isothiocyanatobenzoate

$SCNC_6H_4CO_2CH_3$...193.22 [危] 4-3-III
CAS RN® [16024-82-1] bp104℃(0.1mm)▲ d1.251▲

23530-1A	TFS（23530-1000）			100mL	￥48,900

3-イソチオシアナトチオフェン-2-カルボン酸メチル
Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate

$C_7H_5NO_2S_2$...199.25
CAS RN® [81321-10-0] mp57℃～59℃▲

49264-66	TFS（GK00289EA）	97%		10g	￥86,100
49264-67	TFS（GK00289DA）	97%		1g	￥12,300

イソペンタデカン酸 → 13-メチルテトラデカン酸

イソシアン酸4-(メチルチオ)フェニル
4-(Methylthio)phenyl isocyanate

C_8H_7NOS...165.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1632-84-4］ bp117℃～118℃(8mm)▲ d1.176▲

31419-1A	TFS（31419-0100）		10g	￥25,200

イソチオシアン酸4-モルホリノフェニル
4-Morpholinophenyl isothiocyanate

$C_{11}H_{12}N_2OS$...220.29
CAS RN® ［51317-66-9］ mp84℃～85℃▲

49269-94	TFS（CC17407DE）	97%	5g	☆
49269-95	TFS（CC17407DA）	97%	1g	￥57,300
49269-96	TFS（CC17407CB）	97%	250mg	￥21,100

イソチオシアン酸6-モルホリノ-3-ピリジニル
6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate

$C_{10}H_{11}N_3OS$...221.28
CAS RN® ［52024-29-0］ mp121℃～122℃▲

49270-11	TFS（CC17507DE）	97%	5g	☆
49270-12	TFS（CC17507DA）	97%	1g	￥34,300
49270-13	TFS（CC17507CB）	97%	250mg	￥12,600

イソシアン酸1-ナフチル
1-Naphthyl isocyanate

$C_{11}H_7NO$...169.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［86-84-0］ bp270℃▲ mp4℃▲ d1.18▲

41541-1A	TFS（41541-0050）		5g	￥6,100
41541-2A	TFS（41541-0250）		25g	￥19,300

イソチオシアン酸1-ナフチル
1-Naphthyl isothiocyanate

$C_{10}H_7NCS$...185.24
CAS RN® ［551-06-4］ mp56℃～57℃†

12824-1A	TFS（12824-0050）		5g	￥9,600
12824-2A	TFS（12824-0100）		10g	￥16,500

一酢酸NG-モノメチル-*L*-アルギニン
NG-Monomethyl-*L*-arginine monoacetate

$C_9H_{20}N_4O_4$...248.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［53308-83-1］

32872-1A	TFS（32872-0050）	5mg	￥5,700

イソシアン酸2-ニトロフェニル
2-Nitrophenyl isocyanate

$O_2NC_6H_4NCO$...164.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3320-86-3］ mp38℃～41℃▲

29669-1A	TFS（29669-0250）	25g	￥29,100
29669-2A	TFS（29669-0050）	5g	￥6,700

イソシアン酸3-ニトロフェニル
3-Nitrophenyl isocyanate

$C_7H_4N_2O_3$...164.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3320-87-4］ mp49℃～54℃▲

33618-1A	TFS（33618-0050）	5g	￥7,400
33618-2A	TFS（33618-0250）	25g	￥32,900

イソシアン酸4-ニトロフェニル
4-Nitrophenyl isocyanate

$O_2NC_6H_4NCO$...164.11 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［100-28-7］ mp56℃～58℃▲

29670-1A	TFS（29670-0250）	25g	￥17,300
29670-2A	TFS（29670-0050）	5g	￥5,500

イソシアン酸オクチル
Octyl isocyanate

$CH_3(CH_2)_7NCO$...155.23 ［危］4-3-III
CAS RN® ［3158-26-7］ bp78℃(6mm)▲

41646-1A	TFS（41646-0100）	10g	￥14,600
41646-2A	TFS（41646-0050）	5g	￥8,900

イソシアン酸ペンチル
Pentyl isocyanate

$CH_3(CH_2)_4NCO$...113.15 ［危］4-2-III
CAS RN® ［3954-13-0］bp136℃～137℃▲ d0.878▲

31432-1A	TFS（31432-0050）		5g	￥13,300
31432-2A	TFS（31432-0010）		1g	￥4,700

イソシアン酸フェネチル
Phenethyl isocyanate

危険

C_9H_9NO...147.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1943-82-4］bp210℃▲ d1.06▲

32521-35	>97.0%(GC)	Organics	25g	￥14,500
32521-55	>97.0%(GC)	Organics	5g	￥5,400

2-イソチオシアン酸フェニル-d_5-エチル
2-Phenyl-d_5-ethyl isothiocyanate

$C_6D_5CH_2CH_2NCS$...168.27 ［危］4-3-III
CAS RN® ［912627-98-6］

49147-64	CDN（D-7251）	98 atom% D	100mg	￥52,800

イソチオシアン酸フェニルエチル
Phenylethyl isothiocyanate

$C_6H_5CH_2CH_2NCS$...163.24 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2257-09-2］bp113℃(1mm)▲ d1.10▲

26516-1A	TFS（26516-0050）		5g	￥9,100
26516-2A	TFS（26516-0250）		25g	￥19,300

5-インドールカルボン酸フェニル
Phenyl 5-indolecarboxylate

$C_{15}H_{11}NO_2$...237.25

32763-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥30,000
32763-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥8,500

6-インドールカルボン酸フェニル
Phenyl 6-indolecarboxylate

警告

$C_{15}H_{11}NO_2$...237.25

32760-52	>95.0%(HLC)		5g	￥30,500
32760-62	>95.0%(HLC)		1g	￥8,500

インドール-2-カルボン酸フェニル
Phenyl indole-2-carboxylate

警告

$C_{15}H_{11}NO_2$...237.25

32759-52	>95.0%(HLC)		5g	￥30,000
32759-62	>95.0%(HLC)		1g	￥8,500

イソシアン酸フェニル
Phenyl isocyanate

危険

C_6H_5NCO...119.12 ［危］4-2-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［103-71-9］ bp166℃† mp-30℃† d1.091～1.099△ Fp55℃†

20222-00	>98.0%(GC)	鹿特級		500g	￥11,000
20222-30	>98.0%(GC)	鹿特級		25g	￥2,200

1-イソキノリンカルボン酸フェニル
Phenyl 1-isoquinolinecarboxylate

警告

$C_{16}H_{11}NO_2$...249.26
CAS RN® ［494202-63-0］

32765-52	>95.0%(HLC)		5g	￥30,500
32765-62	>95.0%(HLC)		1g	￥8,500

イソチオシアン酸フェニル
Phenyl isothiocyanate

危険

C_6H_5NCS...135.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［103-72-0］ bp221℃† mp-21℃† d1.131～1.136△ Fp87℃†

32145-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,900

イソチオシアン酸フェニル
Phenyl isothiocyanate

危険

C_6H_5NCS...135.18 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［103-72-0］ bp221℃ mp21℃ d1.1288 Fp87℃

16097-2A	TFS（16097-1000）	100g	￥7,000
16097-3A	TFS（16097-5000）	500g	￥18,900

イソチオシアン酸フェニル-d_5
Phenyl-d_5 isothiocyanate

C_6D_5NCS...140.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［74881-77-9］

49132-51	CDN（D-5529）	98 atom% D	500mg	￥57,200

インジゴトリスルホン酸カリウム
Potassium indigotrisulfonate

$C_{16}H_7N_2O_{11}S_3K_3$...616.73 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［67627-18-3］

21517-1A	TFS（21517-0010）	1g	￥11,800
21517-2A	TFS（21517-0050）	5g	￥43,000

イソチオシアン酸プロピル
Propyl isothiocyanate

$CH_3CH_2CH_2NCS$...101.17 ［危］4-1-II
CAS RN® ［628-30-8］ bp153℃▲ d0.978▲

30531-1A	TFS（30531-0250）	25g	￥17,400

一塩化ピリジニウム → ピリジン塩酸塩

イソチオシアン酸3-ピリジル
3-Pyridyl isothiocyanate

$C_6H_4N_2S$...136.17 ［危］4-3-III ［冷］ 4℃以下
CAS RN® ［17452-27-6］ d1.220▲

49275-34	TFS（CC04107EA）	95%		10g	￥90,800
49275-35	TFS（CC04107DA）	95%		1g	￥13,200

イネ花粉
Rice Pollen

［凍］ -20℃以下

49906-43	ITEA（10934）			1g	￥278,000
49906-44	ITEA（10935）			2g	￥538,000

イミダゾ[1,2-*a*]ピリジン-2-カルボン酸ナトリウム0.5水和物
Sodium imidazo[1,2-*a*]pyridine-2-carboxylate 0.5hydrate

$C_8H_5N_2NaO_2 \cdot 0.5H_2O$...193.13
CAS RN® ［64951-08-2］ mp212℃～213℃▲

49277-04	TFS（CC31351DA）	97%		1g	￥27,700
49277-05	TFS（CC31351CB）	97%		250mg	￥10,100

イミノ二酢酸二ナトリウム一水和物
di-Sodium iminodiacetate monohydrate

警告

$NH(CH_2COONa)_2 \cdot H_2O$...195.08
CAS RN® ［17593-73-6］ mp180℃†

20003-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥3,900

イセチオン酸ナトリウム
Sodium isethionate

$HOCH_2CH_2SO_3Na$...148.11
CAS RN® ［1562-00-1］ mp191℃～194℃†

37199-01	>98.0%(G)	鹿1級	G	500g	￥8,500
37199-31	>98.0%(G)	鹿1級	G	25g	￥1,800

イソアスコルビン酸ナトリウム一水和物
Sodium isoascorbate monohydrate

$C_6H_7O_6Na \cdot H_2O$...216.12
CAS RN®［6381-77-7］

20218-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥4,300

イソ酪酸ナトリウム
Sodium isobutyrate

$(CH_3)_2CHCOONa$...110.08
CAS RN®［996-30-5］

37855-63	>96.0%(T)	ｶﾙﾎﾞﾝ酸分析計用	G	1g	￥2,600

イソペンタン酸ナトリウム → イソ吉草酸ナトリウム

イソ吉草酸ナトリウム
Sodium isovalerate

警告

$(CH_3)_2CHCH_2COONa$...124.11
CAS RN®［539-66-2］

37856-63	>95.0%(T)	ｶﾙﾎﾞﾝ酸分析計用	G	1g	￥2,400

一硫化ナトリウム九水和物 → 硫化ナトリウム九水和物

硫黄
Sulfur

危険

S...32.06［危］2-S-II
CAS RN®［7704-34-9］bp445℃ mp114℃ Fp168℃

19993-1A	TFS（19993-0100）	10g	￥4,800
19993-2A	TFS（19993-0500）	50g	￥13,300
19993-3A	TFS（19993-2500）	250g	￥57,300

硫黄標準液(S 1000)
Sulfur standard solution (S 1000)

危険

H_2SO_4水溶液

37377-96	S:1000mg/L	ICP発光分光分析用	P	100mL	￥5,200

硫黄(結晶)
Sulfur, crystal

危険

S...32.06 ［危］2-S-II
CAS RN® ［7704-34-9］ bp444.7℃† mp117℃～120℃†

37385-00	>99.5%(G)	特級	P	500g	￥5,200
37385-20	>99.5%(G)	特級	G	100g	￥2,400
37385-30	>99.5%(G)	特級	G	25g	￥1,600

硫黄(粉末)
Sulfur, powder

危険

S...32.06 ［危］2-S-II
CAS RN® ［7704-34-9］

37386-02			P	500g	￥1,700
37386-82			C	25kg	☆

硫黄
Sulfur

危険

S...32.06 ［危］2-S-II
CAS RN® ［7704-34-9］ bp445℃ mp114℃ Fp168℃

20125-1A	TFS（20125-0025）		2.5kg	￥23,900
20125-2A	TFS（20125-0250）		25g	￥4,600

一硫化テトラメチルチウラム → 硫化ビス(ジメチルチオカルバミル)

一酸化すず → 酸化すず(II)(酸化第一すず)

イソシアン酸 *p*-トルエンスルホニル,96%
p-Toluenesulfonyl isocyanate, 96%

$CH_3C_6H_4SO_2NCO$...197.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［4083-64-1］ d1.2950†

18307-1A	TFS（18307-1000）		100mL	￥5,900
18307-2A	TFS（18307-0250）		25mL	￥5,700

イソシアン酸 *o*-トリル-d_7
o-Tolyl isocyanate-d_7

C_8D_7NO...140.18 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1219802-73-9］

49144-04	CDN（D-5958）	98 atom% D	500mg	￥46,200

イソシアン酸 *p*-トリル-d_7
p-Tolyl-d_7 isocyanate

$CD_3C_6D_4NCO$...140.18 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1219798-59-0］

49134-93	CDN（D-5911）	98 atom% D	500mg	￥74,800

イソチオシアン酸 *o*-トリル
o-Tolyl isothiocyanate

C_8H_7NS...149.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［614-69-7］ bp239℃▲ d1.11▲

29265-2A	TFS（29265-0050）		5g	￥3,700

イカ粉末 (微量元素分析用) CRM7406-a
Trace elements in squid powder CRM7406-a

「毒物及び劇物取締法」に指定されている物質(As, Se, Hg)を含みます。

49005-81	NMI（CRM7406-a）	認証標準物質	30g	☆

イソシアン酸トリクロロアセチル
Trichloroacetyl isocyanate

$C_3Cl_3NO_2$...188.39 ［危］4-2-III
CAS RN® ［3019-71-4］ bp80℃～85℃(20mm)▲ d1.59▲

20290-1A	TFS（20290-0100）	NMR用	10g	￥14,900

イソチオシアン酸4-(トリフルオロメトキシ)フェニル
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate

$C_8H_4F_3NOS$...219.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［64285-95-6］ d1.350▲

49279-27	TFS（TL00411EA）	97%	10g	￥26,600
49279-28	TFS（TL00411DA）	97%	1g	￥6,300

イソシアン酸4-(トリフルオロメチル)フェニル
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate

警告

$C_8H_4F_3NO$...187.11 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1548-13-6］

40388-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥24,000
40388-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥6,800

イソシアン酸4-(トリフルオロメチルチオ)フェニル
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate

$C_8H_4F_3NOS$...219.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［24032-84-6］

31949-1A	TFS（31949-5000）	500mg	￥29,600

イソチオシアン酸α,α,α-トリフルオロ-*m*-トリル
α,α,α-Trifluoro-*m*-tolyl isothiocyanate

$CF_3C_6H_4NCS$...203.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1840-19-3］ bp206℃～208℃▲ d1.335▲

30689-1A	TFS（30689-0050）	5g	￥7,300

イソシアン酸トリメチルシリル
Trimethylsilyl isocyanate

$(CH_3)_3SiNCO$...115.20 ［危］4-1-II ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1118-02-1］ bp90℃～92℃† d0.851†

22473-1A	TFS（22473-0250）	25g	￥31,400
22473-2A	TFS（22473-0050）	5g	￥8,900

異物混入試験紙 UrineCheck 7
UrineCheck 7-Drug Adulteration Test Strips

尿検査用、検査項目:クレアチニン, 比重, pH, 亜硝酸, グルタルアルデヒド, 漂白剤, クロロクロム酸ピリジニウム

49601-41	Teco（D700-25）	薬毒物分析用	25test	￥4,700
49601-42	Teco（D700-100）	薬毒物分析用	100test	￥13,500

イーストアンドモールド寒天培地(YM寒天培地)
Yeast and mould agar

保存 10℃～30℃

711920-5	Oxd（CM0920B）	500g	￥36,000

イーストオートリゼイトサプリメント
Yeast autolysate supplement

［冷］ 2℃～8℃

713105-1	Oxd（SR0105B）	10vial	￥13,000

イーストエキス末
Yeast extract powder

712021-5	Oxd（LP0021B）	500g	￥11,000

イッテルビウム標準原液(Yb 1000)
Ytterbium standard solution (Yb 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

$Yb(NO_3)_3$・HNO_3(1mol/L)溶液

47011-1B	Yb:1000mg/L	原子吸光分析用	P	100mL	￥4,300

イッテルビウム(III)トリフラート
Ytterbium(III) triflate

$C_3F_9S_3O_9Yb \cdot nH_2O$
CAS RN®［252976-51-5］

30417-1A	TFS（30417-0010）		1g	￥3,400

イットリア,4N → 酸化イットリウム,4N

イットリウム
Yttrium

警告

Y...88.90 ［労］57-2
CAS RN®［7440-65-5］bp3338℃† mp1522℃†

47001-62	>99.0%(T)	G	1g	￥4,200

イットリウム標準原液(Y 1000)
Yttrium standard solution (Y 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

$Y(NO_3)_3$・HNO_3(1mol/L)溶液

47012-1B	Y:1000mg/L	原子吸光分析用	P	100mL	￥3,200

ウエルシュ菌選択増菌培地
C.perfringens selective growth broth

［冷］ 2℃～8℃

717598-2	微生物検査用	5回分	￥4,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 3.0
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 3.0)

警告

26180-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000
26180-84	医薬品試験用		10L	￥12,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 4.0
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 4.0)

警告

26181-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000
26181-84	医薬品試験用		10L	￥12,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 4.5
10×Diluted McIlvaine buffer solution (pH 4.5)

26185-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 5.0
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 5.0)

警告

26182-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000
26182-84	医薬品試験用		10L	￥12,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 5.5
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 5.5)

26186-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 6.0
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 6.0)

26187-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 6.5
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 6.5)

26188-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 6.8
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 6.8)

26183-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 7.0
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 7.0)

26189-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 7.2
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 7.2)

26190-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 7.5
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 7.5)

26184-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000

(10倍濃度)薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 8.0
10× Diluted McIlvaine buffer solution (pH 8.0)

26191-89	医薬品試験用	P	5L	￥10,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 3.0
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 3.0)

警告

26040-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26040-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26040-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 4.0
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 4.0)

26041-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26041-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26041-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 4.5
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 4.5)

26020-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26020-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26020-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 5.0
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 5.0)

26042-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26042-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26042-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 5.5
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 5.5)

26043-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26043-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26043-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 6.0
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 6.0)

26044-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26044-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26044-82	医薬品試験用	P	20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 6.5
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 6.5)

26045-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26045-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26045-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 6.8
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 6.8)

26049-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26049-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26049-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 7.0
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 7.0)

26046-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26046-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26046-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 7.2
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 7.2)

26047-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26047-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26047-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 7.5
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 7.5)

26048-76	医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26048-84	医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26048-82	医薬品試験用		20L	￥13,000

薄めたMcIlvaine緩衝液,pH 8.0
Diluted McIlvaine buffer solution (pH 8.0)

26052-76		医薬品試験用	P	3L	￥4,200
26052-84		医薬品試験用	P	18L	￥12,000
26052-82		医薬品試験用		20L	￥13,000

ウンデカン酸エチル標準品
Ethyl undecanoate standard

$C_{13}H_{26}O_2$...214.34 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［627-90-7］ d0.86▲

49862-25	DES（C17896420）		食品分析用	250mg	￥10,000

ウマ溶血液
Lysed horse blood

［凍］ -20℃以下

717589-2			微生物検査用	100mL	￥15,000

ウンデカン酸メチル
Methyl undecanoate

$C_{12}H_{24}O_2$...200.31 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1731-86-8］

49051-30	MTR（1166）	99%		100mg	☆

ウンデカン酸メチル標準品
Methyl undecanoate standard

$C_{12}H_{24}O_2$...200.31 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1731-86-8］ d0.872▲

49861-94	DES（C17896450）		食品分析用	1mL	￥12,000

ウンデカン酸メチル-d_{21}
Methyl undecanoate-d_{21}

$CD_3(CD_2)_9COOCH_3$...221.44
CAS RN® ［1219804-96-2］

49130-91	CDN（D-5856）	98 atom% D		500mg	￥83,600

10-ウンデセン酸メチル
Methyl 10-undecenoate

$C_{12}H_{22}O_2$...198.30 ［危］4-3-III
CAS RN® ［111-81-9］

25072-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥11,500
25072-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥2,100

ウアバイン八水和物
Ouabain octahydrate

$C_{29}H_{44}O_{12}\cdot 8H_2O$...728.77
CAS RN® ［11018-89-6］ mp260℃▲

16173-1A	TFS（16173-0010）		1g	￥24,600
16173-2A	TFS（16173-0050）		5g	￥88,600

ウルトラポリりん酸ナトリウム
Sodium ultrapolyphosphate

37565-02	53.0%～80.0%(as P_2O_5)(UV-VIS)	P	500g	￥3,500

ウルトラマリンブルー
Ultramarine blue

CAS RN® ［57455-37-5］

43000-32		G	25g	￥3,800

ウンベリフェロン → 7-ヒドロキシクマリン

ウムカリン
Umckalin

$C_{11}H_{10}O_5$...222.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［43053-62-9］

49068-56	PHY（80144）	天然物化学研究用	5mg	￥60,000

ウンカリンC
Uncarine C

$C_{21}H_{24}N_2O_4$...368.42 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［5629-60-7］

49068-57	PHY（89814）	天然物化学研究用		10mg	￥75,000

ウンカリンE
Uncarine E

$C_{21}H_{24}N_2O_4$...368.42 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［5171-37-9］

49068-59	PHY（89816）	天然物化学研究用		10mg	￥75,000

γ-ウンデカラクトン
γ-Undecalactone

$C_{11}H_{20}O_2$...184.27 ［危］4-3-III
CAS RN® ［104-67-6］ d0.943▲

25949-1A	TFS（25949-0250）			25mL	￥2,700

n-ウンデカン
n-Undecane

危険

$CH_3(CH_2)_9CH_3$...156.30 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1120-21-4］ bp195.9℃† mp-26℃† d(20℃) 0.74† Fp61℃▲

43051-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,100

n-ウンデカン
n-Undecane

危険

$CH_3(CH_2)_9CH_3$...156.30 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1120-21-4］ bp196℃ mp26℃ d0.74 Fp60℃

14066-1A	TFS（14066-0025）			2.5L	￥88,200
14066-3A	TFS（14066-1000）			100mL	￥6,100
14066-4A	TFS（14066-5000）			500mL	￥27,500

n-ウンデカン-d_{24}
n-Undecane-d_{24}

$CD_3(CD_2)_9CD_3$...180.45 ［危］4-2-III
CAS RN® ［164858-54-2］

49135-58	CDN（D-5063）	98 atom% D		500mg	￥52,800

n-ウンデカン酸
n-Undecanoic acid

警告

$CH_3(CH_2)_9COOH$...186.29
CAS RN® ［112-37-8］ bp284.0℃† mp28℃～31℃† d(80/4℃) 0.851†

43002-30		>98.0%(GC)	鹿特級	25g	￥5,300
17397-1A	TFS（17397-1000）			100g	￥14,700
17397-2A	TFS（17397-0050）			5g	￥3,500
17397-3A	TFS（17397-0250）			25g	￥4,900

n-ウンデカン酸
n-Undecanoic acid

$CH_3(CH_2)_9COOH$...186.29
CAS RN® ［112-37-8］ bp284.0℃† mp28℃～31℃† d(80/4℃) 0.851†

49051-28	MTR（1165）	99%	100mg	☆

ウンデカン酸標準品
Undecanoic acid standard

$CH_3(CH_2)_9COOH$...186.29 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［112-37-8］ mp28℃～31℃▲ d(80/4℃) 0.851▲

49861-65	DES（C17896400）	食品分析用	250mg	￥9,500

ウンデカン酸-11,11,11-d_3
Undecanoic-11,11,11-d_3 acid

$CD_3(CH_2)_9COOH$...189.30

49149-39	CDN（D-6002）	99 atom% D	250mg	￥61,600

ウンデカン酸-2,2-d_2
Undecanoic-2,2-d_2 acid

$C_{11}H_{20}D_2O_2$...188.30
CAS RN® [64118-43-0]

49144-37	CDN（D-6171）	98 atom% D		1g	￥39,600

ウンデカン酸-d_{21}
Undecanoic-d_{21} acid

$CD_3(CD_2)_9COOH$...207.41
CAS RN® [60658-40-4]

49135-59	CDN（D-4015）	98 atom% D		500mg	￥46,200

ウンデカン酸エチルエステル標準品 → ウンデカン酸エチル標準品

ウンデカン酸メチルエステル → ウンデカン酸メチル

ウンデカン酸メチルエステル標準品 → ウンデカン酸メチル標準品

1-ウンデカノール → *n*-ウンデシルアルコール

2-ウンデカノン
2-Undecanone

警告

$CH_3CO(CH_2)_8CH_3$...170.29 ［危］4-3-III
CAS RN® [112-12-9] bp225℃† mp11℃～13℃† d(20/20℃) 0.83▲

43052-31		>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,700
14069-1A	TFS（14069-2500）				250mL	￥6,000
14069-3A	TFS（14069-0050）				5mL	￥2,800
14069-2A	TFS（14069-0010）				1L	￥22,700

10-ウンデセン酸
10-Undecenoic acid

CH_2:$CH(CH_2)_8COOH$...184.27
CAS RN® [112-38-9] bp275℃(dec)† mp23℃～25℃† d(25/25℃) 0.910†

43005-10	>97.0%(GC)	鹿特級	G	250g	￥4,100
43005-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,200

10-ウンデセン-1-オール
10-Undecen-1-ol

$C_{11}H_{22}O$...170.29 [危] 4-3-III
CAS RN® [112-43-6] d0.846▲

38899-1A	TFS（38899-0250）	25g	￥6,600
38899-2A	TFS（38899-1000）	100g	￥12,200

n-ウンデシルアルコール
n-Undecyl alcohol

警告

$CH_3(CH_2)_9CH_2OH$...172.30 [危] 4-3-III
CAS RN® [112-42-5] mp19℃† d(20/20℃) 0.83▲

43003-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,700
14068-1A	TFS（14068-5000）			500mL	￥17,300
14068-3A	TFS（14068-1000）			100mL	￥6,400

n-ウンデシル-1,1,2,2-d_4アルコール
n-Undecyl-1,1,2,2-d_4 alcohol

$C_{11}H_{20}D_4O$...176.33 [危] 4-3-III
CAS RN® [1219803-47-0]

49144-38	CDN（D-6750）	98 atom% D	500mg	￥57,200

n-ウンデシル-d_{23}アルコール
n-Undecyl-d_{23} alcohol

$CD_3(CD_2)_{10}OH$...195.44 [危] 4-3-III
CAS RN® [349553-88-4]

49135-60	CDN（D-4007）	98 atom% D	500mg	￥88,000

n-ウンデシル-d$_{23}$-アミン
n-Undecyl-d$_{23}$-amine

$CD_3(CD_2)_{10}NH_2$...194.46 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219805-57-8］

49148-31	CDN（D-6255）	98 atom% D	50mg	￥70,400

10-ウンデセン酸
10-Undecenoic acid

CH_2:$CH(CH_2)_8COOH$...184.27
CAS RN® ［112-38-9］bp275℃ mp24.5℃ d0.911 Fp148℃

15449-1A	TFS（15449-0025）	2.5kg	￥22,700
15449-3A	TFS（15449-2500）	250g	￥4,100
15449-4A	TFS（15449-5000）	500g	￥6,300

ウンデシレン酸 → 10-ウンデセン酸

ウンデシレン酸アルデヒド
Undecylenic aldehyde

$C_{11}H_{20}O$...168.27 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［112-45-8］ mp7℃▲ d0.81▲

15799-1A	TFS（15799-0250）	25g	￥4,200
15799-2A	TFS（15799-1000）	100g	￥12,700

n-ウンデシル酸 → *n*-ウンデカン酸

n-ウンデシル酸 → *n*-ウンデカン酸

(*R*)-ウニコナゾール標準品
(*R*)-Uniconazole standard

$C_{15}H_{18}ClN_3O$...291.77 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［83657-16-3］

49867-66	DES（C17897150）	残留農薬試験用	10mg	￥46,000

ウニコナゾール標準品
Uniconazole standard

$C_{15}H_{18}ClN_3O$...291.77 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［83657-22-1］

49832-45	DES（C17897000）	残留農薬試験用	10mg	￥78,000

ウニコナゾール-P標準液
Uniconazole-P standard solution

危険

$C_{15}H_{18}ClN_3O$...291.77 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［83657-17-4］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49803-02	DES（L17897100CY）	残留農薬試験用	10mL	￥16,000

ウラシル
Uracil

警告

$C_4H_4N_2O_2$...112.08
CAS RN® ［66-22-8］ mp335℃▲

43131-02	>97.0%(HLC)	G	500g	￥17,500
43131-32	>97.0%(HLC)	G	25g	￥3,000
15730-1A	TFS（15730-0250）		25g	￥6,200
15730-2A	TFS（15730-1000）		100g	￥15,300

ウラシル-1,3-d_2
Uracil-1,3-d_2

$C_4H_2D_2N_2O_2$...114.09
CAS RN® ［20666-60-8］

49135-61	CDN（D-1883）	98 atom% D	250mg	￥48,400

ウラシル-5,6-d_2
Uracil-5,6-d_2

$C_4H_2D_2N_2O_2$...114.09
CAS RN® ［24897-52-7］

49135-64	CDN（D-5149）	98 atom% D	100mg	￥31,900

ウラシル-5-d_1
Uracil-5-d_1

$C_4H_3DN_2O_2$...113.09
CAS RN® [24897-50-5]

49135-62	CDN（D-2485）	98 atom% D	250mg	￥83,600

ウラシル-6-d_1
Uracil-6-d_1

$C_4H_3DN_2O_2$...113.09
CAS RN® [24897-51-6]

49135-63	CDN（D-5133）	98 atom% D	100mg	￥83,600

ウラシル-d_4
Uracil-d_4

$C_4D_4N_2O_2$...116.11
CAS RN® [24897-55-0]

49135-65	CDN（D-5135）	98 atom% D	250mg	￥46,200

ウラシル-6-カルボン酸一水和物 → オロチン酸一水和物

ウラシル-DNAグリコシラーゼ (UDG)
Uracil-DNA Glycosylase (UDG)

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49885-95	NEB（M0280S）	1000units	￥13,200
49885-96	NEB（M0280L）	5000units	￥53,000

ウラシルグリコシラーゼ阻害剤 (UGI)
Uracil Glycosylase Inhibitor (UGI)

［凍］ -20℃以下

2,000units/mL

49885-97	NEB（M0281S）	200units	￥13,200
49886-00	NEB（M0281L）	1000units	￥53,100

ウラシル-1-β-D-リボフラノシド → ウリジン

ウラニン
Uranine

$C_{20}H_{10}Na_2O_5$...376.26
CAS RN® [518-47-8]

16052-30	特級	G	25g	￥6,100
16052-31	鹿1級	G	25g	￥4,000

ウラニン溶液
Uranine solution

CAS RN® [518-47-8]

43124-23	滴定用指示薬	G	100mL	￥2,600

ウラゾール
Urazole

$C_2H_3N_3O_2$...101.06 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [3232-84-6] mp243℃～248℃▲

14074-1A	TFS（14074-0050）		5g	￥9,500

ウレアーゼ(タチナタ豆)
Urease

警告

[冷] 0℃～6℃
CAS RN® [9002-13-5]

from jack bean 5000U/g

43011-62		G	1g	￥10,000

ウレアーゼ
Urease

[凍] -20℃

from Jack bean

49811-78	TYB（URH-201）		1g	￥15,000

5-ウレイドヒダントイン → アラントイン

ウレタン
Urethane

$C_3H_7NO_2$...89.09 ［労］57,57-2［PRTR］2-8
CAS RN® ［51-79-6］ mp47℃～51℃▲

32554-1A	TFS（32554-0500）				50g	￥3,800
32554-2A	TFS（32554-2500）				250g	￥12,900

ウリカーゼ
Uricase

［凍］ -20℃

49811-80	TYB（UAO-201）				100mg	￥35,000
49811-81	TYB（UAO-201）				10mg	￥5,000
49811-82	TYB（UAO-211）				500U	￥50,000

ウリジン
Uridine

$C_9H_{12}N_2O_6$...244.20
CAS RN® ［58-96-8］ mp165℃†

43014-60		>98.0%(UV-VIS)	鹿特級	G	1g	￥3,900
14077-1A	TFS（14077-0250）				25g	￥15,800
14077-2A	TFS（14077-0010）				1g	￥4,200
14077-3A	TFS（14077-1000）				100g	￥46,600
14077-4A	TFS（14077-5000）				500g	￥155,000

ウリジン-5,6-d_2
Uridine-5,6-d_2

$C_9H_{10}D_2N_2O_6$...246.21
CAS RN® ［40632-21-1］

49135-71	CDN（D-5291）				100mg	￥52,800

ウリジン5′-一りん酸二ナトリウム水和物
Uridine 5′-monophosphate disodium salt hydrate

$C_9H_{11}N_2O_9PNa_2 \cdot nH_2O$
CAS RN® [3387-36-8] mp208℃～210℃▲

22629-1A	TFS（22629-0010）				1g	￥3,900
22629-2A	TFS（22629-0050）				5g	￥8,300

ウロカニン酸
Urocanic acid

$C_6H_6N_2O_2$...138.12
CAS RN® [104-98-3] mp225℃†

43015-50		>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥11,500
22896-1A	TFS（22896-0250）				25g	￥27,200
22896-2A	TFS（22896-0050）				5g	￥7,100

ウロコルチン1 マウス/ラットEIAキット
Urocortin1 Mouse/Rat EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-43	矢内（YK210）	1kit	￥76,000

ウロコルチン2 マウスEIAキット
Urocortin2 Mouse EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-40	矢内（YK190）	1kit	￥76,000

ウロコルチン2 ラットEIAキット
Urocortin2 Rat EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-41	矢内（YK191）	1kit	￥76,000

ウロコルチン3 マウス/ラットEIAキット
Urocortin3 Mouse/Rat EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-42	矢内（YK200）	1kit	￥76,000

ウロトロピン → ヘキサメチレンテトラミン

ウロトロピン標準品 → ヘキサメチレンテトラミン標準品

ウルソデオキシコール酸
Ursodeoxycholic acid

$C_{24}H_{40}O_4$...392.57
CAS RN® [128-13-2] mp203℃～206℃▲

43006-32		>95.0%	G	25g	￥12,000
43006-52		>95.0%	G	5g	￥4,600
20859-1A	TFS（20859-0010）			1g	￥6,200
20859-2A	TFS（20859-0050）			5g	￥16,700

ウルソデオキシコール酸-2,2,4,4-d_4
Ursodeoxycholic-2,2,4,4-d_4 acid

$C_{24}H_{36}D_4O_4$...396.59
CAS RN® [347841-46-7]

49135-74	CDN（D-3819）	98 atom% D	100mg	￥83,600

ウルソデオキシコール酸-24-^{13}C
Ursodeoxycholic-24-^{13}C acid

$C_{23}{}^{13}CH_{40}O_4$...393.56
CAS RN® [63296-46-8]

49135-73	CDN（C-3850）	99 atom% ^{13}C	50mg	￥83,600

ウルソル酸
Ursolic acid

$C_{30}H_{48}O_3$...456.69
CAS RN® [77-52-1] mp283℃～285℃(dec.)†

29018-1A	TFS（29018-2500）		250mg	￥15,500
49871-02	PHY（89541）	天然物化学研究用	25mg	￥43,000

ウルシオール(15:1)
Urushiol (15:1)

$C_{21}H_{34}O_2$...318.49 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［35237-02-6］

49068-60	PHY（80180）	天然物化学研究用	10mg	￥105,000

ウルシオール(15:2)
Urushiol (15:2)

$C_{21}H_{32}O_2$...316.47 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［83258-37-1］

49068-61	PHY（80181）	天然物化学研究用	10mg	￥105,000

ウルシオール(15:3)
Urushiol (15:3)

$C_{21}H_{30}O_2$...314.46 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［83543-37-7］

49068-62	PHY（80182）	天然物化学研究用	10mg	￥105,000

ウサラミン
Usaramine

$C_{18}H_{25}NO_6$...351.39 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［15503-87-4］

49871-39	PHY（84274）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

ウサラミン窒素酸化物
Usaramine N-oxide

$C_{18}H_{25}NO_7$...367.39 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［117020-54-9］

49871-40	PHY（84703）	天然物化学研究用	10mg	￥82,000

(+)-ウスニン酸
(+)-Usnic acid

$C_{18}H_{16}O_7$...344.31
CAS RN®［7562-61-0］

49068-63	PHY（89818）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

ウザリン
Uzarin

$C_{35}H_{54}O_{14}$...698.79 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［20231-81-6］

49877-90	PHY（80833）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

ウェデロラクトン
Wedelolactone

$C_{16}H_{10}O_{7}$...314.24 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［524-12-9］

49068-80	PHY（89823）	天然物化学研究用	10mg	￥75,000

96ウェルプレート 0.35mL ガラスインサート付 キャップ、セプタム組み立て済み
96-well plates, 0.35mL, with glass inserts, caps, septa preassembled

95252-39	ATI（5065-4402）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1個)	￥15,000

96ウェルプレート 150μL
96-well plates, 150μL, skirted

95252-38	ATI（5042-8502）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(25個)	￥41,000

ウィイス試薬
Wijs' reagent

危険

［危］4-2-S-III［労］57,57-2
Fp39℃ †

45003-08		G	500mL	￥3,700
45003-76		G	3L	￥13,000

ウィルフォルギン
Wilforgine

$C_{41}H_{47}NO_{19}$...857.80 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［37239-47-7］

49878-00	PHY（84268）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

ウィルホリン
Wilforine

$C_{43}H_{49}NO_{18}$...867.84 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［11088-09-8］

49870-44	PHY（83298）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

ウィルホルリドA
Wilforlide A

$C_{30}H_{46}O_3$...454.68
CAS RN®［84104-71-2］

49068-81	PHY（80555）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

ウインターグリーンオイル → サリチル酸メチル

ウィタフェリンA
Withaferin A

$C_{28}H_{38}O_6$...470.59 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［5119-48-2］

49068-82	PHY（89824）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

ウィタノリドA
Withanolide A

$C_{28}H_{38}O_6$...470.59 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［32911-62-9］

49068-83	PHY（80556）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

ウィタノリドB
Withanolide B

$C_{28}H_{38}O_5$...454.59 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［56973-41-2］

49068-84	PHY（80557）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

ウィタノン
Withanone

$C_{28}H_{38}O_6$...470.59 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［27570-38-3］

49068-85	PHY（82683）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

ウィタノシドIV
Withanoside IV

$C_{40}H_{62}O_{15}$...782.90 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［362472-81-9］

49068-86	PHY（80632）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

ウィタノシドV
Withanoside V

$C_{40}H_{62}O_{14}$...766.91 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［256520-90-8］

49068-87	PHY（80633）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

ウォゴニン
Wogonin

$C_{16}H_{12}O_5$...284.26
CAS RN® ［632-85-9］

49068-88	PHY（89825）	天然物化学研究用	10mg	￥40,000

ウォゴノシド
Wogonoside

$C_{22}H_{20}O_{11}$...460.38
CAS RN® ［51059-44-0］

49068-89	PHY（82684）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

ウッド合金
Wood's alloy

危険

［労］特-2,57,57-2［PRTR］特1-75,1-304
CAS RN®［76093-98-6］

Bi:abt 50% Pb:abt 25% Cd:abt 12.5% Sn:abt 12.5%

45001-32		G	25g	￥3,100

ウォルトマンニン
Wortmannin

$C_{23}H_{24}O_8$...428.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［19545-26-7］

32859-1A	TFS（32859-0010）		1mg	￥14,700

ウースター試薬 → *N*,*N*,*N*′,*N*′-テトラメチル-*p*-フェニレンジアミン二塩酸塩

塩化アセトキシ酢酸
Acetoxyacetyl chloride

$C_4H_5ClO_3$...136.53 ［危］4-3-III
CAS RN®［13831-31-7］

02054-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥11,000
02054-52	>97.0%(GC)	G	5g	￥4,500

塩化アセトキシアセチル
Acetoxyacetyl chloride

$C_4H_5ClO_3$...136.53 ［危］4-3-III
CAS RN®［13831-31-7］ d1.270▲

37007-1A	TFS（37007-0050）	5g	￥5,100
37007-2A	TFS（37007-0250）	25g	￥11,600

塩化2-アセトキシエチルトリメチルアンモニウム → 塩化アセチルコリン

塩化4-アセチルベンゼンスルホニル
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride

$C_8H_7ClO_3S$...218.65
CAS RN® [1788-10-9] mp83℃～87℃▲

34385-1A	TFS（34385-0010）	1g	￥4,800
34385-2A	TFS（34385-0050）	5g	￥10,300

塩化アセチル
Acetyl chloride

危険

CH_3COCl...78.49 ［危］4-1-II
CAS RN® [75-36-5] bp52℃† mp-112℃† d1.104† Fp5℃†

01043-01	>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥10,500

塩化アセチル
Acetyl chloride

危険

CH_3COCl...78.49 ［危］4-1-II
CAS RN® [75-36-5] bp51℃ mp112℃ d1.1 Fp4℃

21947-1A	TFS（21947-0010）	1L	￥11,900
21947-2A	TFS（21947-0025）	2.5L	￥22,600
21947-3A	TFS（21947-0250）	25mL	￥4,600
21947-4A	TFS（21947-2500）	250mL	￥5,700

塩化アセチル,ジクロロメタン溶液
Acetyl chloride, in dichloromethane

CH_3COCl...78.49 ［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-186 ［変］
CAS RN® [75-36-5]

1mol/L

38774-1A	TFS（38774-1000）	100mL	￥5,500
38774-2A	TFS（38774-8000）	800mL	￥37,800

塩化アセチル-d_3
Acetyl-d_3 chloride

CD_3COCl...81.51 ［危］4-1-II
CAS RN® ［19259-90-6］

49145-13	CDN（D-260）	99 atom% D			10g	￥30,800

塩化アセチルコリン
Acetylcholine chloride

警告

$[CH_3COOCH_2CH_2N(CH_3)_3]Cl$...181.65
CAS RN® ［60-31-1］ mp149℃～152℃$^{\triangle}$

01045-31		>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥5,400
15917-1A	TFS（15917-1000）				100g	￥19,900
15917-2A	TFS（15917-0050）				5g	￥4,000

塩化アセチルコリン-1,1,2,2-d_4
Acetylcholine-1,1,2,2-d_4 chloride

$CH_3COOCD_2CD_2N(CH_3)_3Cl$...185.68
CAS RN® ［344298-94-8］

49120-24	CDN（D-2558）	99 atom% D		50mg	￥64,900

塩化アセチルコリン-d_9（*N*, *N*, *N*-トリメチル-d_9）
Acetylcholine-d_9 chloride (*N*,*N*,*N*-trimethyl-d_9)

$CH_3COOCH_2CH_2N(CD_3)_3Cl$...190.71
CAS RN® ［344298-95-9］

49120-25	CDN（D-2559）	99 atom% D		50mg	￥64,900

塩化アセチル-β-メチルコリン → 塩化メタコリン

エンフロンIIアクロ50ベントデバイス 0.2μm ベント付きホース口
Acro® 50 Vent Devices with Emflon® II Membrane-Hose barb with vent, 0.2μm

97009-63	PALL（A50V002P2）		微生物検査用	1pack(3個)	￥15,600

エンフロンIIアクロ50ベントデバイス 0.2μm ホースロ ベント無し,出荷前完全性100%検査済み
Acro[R] 50 Vent Devices with Emflon[R] II Membrane-Hose barb, no vent, 0.2μm 100% integrity tested during manufacturing

97009-64	PALL（A50V002P2NV）	微生物検査用	1pack(100個)	￥301,700

遠心用アダプター
Adapter collar for centrifugation

97008-88	PALL（5225）	分離精製用	1pack(2個)	￥18,900

ルアーコーン付エアベントキャップ
Air vent cap

70029-52	BRA（704492）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥1,000

ルアーコーン付エアベントキャップ TA用
Air vent cap for Dispensette[R] S trace analysis

70029-53	BRA（704493）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥1,000

エアベントキャップ ディスペンセッテ用
Air vent cap, micro filter with Luer-cone, Dispensette[R]

70008-70	BRA（704495）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥3,300

エアベントキャップ タイトレット、ディスペンセッテ用
Air vent cap, Titrette[R] and Dispensette[R]

70004-28	BRA（6659）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1pack	￥900

塩化アルキルベンジルジメチルアンモニウム → 塩化ベンザルコニウム

塩化アルキルベンジルジメチルアンモニウム溶液 → 50%塩化ベンザルコニウム溶液

塩化アリル → 3-クロロプロペン

塩化アリルジブチルすず
Allyldibutyltin chloride

$C_{11}H_{23}ClSn$...309.46 ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［64549-05-9］ bp103℃(5mm)▲ d1.20▲

29804-1A	TFS（29804-2500）		250mg	￥9,100

塩化1-アリル-3-メチルイミダゾリウム
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride

$C_7H_{11}ClN_2$...158.62
CAS RN® ［65039-10-3］

49515-45	ILT（IL-0022-HP）	>98.0%	100g	￥33,000
49515-44	ILT（IL-0022-HP）	>98.0%	25g	￥19,000

塩化アルミニウム(無水)
Aluminium chloride, anhydrous

危険

$AlCl_3$...133.33 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［7446-70-0］ mp194℃ d2.44

21746-2A	TFS（21746-0050）		5g	￥5,000
21746-3A	TFS（21746-1000）		100g	￥5,800
21746-4A	TFS（21746-5000）		500g	￥7,400

塩化アルミニウム(無水)
Aluminium chloride, anhydrous

危険

$AlCl_3$...133.33 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［7446-70-0］ mp194℃ d2.44

36481-1A	TFS（36481-0100）		10g	￥19,300
36481-2A	TFS（36481-0200）		20g	￥28,300

塩化アルミニウム(III)
Aluminium(III) chloride

危険

$AlCl_3$...133.33 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN®［7446-70-0］

particle size 5mm～10mm

01156-00		>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥6,400
01156-01		>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥4,100

塩化アルミニウム(III)六水和物
Aluminium(III) chloride hexahydrate

警告

$AlCl_3 \cdot 6H_2O$...241.42 ［労］57,57-2
CAS RN®［7784-13-6］

01155-00		>98.0%(T)	特級	P	500g	￥2,800
01155-30		>98.0%(T)	特級	G	25g	￥1,400
01155-80		>98.0%(T)	特級	B	15kg	☆
01155-01		>97.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,400

塩化アンモニウム
Ammonium chloride

危険

NH_4Cl...53.49 ［労］57,57-2
CAS RN®［12125-02-9］

01287-00		>99.5%(T)	特級	P	500g	￥2,000
01287-30		>99.5%(T)	特級	G	25g	￥1,500
01287-80		>99.5%(T)	特級	C	20kg	☆
01287-01		>98.5%(T)	鹿1級	P	500g	￥1,900
01287-81		>98.5%(T)	鹿1級	C	20kg	☆
01151-08		>99.5%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥3,000
1143-1M	M（1.01143.0050）	>99.995%(Im.S.)	Suprapur®		50g	￥15,900
1145-1M	M（1.01145.0500）	>99.8%(T)	EMSURE®		500g	￥4,840

塩化アンモニウム
Ammonium chloride

危険

NH_4Cl...53.49 ［労］57,57-2
CAS RN®［12125-02-9］ mp340℃

19997-1A	TFS（19997-0010）	1kg	￥7,500
19997-2A	TFS（19997-0050）	5kg	￥29,600
19997-3A	TFS（19997-0250）	25kg	￥105,400
19997-4A	TFS（19997-5000）	500g	￥5,800

塩化アンモニウム, 99.9995%
Ammonium chloride, 99.9995%

危険

NH_4Cl...53.49 ［労］57,57-2
CAS RN®［12125-02-9］

01299-96	>99.9995%(Im.S.) Primepure(M)	P	50g	￥21,000

塩化アンモニウム CRM3011-a
Ammonium chloride, CRM3011-a

危険

NH_4Cl...53.49 ［労］57,57-2
CAS RN®［12125-02-9］

49005-01	NMI（CRM3011-a）	認証標準物質	25g	☆

塩化アンモニウム銅(II)二水和物 → 塩化二アンモニウム銅(II)二水和物

塩化パラジウム(II)アンモニウム
Ammonium palladium(II) chloride

危険

$(NH_4)_2PdCl_4$...284.30 ［労］57,57-2
CAS RN®［13820-40-1］

32002-62	>37.0%(as Pd)(T)	G	1g	￥9,500

塩化亜鉛アンモニウム
Ammonium zinc chloride

危険

$2NH_4Cl \cdot ZnCl_2$...243.26 ［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-1
CAS RN®［52628-25-8］

48010-01	>93.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥18,000

塩化 *m*-アニソイル
m-Anisoyl chloride

$CH_3OC_6H_4COCl$...170.59
CAS RN®［1711-05-3］bp123℃～125℃(15mm)▲ d1.214▲

21297-1A	TFS（21297-0250）	25g	￥14,300
21297-2A	TFS（21297-0050）	5g	￥5,300

塩化 *o*-アニソイル
o-Anisoyl chloride

$CH_3OC_6H_4COCl$...170.59 ［危］4-3-III
CAS RN®［21615-34-9］bp137℃(18mm)▲ d1.572▲

27611-1A	TFS（27611-0050）	5g	￥4,600
27611-2A	TFS（27611-0250）	25g	￥14,900

塩化 *p*-アニソイル
p-Anisoyl chloride

危険

$CH_3OC_6H_4COCl$...170.59 ［危］4-3-III
CAS RN®［100-07-2］ mp22℃†

10485-1A	TFS（10485-1000）	100g	￥12,400
10485-2A	TFS（10485-0050）	5g	￥3,600
10485-3A	TFS（10485-5000）	500g	￥45,800

塩化アンチモン(III)
Antimony(III) chloride

危険

$SbCl_3$...228.11 ［劇］II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-31 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［10025-91-9］ mp73℃†

01429-00	>98.0%(T)	特級	G	500g	￥9,000
01429-20	>98.0%(T)	特級	G	100g	￥5,500
01429-30	>98.0%(T)	特級	G	25g	￥3,500

塩化アンチモン(V)
Antimony(V) chloride

危険

$SbCl_5$...299.02 ［劇］II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-31
CAS RN® ［7647-18-9］ mp3.5℃† d(36/4℃) 2.319†

01423-01	>95.0%(T)	鹿1級		500g	￥17,000

塩化アンチモン(V)(無水)
Antimony(V)-chloride, anhydrous

$SbCl_5$...299.02 ［劇］II ［労］57,57-2 ［PRTR］1-31
CAS RN® ［7647-18-9］ bp92℃ mp2.8℃ d2.36

20121-1A	TFS（20121-0010）			1kg	￥52,700
20121-2A	TFS（20121-0500）			50g	￥6,500
20121-3A	TFS（20121-2500）			250g	￥14,400

塩素酸バリウム一水和物
Barium chlorate monohydrate

危険

$Ba(ClO_3)_2 \cdot H_2O$...322.24 ［劇］II ［危］1-C-1-I ［労］57,57-2
CAS RN® ［10294-38-9］ mp414℃†

04016-00	>99.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥10,500

0.05mol/L塩化バリウム溶液(1L調製用濃縮液)
0.05mol/L Barium chloride solution, Titrisol^{R}

$BaCl_2 \cdot 2H_2O$...244.26 ［労］57-2
CAS RN® ［10326-27-9］

9962-1M	M（1.09962.0001）				1amp	￥9,040

塩化バリウム二水和物
Barium chloride dihydrate

危険

$BaCl_2 \cdot 2H_2O$...244.26 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［10326-27-9］

04017-00		>99.0%(T)	特級	P	500g	￥3,000
04017-30		>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,700
04017-01		>98.5%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,900
04017-81		>98.5%(T)	鹿1級	M	20kg	☆

塩化バリウム二水和物,3N
Barium chloride dihydrate, 3N

危険

$BaCl_2 \cdot 2H_2O$...244.26 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［10326-27-9］

04017-08		>99.9%(Im.S.)	高純度試薬	P	500g	￥8,500

塩化バリウム(無水)
Barium chloride, anhydrous

危険

$BaCl_2$...208.23 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［10361-37-2］

04018-00		>97.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥5,100
04018-01		>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥3,600
1716-1M	M（1.01716.0050）	>99.995%(Im.S.)	Suprapur^{R}		50g	￥24,900

塩基性フクシン
Basic fuchsin

$C_{20}H_{20}ClN_3$...337.84 ［労］特-2,57,57-2
CAS RN® ［632-99-5］ mp250℃▲

40169-1A	TFS（40169-0250）	certified	25g	￥13,400

塩基性フクシン
Basic Fuchsin

$C_{20}H_{20}ClN_3$...337.84 ［労］特-2,57,57-2
CAS RN® ［632-99-5］ mp250℃ Fp200℃

41914-1A	TFS（41914-0025）	2.5kg	￥243,100
41914-2A	TFS（41914-1000）	100g	￥34,400
41914-3A	TFS（41914-5000）	500g	￥38,200

塩基性水酸化鉛 → 水酸化鉛

塩化ベンザル → α,α-ジクロロトルエン

塩化ベンザルコニウム
Benzalkonium chloride

危険

$[RN(CH_3)_2CH_2C_6H_5]Cl$ (R=C_8H_{17}~$C_{18}H_{37}$)
CAS RN® ［8001-54-5］

01660-11	鹿1級	G	250g	￥11,500
01660-31	鹿1級	G	25g	￥3,400

塩化ベンザルコニウム
Benzalkonium chloride

危険

$[RN(CH_3)_2CH_2C_6H_5]Cl$ (R=C_8H_{17}~$C_{18}H_{37}$)
CAS RN® ［8001-54-5］ mp40℃ d0.98

21541-1A	TFS（21541-0010）	1kg	￥31,500
21541-3A	TFS（21541-0051）	5kg	￥129,700
21541-4A	TFS（21541-1000）	100g	￥4,800

50%塩化ベンザルコニウム溶液
Benzalkonium chloride solution (50% in water)

危険

$[RN(CH_3)_2CH_2C_6H_5]Cl$ (R=C_8H_{17}~$C_{18}H_{37}$)
CAS RN® [8001-54-5]

in water

01661-02		4.7%～5.3%(as Cl)(T)	G	500mL	￥2,600

塩化ベンザルコニウム標準品
Benzalkonium chloride standard

危険

［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [8001-54-5]

49861-03	DES（C10532200）		環境分析用	100mg	￥15,000

塩化ベンゼンスルホニル
Benzenesulfonyl chloride

危険

$C_6H_5SO_2Cl$...176.62 ［毒］II ［危］4-3-III
CAS RN® [98-09-9] bp251℃～252℃(dec)† mp14.5℃† d(15/15℃) 1.38†

04769-31		>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥1,700
14848-1A	TFS（14848-0100）				10mL	￥2,300
14848-3A	TFS（14848-2500）				250mL	￥4,800
14848-2A	TFS（14848-0010）				1L	￥15,800

塩化ベンゼトニウム
Benzethonium chloride

警告

$C_{27}H_{42}NO_2Cl$...448.07
CAS RN® [121-54-0] mp162℃～164℃†

04604-31		>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥3,900
10538-1A	TFS（10538-1000）				100g	￥7,200
10538-4A	TFS（10538-5000）				500g	￥26,100
10538-2A	TFS（10538-0025）				2.5kg	￥116,400

塩化ベンゾイル
Benzoyl chloride

危険

C_6H_5COCl...140.56 ［劇］III ［危］4-3-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［98-88-4］ bp197.2℃† mp-1.0℃† d(25/4℃) 1.207† Fp72℃†

04135-00	>99.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥3,200
04135-01	>98.5%(T)	鹿1級	G	500g	￥2,800

塩化ベンゾイル
Benzoyl chloride

C_6H_5COCl...140.56 ［劇］III ［危］4-3-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［98-88-4］ bp198℃ mp1℃ d1.21 Fp93℃

40203-1A	TFS（40203-0025）	2.5kg	￥53,600
40203-2A	TFS（40203-0050）	5g	￥3,500
40203-3A	TFS（40203-5000）	500g	￥13,500

塩化ベンゾイル-d_5
Benzoyl-d_5 chloride

$C_6D_5C(O)Cl$...145.59 ［劇］III ［危］4-3-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［43019-90-5］

49136-50	CDN（D-315）	99 atom% D	1g	￥34,100

塩化ベンジル
Benzyl chloride

危険

$C_6H_5CH_2Cl$...126.58 ［毒］II ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-398 ［変］
CAS RN® ［100-44-7］ bp179℃† mp-43℃† d(20/20℃) 1.100† Fp67.2℃†

04152-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,300
04152-01	>96.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥4,100

塩化ベンジル標準品 → α-クロロトルエン標準品

塩化ベンジル-d_7
Benzyl chloride-d_7

C_7D_7Cl...133.62 ［毒］II［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-398 ［変］
CAS RN®［59502-05-5］

49152-73	CDN（D-0330）	99 atom% D	1g	￥35,200

塩化ベンジル-2,3,4,5,6-d_5
Benzyl-2,3,4,5,6-d_5 chloride

$C_6D_5CH_2Cl$...131.61 ［毒］II［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-398 ［変］
CAS RN®［68661-11-0］

49121-66	CDN（D-1652）	99 atom% D	1g	￥57,200

塩化ベンジル-α,α-d_2
Benzyl-α,α-d_2 chloride

$C_6H_5CD_2Cl$...128.59 ［毒］II［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-398 ［変］
CAS RN®［33712-34-4］

49121-65	CDN（D-1676）		500mg	￥70,400

塩化ベンジルジメチルヘキサデシルアンモニウム *n* 水和物
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride *n*-hydrate

$C_{25}H_{46}ClN \cdot nH_2O$
CAS RN®［122-18-9］ mp55℃▲

40207-1A	TFS（40207-0050）		5g	￥2,300
40207-2A	TFS（40207-5000）		500g	￥49,300

塩化ベンジルマグネシウム,テトラヒドロフラン溶液,1mol/L
Benzylmagnesium chloride, in tetrahydrofuran, 1mol/L

危険

$(C_6H_5)CH_2MgCl$...150.88 ［危］3-OM-2-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［6921-34-2］ Fp-17.2℃†

air/moisture sensitive

04162-25		abt 1mol/L(T)	Organics		100mL	￥10,500

塩化1-ベンジル-3-メチルイミダゾリウム
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride

$C_{11}H_{13}ClN_2$...208.68
CAS RN® [36443-80-8]

49515-47	ILT（IL-0140-HP）	99%		100g	￥55,000
49515-46	ILT（IL-0140-HP）	99%		25g	￥26,000

塩化ベンジルスルホニル → 塩化α-トルエンスルホニル

塩化ベンジルトリブチルアンモニウム
Benzyltributylammonium chloride

$C_{19}H_{34}ClN$...311.93
CAS RN® [23616-79-7] mp155℃(dec.)▲

18615-2A	TFS（18615-1000）			100g	￥3,400
18615-3A	TFS（18615-5000）			500g	￥10,900

塩化ベンジルトリエチルアンモニウム
Benzyltriethylammonium chloride

警告

$[C_6H_5CH_2N(C_2H_5)_3]Cl$...227.77
CAS RN® [56-37-1] mp185℃(dec.)†

04178-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,400
16402-1A	TFS（16402-1000）				100g	￥3,000
16402-2A	TFS（16402-5000）				500g	￥9,600

塩化ベンジルトリメチルアンモニウム
Benzyltrimethylammonium chloride

危険

$[C_6H_5CH_2N(CH_3)_3]Cl$...185.69 [変]
CAS RN® [56-93-9] mp239℃(dec.)†

04181-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,100
21186-1A	TFS（21186-2500）				250g	￥7,700
21186-2A	TFS（21186-0500）				50g	￥3,200

塩化ベンジルトリメチルアンモニウム,50%溶液
Benzyltrimethylammonium chloride, 50% in water

$[C_6H_5CH_2N(CH_3)_3]Cl$...185.69 ［変］
CAS RN® ［56-93-9］ d1.044▲

20938-1A	TFS（20938-1000）			100g	￥3,400

塩化ベンジルトリフェニルホスホニウム
Benzyltriphenylphosphonium chloride

危険

$C_6H_5CH_2P(C_6H_5)_3(Cl)$...388.86
CAS RN® ［1100-88-5］ mp>300℃†

moisture sensitive

04836-31		>97.0%(T)	鹿1級	25g	￥4,500
10621-1A	TFS（10621-1000）			100g	￥8,500
10621-2A	TFS（10621-0250）			25g	￥3,000

塩化ベルベリン二水和物
Berberine chloride dihydrate

$C_{20}H_{18}NO_4Cl \cdot 2H_2O$...407.84
CAS RN® ［5956-60-5］

49060-92	PHY（89487）		天然物化学研究用	100mg	￥40,000

塩化ベルベルビン
Berberrubine chloride

$C_{19}H_{16}NO_4Cl$...357.78
CAS RN® ［15401-69-1］

49871-91	PHY（85722）		天然物化学研究用	10mg	￥40,000

塩化4-ビフェニルカルボニル
4-Biphenylcarbonyl chloride

$C_6H_5C_6H_4COCl$...216.66
CAS RN® ［14002-51-8］ mp110℃～112℃▲

17125-1A	TFS（17125-0100）			10g	￥5,900
17125-2A	TFS（17125-0500）			50g	￥18,000

塩化1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾリウム
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride

$C_{27}H_{37}ClN_2$...425.04
CAS RN® [250285-32-6]

37831-2A	TFS（37831-0020）	2g	￥40,500

塩化[1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]ニッケル(II)
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) chloride

$C_{27}H_{26}Cl_2NiP_2$...542.03 ［労］57,57-2［PRTR］特1-309
CAS RN® [15629-92-2] mp213℃(dec.)†

29159-1A	TFS（29159-0050）	5g	￥9,100
29159-2A	TFS（29159-0010）	1g	￥4,500

塩化ビス(2-ヒドロキシエチル)ジメチルアンモニウム
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride

$C_6H_{16}ClNO_2$...169.64
CAS RN® [38402-02-7]

40253-1A	TFS（40253-0250）	25g	￥20,800

塩化ビスマス(III)
Bismuth(III) chloride

危険

$BiCl_3$...315.33
CAS RN® [7787-60-2] mpabt 230℃†

04201-00	>98.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥12,500
04201-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,600

塩化3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンゾイル
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride

$(CF_3)_2C_6H_3COCl$...276.56 ［危］4-3-III
CAS RN® [785-56-8] bp65℃～67℃(12mm)▲ d1.526▲

30353-1A	TFS（30353-0050）	5g	￥5,600

二塩化1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-4,5-ジヒドロイミダゾール-2-イリデン[2-(イソプロポキシ)-5-(*N*,*N*-ジメチルアミノスルホニル)フェニル]メチレンルテニウム(II)
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene[2-(isopropoxy)-5-(*N*,*N*-dimethylaminosulfonyl)phenyl]methyleneruthenium(II) dichloride

$C_{33}H_{43}Cl_2N_3O_3RuS$...733.75
CAS RN® [918870-76-5]

04435-55	>96.0%(as Ru)	Organics	5g	￥135,000
04435-65	>96.0%(as Ru)	Organics	1g	￥35,000

塩化1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾリジニウム
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidinium chloride

$C_{21}H_{27}ClN_2$...342.90 ［危］4-2-S-III
CAS RN® [173035-10-4]

37833-1A	TFS（37833-0010）	1g	￥10,300

塩化1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)イミダゾリウム
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride

$C_{21}H_{25}ClN_2$...340.88
CAS RN® [141556-45-8]

35619-1A	TFS（35619-0010）	1g	￥9,300

塩化ビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(II)
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride

$C_{36}H_{30}Cl_2NiP_2$...654.16 ［労］57,57-2［PRTR］特1-309
CAS RN® [14264-16-5] mp>300℃▲

21750-1A	TFS（21750-0100）	10g	￥6,300
21750-2A	TFS（21750-0500）	50g	￥20,900

塩化2-ブロモベンゼンスルホニル
2-Bromobenzenesulfonyl chloride

$C_6H_4BrClO_2S$...255.51
CAS RN® [2905-25-1]

04276-32		>95.0%(HLC)	G	25g	￥22,000
04276-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥7,000
30644-1A	TFS（30644-0050）			5g	￥11,600
30644-2A	TFS（30644-0010）			1g	￥3,900

塩化 *p*-ブロモベンゼンスルホニル
p-Bromobenzenesulfonyl chloride

$BrC_6H_4SO_2Cl$...255.51
CAS RN® [98-58-8] mp74.5℃ †

14876-1A	TFS（14876-1000）			100g	￥22,500
14876-2A	TFS（14876-0250）			25g	￥7,000

塩化2-ブロモベンゾイル
2-Bromobenzoyl chloride

C_7H_4BrClO...219.46 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [7154-66-7] mp11℃▲ d1.67▲

10675-1A	TFS（10675-0100）			10mL	￥7,700
10675-2A	TFS（10675-0500）			50mL	￥20,900

塩化4-ブロモベンゾイル
4-Bromobenzoyl chloride

危険

C_7H_4BrClO...219.46
CAS RN® [586-75-4] mp36℃～41℃▲

04411-02		>98.0%	G	500g	￥22,500
04411-32		>98.0%	G	25g	￥3,300
10676-1A	TFS（10676-0100）			10g	￥5,300
10676-2A	TFS（10676-0250）			25g	￥9,800

塩化4-ブロモベンジル
4-Bromobenzyl chloride

C_7H_6BrCl...205.47
CAS RN®［589-17-3］ mp36℃～40℃▲

34675-1A	TFS（34675-0050）		5g	￥7,700
34675-2A	TFS（34675-0250）		25g	￥29,700

塩化4-ブロモブチリル
4-Bromobutyryl chloride

$Br(CH_2)_3COCl$...185.44 ［危］4-3-III
CAS RN®［927-58-2］bp101℃(37mm)▲ d1.602▲

30344-1A	TFS（30344-0050）		5g	￥7,400

塩化5-ブロモ-2,4-ジフルオロベンゼンスルホニル
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulfonyl chloride

$C_6H_2BrClF_2O_2S$...291.49 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［287172-61-6］

05557-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥38,000
05557-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥12,000

塩化2-ブロモ-5-フルオロベンゼンスルホニル
2-Bromo-5-fluorobenzenesulfonyl chloride

$C_6H_3BrClFO_2S$...273.50
CAS RN®［771-67-5］

04834-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥14,500
04834-62	>95.0%(HLC)	G	1g	￥4,900

塩化2-ブロモプロピオニル
2-Bromopropionyl chloride

C_3H_4BrClO...171.41 ［危］4-2-III
CAS RN®［7148-74-5］bp131℃～133℃▲ d1.70▲

16362-1A	TFS（16362-0100）		10mL	￥8,900
16362-2A	TFS（16362-0500）		50mL	￥31,000

塩化3-ブロモプロピオニル
3-Bromopropionyl chloride

$BrCH_2CH_2COCl$...171.41
CAS RN® [15486-96-1] bp55℃～57℃(17mm)▲ d1.701▲

16199-1A	TFS（16199-0250）	tech.		25g	￥10,800
16199-2A	TFS（16199-1000）	tech.		100g	￥28,200

塩化1-ブタン-d_9-スルホニル
1-Butane-d_9-sulfonyl chloride

$CD_3(CD_2)_3SO_2Cl$...165.68 ［危］4-3-III
CAS RN® [1219794-70-3]

49145-74	CDN（D-6021）	98 atom% D		100mg	￥88,000

塩化1-ブタンスルホニル
1-Butanesulfonyl chloride

$CH_3(CH_2)_3SO_2Cl$...156.63 ［危］4-3-III
CAS RN® [2386-60-9] d1.213～1.219△

04759-31		>97.0%(T)	鹿1級	25g	￥18,000

塩化1-ブタンスルホニル
1-Butanesulfonyl chloride

$CH_3(CH_2)_3SO_2Cl$...156.63 ［危］4-3-III
CAS RN® [2386-60-9] bp96℃ d1.2 Fp79℃

40332-2A	TFS（40332-0250）			25g	￥7,900
40332-3A	TFS（40332-1000）			100g	￥21,600

塩化 *n*-ブタノイル → 塩化 *n*-ブチリル

塩化 *t r a n s*-2-ブテノイル → 塩化クロトノイル(塩化クロトニル)

塩化ｔｅｒｔ-ブチルアセチル
tert-Butylacetyl chloride

危険

$(CH_3)_3CCH_2COCl$...134.60 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7065-46-5］ bp127℃～129℃▲ d0.969▲

10779-1A	TFS（10779-0500）	50mL	￥9,700
10779-2A	TFS（10779-2500）	250mL	￥37,100

塩化4-ｔｅｒｔ-ブチルベンゼンスルホニル
4-*tert*-Butylbenzenesulfonyl chloride

$(CH_3)_3CC_6H_4SO_2Cl$...232.72
CAS RN® ［15084-51-2］ mp78℃～81℃▲

30347-1A	TFS（30347-0100）	10g	￥7,100

塩化4-ｔｅｒｔ-ブチルベンゾイル
4-*tert*-Butylbenzoyl chloride

$(CH_3)_3CC_6H_4COCl$...196.67 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1710-98-1］ bp135℃(20mm)▲ d1.007▲

16910-1A	TFS（16910-0250）	25g	￥7,800
16910-2A	TFS（16910-0050）	5g	￥3,700
16910-3A	TFS（16910-1000）	100g	￥19,700

塩化ｉｓｏ-ブチル → 1-クロロ-2-メチルプロパン

塩化 *n*-ブチル → 1-クロロブタン

塩化ｓｅｃ-ブチル → 2-クロロブタン

塩化ｔｅｒｔ-ブチル → 2-クロロ-2-メチルプロパン

塩化1-ブチル-2,3-ジメチルイミダゾリウム
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride

$C_9H_{17}ClN_2$...188.69
CAS RN® [98892-75-2] mp99℃▲

49515-71	ILT（IL-0056-HP）	99%		100g	￥43,000
49515-70	ILT（IL-0056-HP）	99%		25g	￥24,000

4-[4-(エトキシカルボニル)-1,3-チアゾール-2-イル]テトラヒドロ-1(2*H*)-ピリジンカルボン酸ｔｅｒｔ-ブチル
tert-Butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2*H*)-pyridinecarboxylate

$C_{16}H_{24}N_2O_4S$...340.44
CAS RN® [365413-31-6] mp71℃～73℃▲

49249-94	TFS（CC31023DA）	97%		1g	￥39,200
49249-95	TFS（CC31023CB）	97%		250mg	￥15,100

塩化 *n*-ブチルマグネシウム,テトラヒドロフラン溶液,1.0mol/L
n-Butylmagnesium chloride, in tetrahydrofuran, 1.0mol/L

危険

$CH_3(CH_2)_2CH_2MgCl$...116.87 ［危］3-OM-2-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® [693-04-9] Fp-17.2℃†

air/moisture sensitive

04940-05	0.8mol/L～1.1mol/L(T)	Organics		500mL	￥16,000
04940-25	0.8mol/L～1.1mol/L(T)	Organics		100mL	￥7,000
04940-85	0.8mol/L～1.1mol/L(T)	Organics	M	20kg	☆

塩化ｔｅｒｔ-ブチルマグネシウム,テトラヒドロフラン溶液,1.0mol/L
tert-Butylmagnesium chloride, in tetrahydrofuran, 1.0mol/L

危険

$(CH_3)_3CMgCl$...116.87 ［危］3-OM-2-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［677-22-5］ Fp-17.2℃†

air/moisture sensitive

04942-05	0.8mol/L～1.1mol/L(T)	Organics		500mL	￥24,000
04942-25	0.8mol/L～1.1mol/L(T)	Organics		100mL	￥7,500
04942-85	0.8mol/L～1.1mol/L(T)	Organics	M	20kg	☆

塩化ｓｅｃ-ブチルマグネシウム-塩化リチウム錯体,テトラヒドロフラン溶液,1.2mol/L
sec-Butylmagnesium chloride-lithium chloride complex, in tetrahydrofuran, 1.2mol/L

危険

$C_4H_9MgCl \cdot LiCl$...159.29 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［1032768-06-1］

04944-25	1.1mol/L～1.3mol/L	Organics		100mL	￥13,500
04944-05	1.1mol/L～1.3mol/L	Organics		500mL	￥34,000

塩化1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride

警告

$C_8H_{15}ClN_2$...174.67
CAS RN®［79917-90-1］ mp73℃▲

05068-33		素材研究用		25g	￥17,000
05068-53		素材研究用	G	5g	￥7,000
35409-1A	TFS（35409-0250）			25g	￥10,300
35409-2A	TFS（35409-0050）			5g	￥9,600

塩化 1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム/塩化アルミニウム(1:1.5)
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride and Aluminum chloride(1:1.5), [BMIMCl+$AlCl_3$(1:1.5)]

49527-69	ILT（EP-0002-HP）		25g	￥15,000
49527-70	ILT（EP-0002-HP）		100g	￥28,000

塩化1-ブチル-2-メチルピリジニウム
1-Butyl-2-methylpyridinium chloride

$C_{10}H_{16}ClN$...185.69
CAS RN® [112400-85-8]

49516-36	ILT（IL-0129-HP）	99%	100g	￥98,000
49516-35	ILT（IL-0129-HP）	99%	25g	￥55,000

塩化1-ブチル-3-メチルピリジニウム
1-Butyl-3-methylpyridinium chloride

$C_{10}H_{16}ClN$...185.69
CAS RN® [125652-55-3]

49516-50	ILT（IL-0079-HP）	99%	100g	￥77,000
49516-49	ILT（IL-0079-HP）	99%	25g	￥44,000

塩化1-ブチル-4-メチルピリジニウム
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride

$C_{10}H_{16}ClN$...185.69
CAS RN® [112400-86-9] mp160℃▲

49516-64	ILT（IL-0083-HP）	99%	100g	￥75,000
49516-63	ILT（IL-0083-HP）	99%	25g	￥42,000

塩化1-ブチル-1-メチルピロリジニウム
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride

$C_9H_{20}ClN$...177.71
CAS RN® [479500-35-1] mp106℃▲

49517-51	ILT（IL-0075-HP）	99%	100g	￥36,000
49517-50	ILT（IL-0075-HP）	99%	25g	￥21,000

塩化1-ブチルピリジニウム
1-Butylpyridinium chloride (1=*N*)

$C_9H_{14}ClN$...171.66
CAS RN® [1124-64-7] mp134℃▲

49516-03	ILT（IL-0087-HP）	99%		100g	￥78,000
49516-02	ILT（IL-0087-HP）	99%		25g	￥32,000

塩化ブチリル-2,2-d_2
Butyryl-2,2-d_2 chloride

$CH_3CH_2CD_2COCl$...108.56 ［危］4-2-S-III
CAS RN® [90587-10-3]

49123-27	CDN（D-350）	98 atom% D		1g	￥44,000

塩化ブチリル-d_7
Butyryl-d_7 chloride

C_4D_7OCl...113.59 ［危］4-2-S-III
CAS RN® [1219805-71-6]

49123-28	CDN（D-5779）	98 atom% D		1g	￥70,400

塩化 *n*-ブチリル
n-Butyryl chloride

危険

$CH_3CH_2CH_2COCl$...106.54 ［危］4-2-III
CAS RN® [141-75-3] bp101℃～102℃† mp-89℃† d1.014～1.019△

04454-00	>97.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥12,000
04454-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,900

塩化 *n*-ブチリル
n-Butyryl chloride

危険

$CH_3CH_2CH_2COCl$...106.54 ［危］4-2-III
CAS RN® [141-75-3] bp102℃ mp89℃ d1.018 Fp18℃

14921-1A	TFS（14921-0010）		1L	￥20,500
14921-2A	TFS（14921-0500）		50mL	￥3,200
14921-3A	TFS（14921-2500）		250mL	￥6,000

塩化カドミウム・2.5水和物
Cadmium chloride 2.5-hydrate

危険

$CdCl_2 \cdot 2.5H_2O$...228.35 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2［PRTR］特1-75
CAS RN®［7790-78-5］

07013-00	>98.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥11,000
07013-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,200

塩化カドミウム(無水)
Cadmium chloride, anhydrous

危険

$CdCl_2$...183.31 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2［PRTR］特1-75
CAS RN®［10108-64-2］ mp568℃†

07014-00	98.0%～100.5%(T)	鹿特級	P	500g	￥13,500

塩化カドミウム(無水)
Cadmium chloride, anhydrous

危険

$CdCl_2$...183.31 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2［PRTR］特1-75
CAS RN®［10108-64-2］bp960℃ mp568℃

21914-2A	TFS（21914-1000）			100g	￥11,900
21914-3A	TFS（21914-5000）			500g	￥47,300

塩化カルシウム
Calcium chloride

危険

$CaCl_2$...110.98
CAS RN®［10043-52-4］

07057-00	>95.0%(T)	特級	P	500g	￥2,900
07057-80	>95.0%(T)	特級	M	10kg	☆
07057-01	>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,700
07057-81	>95.0%(T)	鹿1級	M	10kg	☆

塩化カルシウム(粒状)
Calcium chloride

危険

$CaCl_2 \cdot 0\text{-}2H_2O$
CAS RN® [10035-04-8]

58001-17		70.0%～78.0%(T)	食品添加物	P	500g	￥2,000
58001-41		70.0%～78.0%(T)	食品添加物	C	20kg	☆

塩化カルシウム二水和物
Calcium chloride dihydrate

危険

$CaCl_2 \cdot 2H_2O$...147.01
CAS RN® [10035-04-8]

07058-00		99.0%～103.0%(T)	特級	P	500g	￥2,100
07058-80		99.0%～103.0%(T)	特級	M	15kg	☆
07058-01		71.0%～77.5%(as anhydrous)(T)	鹿1級	P	500g	￥1,900
07058-81		71.0%～77.5%(as anhydrous)(T)	鹿1級	M	15kg	☆
07058-23		99.0%～103.0%	分子生物学用	P	100g	￥1,700
2382-1M	M（1.02382.0250）	99.0%～102.0%(T)	EMSURE®		250g	￥2,760

塩化カルシウム四水和物
Calcium chloride tetrahydrate

$CaCl_2 \cdot 4H_2O$...183.04
CAS RN® [25094-02-4]

2384-2M	M（1.02384.0100）	>99.995%(Im.S.)	Suprapur®		100g	￥38,800

塩化カルシウム(乾燥用)
Calcium chloride, for drying

危険

$CaCl_2$...110.98
CAS RN® [10043-52-4]

abt 2mm～3mm

07053-08		>85.0%(T)	乾燥用	P	500g	￥1,900
07053-84		>85.0%(T)	乾燥用	M	10kg	☆

塩化カルシウム(水分測定用)
Calcium chloride, for U-tube

危険

$CaCl_2$...110.98
CAS RN®［10043-52-4］

abt 2.0mm～3.0mm

07055-08	>90.0%(T)	水分測定用	P	500g	￥3,000
07055-84	>90.0%(T)	水分測定用	M	10kg	☆

塩化カルシウム, 粉末, 無水
Calcium chloride, powder, anhydrous

危険

$CaCl_2$...110.98
CAS RN®［10043-52-4］bp1600℃ mp782℃

34961-1A	TFS（34961-0025）	2.5kg	￥22,000
34961-2A	TFS（34961-0250）	25g	￥2,500
34961-3A	TFS（34961-5000）	500g	￥5,500

塩化カルシウム二水和物
Calcium chloride dihydrate

危険

$CaCl_2 \cdot 2H_2O$...147.01
CAS RN®［10035-04-8］ mp175℃ d0.83

42352-1A	TFS（42352-0250）	25g	￥4,300
42352-2A	TFS（42352-5000）	500g	￥8,000

塩化カルシウム溶液(BOD測定用C液)
Calcium chloride solution (Solution C)

警告

CAS RN®［10043-52-4］

08209-08		BOD測定用	P	500mL	￥2,900

塩化カプリリル → 塩化 *n*-オクタノイル

塩化 *N*-(カルボキシメチル)-*N*, *N*, *N*-トリメチル-d_3-アンモニウム(*N*-メチル-d_3)
N-(Carboxymethyl)-*N*,*N*,*N*-trimethyl-d_3-ammonium chloride (*N*-methyl-d_3)

$C_5H_9ClD_3NO_2$...156.62
CAS RN® [1219349-47-9]

49137-35	CDN（D-6303）	99 atom% D		10mg	￥30,800

塩化 *N*-(カルボキシメチル)-*N*, *N*, *N*-トリメチル-d_9-アンモニウム
N-(Carboxymethyl)-*N*,*N*,*N*-trimethyl-d_9-ammonium chloride

$HOOCCH_2N(CD_3)_3Cl$...162.66
CAS RN® [285979-85-3]

49123-40	CDN（D-3352）	99 atom% D		100mg	￥37,400

塩化セリウム(III)七水和物(塩化第一セリウム七水和物)
Cerium(III) chloride heptahydrate

$CeCl_3 \cdot 7H_2O$...372.57
CAS RN® [18618-55-8]

07176-32	>99.0%(T)		G	25g	￥2,700

塩化セリウム(III)七水和物,3N(塩化第一セリウム七水和物,3N)
Cerium(III) chloride heptahydrate, 3N

$CeCl_3 \cdot {}_7H_2O$...372.57
CAS RN® [18618-55-8]

07176-33	>99.9%(Im.S.)	高純度試薬	P	25g	￥6,000

塩化セシウム
Cesium chloride

CsCl...168.35
CAS RN® [7647-17-8] mp646℃▲

07185-32		>98.0%(T)		G	25g	￥3,600
07185-08		>99.8%(T)	平衡密度勾配遠心用	G	500g	￥49,500
07185-23		>99.8%(T)	平衡密度勾配遠心用	G	100g	￥17,000
08121-33		>99.8%(T)	平衡密度勾配遠心用	G	25g	￥5,500
2038-1M	M（1.02038.0025）	>99.5%(T)	GR		25g	￥13,500

塩化セシウム
Cesium chloride

ClCs...168.35
CAS RN® [7647-17-8] bp1290℃ mp646℃

19281-1A	TFS（19281-0100）				10g	￥8,100
19281-2A	TFS（19281-0500）				50g	￥30,000

塩化セシウム,4N
Cesium chloride, 4N

CsCl...168.35 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7647-17-8]

07185-13		>99.99%(Im.S.)	高純度試薬	G	250g	￥45,000
07185-33		>99.99%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥9,000

塩化 *N*-セチルピリジニウム一水和物 → 塩化1- *n*-ヘキサデシルピリジニウム一水和物

塩化セチルトリメチルアンモニウム → 塩化 *n*-ヘキサデシルトリメチルアンモニウム

塩素酸イオン標準液
Chlorate ion standard solution

［劇］III
CAS RN®［7775-09-9］

$NaClO_3$水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

08169-96		ClO_3^-:1000mg/L	JCSS化学分析用(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用)	100mL	￥7,500

塩酸クロルジメホルム標準品
Chlordimeform HCl standard

危険

$C_{10}H_{13}ClN_2$･HCl...233.13 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［19750-95-9］

49827-20	DES（C11240100）		残留農薬試験用	100mg	￥9,000

塩化物イオン標準液
Chloride ion standard solution

CAS RN®［7647-14-5］

NaCl水溶液.「計量法トレーサビリティ制度適合品」

08126-23		Cl^-:1000mg/L	JCSS化学分析用(ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用)	100mL	￥5,500

塩素化パラフィンC10 44.82% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10 44.82% Cl 標準液

塩素化パラフィンC10 50.18% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10 50.18% Cl 標準液

塩素化パラフィンC10 55.00% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10 55.00% Cl 標準液

塩素化パラフィンC10 60.09% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10 60.09% Cl 標準液

塩素化パラフィンC10 65.02% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10 65.02% Cl 標準液

塩素化パラフィンC11 45.50% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C11 45.50% Cl 標準液

塩素化パラフィンC11 50.21% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C11 50.21% Cl 標準液

塩素化パラフィンC11 55.20% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C11 55.20% Cl 標準液

塩素化パラフィンC11 60.53% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C11 60.53% Cl 標準液

塩素化パラフィンC11 65.25% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C11 65.25% Cl 標準液

塩素化パラフィンC12 45.32% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C12 45.32% Cl 標準液

塩素化パラフィンC12 50.18% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C12 50.18% Cl 標準液

塩素化パラフィンC12 55.00% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C12 55.00% Cl 標準液

塩素化パラフィンC12 65.08% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C12 65.08% Cl 標準液

塩素化パラフィンC12 69.98% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C12 69.98% Cl 標準液

塩素化パラフィンC13 44.90% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C13 44.90% Cl 標準液

塩素化パラフィンC13 50.23% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C13 50.23% Cl 標準液

塩素化パラフィンC13 55.03% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C13 55.03% Cl 標準液

塩素化パラフィンC13 59.98% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C13 59.98% Cl 標準液

塩素化パラフィンC13 65.18% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C13 65.18% Cl 標準液

塩素化パラフィン C22 72.1% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C22 72.1% Cl 標準液

塩素化パラフィン C10-C13 51.5% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10-C13 51.5% Cl 標準液

塩素化パラフィン C10-C13 55.5% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10-C13 55.5% Cl 標準液

塩素化パラフィン C10-C13 55.5% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10-C13 55.5% Cl 標準液

塩素化パラフィン C10-C13 63% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10-C13 63% Cl 標準液

塩素化パラフィン C10-C13 63% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C10-C13 63% Cl 標準液

塩素化パラフィン C10 Mix 1 → 塩化パラフィン C10 Mix 1

塩素化パラフィン C10 Mix 2 → 塩化パラフィン C10 Mix 2

塩素化パラフィン C10-C12 Mix 5 → 塩化パラフィン C10-C12 Mix 5

塩素化パラフィン C10-C13 Mix 1 → 塩化パラフィン C10-C13 Mix 1

塩素化パラフィン C10-C13 Mix 2 → 塩化パラフィン C10-C13 Mix 2

塩素化パラフィン C10-C13 Mix 3 → 塩化パラフィン C10-C13 Mix 3

塩素化パラフィン C10-C13 Mix 4 → 塩化パラフィン C10-C13 Mix 4

塩素化パラフィン C10-C13 Mix 6 → 塩化パラフィン C10-C13 Mix 6

塩素化パラフィン C10-C13 Mix 6 → 塩化パラフィン C10-C13 Mix 6

塩素化パラフィン C10-C13 Mix 7 → 塩化パラフィン C10-C13 Mix 7

塩素化パラフィン C10-C13 Mix 7 → 塩化パラフィン C10-C13 Mix 7

塩素化パラフィン C14-C17 42% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C14-C17 42% Cl 標準液

塩素化パラフィン C14-C17 52% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C14-C17 52% Cl 標準液

塩素化パラフィン C14-C17 52% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C14-C17 52% Cl 標準液

塩素化パラフィン C14-C17 57% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C14-C17 57% Cl 標準液

塩素化パラフィン C14-C17 57% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C14-C17 57% Cl 標準液

塩素化パラフィン C14-C17 57% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C14-C17 57% Cl 標準液

塩素化パラフィン C18-C20 36% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C18-C20 36% Cl 標準液

塩素化パラフィン C18-C20 49% Cl 標準液 → 塩化パラフィン C18-C20 49% Cl 標準液

塩素水(有効塩素:0.3%以上)
Chlorine water

警告

保存 15℃以下
CAS RN® [7782-50-5]

07220-01	>0.3%(as available chlorine)(T)	鹿1級	G	500mL	￥1,700

塩化クロロアセチル
Chloroacetyl chloride

危険

$ClCH_2COCl$...112.94 [劇] III [労] 57,57-2
CAS RN® [79-04-9] bp106℃† mp-22℃† d(20/4℃) 1.4202†

07234-01	>96.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥5,900
07234-31	>96.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,900

塩化4-クロロベンゼンアセチル
4-Chlorobenzeneacetyl chloride

$ClC_6H_4CH_2COCl$...189.03
CAS RN® [25026-34-0] d1.292▲

12345-1A	TFS（12345-0250）	25g	￥11,300
12345-2A	TFS（12345-0050）	5g	￥3,400
12345-3A	TFS（12345-1000）	100g	￥34,500

塩化2-クロロベンゼンスルホニル
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride

$C_6H_4Cl_2O_2S$...211.06 [危] 4-3-III
CAS RN® [2905-23-9] bp150℃～152℃(12mm)▲

35746-1A	TFS（35746-0010）	1g	￥3,500
35746-2A	TFS（35746-0050）	5g	￥9,600

塩化4-クロロベンゼンスルホニル
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride

危険

$ClC_6H_4SO_2Cl$...211.06
CAS RN® [98-60-2] bp141℃(15mm)▲ mp50℃～52℃▲

15856-1A	TFS（15856-0250）	25g	￥3,500
15856-2A	TFS（15856-0050）	5g	￥2,300
15856-3A	TFS（15856-1000）	100g	￥5,500
15856-4A	TFS（15856-5000）	500g	￥26,100

4-クロロベンジル-2,3,5,6-d_4 クロリド
4-Chlorobenzyl-2,3,5,6-d_4 chloride

$C_7H_2D_4Cl_2$...165.05 ［変］
CAS RN® [1219802-84-2]

49137-48	CDN（D-6016）	98 atom% D		250mg	￥74,800

塩化 *o*-クロロベンジル → α, *o*-ジクロロトルエン

塩化4-クロロブチリル
4-Chlorobutyryl chloride

危険

$ClCH_2CH_2CH_2COCl$...140.99 ［危］4-3-III
CAS RN® [4635-59-0] bp173℃～174℃ † d(20/20℃) 1.26▲

07984-31	>97.0%(T)	鹿1級	G	25mL	￥2,300

塩化4-クロロブチリル
4-Chlorobutyryl chloride

$ClCH_2CH_2CH_2COCl$...140.99 ［危］4-3-III
CAS RN® [4635-59-0] bp173℃～174℃ mp47℃ d1.25 Fp85℃

10890-2A	TFS（10890-0010）	1L	￥19,900

塩化クロロコリン
Chlorocholine chloride

警告

$[(CH_3)_3NCH_2CH_2Cl]Cl$...158.06 ［劇］III
CAS RN® ［999-81-5］ mp245℃(dec.)†

07739-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥5,400

塩化(2-クロロエチル)トリメチルアンモニウム → 塩化クロロコリン

塩化(2-クロロエチル)トリメチルアンモニウム
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride

$[(CH_3)_3NCH_2CH_2Cl]Cl$...158.06 ［劇］III
CAS RN® ［999-81-5］ mp239℃～243℃

21542-1A	TFS（21542-0250）	25g	￥5,800
21542-2A	TFS（21542-1000）	100g	￥17,100

塩化パラフィン C10 44.82% Cl 標準液
Chloroparaffin C10 44.82% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-84	DES（LA11457510CY）	環境分析用	1mL	￥50,000

塩化パラフィン C10 50.18% Cl 標準液
Chloroparaffin C10 50.18% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-85	DES（LA11457512CY）	環境分析用	1mL	￥50,000

塩化パラフィン C10 55.00% Cl 標準液
Chloroparaffin C10 55.00% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-86	DES（LA11457514CY）	環境分析用	1mL	￥50,000

塩化パラフィン C10 60.09% Cl 標準液
Chloroparaffin C10 60.09% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-87	DES（LA11457516CY）	環境分析用	1mL	￥50,000

塩化パラフィン C10 65.02% Cl 標準液
Chloroparaffin C10 65.02% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-88	DES（LA11457518CY）	環境分析用	1mL	￥50,000

塩化パラフィン C11 45.50% Cl 標準液
Chloroparaffin C10 65.02% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-89	DES（LA11457520CY）	環境分析用	1mL	￥50,000

塩化パラフィン C11 50.21% Cl 標準液
Chloroparaffin C11 50.21% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-90 DES（LA11457522CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C11 55.20% Cl 標準液
Chloroparaffin C11 55.20% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-91 DES（LA11457524CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C11 60.53% Cl 標準液
Chloroparaffin C11 60.53% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-92 DES（LA11457526CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C11 65.25% Cl 標準液
Chloroparaffin C11 65.25% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-93 DES（LA11457528CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C12 45.32% Cl 標準液
Chloroparaffin C12 45.32% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-94 DES（LA11457530CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C12 50.18% Cl 標準液
Chloroparaffin C12 50.18% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-95 DES（LA11457532CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C12 55.00% Cl 標準液
Chloroparaffin C12 55.00% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-96 DES（LA11457534CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C12 65.08% Cl 標準液
Chloroparaffin C12 65.08% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49865-97 DES（LA11457536CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C12 69.98% Cl 標準液
Chloroparaffin C12 69.98% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-00 DES（LA11457538CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C13 44.90% Cl 標準液
Chloroparaffin C13 44.90% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-01 DES（LA11457540CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C13 50.23% Cl 標準液
Chloroparaffin C13 50.23% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-02 DES（LA11457542CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C13 55.03% Cl 標準液
Chloroparaffin C13 55.03% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-03 DES（LA11457544CY） 環境分析用 1mL ￥50,000

塩化パラフィン C13 59.98% Cl 標準液
Chloroparaffin C13 59.98% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-04	DES（LA11457546CY）	環境分析用	1mL	￥50,000

塩化パラフィン C13 65.18% Cl 標準液
Chloroparaffin C13 65.18% Cl standard solution

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85422-92-0］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。10μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-05	DES（LA11457548CY）	環境分析用	1mL	￥50,000

塩化パラフィン C22 72.1% Cl 標準液
Chloroparaffin C22 72.1% Cl standard solution

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

100μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-25	DES（X23227200CY）	環境分析用	10mL	￥30,000

塩化パラフィン C10-C13 51.5% Cl 標準液
Chloroparaffin C10-C13 51.5% Cl standard solution

危険

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。100μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-06	DES（X23105100CY）	環境分析用	10mL	￥23,000

塩化パラフィン C10-C13 55.5% Cl 標準液
Chloroparaffin C10-C13 55.5% Cl standard solution

危険

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。100 μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-07	DES（X23105500CY）	環境分析用	10mL	￥23,000

塩化パラフィン C10-C13 55.5% Cl 標準液
Chloroparaffin C10-C13 55.5% Cl standard solution

危険

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。1000 μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-28	DES（YS23105500CY）	環境分析用	10mL×2	☆

塩化パラフィン C10-C13 63% Cl 標準液
Chloroparaffin C10-C13 63% Cl standard solution

危険

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。1000 μg/mL シクロヘキサン溶液

49863-76	DES（Y23106300CY）	環境分析用	10mL	☆
49866-08	DES（YS23106300CY）	環境分析用	10mL×2	☆

塩化パラフィン C10-C13 63% Cl 標準液
Chloroparaffin C10-C13 63% Cl standard solution

危険

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。100 μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-19	DES（X23106300CY）	環境分析用	10mL	￥23,000

塩化パラフィン C10 Mix 1
Chloroparaffin C10 Mix 1

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。各10μg/mL シクロヘキサン溶液.1,2,5,6,9,10-ヘキサクロロデカン(CP-4),1,2,5,6,9,10-ヘキサクロロデカン(CP-5),1,2,5,6,9-ペンタクロロデカン(CP-3),1,2,9,10-テトラクロロデカン(CP-2),2,5,6,9-テトラクロロデカン(CP-1).

49866-14	DES（LA22102000CY）	環境分析用	1mL	☆

塩化パラフィン C10 Mix 2
Chloroparaffin C10 Mix 2

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。シクロヘキサン溶液.1,2,3,4,5,6,7,8,9-ノナクロロデカン(CP-10) 0.9μg/mL,1,2,4,5,6,9,10-ヘプタクロロデカン(CP-7) 2.5μg/mL,1,2,4,5,9,10-ヘキサクロロデカン(CP-6) 3.7μg/mL,1,2,5,6,9-ペンタクロロデカン(CP-3) 19.0μg/mL,2,3,4,5,6,7,8,9-オクタクロロデカン(CP-9) 0.5μg/mL.

49866-13	DES（LA22102200CY）	環境分析用	1mL	☆

塩化パラフィン C10-C12 Mix 5
Chloroparaffin C10-C12 Mix 5

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。ヘプタン溶液.塩化パラフィン C10 50.18% Cl,塩化パラフィン C10 55.00% Cl,塩化パラフィン C11 45.50% Cl,塩化パラフィン C11 50.21% Cl 各1.0μg/mL,塩化パラフィン C12 45.32% Cl,塩化パラフィン C12 50.18% Cl,塩化パラフィン C12 55.00% Cl 各2.0μg/mL.

49866-17	DES（ZS22102105HP）	環境分析用	1mL×3	☆
49866-18	DES（ZA22102105HP）	環境分析用	1mL	☆

塩化パラフィン C10-C13 Mix 1
Chloroparaffin C10-C13 Mix 1

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。シクロヘキサン溶液.塩化パラフィン C10 44.82% Cl,塩化パラフィン C10 50.18% Cl 各0.5μg/mL,塩化パラフィン C10-C13 -,塩化パラフィン C11 45.50% Cl 1.2μg/mL,塩化パラフィン C11 50.21% Cl 2.6μg/mL,塩化パラフィン C12 45.32% Cl 1.0μg/mL,塩化パラフィン C12 50.18% Cl 2.4μg/mL,塩化パラフィン C13 50.23% Cl 1.8μg/mL.

49866-10	DES（LA22102101CY）	環境分析用	1mL	☆

塩化パラフィン C10-C13 Mix 2
Chloroparaffin C10-C13 Mix 2

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。シクロヘキサン溶液.塩化パラフィン C10-C13 -,塩化パラフィン C10 55.00% Cl,塩化パラフィン C11 50.21% Cl,塩化パラフィン C11 55.20% Cl, 塩化パラフィン C11 60.53% Cl,塩化パラフィン C12 50.18% Cl,塩化パラフィン C12 55.00% Cl,塩化パラフィン C12 65.08% Cl,塩化パラフィン C13 55.03% Cl,塩化パラフィン C13 59.98% Cl 各10μg/mL.

49866-11	DES（LA22102102CY）	環境分析用	1mL	☆

塩化パラフィン C10-C13 Mix 3
Chloroparaffin C10-C13 Mix 3

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。シクロヘキサン溶液.塩化パラフィン C10 65.02% Cl 2.0μg/mL,塩化パラフィン C10-C13 -,塩化パラフィン C11 65.25% Cl 3.2μg/mL,塩化パラフィン C12 69.98% Cl 3.1μg/mL,塩化パラフィン C13 65.18% Cl 1.7μg/mL.

49866-09	DES（LA22102103CY）	環境分析用	1mL	☆

塩化パラフィン C10-C13 Mix 4
Chloroparaffin C10-C13 Mix 4

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。シクロヘキサン溶液.塩化パラフィン C10 50.18% Cl 0.5μg/mL,塩化パラフィン C10 55.00% Cl 0.5μg/mL,塩化パラフィン C10-C13 -,塩化パラフィン C11 50.21% Cl 0.5μg/mL,塩化パラフィン C11 55.20% Cl 2.0μg/mL,塩化パラフィン C11 60.53% Cl 1.9μg/mL,塩化パラフィン C12 50.18% Cl 0.5μg/mL,塩化パラフィン C12 55.00% Cl 2.5μg/mL,塩化パラフィン C12 65.08% Cl 0.2μg/mL,塩化パラフィン C13 55.03% Cl 1.0μg/mL,塩化パラフィン C13 59.98% Cl 0.4μg/mL.

49866-12	DES（LA22102104CY）	環境分析用	1mL	☆

塩化パラフィン C10-C13 Mix 6
Chloroparaffin C10-C13 Mix 6

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。ヘプタン溶液.塩化パラフィン C10 60.09% Cl 0.5μg/mL,塩化パラフィン C10 65.02% Cl 1.0μg/mL,塩化パラフィン C10-C13 -,塩化パラフィン C11 55.20% Cl 0.6μg/mL, 塩化パラフィン C11 60.53% Cl 1.0μg/mL,塩化パラフィン C11 65.25% Cl 3.0μg/mL,塩化パラフィン C12 50.18% Cl 0.8μg/mL,塩化パラフィン C12 55.00% Cl 2.0μg/mL,塩化パラフィン C12 65.08% Cl 0.9μg/mL,塩化パラフィン C13 59.98% Cl 0.1μg/mL.

49866-16	DES（ZS22102106HP）	環境分析用	1mL×3	☆

塩化パラフィン C10-C13 Mix 6
Chloroparaffin C10-C13 Mix 6

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。ヘプタン溶液.塩化パラフィン C10 60.09% Cl 0.5μg/mL,塩化パラフィン C10 65.02% Cl 1.1μg/mL,塩化パラフィン C11 55.20% Cl 0.6μg/mL,塩化パラフィン C11 60.53% Cl 1.0μg/mL,塩化パラフィン C11 65.25% Cl 3.0μg/mL,塩化パラフィン C12 50.18% Cl 0.8μg/mL, 塩化パラフィン C12 55.00% Cl 2.0μg/mL,塩化パラフィン C12 65.08% Cl 0.9μg/mL,塩化パラフィン C13 59.98% Cl 0.1μg/mL.

49866-33	DES（ZA22102106HP）	環境分析用	1mL	☆

塩化パラフィン C10-C13 Mix 7
Chloroparaffin C10-C13 Mix 7

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。ヘプタン溶液.塩化パラフィン C10 65.02% Cl 0.28μg/mL,塩化パラフィン C10-C13 -,塩化パラフィン C11 60.53% Cl 0.5μg/mL,塩化パラフィン C11 65.25% Cl 0.66μg/mL,塩化パラフィン C12 65.08% Cl 1.0μg/mL,塩化パラフィン C12 69.98% Cl 0.83μg/mL,塩化パラフィン C13 59.98% Cl 0.73μg/mL,塩化パラフィン C13 65.18% Cl 6.0μg/mL.

49866-15	DES（ZS22102107HP）	環境分析用	1mL×3	☆

塩化パラフィン C10-C13 Mix 7
Chloroparaffin C10-C13 Mix 7

［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-84-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。ヘプタン溶液.塩化パラフィン C10 65.02% Cl 0.28μg/mL,塩化パラフィン C11 60.53% Cl 0.5μg/mL,塩化パラフィン C11 65.25% Cl 0.66μg/mL,塩化パラフィン C12 65.08% Cl 1.0μg/mL,塩化パラフィン C12 69.98% Cl 0.83μg/mL,塩化パラフィン C13 59.98% Cl 0.73μg/mL,塩化パラフィン C13 65.18% Cl 6.0μg/mL.

49866-32	DES（ZA22102107HP）	環境分析用	1mL	☆

塩化パラフィン C14-C17 42% Cl 標準液
Chloroparaffin C14-C17 42% Cl standard solution

危険

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-85-9］

100μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-21	DES（X23144200CY）	環境分析用	10mL	￥23,000

塩化パラフィン C14-C17 52% Cl 標準液
Chloroparaffin C14-C17 52% Cl standard solution

危険

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-85-9］

100μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-22	DES（X23145200CY）	環境分析用	10mL	￥23,000

塩化パラフィン C14-C17 52% Cl 標準液
Chloroparaffin C14-C17 52% Cl standard solution

危険

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-85-9］

1000μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-26	DES（Y23145200CY）	環境分析用	10mL	￥125,000

塩化パラフィン C14-C17 57% Cl 標準液
Chloroparaffin C14-C17 57% Cl standard solution

危険

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-85-9］

100μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-23	DES（X23145700CY）	環境分析用	10mL	￥23,000

塩化パラフィン C14-C17 57% Cl 標準液
Chloroparaffin C14-C17 57% Cl standard solution

危険

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-85-9］

1000μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-27	DES（Y23145700CY）	環境分析用	10mL	☆

塩化パラフィン C14-C17 57% Cl 標準液
Chloroparaffin C14-C17 57% Cl standard solution

危険

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［85535-85-9］

1000μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-31	DES（YS23145700CY）	環境分析用	10mL×2	☆

塩化パラフィン C18-C20 36% Cl 標準液
Chloroparaffin C18-C20 36% Cl standard solution

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

100μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-20	DES（X23183600CY）	環境分析用	10mL	￥24,000

塩化パラフィン C18-C20 49% Cl 標準液
Chloroparaffin C18-C20 49% Cl standard solution

［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃

100μg/mL シクロヘキサン溶液

49866-24	DES（X23184900CY）	環境分析用	10mL	￥24,000

塩化白金酸六水和物 → ヘキサクロロ白金(IV)酸六水和物

塩化3-(クロロスルホニル)ベンゾイル
3-(Chlorosulfonyl)benzoyl chloride

$COClC_6H_4SO_2Cl$...239.07
CAS RN®［4052-92-0］ mp18℃～20℃▲

40507-1A	TFS（40507-0250）		25g	￥53,600

塩化3-クロロ-5-(トリフルオロメチル)フェニルスルホニル
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylsulfonyl chloride

$C_7H_3Cl_2F_3O_2S$...279.06 ［危］4-3-III
CAS RN®［875167-01-4］

07198-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥27,000
07198-62	>95.0%(GC)	G	1g	￥11,000

塩化コリン
Choline chloride

警告

$[(CH_3)_3NCH_2CH_2OH]Cl$...139.62
CAS RN®［67-48-1］ mp302℃～305℃(dec.)†

07823-00	98.0%～101.0%(T) 鹿特級	G	500g	￥10,500
07823-30	98.0%～101.0%(T) 鹿特級	G	25g	￥2,200

塩化コリン
Choline chloride

$[(CH_3)_3NCH_2CH_2OH]Cl$...139.62
CAS RN® [67-48-1] mp298℃～304℃

11029-1A	TFS（11029-0010）	1kg	￥15,600
11029-2A	TFS（11029-0050）	5kg	￥70,100
11029-3A	TFS（11029-0500）	50g	￥4,200
11029-4A	TFS（11029-5000）	500g	￥11,100

塩化コリン-1,1,2,2-d_4
Choline-1,1,2,2-d_4 chloride

$HOCD_2CD_2N(CH_3)_3Cl$...143.64
CAS RN® [285979-70-6]

49124-02	CDN（D-2464）	99 atom% D	250mg	￥44,000

塩化コリン-d_{13}
Choline-d_{13} chloride

$HOCD_2CD_2N(CD_3)_3Cl$...152.70
CAS RN® [352438-97-2]

49124-04	CDN（D-5185）	99 atom% D	100mg	￥70,400

塩化コリン-d_9（*N*,*N*,*N*-トリメチル-d_9）
Choline-d_9 chloride (*N*,*N*,*N*-trimethyl-d_9)

$HOCH_2CH_2N(CD_3)_3Cl$...148.67
CAS RN® [61037-86-3]

49124-03	CDN（D-2142）	99 atom% D	1g	￥33,000

塩化クロム(III)(無水)
Chromium(III) chloride anhydrous

Cl_3Cr...158.35 [労] 57,57-2 [PRTR] 1-87
CAS RN® [10025-73-7] mp1152℃▲ d2.7600▲

sublimed

19047-1A	TFS（19047-0250）	25g	￥10,400

塩化クロム(III)六水和物
Chromium(III) chloride hexahydrate

危険

$CrCl_3 \cdot 6H_2O$...266.44 ［労］57,57-2［PRTR］1-87
CAS RN®［10060-12-5］

07342-00	>93.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥9,500
07342-20	>93.0%(T)	鹿特級	G	100g	￥3,500
07342-01	>93.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥8,500

塩化クロム(III)溶液
Chromium(III) chloride solution

危険

［労］57,57-2［PRTR］1-87
CAS RN®［10025-73-7］

07585-02	8.0%～12.0%(as Cr)(T)24.3%～36.6%(as $CrCl_3$)(T)	G	500mL	￥7,500

塩化シンナモイル
Cinnamoyl chloride

危険

$C_6H_5CH{:}CHCOCl$...166.60
CAS RN®［102-92-1］bp256℃～258℃† mp35℃～36℃†

07378-32		>90.0%(T)	G	25g	￥2,800
11039-1A	TFS（11039-5000）			500g	￥23,600
11039-2A	TFS（11039-0050）			5g	￥3,300
11039-3A	TFS（11039-1000）			100g	￥5,500

塩化シンナミル
Cinnamyl chloride

$C_6H_5CH{:}CHCH_2Cl$...152.61 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2687-12-9］bp120℃～126℃(15mm)▲ mp7℃▲ d1.08▲

18185-1A	TFS（18185-0050）		5g	￥4,300
18185-2A	TFS（18185-1000）		100g	￥16,400
18185-3A	TFS（18185-5000）		500g	￥54,500

塩化コバルト(II)六水和物
Cobalt(II) chloride hexahydrate

危険

$CoCl_2 \cdot 6H_2O$...237.92 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-132
CAS RN® ［7791-13-1］ mp87℃†

07398-00	99.0%～102.0%(T)	特級	P	500g	￥13,000
07398-20	99.0%～102.0%(T)	特級	G	100g	￥4,300
07398-30	99.0%～102.0%(T)	特級	G	25g	￥1,800
07398-01	>97.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥11,500

塩化コバルト(II)六水和物,3N5
Cobalt(II) chloride hexahydrate, 3N5

危険

$CoCl_2 \cdot 6H_2O$...237.92 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-132
CAS RN® ［7791-13-1］ mp87℃†

07398-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥3,300

塩化コバルト(II)(無水)
Cobalt(II) chloride, anhydrous

危険

$CoCl_2$...129.83 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-132
CAS RN® ［7646-79-9］ mp724℃†

07399-01	>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥15,500
07399-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,800

塩化コバルト(II)の色の比較原液
Cobalt(II) chloride colorimetric stock solution

危険

［労］特-2,特-3,57,57-2［PRTR］1-132

59.5g/L～60.5g/L CoCl2・6H2O(in HCl)

08191-23		医薬品試験用	G	100mL	￥5,500

塩化コバルト(II)の色の比較原液(E)
Cobalt(II) chloride colorimetric stock solution (E)

危険

［労］特-2,特-3,57,57-2［PRTR］1-132

59.5g/L～60.5g/L $CoCl_2$・$6H_2O$(in HCl)

08066-23		医薬品試験用	G	100mL	￥5,500

塩化コバルト(II)六水和物
Cobalt(II) chloride hexahydrate

危険

$CoCl_2$・$6H_2O$...237.92 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-132
CAS RN®［7791-13-1］ mp86℃

42357-1A	TFS（42357-0050）			5g	￥4,600
42357-2A	TFS（42357-1000）			100g	￥8,800
42357-3A	TFS（42357-5000）			500g	￥22,400

塩化銅(II)アンモニウム二水和物(塩化第二銅アンモニウム二水和物) → 塩化二アンモニウム銅(II)二水和物

塩化銅(I)
Copper(I) chloride

警告

CuCl...98.99 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN®［7758-89-6］ mp430℃▲

07524-00	>95.0%(T)	特級	P	500g	￥9,500
07524-20	>95.0%(T)	特級	G	100g	￥4,100
07524-30	>95.0%(T)	特級	G	25g	￥2,400

塩化銅(I)
Copper(I) chloride

警告

CuCl...98.99 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN®［7758-89-6］ bp1490℃ mp430℃ d4.14

21242-1A	TFS（21242-0100）			10g	￥10,500
21242-2A	TFS（21242-1000）			100g	￥63,600

塩化銅(II)(無水)(塩化第二銅)
Copper(II) chloride, anhydrous

危険

$CuCl_2$...134.44 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-272
CAS RN® ［7447-39-4］ mp498℃ †

07824-01	>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥6,700

塩化銅(II)(無水)(塩化第二銅)
Copper(II) chloride, anhydrous

$CuCl_2$...134.44 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-272
CAS RN® ［7447-39-4］ bp993℃ mp498℃

20653-1A	TFS（20653-0010）			1kg	￥21,500
20653-2A	TFS（20653-0025）			2.5kg	￥44,600
20653-3A	TFS（20653-2500）			250g	￥7,700

塩化銅(II)二水和物(塩化第二銅二水和物)
Copper(II) chloride dihydrate

危険

$CuCl_2 \cdot 2H_2O$...170.48 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-272
CAS RN® ［10125-13-0］

07489-00	>99.0%(T)	特級	P	500g	￥4,300
07489-20	>99.0%(T)	特級	G	100g	￥3,200
07489-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,600
07489-01	>97.5%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,900
07489-81	>97.5%(T)	鹿1級	B	20kg	☆

塩化銅(II)二水和物,3N(塩化第二銅二水和物)
Copper(II) chloride dihydrate, 3N

危険

$CuCl_2 \cdot 2H_2O$...170.48 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-272
CAS RN® ［10125-13-0］

07489-08	>99.9%(Im.S.)	高純度試薬	P	500g	￥7,500

塩化二アンモニウム銅(II)二水和物
Copper(II) diammonium chloride dihydrate

$Cu(NH_4)_2Cl_4 \cdot 2H_2O$...277.46 ［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-272
CAS RN®［10060-13-6］

07475-00	>98.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥5,400
07475-20	>98.0%(T)	鹿特級	G	100g	￥3,700
07475-01	>97.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥4,800

塩化カリウム銅(II)二水和物 → テトラクロロジアクア銅(II)酸カリウム

塩化コプチシン
Coptisin chloride

$C_{19}H_{14}NO_4Cl$...355.76 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［6020-18-4］

49061-65	PHY（89524）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

塩化クロトノイル(塩化クロトニル)
Crotonoyl chloride

危険

$CH_3CH{:}CHCOCl$...104.53 ［危］4-2-III
CAS RN®［10487-71-5］ d(20/20℃) 1.09▲ Fp35℃†

07779-32	>70.0%(GC)	G	25g	￥3,000

塩化クロチル
Crotyl chloride

C_4H_7Cl...90.55 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［591-97-9］ bp80℃～85℃▲ d0.92▲

15480-1A	TFS（15480-1000）	tech.	100mL	￥13,000
15480-2A	TFS（15480-5000）	tech.	500mL	￥47,200

塩化2-シアノ-5-フルオロベンゼンスルホニル
2-Cyano-5-fluorobenzenesulfonyl chloride

$C_7H_3ClFNO_2S$...219.62 ［劇］III
CAS RN®［612541-15-8］

07162-97	>97.0%(HLC)	G	500mg	￥15,000

4-エチル安息香酸4-シアノフェニル
4-Cyanophenyl 4-ethylbenzoate

$C_{16}H_{13}NO_2$...251.27
CAS RN® [56131-48-7]

07016-02	>98.0%(GC)			500g	￥28,000
07016-32	>98.0%(GC)			25g	￥2,800

塩化シアヌール
Cyanuric chloride

危険

$C_3Cl_3N_3$...184.40 [PRTR] 1-283 [変]
CAS RN® [108-77-0] bp190℃† mp144℃～148℃†

07544-01	>98.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥9,500
07544-31	>98.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,200

塩化シアヌル
Cyanuric chloride

$C_3Cl_3N_3$...184.40 [PRTR] 1-283 [変] [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [108-77-0] bp190℃ mp145℃～148℃ d1.92

11089-1A	TFS（11089-0010）			1kg	￥6,700
11089-3A	TFS（11089-0051）			5kg	￥30,200
11089-4A	TFS（11089-2500）			250g	￥2,800

塩化 *n*-デカノイル
n-Decanoyl chloride

危険

$CH_3(CH_2)_8COCl$...190.70 [危] 4-3-III
CAS RN® [112-13-0] d0.930～0.935△

11188-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥5,200
16119-1A	TFS（16119-1000）			100g	￥6,000
16119-3A	TFS（16119-5000）			500g	￥18,100

塩化 *n*-デシル → 1-クロロデカン

塩化 *n*-デシル標準原液 → 1-クロロデカン標準原液

塩化1-デシル-3-メチルイミダゾリウム
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride

$C_{14}H_{27}ClN_2$...258.82
CAS RN® [171058-18-7] mp38℃▲ d0.98▲

49515-04	ILT（IL-0065-HP）	>98.0%		100g	￥62,000
49515-03	ILT（IL-0065-HP）	>98.0%		25g	￥29,000

塩化デルフィニジン
Delphinidin chloride

$C_{15}H_{11}O_7Cl$...338.69 [凍] -20℃以下
CAS RN® [528-53-0]

49062-19	PHY（89625）	天然物化学研究用		10mg	￥55,000

塩化ジクロロアセチル
Dichloroacetyl chloride

危険

$CHCl_2COCl$...147.38 [危] 4-2-III
CAS RN® [79-36-7] bp107℃～108℃† d(16/4℃) 1.532†

10115-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,400

塩化2,4-ジクロロベンジル → α,2,4-トリクロロトルエン

塩化2,4-ジクロロベンジル標準品 → α,2,4-トリクロロトルエン標準品

塩化ジデシルジメチルアンモニウム標準品
Didecyl dimethylammonium chloride standard

危険

$C_{22}H_{48}ClN$...362.07 [劇] III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7173-51-5]

49832-71	DES（C12588000）	食品分析用		100mg	￥22,000

塩化ジエチルアルミニウム, *n*-ヘキサン溶液,1.0mol/L
Diethylaluminium chloride, in *n*-hexane, 1.0mol/L

危険

$(C_2H_5)_2AlCl$...120.55 ［危］3-OT-2-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-392 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［96-10-6］

製造元:東ソー・ファインケム株式会社, air/moisture/heat sensitive

11258-05	abt 1mol/L(T)	Organics		500mL	￥15,500
11258-25	abt 1mol/L(T)	Organics		100mL	￥6,200

塩化ジエチルカルバミル
Diethylcarbamyl chloride

$(C_2H_5)_2NCOCl$...135.59 ［危］4-3-III
CAS RN® ［88-10-8］ bp121℃～123℃(133mm)▲ d1.07▲

11420-1A	TFS（11420-0050）			5mL	￥4,900

エトキシメチレンマロン酸ジエチル
Diethyl ethoxymethylenemalonate

警告

$C_2H_5OCH:C(CO_2C_2H_5)_2$...216.23 ［危］4-3-III
CAS RN® ［87-13-8］ bp279℃～281℃▲ d1.08▲

10146-02		>95.0%(GC)	G	500mL	￥11,000
10146-32		>95.0%(GC)	G	25mL	￥2,000
11434-2A	TFS（11434-1000）			100g	￥3,300
11434-3A	TFS（11434-5000）			500g	￥12,000

エチルマロン酸ジエチル
Diethyl ethylmalonate

$C_9H_{16}O_4$...188.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［133-13-1］

13811-02		>97.0%(GC)	G	500g	￥14,000
13811-32		>97.0%(GC)	G	25g	￥2,000
11436-1A	TFS（11436-1000）			100g	￥3,600
11436-2A	TFS（11436-5000）			500g	￥12,000

塩化4,4′-ジメトキシトリチル
4,4′-Dimethoxytrityl chloride

$C_{21}H_{19}ClO_2$...338.82
CAS RN®［40615-36-9］ mp121℃～125℃▲

14602-1A	TFS（14602-0050）	5g	￥4,600
14602-2A	TFS（14602-0250）	25g	￥12,500

塩化ジメチルアルミニウム,ヘプタン溶液,AcroSeal[R]
Dimethylaluminium chloride, 0.9mol/L solution in heptane, AcroSeal[R]

［危］3-OT-2-II［労］57,57-2
CAS RN®［1184-58-3］

abt 0.9mol/L

37779-1A	TFS（37779-1000）	100mL	￥14,100
37779-2A	TFS（37779-8000）	800mL	￥104,400

塩化3-ジメチルアミノ-2-メチルプロピル塩酸塩
3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride

$C_6H_{14}ClN \cdot HCl$...172.09
CAS RN®［4261-67-0］ mp169℃～173℃▲

16679-1A	TFS（16679-0250）	25g	￥2,400
16679-2A	TFS（16679-1000）	100g	￥5,700

塩化5-ジメチルアミノナフタレン-1-スルホニル → ダンシルクロリド

塩化3-ジメチルアミノプロピル塩酸塩
3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride

$C_5H_{12}ClN \cdot HCl$...158.06
CAS RN®［5407-04-5］ mp139℃～145℃▲

11591-1A	TFS（11591-1000）	100g	￥5,800
11591-2A	TFS（11591-5000）	500g	￥19,600

塩化ジメチルアンモニウム → ジメチルアミン塩酸塩

塩化1,2-ジメチルイミダゾリウム
1,2-Dimethylimidazolium chloride

$C_5H_9ClN_2$...132.59
CAS RN® [34531-53-8]

49519-51	ILT（IL-0277-SG-0100）	98%	100g	￥36,000
49519-50	ILT（IL-0277-SG-0025）	98%	25g	￥21,000

塩化ジメチルオクタデシル[3-(トリメトキシシリル)プロピル]アンモニウム,60%メタノール溶液
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride, 60% in methanol

$C_{26}H_{58}ClNO_3Si$...496.28 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® [27668-52-6] d0.89▲

33853-1A	TFS（33853-1000）	100mL	￥11,000

塩化ジメチルスルファモイル
Dimethylsulfamoyl chloride

$C_2H_6ClNO_2S$...143.59 ［危］4-3-III
CAS RN® [13360-57-1] d1.33▲

40859-2A	TFS（40859-0250）	25g	￥6,700
40859-3A	TFS（40859-1000）	100g	￥17,400
40859-4A	TFS（40859-5000）	500g	￥59,100

塩化ジメチルチオカルバモイル
Dimethylthiocarbamoyl chloride

$(CH_3)_2NC(:S)Cl$...123.60
CAS RN® [16420-13-6] mp42℃†

40861-1A	TFS（40861-0250）	25g	￥9,200
40861-2A	TFS（40861-1000）	100g	￥26,800

塩化3,5-ジニトロベンゾイル
3,5-Dinitrobenzoyl chloride

$C_7H_3ClN_2O_5$...230.56 ［危］5-NC-2-II
CAS RN® [99-33-2] mp67℃～70℃▲

40871-1A	TFS（40871-0250）	25g	￥5,300
40871-2A	TFS（40871-1000）	100g	￥15,900

塩化ジフェニルアセチル
Diphenylacetyl chloride

$C_{14}H_{11}ClO$...230.68
CAS RN®［1871-76-7］ mp51℃～56℃▲

29202-1A	TFS（29202-0050）		5g	￥4,500
29202-2A	TFS（29202-0250）		25g	￥17,400

塩化ジフェニルカルバミル
Diphenylcarbamyl chloride

$C_{13}H_{10}ClNO$...231.67
CAS RN®［83-01-2］ mp81℃～85℃▲

16714-1A	TFS（16714-0250）		25g	￥7,100
16714-2A	TFS（16714-1000）		100g	￥29,400

エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物 → エデト酸ナトリウム水和物

エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物 → エデト酸ナトリウム水和物(UE-E)

エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物
Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetic acid dihydrate

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN®［6381-92-6］ mp248℃(dec.)▲

14097-00	>99.5%(T)	特級	P	500g	￥7,000
14097-20	>99.5%(T)	特級	P	100g	￥2,900
14097-30	>99.5%(T)	特級	G	25g	￥1,700
10215-08	>99.5%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥11,000

0.01mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
0.01mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN®［6381-92-6］

(ISO/IEC 17025)対応

14570-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥2,900

0.025mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
0.025mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN® [6381-92-6]

14580-08	容量分析用滴定液		500mL	￥3,000

0.02mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液
0.02mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN® [6381-92-6]

14572-08	医薬品試験用		500mL	￥3,100
14572-23	医薬品試験用		100mL	￥2,500

0.05mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
0.05mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN® [6381-92-6]

(ISO/IEC 17025)対応

14569-08	容量分析用滴定液		500mL	￥3,000

0.05mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液
0.05mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN® [6381-92-6]

13500-08	医薬品試験用		500mL	￥3,100
13500-23	医薬品試験用		100mL	￥2,500

0.1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
0.1mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN® [6381-92-6]

(ISO/IEC 17025)対応

14568-08	容量分析用滴定液		500mL	￥2,900

0.1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液
0.1mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN®［6381-92-6］

14565-08	医薬品試験用	P	500mL	￥3,100
14565-23	医薬品試験用		100mL	￥2,500

0.1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(1L調製用濃縮液)
0.1mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2O_8Na_2 \cdot 2H_2O$...372.23

9992-1M M（1.09992.0001）		1amp	￥6,750

0.25mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
0.25mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN®［6381-92-6］

14579-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥3,800

0.2mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
0.2mol/L Disodium dihydrogen ethylenediamine tetraacetate solution

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN®［6381-92-6］

14567-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥4,000

エデト酸ナトリウム水和物
Disodium edetate hydrate

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN®［6381-92-6］ mp248℃(dec.)†

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

11706-08	>99.0%(T)	日本薬局方(製造専用)	G	500g	☆
11706-84	>99.0%(T)	日本薬局方(製造専用)	M	10kg	☆

エデト酸ナトリウム水和物(UE-E)
Disodium edetate hydrate (UE-E)

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN® [6381-92-6] mp248℃(dec.)†

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

11511-08		>99.0%(T)	日本薬局方(製造専用) G	500g	☆
11511-84		>99.0%(T)	日本薬局方(製造専用) M	10kg	☆

エチドロン酸-d_3二ナトリウム(メチル-d_3)
Disodium etidronate-d_3 (methyl-d_3)

$C_2H_3D_3Na_2O_7P_2$...253.01
CAS RN® [358730-93-5]

49126-46	CDN（D-5509）	98 atom% D	50mg	￥132,000

塩化 *n*-ドデカノイル → 塩化ラウロイル

塩化 *n*-ドデシル → 1-クロロドデカン

塩化1-ドデシル-3-メチルイミダゾリウム
1-Dodecyl-3-methylimidazolium chloride

$C_{16}H_{31}ClN_2$...286.88
CAS RN® [114569-84-5] mp97℃▲

49515-16	ILT（IL-0120-HP）	>98.0%	100g	￥92,000
49515-15	ILT（IL-0120-HP）	>98.0%	25g	￥43,000

塩化 *n*-ドデシルトリメチルアンモニウム
n-Dodecyltrimethylammonium chloride

警告

$[CH_3(CH_2)_{11}N(CH_3)_3]Cl$...263.88
CAS RN® [112-00-5] mp246℃(dec.)†

11122-52		>85.0%(T)	G	5g	￥4,100
40932-1A	TFS（40932-0250）			25g	￥15,400

エブセン
Ebselen

$C_{13}H_9NOSe$...274.18 ［毒］I ［労］57,57-2 ［PRTR］1-242
CAS RN® ［60940-34-3］ mp178℃～181℃▲

30057-1A	TFS（30057-2500）		250mg	￥85,100

β-エクジソン
β-Ecdysone

$C_{27}H_{44}O_7$...480.63 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［5289-74-7］

49062-70	PHY（89651）	天然物化学研究用	25mg	￥46,000

エキミジン
Echimidine

$C_{20}H_{31}NO_7$...397.46 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［520-68-3］

49062-71	PHY（89553）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

エチミジン N-オキシド
Echimidine N-oxide

$C_{20}H_{31}NO_8$...413.46 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［41093-89-4］

49871-11	PHY（83590）	天然物化学研究用	5mg	￥64,000

エキナコシド
Echinacoside

$C_{35}H_{46}O_{20}$...786.72
CAS RN® ［82854-37-3］

49062-72	PHY（89188）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

エキナチン(フラボノイド)
Echinatin (flavonoid)

$C_{16}H_{14}O_4$...270.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［34221-41-5］

49872-74	PHY（83847）	天然物化学研究用	10mg	￥50,000

エキナチン窒素酸化物
Echinatine N-oxide

$C_{15}H_{25}NO_6$...315.36 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［20267-93-0］

49871-33	PHY（84093）	天然物化学研究用	5mg	￥72,000

エキナチン硫酸塩
Echinatine sulfate

$C_{15}H_{25}NO_5 \cdot 0.5H_2SO_4$...348.40 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［480-83-1］

49871-34	PHY（86118）	天然物化学研究用	5mg	￥72,000

エキノシスチン酸
Echinocystic acid

$C_{30}H_{48}O_4$...472.69
CAS RN®［510-30-5］

49872-75	PHY（83848）	天然物化学研究用	20mg	￥32,000

エキウミン
Echiumine

$C_{20}H_{31}NO_6$...381.46 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［633-16-9］

49872-76	PHY（83749）	天然物化学研究用	5mg	￥44,000

エキウミン *N*-オキシド
Echiumine *N*-oxide

$C_{20}H_{31}NO_7$...397.46 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［685554-68-1］

49872-77	PHY（84164）	天然物化学研究用	5mg	￥47,500

エクロメゾール標準品 → エトリジアゾール標準品

エクラルバサポニンI
Eclalbasaponin I

$C_{36}H_{58}O_9$...634.83 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［158511-59-2］

49869-27	PHY（83256）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

エクラルバサポニンII
Eclalbasaponin II

$C_{42}H_{68}O_{14}$...796.97 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［78285-90-2］

49869-26	PHY（83255）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

エジフェンホス標準品
Edifenphos standard

危険

$C_6H_5SP(O)(OC_2H_5)SC_6H_5$...310.37 ［劇］III［危］4-3-III ［PRTR］1-192 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［17109-49-8］ mp-25℃† d(20℃) 1.25† Fp115℃†

49861-23	DES（CA13110000）	残留農薬試験用	250mg	￥14,000

エドロホニウム塩化物-d_5
Edrophonium-d_5 chloride

$C_{10}H_{11}ClD_5NO$...206.72

49139-27	CDN（D-6703）	99 atom% D	50mg	￥110,000

エドワード培地(改良型)
Edwards medium (modified)

警告

［劇］II

711027-5	Oxd（CM0027B）		500g	￥30,000

11,14-エイコサジエン酸
11,14-Eicosadienoic acid

$C_{20}H_{36}O_2$...308.49 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［2091-39-6］

49051-40	MTR（1192）	99%	100mg	☆

11,14-エイコサジエン酸メチルエステル → *cis*-11,14-エイコサジエン酸メチル

n-エイコサン
n-Eicosane

$CH_3(CH_2)_{18}CH_3$...282.54
CAS RN® [112-95-8] mp36℃～38℃† d0.789†

14542-31		>99.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥4,600
20437-1A	TFS（20437-1000）				100g	￥9,000
20437-2A	TFS（20437-0020）				2g	￥3,700

n-エイコサン-d_{42}
n-Eicosane-d_{42}

$CD_3(CD_2)_{18}CD_3$...324.80
CAS RN® [62369-67-9]

49126-62	CDN（D-1532）	98 atom% D		500mg	￥26,400

エイコサン酸
Eicosanoic acid

$CH_3(CH_2)_{18}COOH$...312.52
CAS RN® [506-30-9] mp75.5℃†

11772-1A	TFS（11772-0100）			10g	￥27,000
11772-2A	TFS（11772-0010）			1g	￥5,400

エイコサン酸
Eicosanoic acid

$CH_3(CH_2)_{18}COOH$...312.52
CAS RN® [506-30-9] mp75.5℃†

49050-23	MTR（1030）	99%		500mg	☆

エイコサン酸標準品
Eicosanoic acid standard

$CH_3(CH_2)_{18}COOH$...312.52 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [506-30-9] bp215℃～216℃▲ mp75.5℃▲

49861-74	DES（C13112800）		食品分析用	100mg	￥18,000

エイコサン酸-17,17,18,18-d_4
Eicosanoic-17,17,18,18-d_4 acid

$C_{20}H_{36}D_4O_2$...316.55
CAS RN® [1219803-69-6]

49139-28	CDN（D-6312）	98 atom% D		100mg	￥74,800

エイコサン酸-2,2-d_2
Eicosanoic-2,2-d_2 acid

$CH_3(CH_2)_{17}CD_2COOH$...314.54
CAS RN® [232600-70-3]

49126-63	CDN（D-5327）	98 atom% D		1g	￥70,400

エイコサン酸-20,20,20-d_3
Eicosanoic-20,20,20-d_3 acid

$CD_3(CH_2)_{18}COOH$...315.54
CAS RN® [202480-70-4]

49126-64	CDN（D-5254）	99 atom% D		100mg	￥36,300

エイコサン酸-d_{39}
Eicosanoic-d_{39} acid

$CD_3(CD_2)_{18}COOH$...351.76
CAS RN® [39756-32-6]

49126-65	CDN（D-1617）	98 atom% D		250mg	￥41,800

エイコサン酸メチルエステル → エイコサン酸メチル

エイコサン酸メチルエステル標準品 → エイコサン酸メチル標準品

1-エイコサノール
1-Eicosanol

警告

$CH_3(CH_2)_{19}OH$...298.54
CAS RN® [629-96-9] bp369℃† mp64℃～68℃△

14502-41	>96.0%(GC)	鹿1級	G	10g	￥2,500

n-エイコサニル-d_{41}アルコール
n-Eicosanyl-d_{41} alcohol

$CD_3(CD_2)_{19}OH$...339.79
CAS RN® [349553-89-5]

49126-67	CDN（D-4009）	99 atom% D	100mg	￥66,000

エイコサペンタエン酸
Eicosapentaenoic acid

$C_{20}H_{30}O_2$...302.45 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [10417-94-4]

49051-31	MTR（1167）	99%	25mg	☆

c i s-8-エイコセン酸標準液
cis-8-Eicosenoic acid standard solution

$C_{20}H_{38}O_2$...310.51 [危] 4-AL-S-II [労] 有-2,57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [76261-96-6]

10mg/L メタノール溶液

49862-49	DES（L13113500ME）	食品分析用	10mL	￥16,000

エイコセン酸
Eicosenoic acid

$C_{20}H_{38}O_2$...310.51 [危] 4-3-III [凍] -20℃以下
CAS RN® [5561-99-9]

cis-11

49050-25	MTR（1032）	99%	100mg	☆

n-エイコシルアルコール → 1-エイコサノール

エキクロディスク 13CR シリンジフィルター PTFE 13mm 0.45μm 溶媒系
EKICRODISK 13CR syringe filters with PTFE 13mm 0.45μm for hydrophobic

97004-07	PALL（E132）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥24,700

エキクロディスク 25CR シリンジフィルター PTFE 25mm 0.2μm 溶媒系
EKICRODISK 25CR syringe filters with PTFE 25mm 0.2μm for hydrophobic

97004-08	PALL（E255）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(50個)	￥26,600

エキクロディスク 25CR シリンジフィルター PTFE 25mm 0.45μm 溶媒系
EKICRODISK 25CR syringe filters with PTFE 25mm 0.45μm for hydrophobic

97004-09	PALL（E252）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(50個)	￥26,600

エキクロディスク 3CR シリンジフィルター PTFE 3mm 0.45μm 溶媒系
EKICRODISK 3CR syringe filters with PTFE 3mm 0.45μm for hydrophobic

97004-05	PALL（E032）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(100個)	￥41,400

エキクロディスク 13 シリンジフィルター バーサポア 13mm 0.2μm 水系
EKICRODISK 13 syringe filters with Versapor^{R} 13mm 0.2μm for hydrophilic

97004-01	PALL（E134）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(100個)	￥17,800

エキクロディスク 13 シリンジフィルター バーサポア 13mm 0.45μm 水系
EKICRODISK 13 syringe filters with Versapor^{R} 13mm 0.45μm for hydrophilic

97004-02	PALL（E131）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ-用	1pack(100個)	￥17,800

エキクロディスク 3 シリンジフィルター バーサポア 3mm 0.45μm 水系
EKICRODISK 3 syringe filters with Versapor[R] 3mm 0.45μm for hydrophilic

97004-00	PALL（E031）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(100個)	￥29,000

エライジン酸標準品
Elaidic acid standard

$C_{18}H_{34}O_2$...282.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［112-79-8］

49862-45	DES（C13115000）	食品分析用	100mg	￥14,000

エライジン酸メチルエステル標準品 → ｔｒａｎｓ-9-オクタデセン酸メチル標準品

エラスチカ・ワンギーソン染色キット
Elastica van Gieson staining kit

［危］4-AL-S-II ［労］57-2 ［冷］ 2℃～8℃

15974-1M	M（1.15974.0002）	顕微鏡用	1ST	￥53,600

α,β-エレモール酸
α,β-Elemolic acid

$C_{30}H_{48}O_3$...456.69
CAS RN® ［28282-27-1］

49062-75	PHY（80435）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

β-エレモン酸
β-Elemonic acid

$C_{30}H_{46}O_3$...454.68
CAS RN® ［28282-25-9］

49062-76	PHY（80079）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

エロイテロシドB
Eleutheroside B

$C_{17}H_{24}O_9$...372.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［118-34-3］

49062-77	PHY（89189）	天然物化学研究用	10mg	￥90,000

エロイテロシドE
Eleutheroside E

$C_{34}H_{46}O_{18}$...742.71 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［39432-56-9］

49062-78	PHY（89190）	天然物化学研究用	10mg	￥90,000

エリカーブ SW (AQ)
Elicarb SW (AQ)

Single-wall carbon nanotube, Diameter(from Raman spectra):0.9nm～1.7nm, Mean length:1 μm

49901-01	SWAN（PR0920）	>70.0%	500mg	￥35,000

エリカーブ SW (IMS)
Elicarb SW (IMS)

［危］4-AL-S-II

Single-wall carbon nanotube, Diameter(from Raman spectra):0.9nm～1.7nm, Mean length:1 μm

49901-02	SWAN（PR0921）	>70.0%	500mg	￥35,000

エラグ酸
Ellagic acid

$C_{14}H_6O_8 \cdot nH_2O$
CAS RN® ［476-66-4］ mp>300℃ †

11774-1A	TFS（11774-0100）		10g	￥31,600
49870-92	PHY（89653）	天然物化学研究用	50mg	￥40,000

エルマン試薬 → 5,5′-ジチオビス(2-ニトロ安息香酸)

エマメクチン安息香酸塩標準品
Emamectin benzoate standard

危険

［劇］III［PRTR］1-70［凍］-20℃以下
CAS RN®［155569-91-8］

49829-52	DES（C13117000）	残留農薬試験用	100mg	￥25,000

エンベリン
Embelin

$C_{17}H_{26}O_4$...294.38
CAS RN®［550-24-3］

49062-79	PHY（89654）	天然物化学研究用	100mg	￥40,000

エメチン二塩酸塩
Emetine dihydrochloride

$C_{29}H_{40}N_2O_4 \cdot 2HCl$...553.55［冷］0℃～6℃
CAS RN®［316-42-7］

49062-80	PHY（89489）	天然物化学研究用	50mg	￥66,000

エモジン
Emodin

$C_{15}H_{10}O_5$...270.23
CAS RN®［518-82-1］ mp253℃†

11775-1A	TFS（11775-1000）	tech.	100mg	￥26,700
11775-2A	TFS（11775-5000）	tech.	500mg	￥90,200
49870-93	PHY（89191）	天然物化学研究用	20mg	￥43,000

エモジン 8-グルコシド
Emodin 8-glucoside

$C_{21}H_{20}O_{10}$...432.37
CAS RN®［23313-21-5］

49872-79	PHY（83849）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

エンペントリン標準品
Empenthrin standard

$C_{18}H_{26}O_2$...274.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［54406-48-3］

49838-04	DES（C13118000）	残留農薬試験用	100mg	￥17,000

エナラプリラット-d_5(フェニル-d_5)
Enalaprilat-d_5 (phenyl-d_5)

$C_{18}H_{19}D_5N_2O_5$...353.42 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［349554-00-3］

49126-69	CDN（D-4166）	98 atom% D	10mg	￥61,600

エナントアルデヒド → 1-ヘプタナール

エナント酸 → *n*-ヘプタン酸

エナント酸 → *n*-ヘプタン酸

エナント酸標準品 → ヘプタン酸標準品

エナントアルコール → *n*-ヘプチルアルコール

エンドグリコセラミダーゼ I
Endoglycoceramidase I (EGCase I)

［凍］ -20℃以下

49920-41	NEB（P0773S）	150mU	￥14,400

エンドグリコシダーゼ反応バッファー・パック
Endoglycosidase Reaction Buffer Pack

［凍］ -20℃以下

49882-41	NEB（B0701S）	1mL×4	￥3,300

エンドヌクレアーゼIV
Endonuclease IV

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-37	NEB（M0304S）	1000units	￥13,200
49886-38	NEB（M0304L）	5000units	￥53,000

エンドヌクレアーゼV
Endonuclease V

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-39	NEB（M0305S）	250units	￥13,200

エンドヌクレアーゼVIII
Endonuclease VIII

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-26	NEB（M0299S）	1000units	￥13,200
49886-27	NEB（M0299L）	5000units	￥53,000

Tma エンドヌクレアーゼ III
Tma Endonuclease III

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-14	NEB（M0291S）	500units	￥13,200

Tth エンドヌクレアーゼ IV
Tth Endonuclease IV

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49886-18	NEB（M0294S）	500units	￥13,200

エンドプロテイナーゼAspN
Endoproteinase AspN

［凍］ -20℃以下

49889-58	NEB（P8104S）		50μg	￥14,200

エンドプロテイナーゼGluC
Endoproteinase GluC

[カルタヘナ]　［凍］ -20℃以下

カルタヘナ法該当品

49889-55	NEB（P8100S）		50μg	￥14,700

エンドプロテイナーゼ LysC
Endoproteinase LysC

［凍］ -20℃以下

49914-88	NEB（P8109S）		20μg	￥26,800

エンドスルファン標準品(α＋β)
Endosulfan standard (α＋β)

危険

$C_9H_6Cl_6O_3S$...406.92［審］-1［毒］II［労］57,57-2［PRTR］1-388［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［115-29-7］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49802-45	DES（C13120000）	残留農薬試験用	250mg	￥24,000

エンドスルファン-I-d_4
Endosulfan-I-d_4

$C_9H_2D_4Cl_6O_3S$...410.94［審］-1［毒］II［労］57-2［PRTR］1-388
CAS RN®［203645-57-2］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49126-71	CDN（D-3007）	97 atom% D	10mg	￥81,000

α-エンドスルファン標準品
α-Endosulfan standard

危険

$C_9H_6Cl_6O_3S$...406.92［審］-1［毒］II［労］57-2［PRTR］1-388［冷］0℃～6℃
CAS RN®［959-98-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49802-74	DES（C13121000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

α-エンドスルファン-d_4標準品
α-Endosulfan-d_4 standard

$C_9H_2Cl_6D_4O_3S$...410.94［審］-1［毒］II［労］57-2［PRTR］1-388［冷］0℃～6℃
CAS RN®［203645-57-2］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49836-58	DES（C13121100）	残留農薬試験用	10mg	￥140,000

β-エンドスルファン標準品
β-Endosulfan standard

危険

$C_9H_6Cl_6O_3S$...406.92［審］-1［毒］II［労］57-2［PRTR］1-388［冷］0℃～6℃
CAS RN®［33213-65-9］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49802-75	DES（C13122000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

β-エンドスルファン-d_4標準品
β-Endosulfan-d_4 standard

$C_9H_2Cl_6D_4O_3S$...410.94［審］-1［毒］II［労］57-2［PRTR］1-388［冷］0℃～6℃
CAS RN®［203716-99-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49836-59	DES（C13122100）	残留農薬試験用	10mg	☆

エンドスルファン-アルコール標準品
Endosulfan-alcohol standard

$C_9H_8Cl_6O_2$...360.87［冷］0℃～6℃
CAS RN®［2157-19-9］

49838-05	DES（C13130000）	残留農薬試験用	100mg	￥28,000

エンドスルファン-エーテル標準品
Endosulfan-ether standard

$C_9H_6Cl_6O$...342.85 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［3369-52-6］

49838-06	DES（C13131000）	残留農薬試験用	100mg	￥28,000

エンドスルファン-ラクトン標準品
Endosulfan-lacton standard

$C_9H_4Cl_6O_2$...356.83 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［3868-61-9］

49838-07	DES（C13132000）	残留農薬試験用	100mg	￥28,000

エンドタール水和物標準品
Endothal hydrate standard

危険

$C_8H_{10}O_5$...186.16 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［145-73-3］

49826-82	DES（C13150000）	残留農薬試験用	100mg	￥11,000

エンドタール-3,4,4,5,5,6-d_6
Endothal-3,4,4,5,5,6-d_6

$C_8H_4D_6O_5$...192.19 ［劇］III

49146-27	CDN（D-7289）	93 atom% D	50mg	￥57,200

エンドヌクレアーゼIII (Nth)
Endouclease III (Nth)

［凍］ -20℃以下

10,000units/mL

49885-70	NEB（M0268S）	1000units	￥13,200

エンドリン標準品
Endrin standard

危険

$C_{12}H_8Cl_6O$...380.90［審］-1［毒］II［労］57,57-2［冷］0℃～6℃
CAS RN®［72-20-8］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49801-82	DES（C13160000）	残留農薬試験用	100mg	￥20,000

エンドリンアルデヒド標準品
Endrin aldehyde standard

$C_{12}H_8Cl_6O$...380.90［冷］0℃～6℃
CAS RN®［7421-93-4］

49835-76	DES（C13161000）	残留農薬試験用	10mg	￥43,000

エンゲレチン
Engeletin

$C_{21}H_{22}O_{10}$...434.39
CAS RN®［572-31-6］

49869-30	PHY（83279）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

(-)-エングレリンA
(-)-Englerin A

$C_{26}H_{34}O_6$...442.54
CAS RN®［1094250-15-3］

49062-81	PHY（82530）	天然物化学研究用	10mg	￥130,000

(-)-エングレリンB
(-)-Englerin B

$C_{24}H_{32}O_4$...384.50
CAS RN®［1094250-13-1］

49872-78	PHY（83850）	天然物化学研究用	5mg	￥120,000

エンロフロキサシン標準品
Enrofloxacin standard

$C_{19}H_{22}FN_3O_3$...359.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［93106-60-6］ mp219℃～221℃†

14011-96	>99.5%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥8,000

エンロフロキサシン-d_5よう化水素酸塩
Enrofloxacin-d_5 hydroiodide

$C_{19}H_{17}D_5FN_3O_3$·HI...492.33 ［労］57,57-2
CAS RN®［1219795-24-0］

49144-60	CDN（D-6993）	99 atom% D	50mg	￥123,200

エンタカポン-d_{10}
Entacapone-d_{10}

$C_{14}H_5D_{10}N_3O_5$...315.34
CAS RN®［1185241-19-3］

49139-30	CDN（D-6835）	99 atom% D	10mg	￥149,600

エンテランニュー(速乾性封入剤)
Entellan^R new

［危］4-2-III［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-80

rapid embedding agent

7961-1M	M（1.07961.0500）	顕微鏡用	500mL	￥11,200
7961-2M	M（1.07961.0100）	顕微鏡用	100mL	￥4,000

エンテランニュー(自動封入機用)
Entellan new for cover slipper

［危］4-2-III［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-80

869-1M	M（1.00869.0500）	顕微鏡用	500mL	￥9,760

エンテロジオール
Enterodiol

$C_{18}H_{22}O_4$...302.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［77756-22-0］

49869-31	PHY（80436）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

エンテロヘモリジン血液寒天培地
Enterohemolysin blood agar (Prepared media)

［冷］ 2℃～8℃

717551-0		10枚×10	￥33,000
71755		5枚	￥2,200

エンテロキナーゼ(軽鎖)
Enterokinase, Light Chain

［凍］ -20℃以下

2μg/mL

49889-49	NEB（P8070S）	0.063μg	￥23,600
49889-50	NEB（P8070L）	0.32μg	￥93,900

エンテロラクトン
Enterolactone

$C_{18}H_{18}O_4$...298.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［78473-71-9］

49062-83	PHY（80437）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

エンバイロチェック サンプリングカプセルフィルター
Envirochek^R sampling capsule filter

97002-70	PALL（12110）	微生物検査用	1pack	￥17,900

5%エオシンアルコール溶液
5% Eosin alcohol solution

危険

［危］4-AL-S-II ［労］57,57-2
Fp14℃ †

14583-23		病理組織染色用	100mL	￥3,500

エオシンB
Eosin B

警告

$C_{20}H_6Br_2N_2O_9Na_2$...624.05
CAS RN® [548-24-3]

14001-31			鹿1級	G	25g	￥12,500
15934-1M	M（1.15934.0025）		顕微鏡用(Certistain®)		25g	￥19,300
22965-1A	TFS（22965-0250）				25g	￥5,600

エオシンG → エオシンY

エオシンメチレンブルー(EMB)寒天培地
Eosin methylene blue agar (Levine)

711069-5	Oxd（CM0069B）				500g	￥16,000

エオシンY
Eosin Y

警告

$C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$...691.85
CAS RN® [17372-87-1] mp300℃ d1.018

40943-1A	TFS（40943-0250）				25g	￥5,700

エオシンY
Eosin Y (Y=G)

警告

$C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$...691.85
CAS RN® [17372-87-1]

14002-30		>85.0%	鹿特級	G	25g	￥4,400
14002-31			鹿1級	G	25g	￥4,200
15288-1A	TFS（15288-0250）				25g	￥4,600
15288-2A	TFS（15288-1000）				100g	￥12,600
15935-1M	M（1.15935.0025）		顕微鏡用(Certistain®)		25g	￥7,450
15935-2M	M（1.15935.0100）		顕微鏡用(Certistain®)		100g	￥24,300

エピアンドロステロン
Epiandrosterone

$C_{19}H_{30}O_2$...290.43
CAS RN® [481-29-8] mp171℃～175℃▲

21539-1A	TFS（21539-0050）	5g	￥21,100

4-エピアンヒドロクロルテトラサイクリン塩酸塩
4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride

$C_{22}H_{21}ClN_2O_7 \cdot HCl$...497.32
CAS RN® [158018-53-2] mp222℃▲

can be used as secondary standard

26822-1A	TFS（26822-1000）	100mg	￥22,400
26822-2A	TFS（26822-5000）	500mg	￥89,900

4-エピアンヒドロテトラサイクリン塩酸塩
4-Epianhydrotetracycline hydrochloride

$C_{22}H_{22}N_2O_7 \cdot HCl$...462.87
CAS RN® [4465-65-0] mp220℃(dec.)▲

23311-1A	TFS（23311-1000）	100mg	￥49,800
23311-2A	TFS（23311-5000）	500mg	￥216,000

エピブロモヒドリン
Epibromohydrin

危険

$C_2H_3OCH_2Br$...136.97 ［危］4-2-III
CAS RN® [3132-64-7] bp134℃～136℃† mp-40℃† d(20/20℃) 1.67▲

14003-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥10,000

(-)-エピカテキン
(-)-Epicatechin

$C_{15}H_{14}O_6$...290.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [490-46-0]

49062-85	PHY（89192）	天然物化学研究用	20mg	￥49,000

(-)-エピカテキン3-ガラート
(-)-Epicatechin 3-gallate

$C_{22}H_{18}O_{10}$...442.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1257-08-5］

49062-86	PHY（89193）	天然物化学研究用		20mg	￥55,000

(*R*)-エピクロロヒドリン
(*R*)-Epichlorohydrin

危険

C_3H_5ClO...92.52 ［劇］II ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-65 ［変］
CAS RN® ［51594-55-9］ bp114℃† d1.18†

14618-35	>97.0%(GC)	不斉合成用		25g	￥10,500
14618-55	>97.0%(GC)	不斉合成用		5g	￥3,400
34901-1A	TFS（34901-0010）			1g	￥6,600

(*S*)-エピクロロヒドリン
(*S*)-Epichlorohydrin

危険

C_3H_5ClO...92.52 ［劇］II ［危］4-2-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-65 ［変］
CAS RN® ［67843-74-7］ bp114℃▲ d1.183▲

14619-35	>97.0%(GC)	不斉合成用		25g	￥10,500
14619-55	>97.0%(GC)	不斉合成用		5g	￥3,400
34902-1A	TFS（34902-0010）			1g	￥9,100

エピクロロヒドリン → クロロメチルオキシラン

エピクロロヒドリン標準原液
Epichlorohydrin standard stock solution

危険

C_3H_5ClO...92.52 ［劇］III ［危］4-AL-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［106-89-8］ Fp12℃(as Methanol)†

1mg/mL メタノール溶液

14635-96		水質試験用		2mL×5	￥8,500

エピクロロヒドリン-2-d_1
Epichlorohydrin-2-d_1

C_3H_4DClO...93.52 ［劇］III［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-65 ［変］
CAS RN®［70735-27-2］

49126-73	CDN（D-5370）	98 atom% D	250mg	￥41,800

エピクロロヒドリン-d_5
Epichlorohydrin-d_5

C_3D_5ClO...97.55 ［劇］III［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-65 ［変］
CAS RN®［69533-54-6］

49126-74	CDN（D-1194）	98 atom% D	1g	￥68,200

4-エピクロロテトラサイクリン塩酸塩
4-Epichlorotetracycline hydrochloride

$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$･HCl...515.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［101342-45-4］ mp>250℃(dec.)▲

26823-1A	TFS（26823-1000）		100mg	￥19,700
26823-2A	TFS（26823-5000）		500mg	￥80,100

(-)-エピガロカテキン
(-)-Epigallocatechin

$C_{15}H_{14}O_7$...306.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［970-74-1］

49062-87	PHY（89655）	天然物化学研究用	20mg	￥55,000

(-)-エピガロカテキン3-ガラート
(-)-Epigallocatechin 3-gallate

$C_{22}H_{18}O_{11}$...458.37
CAS RN®［989-51-5］

49062-88	PHY（89656）	天然物化学研究用	50mg	￥55,000

エピメジンA
Epimedin A

$C_{39}H_{50}O_{20}$...838.80 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［110623-72-8］

49062-89	PHY（80586）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

エピメジンA1
Epimedin A1

$C_{39}H_{50}O_{20}$...838.80
CAS RN® [140147-77-9]

49870-94	PHY（83498）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

エピメジンB
Epimedin B

$C_{38}H_{48}O_{19}$...808.77 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [110623-73-9]

49062-90	PHY（80587）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

エピメジンC
Epimedin C

$C_{39}H_{50}O_{19}$...822.80 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [110642-44-9]

49062-91	PHY（80588）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

(±)-エピネフリン-2,5,6,α,β,β-d_6
(±)-Epinephrine-2,5,6,α,β,β-d_6

$C_9H_7D_6NO_3$...189.24 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [1219803-77-6]

49139-32	CDN（D-6632）	98 atom% D	10mg	￥39,600

(±)-エピネフリン-d_3(*N*-メチル-d_3)
(±)-Epinephrine-d_3 (*N*-methyl-d_3)

$C_9H_{10}D_3NO_3$...186.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [1189977-29-4]

49139-31	CDN（D-6633）	99 atom% D	50mg	￥88,000

l-エピネフリン → *l*-アドレナリン

(±)-エピネフリン塩酸塩標準品
(±)-Epinephrine hydrochloride standard

$C_9H_{13}NO_3$･HCl...183.20 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［329-63-5］

49864-19	DES（C13178000）	環境分析用	100mg	￥14,000

4-エピオキシテトラサイクリン
4-Epioxytetracycline

$C_{22}H_{24}N_2O_9$...460.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［14206-58-7］ mp168℃▲

can be used as secondary standard

25771-1A	TFS（25771-1000）	100mg	￥61,200

エピプロゴイトリンカリウム
Epiprogoitrin potassium salt

$C_{11}H_{18}NO_{10}S_2K$...427.49 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［21087-74-1］

49062-92	PHY（89657）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

4-エピテトラサイクリン塩酸塩
4-Epitetracycline hydrochloride

$C_{22}H_{24}N_2O_8$･HCl...480.89 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［23313-80-6］ mp217℃(dec.)▲

23312-1A	TFS（23312-1000）	100mg	￥46,300
23312-2A	TFS（23312-5000）	500mg	￥182,800

エピチオクロロヒドリン
Epithiochlorohydrine

C_3H_5ClS...108.59 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［3221-15-6］bp69℃～70℃(67mm)▲

29139-1A	TFS（29139-0050）	5g	￥34,100

エポキシコナゾール標準品
Epoxiconazole standard

$C_{17}H_{13}ClFN_3O$...329.75 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［133855-98-8］

49830-12	DES（C13185000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

エポキシベルガモッチン
Epoxybergamottin

$C_{21}H_{22}O_5$...354.39 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［206978-14-5］

49062-93	PHY（80438）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

1,2-エポキシシクロヘキサン → 7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン

(*R*)-(+)-エポキシエチルベンゼン → (*R*)-(+)-スチレンオキシド

(*R*)-エポキシエチルベンゼン → (*R*)-スチレンオキシド

(*S*)-(-)-エポキシエチルベンゼン → (*S*)-(-)-スチレンオキシド

1,2-エポキシエチルベンゼン → スチレンオキシド

1,2-エポキシヘキサン
1,2-Epoxyhexane

$C_6H_{12}O$...100.15 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1436-34-6］bp118℃～120℃▲ d0.83▲

33555-1A	TFS（33555-0250）		25mL	￥5,600
33555-2A	TFS（33555-0050）		5mL	￥2,700

1,8-エポキシ-*p*-メタン → シネオール

1,2-エポキシ-3-フェノキシプロパン → グリシジルフェニルエーテル

(*R*)-(+)-1,2-エポキシプロパン → (*R*)-プロピレンオキシド(酸化プロピレン)

(*S*)-(-)-1,2-エポキシプロパン → (*S*)-プロピレンオキシド(酸化プロピレン)

1,2-エポキシプロパン → プロピレンオキシド(酸化プロピレン)

2,3-エポキシ-1-プロパノール → グリシドール

2,3-エポキシプロピルフェニルエーテル → グリシジルフェニルエーテル

2,3-エポキシ-1,2,3,4-テトラヒドロアントラセン
2,3-Epoxy-1,2,3,4-tetrahydroanthracene

$C_{14}H_{12}O$...196.24
CAS RN®［176236-88-7］ mp159℃～160℃▲

30172-1A	TFS（30172-2500）	250mg	￥45,600

3,4-エポキシテトラヒドロフラン
3,4-Epoxytetrahydrofuran

$C_4H_6O_2$...86.08 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［285-69-8］ bp44℃(10mm)▲

42553-2A	TFS（42553-0010）	1g	￥16,000
42553-3A	TFS（42553-0100）	10g	￥82,600

エプリノメクチン標準品
Eprinomectin standard

［凍］ -20℃以下
CAS RN®［123997-26-2］

49829-55	DES（CA13187000）	食品分析用	100mg	￥54,000

エキレニン-4,16,16-d_3
Equilenin-4,16,16-d_3

$C_{18}D_3H_{17}O_2$...271.36
CAS RN® [56588-54-6]

49148-85	CDN（D-5658）	97 atom% D	5mg	￥86,900

エクイリン-2,4,16,16-d_4
Equilin-2,4,16,16-d_4

$C_{18}D_4H_{16}O_2$...272.37
CAS RN® [285979-79-5]

49126-77	CDN（D-4186）	98 atom% D	50mg	￥114,400

(*R*)-エクオール
(*R*)-Equol

$C_{15}H_{14}O_3$...242.26
CAS RN® [221054-79-1]

49213-09	ダイセル（100151-001G）	1g	￥23,300

(*S*)-エクオール
(*S*)-Equol

$C_{15}H_{14}O_3$...242.26
CAS RN® [531-95-3]

49213-10	ダイセル（100152-001G）	1g	￥35,000

エルビウム標準原液(Er 1000)
Erbium standard solution (Er 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

$Er(NO_3)_3$・HNO_3(1mol/L)溶液

14553-1B	Er:1000mg/L	原子吸光分析用	P	100mL	￥4,400

エルビウムアセチルアセトナート二水和物,3N5
Erbium acetylacetonate dihydrate, 3N5

警告

$Er(CH_3COCHCOCH_3)_3 \cdot 2H_2O$...500.61
CAS RN®［14553-08-3］

14603-23	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬		100g	￥17,000

エルゴカルシフェロール → カルシフェロール

エルゴカルシフェロール標準品 → カルシフェロール標準品

エルゴコルニン標準品
Ergocornine standard

$C_{31}H_{39}N_5O_5$...561.67［冷］0℃～6℃
CAS RN®［564-36-3］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 5mL solvent.

49160-11	B.P.（10000357）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.5mg	￥88,000

エルゴコルニニン標準品
Ergocorninine standard

$C_{31}H_{39}N_5O_5$...561.67［冷］0℃～6℃
CAS RN®［564-37-4］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 5mL solvent.

49160-21	B.P.（10000364）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.125mg	￥88,000

エルゴクリスチン
Ergocristine

$C_{35}H_{39}N_5O_5$...609.71
CAS RN®［511-08-0］

49872-80	PHY（80440）	天然物化学研究用	10mg	￥44,500

エルゴクリスチン標準品
Ergocristine standard

$C_{35}H_{39}N_5O_5$...609.71 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［511-08-0］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 5mL solvent.

49160-12	B.P.（10000358）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.5mg	￥88,000

エルゴクリスチニン標準品
Ergocristinine standard

$C_{35}H_{39}N_5O_5$...609.71 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［511-07-9］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 5mL solvent.

49160-22	B.P.（10000365）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.125mg	￥88,000

エルゴクリプチン標準品
Ergocryptine standard

$C_{32}H_{41}N_5O_5$...575.69 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［511-09-1］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 5mL solvent.

49160-13	B.P.（10000359）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.5mg	￥88,000

エルゴクリプチニン標準品
Ergocryptinine standard

$C_{32}H_{41}N_5O_5$...575.69 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［511-10-4］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 5mL solvent.

49160-23	B.P.（10000366）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.125mg	￥88,000

エルゴメトリン標準品
Ergometrine standard

$C_{19}H_{23}N_3O_2$...325.40 ［麻］特定麻薬向精神薬原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［60-79-7］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。Stated concentration after reconstitution in 5 mL of solvent : 100μg/mL, dried down

49160-95	B.P.（10000360）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.5mg	￥88,000

エルゴメトリニン標準品
Ergometrinine standard

$C_{19}H_{23}N_3O_2$...325.40 ［麻］特定麻薬向精神薬原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［479-00-5］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。Stated concentration after reconstitution in 5 mL of solvent : 25μg/mL, dried down

49160-96	B.P.（10002877）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.125mg	￥93,000

エルゴシン標準品
Ergosine standard

$C_{30}H_{37}N_5O_5$...547.64 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［561-94-4］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。100ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 5mL solvent.

49160-14	B.P.（10000361）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.5mg	☆

エルゴシニン標準品
Ergosinine standard

$C_{30}H_{37}N_5O_5$...547.64 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［596-88-3］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。25ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 5mL solvent.

49160-64	B.P.（10002876）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.125mg	☆

エルゴステロール
Ergosterol

$C_{28}H_{44}O$...396.64 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［57-87-4］ mp168℃†

11781-1A	TFS（11781-0050）		5g	￥15,100
11781-2A	TFS（11781-0250）		25g	￥56,200

エルゴステロール(プロビタミンD2)標準品
Ergosterol (Provitamin D2) standard

$C_{28}H_{44}O$...396.64 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［57-87-4］

49866-93	DES（C13201500）	食品分析用	100mg	￥10,000

エルゴタミン標準品
Ergotamine standard

$C_{33}H_{35}N_5O_5$...581.66 ［麻］特定麻薬向精神薬原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［113-15-5］ mp212℃～214℃▲

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。Stated concentration after reconstitution in 5 ML of solvent : 100μg/mL, dried down

49160-93	B.P.（10000362）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.5mg	￥88,000

エルゴタミニン標準品
Ergotaminine standard

$C_{33}H_{35}N_5O_5$...581.66 ［麻］特定麻薬向精神薬原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［639-81-6］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。Stated concentration after reconstitution in 5 mL of solvent : 25μg/mL, dried down

49160-94	B.P.（10000367）	ｶﾋﾞ毒分析用	0.125mg	￥88,000

エリアニン
Erianin

$C_{18}H_{22}O_5$...318.36
CAS RN® ［95041-90-0］

49870-95	PHY（83499）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

エリオクロムブラックT
Eriochrome black T

警告

$C_{20}H_{12}N_3O_7SNa$...461.38
CAS RN® [1787-61-7]

14008-31		鹿1級	G	25g	￥3,100
22836-1A	TFS（22836-0010）	indicator grade		1kg	￥32,500
22836-2A	TFS（22836-0250）	indicator grade		25g	￥4,500
22836-3A	TFS（22836-1000）	indicator grade		100g	￥5,200
22836-4A	TFS（22836-5000）	indicator grade		500g	￥19,200

エリオシトリン
Eriocitrin

$C_{27}H_{32}O_{15}$...596.53 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [13463-28-0]

49062-97	PHY（89194）	天然物化学研究用		10mg	￥66,000

エリオジクチオール
Eriodictyol

$C_{15}H_{12}O_6$...288.25
CAS RN® [552-58-9]

49063-00	PHY（80444）	天然物化学研究用		20mg	￥49,000

エルカ酸
Erucic acid

警告

$CH_3(CH_2)_7CH{:}CH(CH_2)_{11}COOH$...338.56
CAS RN® [112-86-7] bp381.5℃† mp33.8℃†

14018-32		>85.0%(GC)	G	25g	￥3,300

エルカ酸
Erucic acid

$CH_3(CH_2)_7CH{:}CH(CH_2)_{11}COOH$...338.56 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® [112-86-7] bp381.5℃† mp33.8℃†

49051-80	MTR（1264）	>99.0%		100mg	☆

エルカ酸標準品
Erucic acid standard

$CH_3(CH_2)_7CH:CH(CH_2)_{11}COOH$...338.56 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［112-86-7］bp381.5℃▲ mp33.8℃▲ d(20℃) 0.891▲

49862-50	DES（C13203000）	食品分析用		100mg	￥14,000

エルカ酸メチルエステル → *c i s*-13-ドコセン酸メチル

エルシホリン
Erucifoline

$C_{18}H_{23}NO_6$...349.37 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［40158-95-0］

49871-12	PHY（83432）	天然物化学研究用		5mg	￥70,000

エルシホリン *N*-オキシド
Erucifoline *N*-oxide

$C_{18}H_{23}NO_7$...365.37 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［123864-94-8］

49871-13	PHY（83433）	天然物化学研究用		5mg	￥75,000

エリソルビン酸ナトリウム一水和物標準品
Erythorbic acid sodium salt monohydrate standard

$C_6H_7O_6Na \cdot H_2O$...216.12 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［6381-77-7］

14620-96	>99.5%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥5,800

m e s o-エリスライト → *m e s o*-エリスリトール

m e s o-エリスリトール
meso-Erythritol

$HOCH_2(CHOH)_2CH_2OH$...122.11
CAS RN® [149-32-6] bp329℃～331℃† mp121.5℃†

14019-50		>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥4,900
14019-60		>98.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥1,800
11782-1A	TFS（11782-0250）				25g	￥11,800
11782-2A	TFS（11782-1000）				100g	￥31,000

エリスロジオール
Erythrodiol

$C_{30}H_{50}O_2$...442.71
CAS RN® [545-48-2]

49872-81	PHY（83773）		天然物化学研究用		10mg	￥22,500

(-)-エリスロマイシン
(-)-Erythromycin

$C_{37}H_{67}NO_{13}$...733.92
CAS RN® [114-07-8] mp138℃～140℃

34388-1A	TFS（34388-0050）				5g	￥8,800
34388-2A	TFS（34388-0250）				25g	￥26,500

エリスロマイシン
Erythromycin

$C_{37}H_{67}NO_{13}$...733.92
CAS RN® [114-07-8] mp138℃～140℃▲

22733-1A	TFS（22733-0050）				5g	￥8,000
22733-2A	TFS（22733-0250）				25g	￥27,000
22733-3A	TFS（22733-1000）				100g	￥78,100

エリスロマイシン標準品(A,B,C混合物)
Erythromycin standard (mixture A,B,C)

$C_{37}H_{67}NO_{13}$...733.92 [凍] -20℃以下
CAS RN® [114-07-8]

49829-56	DES（C13203490）		食品分析用		100mg	￥12,000

(3*R*,4*R*)-(-)-*D*-エリスロノラクトン
(3*R*,4*R*)-(-)-*D*-Erythronolactone

$C_4H_6O_4$...118.08
CAS RN® [15667-21-7] mp99℃～102℃†

27717-1A	TFS（27717-2500）			250mg	￥9,600

エリスロシンB
Erythrosin B

警告

$C_{20}H_6I_4Na_2O_5$...879.85 [労] 57,57-2
CAS RN® [16423-68-0]

14020-30		>88.0%(G)	鹿特級	25g	￥4,300
15936-2M	M（1.15936.0025）		顕微鏡用(Certistain®)	25g	￥12,900
18946-1A	TFS（18946-0250）			25g	￥6,500

エリスロシンB(アルコール溶性)
Erythrosin B, spirit soluble

$C_{20}H_8I_4O_5$...835.89 [労] 57,57-2
CAS RN® [15905-32-5] mp303℃▲

spirit soluble

19112-1A	TFS（19112-0050）		5g	￥8,000

エッシェンモサー塩
Eschenmoser's salt

$H_2C{:}N(CH_3)_2I$...185.00 [労] 57,57-2 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [33797-51-2] mp219℃▲

20101-1A	TFS（20101-0100）		10g	￥14,800
20101-2A	TFS（20101-0500）		50g	￥41,400

エシュカ合剤
Eschka's mixture

危険

14021-02			500g	￥17,000

エシン
Escin

CAS RN®［6805-41-0］

49063-01	PHY（89871）	天然物化学研究用		100mg	￥56,000

エシンIA
Escin IA

$C_{55}H_{86}O_{24}$...1131.25 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［123748-68-5］

49872-82	PHY（80445）	天然物化学研究用		10mg	￥45,000

エシンIB
Escin IB

$C_{55}H_{86}O_{24}$...1131.25 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［26339-90-2］

49872-83	PHY（80446）	天然物化学研究用		10mg	￥45,000

エスクレントシドA
Esculentoside A

$C_{42}H_{66}O_{16}$...826.96
CAS RN®［65497-07-6］

49063-04	PHY（80589）	天然物化学研究用		10mg	￥85,000

エスクレチン
Esculetin

$C_9H_6O_4$...178.14
CAS RN®［305-01-1］

49063-05	PHY（80449）	天然物化学研究用		25mg	￥46,000

エスクリン・1.5水
Esculin 1.5-water

$C_{15}H_{16}O_9 \cdot 1.5H_2O$...367.30
CAS RN®［531-75-9(as monohydr)］ mp203℃～207℃△

14505-60		鹿特級	G	1g	￥3,500
842-2M	M（1.00842.0025）	微生物学用		25g	￥37,100

エスクリン水和物
Esculin hydrate

$C_{15}H_{16}O_9 \cdot H_2O$...358.29
CAS RN® [531-75-9] mp203℃～205℃†

11783-1A	TFS（11783-0100）			10g	￥10,700
11783-2A	TFS（11783-0050）			5g	￥5,500
49870-96	PHY（89659）		天然物化学研究用	100mg	￥56,000

エスフェンバレレート標準品
Esfenvalerate standard

危険

$C_{25}H_{22}ClNO_3$...419.89 [劇] III [PRTR] 2-22 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [66230-04-4]

49803-09	DES（C13211000）		残留農薬試験用	100mg	￥19,000

エスプロカルブ標準品
Esprocarb standard

警告

$C_{15}H_{23}NOS$...265.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [85785-20-2] d1.0353†

14010-96		>97.0%(GC)	残留農薬試験用	200mg	￥14,000

エスプロカルブ標準品
Esprocarb standard

$C_{15}H_{23}NOS$...265.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [85785-20-2]

49865-27	DES（C13212000）		残留農薬試験用	100mg	￥32,000

17α-エストラジオール標準品
17α-Estradiol standard

$C_{18}H_{24}O_2$...272.38 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [57-91-0]

49827-80	DES（C13213000）		環境分析用	100mg	￥49,000

17α-エストラジオール-2,4-d_2
17α-Estradiol-2,4-d_2

$C_{18}H_{22}D_2O_2$...274.39
CAS RN® [81586-94-9]

49126-78	CDN（D-5431）	98 atom% D		10mg	￥39,600

17β-エストラジオール標準品
17β-Estradiol standard

危険

$C_{18}H_{24}O_2$...272.38
CAS RN® [50-28-2] mp176℃～180℃†

14624-96	>97.0%(GC)	環境分析用	G	500mg	￥10,000

17β-エストラジオール CRM6004-a
17β-Estradiol, CRM6004-a

$C_{18}H_{24}O_2$...272.38 [冷] 5℃
CAS RN® [50-28-2]

Certified value:98.4±0.3%

49003-92	NMI（CRM6004-a）	認証標準物質		300mg	☆

17β-エストラジオール-16,16,17-d_3
17β-Estradiol-16,16,17-d_3

危険

$C_{18}D_3H_{21}O_2$...275.39
CAS RN® [79037-37-9]

14625-96	>97.0%(GC)	環境分析用	G	50mg	￥41,000
49148-86	CDN（D-2325）	98 atom% D		50mg	￥61,600

17β-エストラジオール-16,16-d_2
17β-Estradiol-16,16-d_2

$C_{18}H_{22}D_2O_2$...274.39
CAS RN® [3188-46-3]

49126-80	CDN（D-5433）	98 atom% D		50mg	￥114,400

17β-エストラジオール-2,4,16,16,17-d_5
17β-Estradiol-2,4,16,16,17-d_5

$C_{18}D_5H_{19}O_2$...277.41
CAS RN® [221093-45-4]

49126-82	CDN（D-5403）	98 atom% D		50mg	￥96,800

17β-エストラジオール-2,4,16,16-d_4
17β-Estradiol-2,4,16,16-d_4

危険

$C_{18}D_4H_{20}O_2$...276.40
CAS RN® [66789-03-5]

14626-96		>97.0%(GC)	環境分析用	50mg	￥50,000
49126-81	CDN（D-4318）	98 atom% D		50mg	￥79,200

17β-エストラジオール-2,4-d_2
17β-Estradiol-2,4-d_2

$C_{18}H_{22}D_2O_2$...274.39
CAS RN® [53866-33-4]

49126-79	CDN（D-5432）	98 atom% D	50mg	￥105,600

17β-エストラジオールEIAキット
17β-Estradiol EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-38	矢内（YK170）		1kit	￥45,000

エストラジオールEIAキット
Estradiol EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

sample:50μL serum

49776-01	DSL（DSL-10-4300）		1kit	￥85,000

エストラゴール → 4-アリルアニソール

1,3,5(10)-エストラトリエン-17α-エチル-d_5-3,17β-ジオール-3-メチルエーテル
1,3,5(10)-Estratriene-17α-ethyl-d_5-3,17β-diol-3-methyl ether

［冷］ 0℃～6℃

49139-33	CDN（D-6742）	98 atom% D	50mg	￥61,600

エストロン
Estrone

$C_{18}H_{22}O_2$...270.36
CAS RN®［53-16-7］ mp258℃～261℃▲

11784-1A	TFS（11784-0010）		1g	￥6,600
11784-2A	TFS（11784-0050）		5g	￥22,700

エストロン-16,16-d_2
Estrone-16,16-d_2

$C_{18}D_2H_{20}O_2$...272.37
CAS RN®［56588-58-0］

49126-88	CDN（D-5004）	98 atom% D	50mg	￥61,600

エストロン-2,4,16,16-d_4
Estrone-2,4,16,16-d_4

$C_{18}D_4H_{18}O_2$...274.38
CAS RN®［53866-34-5］

49126-89	CDN（D-3650）	98 atom% D	50mg	￥57,200

エストロン-2,4-d_2
Estrone-2,4-d_2

$C_{18}D_2H_{20}O_2$...272.37
CAS RN®［350820-16-5］

49126-87	CDN（D-5005）	98 atom% D	50mg	￥70,400

エストロンEIAキット
Estrone EIA kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-39	矢内（YK180）		1kit	￥76,000

エタコナゾール標準品
Etaconazole standard

$C_{14}H_{15}Cl_2N_3O_2$...328.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［60207-93-4］

49860-97	DES（C13215000）	残留農薬試験用	100mg	￥11,000

エタボキサム標準品
Ethaboxam standard

$C_{14}H_{16}N_4OS_2$...320.43 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［162650-77-3］

49866-80	DES（C13217000）	残留農薬試験用	50mg	￥37,000

エタルフルラリン標準品
Ethalfluralin standard

$C_{13}H_{14}F_3N_3O_4$...333.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［55283-68-6］

49826-83	DES（C13220000）	残留農薬試験用	250mg	￥15,000

エタメツルフロンメチル標準品
Ethametsulfuron-methyl standard

$C_{15}H_{18}N_6O_6S$...410.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［97780-06-8］

49829-54	DES（C13222000）	残留農薬試験用	100mg	￥48,000

エタン-1,2-ジカルボン酸 → こはく酸

エタン-1,2-ジカルボン酸標準品 → こはく酸標準品

エタン-1,2-ジカルボン酸-2,2,3,3-d_4 → こはく酸-2,2,3,3-d_4

エタン-1,2-ジカルボン酸-d_6 → こはく酸-d_6

エタン二酸 → しゅう酸二水和物

1,2-エタンジオール → エチレングリコール

1,2-エタン-d_4-ジチオール
1,2-Ethane-d_4-dithiol

$HSCD_2CD_2SH$...98.22 ［危］4-2-III
CAS RN® ［100189-81-9］

49126-90	CDN（D-5163）	99 atom% D		500mg	￥57,200

エタンジチオール
Ethanedithiol

$HSCH_2CH_2SH$...94.20 ［危］4-2-III
CAS RN® ［540-63-6］bp146℃† mp-41℃† d(20/20℃) 1.13▲

10491-30		>98.0%(GC)	鹿特級	25g	￥5,900

エタンスルホン酸
Ethanesulfonic acid

$C_2H_5SO_3H$...110.13 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［594-45-6］ mp-17℃† d1.35†

14022-51		>95.0%(T)	鹿1級	5g	￥5,800
36604-1A	TFS（36604-0050）			5g	￥3,700
36604-2A	TFS（36604-0250）			25g	￥11,000

塩化エタンスルホニル
Ethanesulfonyl chloride

$C_2H_5SO_2Cl$...128.57 ［危］4-3-III ［変］
CAS RN® ［594-44-5］bp177℃† d1.357†

21582-1A	TFS（21582-1000）			100mL	￥6,900
21582-2A	TFS（21582-0050）			5mL	￥2,900
21582-3A	TFS（21582-0500）			50mL	￥4,200
21582-4A	TFS（21582-5000）			500mL	￥23,700

エタン-d_5-チオール
Ethane-d_5-thiol

CD_3CD_2SH...67.16 ［危］4-SI-I［労］57,57-2［PRTR］1-45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［61260-03-5］

49126-92	CDN（D-492）	98 atom% D		1g	￥88,000

エタンチオール
Ethanethiol

C_2H_5SH...62.13 ［危］4-SI-I［労］57,57-2［PRTR］1-45
CAS RN® ［75-08-1］ bp35℃† d0.839†

11786-1A	TFS（11786-5000）			500mL	￥8,000
11786-2A	TFS（11786-0500）			50mL	￥3,500

エタンチオール-SD
Ethanethiol-SD

CH_3CH_2SD...63.14 ［危］4-SI-I［労］57,57-2［PRTR］1-45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［33458-36-5］

49126-91	CDN（D-5665）	98 atom% D		5g	￥74,800

エタノール
Ethanol

危険

C_2H_5OH...46.06 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［64-17-5］ d(20℃) 0.81† Fp14℃†

14032-79	>99.9%(GC)	Primepure(M)	G	1L	￥6,300

エタノール
Ethanol

危険

C_2H_5OH...46.06 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［64-17-5］ d(20℃) 0.81† Fp14℃†

14650-08	95.0%～95.5%(Sp. Gr.)	医薬部外品原料規格	G	500mL	￥3,000
14650-84	95.0%～95.5%(Sp. Gr.)	医薬部外品原料規格	M	18L	☆

エタノール(95)
Ethanol (95)

危険

C_2H_5OH...46.06 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［64-17-5］ d(20℃) 0.81† Fp14℃†

14034-00	94.8%～95.8%(Sp. Gr.)	特級	G	500mL	￥2,700
14034-70	94.8%～95.8%(Sp. Gr.)	特級	G	3L	￥15,000
14034-80	94.8%～95.8%(Sp. Gr.)	特級	M	18L	☆
14034-02		特級(医薬品試験用)	G	500mL	￥2,900
14034-01	94.8%～95.8%(Sp. Gr.)	1級	G	500mL	￥2,600
14034-71	94.8%～95.8%(Sp. Gr.)	1級	G	3L	￥13,000
14034-81	94.8%～95.8%(Sp. Gr.)	1級	M	18L	☆
14070-08	94.8%～95.8%(Sp. Gr.)	RoHS2対応用	G	500mL	￥3,900
14034-08	94.8%～95.8%(Sp. Gr.)	鉄試験用	G	500mL	￥4,500
980-1B	94.8%～95.8%(Sp. Gr.)	分光分析用	G	500mL	￥5,300

エタノール(99.5)
Ethanol (99.5)

危険

C_2H_5OH...46.06 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［64-17-5］ bp78.5℃† mp-114.1℃† d(20/4℃) 0.789† Fp14℃†

14033-00	>99.5%(GC)	特級	G	500mL	￥2,600
14033-73	>99.5%(GC)	特級	G	1L	￥5,000
14033-70	>99.5%(GC)	特級	G	3L	￥13,000
14033-87	>99.5%(GC)	特級	M	9L	￥27,000
14033-80	>99.5%(GC)	特級	M	18L	☆
14033-02		特級(医薬品試験用)	G	500mL	￥2,900
14033-72		特級(医薬品試験用)	G	3L	￥14,000
14033-01	>99.5%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥2,400
14033-74	>99.5%(GC)	鹿1級	G	1L	￥4,700
14033-71	>99.5%(GC)	鹿1級	G	3L	￥12,000

14033-89	>99.5%(GC)	鹿1級	M	9L	￥25,000
14033-81	>99.5%(GC)	鹿1級	M	18L	☆
14033-03	>99.5%(GC)	UGR	G	500mL	￥3,500
14016-08	>99.5%(GC)	RoHS2対応用	G	500mL	￥3,400
14016-84	>99.5%(GC)	RoHS2対応用	M	18L	☆
973-1B	>99.5%(GC)	けい光分析用	G	500mL	￥6,200
14033-84	>99.5%(GC)	大量分取液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	M	18L	☆
14033-1B	>99.5%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	1L	￥5,000
14033-2B	>99.5%(GC)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	3L	￥13,000
14032-1B	>99.5%(GC)	残留農薬試験･PCB試験用(5000倍濃縮)	G	1L	￥5,800
14033-4B	>99.5%(GC)	残留農薬試験･PCB試験用(300倍濃縮)	G	1L	￥5,200
14033-5B	>99.5%(GC)	残留農薬試験･PCB試験用(300倍濃縮)	G	3L	￥14,000
14039-78	>99.5%(GC)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析用(1万倍濃縮)	G	1L	￥6,200
14039-76	>99.5%(GC)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類分析用(1万倍濃縮)	G	3L	￥17,000
14033-09	>99.5%(GC)	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ分析用	G	500mL	￥5,100
14033-08	>99.5%(GC)	ｶﾙﾎﾞﾝ酸分析計用	G	500mL	￥4,200
14032-08	>99.5%(GC)	分子生物学用	G	500mL	￥5,000

エタノール(99.5) → 無水エタノール(UE)

エタノール標準原液
Ethanol standard stock soluton

危険

C_2H_5OH...46.06 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［64-17-5］

1mg/mL 水溶液

14284-96	1mg/mL	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		5mL×5	￥9,500

エタノール CRM4001-b
Ethanol, CRM4001-b

C_2H_5OH...46.06 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［64-17-5］

Certified value:99.895±0.050%

49002-42	NMI（CRM4001-b）	認証標準物質	15mL	☆

エタノール(脱水)
Ethanol, dehydrated

危険

C_2H_5OH...46.06 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN®［64-17-5］ d(20/4℃) 0.789† Fp14℃†

water:0.005%max△

14599-05	>99.5%(GC)	Organics	G	500mL	￥5,200
14599-25	>99.5%(GC)	Organics	G	100mL	￥2,400
14599-95	>99.5%(GC)	Organics	G	3L	￥19,000
14599-85	>99.5%(GC)	Organics	S	18L	☆

エタノール-1,1-d_2
Ethanol-1,1-d_2

CH_3CD_2OH...48.08 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN®［1859-09-2］

49126-94	CDN（D-60）	99 atom% D	1g	￥35,200

エタノール-1,1-d_2-OD
Ethanol-1,1-d_2-OD

$C_2H_3D_3O$...49.08 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN®［22544-42-9］

49139-43	CDN（D-6882）	98 atom% D	500mg	￥48,400

エタノール-1,2,2,2-d_4
Ethanol-1,2,2,2-d_4

CD_3CHDOH...50.09 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN®［22544-43-0］

49126-97	CDN（D-5475）	98 atom% D	500mg	￥44,000

エタノール-1-d_1
Ethanol-1-d_1

C_2H_5DO...47.07 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［1624-36-8］

49139-42	CDN（D-6587）	98 atom% D	500mg	￥47,300

エタノール-2,2,2-d_3
Ethanol-2,2,2-d_3

CD_3CH_2OH...49.08 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［1759-87-1］

49126-95	CDN（D-209）	98 atom% D	1g	￥25,300

エタノール-2,2,2-d_3,95%溶液
Ethanol-2,2,2-d_3, 95% solution

CD_3CH_2OH...49.08 ［危］4-AL-S-II［労］57-2
CAS RN® ［1759-87-1］

95% 水溶液

49126-96	CDN（D-752）	98 atom% D	1g	￥25,300

エタノール-2-d_1
Ethanol-2-d_1

CH_2DCH_2OH...47.07 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［6181-08-4］

49126-93	CDN（D-1103）	98 atom% D	250mg	￥44,000

エタノール-d_5
Ethanol-d_5 alcohol

CD_3CD_2OH...51.09 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN® ［1859-08-1］

49127-00	CDN（D-108）	99 atom% D	5g	￥80,300

エタノール-1,1,2,2-d_4-アミン
Ethanol-1,1,2,2-d_4-amine

$HOCD_2CD_2NH_2$...65.10 ［劇］III［危］4-3-S-III［労］57-2［PRTR］1-20
CAS RN® ［85047-08-1］

49127-01	CDN（D-2321）	98 atom% D	250mg	￥39,600

エタノールアミン → 2-アミノエタノール

エタノールアミン-d_7
Ethanolamine-d_7

C_2D_7NO...68.12 ［劇］III［危］4-3-S-III［労］57-2［PRTR］1-20
CAS RN®［1219802-89-7］

49139-37	CDN（D-6816）	98 atom% D	250mg	￥68,200

エタノールアミン塩酸塩(塩酸エタノールアミン) → 2-アミノエタノール塩酸塩

エタノールアミン塩酸塩(塩酸エタノールアミン) → 2-アミノエタノール塩酸塩

エタノール-1,1,2,2-d_4-アミン塩酸塩
Ethanol-1,1,2,2-d_4-amine hydrochloride

$C_2H_4D_4ClNO$...101.56

49149-88	CDN（D-7964）	250mg	￥18,700

1-エタノール-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド → 1-(2-ヒドロキシエチル)-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド

エテホン標準品
Ethephon standard

危険

$C_2H_6ClO_3P$...144.49 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［16672-87-0］

49826-84	DES（C13230000）	残留農薬試験用	250mg	￥22,000

エテホン-d_4
Ethephon-d_4

$C_2H_2D_4ClO_3P$...148.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1020719-29-2］

49149-89	CDN（D-8055）	5mg	￥44,000

エテホン-d_4標準液
Ethephon-d_4 standard solution

$C_2H_2ClD_4O_3P$...148.51 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1020719-29-2］

100mg/L アセトン溶液

49835-39	DES（XA13230100AC）	残留農薬試験用	1mL	￥55,000

エチジムロン標準品
Ethidimuron standard

$C_7H_{12}N_4O_3S_2$...264.33 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［30043-49-3］

49803-31	DES（C13240000）	残留農薬試験用	250mg	￥18,000

17α-エチニルエストラジオール標準品
17α-Ethinylestradiol standard

$C_{20}H_{24}O_2$...296.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［57-63-6］

49867-54	DES（C13245100）	環境分析用	250mg	￥15,000

エチオフェンカルブ標準品
Ethiofencarb standard

危険

$C_{11}H_{15}NO_2S$...225.31 ［劇］III ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［29973-13-5］

49801-31	DES（C13250000）	残留農薬試験用	100mg	￥11,000

エチオフェンカルブスルホン標準品
Ethiofencarb-sulfone standard

$C_{11}H_{15}NO_4S$...257.30 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［53380-23-7］

49826-02	DES（C13250500）	残留農薬試験用	10mg	￥25,000

エチオフェンカルブスルホキシド標準品
Ethiofencarb-sulfoxide standard

$C_{11}H_{15}NO_3S$...241.30 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［53380-22-6］

49826-03	DES（CA13251000）		残留農薬試験用	10mg	￥23,000

エチオレート標準品
Ethiolate standard

$C_7H_{15}NOS$...161.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2941-55-1］

49863-57	DES（C13260000）		残留農薬試験用	100mg	￥19,000

エチオン標準品
Ethion standard

危険

$C_9H_{22}O_4P_2S_4$...384.48 ［劇］II［危］4-3-III［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［563-12-2］

49803-72	DES（CA13270000）		残留農薬試験用	250mg	￥14,000

エチオン-d_{20}標準液
Ethion-d_{20} standard solution

$C_9H_2D_{20}O_4P_2S_4$...404.61 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃

100mg/L アセトン溶液

49836-61	DES（XA13270100AC）		残留農薬試験用	1.1mL	￥43,000

D L-エチオニン
DL-Ethionine

$CH_3CH_2S(CH_2)_2CH(NH_2)COOH$...163.24
CAS RN®［67-21-0］ mp278℃(dec.)†

14511-30		>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥32,000

D L-エチオニン
DL-Ethionine

$CH_3CH_2S(CH_2)_2CH(NH_2)COOH$...163.24
CAS RN® [67-21-0] mp265℃～268℃

14617-1A	TFS（14617-0025）		2.5g	￥10,700
14617-2A	TFS（14617-0100）		10g	￥30,200
14617-3A	TFS（14617-0500）		50g	￥108,300

エチオジン標準品
Ethiozin standard

$C_9H_{16}N_4OS$...228.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [64529-56-2] mp96.4℃(dec.)▲

49864-79	DES（C13272000）	残留農薬試験用	100mg	￥28,000

エチプロール標準品
Ethiprole standard

$C_{13}H_9Cl_2F_3N_4OS$...397.20 [PRTR] 2-3 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [181587-01-9]

49830-46	DES（C13275000）	残留農薬試験用	100mg	￥14,000

エチリモール標準品
Ethirimol standard

$C_{11}H_{19}N_3O$...209.28 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23947-60-6]

49838-08	DES（C13280000）	残留農薬試験用	100mg	￥9,500

エトフメセート標準品
Ethofumesate standard

$C_{13}H_{18}O_5S$...286.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [26225-79-6]

49827-44	DES（C13290000）	残留農薬試験用	250mg	￥11,000

エトフメセート-2-ケト標準品
Ethofumesate-2-keto standard

$C_{11}H_{12}O_5S$...256.27 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [26244-33-7]

49867-18	DES（C13291000）	残留農薬試験用	10mg	￥11,000

エトフメセート代謝物M2標準品 → エトフメセート-2-ケト標準品

エトパベート標準品
Ethopabate standard

$C_{12}H_{15}NO_4$...237.25 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［59-06-3］ mp148℃～149℃†

14023-96	>98.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥7,000

エトプロホス標準品
Ethoprophos standard

危険

$CH_3CH_2OP(O)(SCH_2CH_2CH_3)_2$...242.34 ［毒］I［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［13194-48-4］

49801-32	DES（C13300000）	残留農薬試験用	100mg	￥16,000

エトプロホス標準液
Ethoprophos standard solution

危険

$CH_3CH_2OP(O)(SCH_2CH_2CH_3)_2$...242.34 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［13194-48-4］

10mg/L アセトニトリル溶液

49828-17	DES（L13300000AL）	残留農薬試験用	10mL	￥12,000

エトキシ酢酸
Ethoxyacetic acid

$C_4H_8O_3$...104.10 ［危］4-3-III
CAS RN® ［627-03-2］ d1.102▲

15986-1A	TFS（15986-0250）	25g	￥19,800
15986-2A	TFS（15986-1000）	100g	￥58,700

4′-エトキシアセトフェノン
4′-Ethoxyacetophenone

$C_{10}H_{12}O_2$...164.20
CAS RN® ［1676-63-7］ mp35℃～38℃▲

40959-1A	TFS（40959-1000）	100g	￥38,800
40959-2A	TFS（40959-0050）	5g	￥4,000

3-エトキシアクリル酸
3-Ethoxyacrylic acid

$C_5H_8O_3$...116.11
CAS RN® [6192-01-4] mp109℃～111℃▲

49256-96	TFS（RH00924DE）	95%	5g	￥61,700
49256-97	TFS（RH00924DA）	95%	1g	￥20,600

エトキシアミン塩酸塩
Ethoxyamine hydrochloride

$C_2H_5ONH_2$･HCl...97.54
CAS RN® [3332-29-4] mp123℃†

40961-1A	TFS（40961-0100）		10g	￥24,500
40961-3A	TFS（40961-0250）		25g	￥50,800

エトキシ-d_5-アミン塩酸塩
Ethoxy-d_5-amine hydrochloride

$CD_3CD_2ONH_2$･HCl...66.11
CAS RN® [118087-07-3]

49146-30	CDN（D-5298）	99 atom% D	100mg	￥47,300

o-エトキシアニリン → *o*-フェネチジン

p-エトキシアニリン → *p*-フェネチジン

4-エトキシベンズアルデヒド
4-Ethoxybenzaldehyde

$C_9H_{10}O_2$...150.17 ［危］4-3-III
CAS RN® [10031-82-0] bp255℃▲ mp13℃～14℃▲ d1.0800▲

17425-1A	TFS（17425-0250）		25g	￥4,400
17425-2A	TFS（17425-0050）		5g	￥2,100
17425-3A	TFS（17425-1000）		100g	￥12,700

2-エトキシベンズアミド
2-Ethoxybenzamide

$C_2H_5OC_6H_4CONH_2$...165.18
CAS RN®［938-73-8］ mp132℃～133℃▲

11787-1A	TFS（11787-0050）		5g	￥2,500
11787-2A	TFS（11787-1000）		100g	￥9,100

エトキシベンゼン → フェネトール

7-エトキシベンゾフラン-2-カルボン酸
7-Ethoxybenzofuran-2-carboxylic acid

$C_{11}H_{10}O_4$...206.19
CAS RN®［206559-61-7］ mp195℃～199℃▲

35639-1A	TFS（35639-0010）		1g	￥6,300

2-エトキシ安息香酸
2-Ethoxybenzoic acid

$C_9H_{10}O_3$...166.17 ［危］4-3-III
CAS RN®［134-11-2］

14144-02	>95.0%(HLC)	G	500mL	￥19,500

エトキシぎ酸クロリド → クロロぎ酸エチル

N-エトキシカルボニル-2-エトキシ-1,2-ジヒドロキノリン → EEDQ

3-エトキシカルボニル-4-フルオロフェニルボロン酸
3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid

$C_9H_{10}BFO_4$...211.98 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［874219-36-0］

14244-65	>97.0%(HLC)	G	1g	￥6,000

4-エトキシカルボニル-3-フルオロフェニルボロン酸
4-Ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid

警告

$C_9H_{10}BFO_4$...211.98 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［874288-38-7］

14662-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥21,000
14662-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥7,000

3-(エトキシカルボニル)-5-ニトロフェニルボロン酸
3-(Ethoxycarbonyl)-5-nitrophenylboronic acid

$C_9H_{10}BNO_6$...238.99 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［850568-37-5］

14263-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥31,000
14263-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥9,500

4-(エトキシカルボニル)-2-ニトロフェニルボロン酸
4-(Ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronic acid

$C_9H_{10}BNO_6$...238.99 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［5785-70-6］

14264-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥31,000
14264-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥9,500

2-(エトキシカルボニル)フェニルボロン酸
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid

警告

$C_9H_{11}BO_4$...193.99 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［380430-53-5］

14663-55	>97.0%(T)	Organics	G	5g	￥15,500
14663-65	>97.0%(T)	Organics	G	1g	￥5,800

4-(エトキシカルボニル)フェニルボロン酸
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid

警告

$C_9H_{11}BO_4$...193.99 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［4334-88-7］ mp184℃～189℃▲

14678-55	>98.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥16,500
14678-65	>98.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥5,800
36779-1A TFS（36779-0050）				5g	￥16,200
36779-2A TFS（36779-0010）				1g	￥5,400

3-(エトキシカルボニル)フェニルボロン酸ピナコールエステル
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester

$C_{15}H_{21}BO_4$...276.13 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［269410-00-6］

14266-55	>97.0%(GC)	Organics	G	5g	￥24,000
14266-65	>97.0%(GC)	Organics	G	1g	￥8,500

N-[(*S*)-(+)-1-エトキシカルボニル)-3-フェニルプロピル]-*L*-アラニン
N-[(*S*)-(+)-1-Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-*L*-alanine

$C_{15}H_{21}NO_4$...279.33
CAS RN® ［82717-96-2］ mp148℃～153℃▲

33225-1A TFS（33225-0010）				1g	￥2,900

N-エトキシカルボニル-3-ピロリドン
N-Ethoxycarbonyl-3-pyrrolidone

$C_7H_{11}NO_3$...157.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［14891-10-2］

14253-62	>95.0%(GC)		G	1g	￥12,000

7-エトキシ-d_5-クマリン
7-Ethoxy-d_5-coumarin

$C_{11}H_5D_5O_3$...195.22
CAS RN® ［1189956-39-5］

49139-38 CDN（D-6860）	99 atom% D			100mg	￥61,600

(±)-2-エトキシシクロヘキサノン
(±)-2-Ethoxycyclohexanone

$C_2H_5OC_6H_9(:O)$...142.19 ［危］4-2-III
CAS RN® ［33371-97-0］bp85℃(15mm)▲ d1.002▲

31466-1A	TFS（31466-0050）	5g	￥9,700

3-エトキシ-2-シクロヘキセン-1-オン
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one

$C_2H_5OC_6H_7(:O)$...140.17 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［5323-87-5］bp76℃～78℃(15mm)▲ d1.044▲

11788-1A	TFS（11788-0100）	10g	￥5,700
11788-2A	TFS（11788-0250）	25g	￥10,900

(1-エトキシシクロプロポキシ)トリメチルシラン
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane

警告

$C_8H_{18}O_2Si$...174.31 ［危］4-2-III
CAS RN® ［27374-25-0］

14676-32	>92.0%(GC)		G	25mL	￥9,500
14676-52	>92.0%(GC)		G	5mL	￥4,100

(1-エトキシシクロプロポキシ)トリメチルシラン
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane

警告

$C_8H_{18}O_2Si$...174.31 ［危］4-2-III
CAS RN® ［27374-25-0］bp50℃～53℃ d0.867 Fp26℃

36890-1A	TFS（36890-0050）	5g	￥15,000
36890-2A	TFS（36890-0250）	25g	￥49,600

4-エトキシ-2,3-ジフルオロフェニルボロン酸
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylboronic acid

$C_8H_9BF_2O_3$...201.96 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［212386-71-5］

13772-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥38,000
13772-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥11,000

2-エトキシエタノール
2-Ethoxyethanol

危険

$CH_3CH_2OCH_2CH_2OH$...90.12 ［危］4-2-S-III［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-57
CAS RN® ［110-80-5］bp135℃† mp-70℃† d(20/20℃) 0.931† Fp45℃†

14124-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥1,700
14124-70	>98.0%(GC)	鹿特級	G	3L	￥8,000
14124-80	>98.0%(GC)	鹿特級	M	15kg	☆
14124-01	>96.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥1,300
14124-81	>96.0%(GC)	鹿1級	M	15kg	☆

2-エトキシエタノール-1,1,2,2-d_4
2-Ethoxyethanol-1,1,2,2-d_4

$C_4H_6D_4O_2$...94.14 ［危］4-2-S-III［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-57

49139-39	CDN（D-6139）	98 atom% D	500mg	￥57,200

2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol

危険

$HOCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_3$...134.17 ［危］4-3-S-III
CAS RN® ［111-90-0］bp196℃† d(20/20℃) 0.986† Fp94℃†

10236-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥1,500
10236-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,300

2-(2-エトキシエトキシ)エタノール-d_1
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol-d_1

$C_6H_{13}DO_3$...135.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［37421-08-2］

17290-1A	TFS（17290-0500）	50g	￥51,400

エトキシエチレン → エチルビニルエーテル

(1-エトキシエチリデン)マロノニトリル
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile

$CH_3C(OC_2H_5):C(CN)_2$...136.15 ［劇］III
CAS RN® ［5417-82-3］ mp90℃～92℃▲

17029-1A	TFS（17029-0250）			25g	￥18,900
17029-2A	TFS（17029-1000）			100g	￥55,800

2-エトキシ-4-フルオロフェニルボロン酸
2-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid

$C_8H_{10}BFO_3$...183.97 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［480438-58-2］

14261-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥31,000
14261-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥9,500

2-エトキシ-5-フルオロフェニルボロン酸
2-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid

警告

$C_8H_{10}BFO_3$...183.97 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［864301-27-9］ mp108℃～113℃†

14664-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥20,000
14664-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥6,800

4-エトキシ-3-フルオロフェニルボロン酸
4-Ethoxy-3-fluorophenylboronic acid

警告

$C_8H_{10}BFO_3$...183.97 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［279263-10-4］

14665-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥10,500
14665-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,200

5-エトキシ-2-フルオロフェニルボロン酸
5-Ethoxy-2-fluorophenylboronic acid

$C_8H_{10}BFO_3$...183.97 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［900174-60-9］

14245-65	>97.0%(HLC)		G	1g	￥6,000

4-エトキシ-2-ホルミルフェニルボロン酸
4-Ethoxy-2-formylphenylboronic acid

$C_9H_{11}BO_4$...193.99 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［1106867-72-4］

14246-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥43,000
14246-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥10,500

3-エトキシ-4-ヒドロキシベンズアルデヒド
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde

$C_9H_{10}O_3$...166.17
CAS RN® ［121-32-4］ mp76℃～79℃▲

15603-1A	TFS（15603-1000）		100g	￥3,800
15603-2A	TFS（15603-0050）		5g	￥2,600

3-エトキシメタクロレイン
3-Ethoxymethacrolein

$C_6H_{10}O_2$...114.14 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［42588-57-8］ d0.96▲

21399-2A	TFS（21399-0100）	tech.	10g	￥41,900
21399-1A	TFS（21399-0010）	tech.	1g	￥8,400

4-エトキシ-3-メトキシベンズアルデヒド
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde

$C_2H_5OC_6H_3(OCH_3)CHO$...180.20
CAS RN® ［120-25-2］ mp59℃～60℃▲

11791-1A	TFS（11791-0250）	25g	￥19,400

4-エトキシ-3-メトキシベンジルアルコール
4-Ethoxy-3-methoxybenzyl alcohol

$C_{10}H_{14}O_3$...182.21
CAS RN® ［61813-58-9］ mp54℃～59℃▲

18302-1A	TFS（18302-0100）	10g	￥25,600

エトキシメチレンマロノニトリル
Ethoxymethylenemalononitrile

$C_2H_5OCH:C(CN)_2$...122.12 ［劇］III
CAS RN® ［123-06-8］ bp160℃(12mm)▲ mp64℃～66℃▲

11792-3A	TFS（11792-1000）			100g	￥16,000

3-(エトキシメチレン)-2,4-ペンタンジオン
3-(Ethoxymethylene)-2,4-pentanedione

$C_8H_{12}O_3$...156.17
CAS RN® ［33884-41-2］

38220-1A	TFS（38220-0010）			1g	￥9,900

2-エトキシ-5-メチルフェニルボロン酸
2-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid

$C_9H_{13}BO_3$...180.01 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［123291-97-4］

14247-55	>97.0%(HLC)		G	5g	￥16,000
14247-65	>97.0%(HLC)		G	1g	￥5,000

4-エトキシ-2-メチルフェニルボロン酸
4-Ethoxy-2-methylphenylboronic acid

$C_9H_{13}BO_3$...180.01 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［313545-31-2］

14262-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥30,000
14262-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥9,000

4-エトキシ-3-メチルフェニルボロン酸
4-Ethoxy-3-methylphenylboronic acid

$C_9H_{13}BO_3$...180.01 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［850568-08-0］

14260-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥34,000
14260-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥10,000

1-エトキシナフタレン
1-Ethoxynaphthalene

$C_{12}H_{12}O$...172.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［5328-01-8］ bp280℃▲ d1.06▲

18532-1A	TFS（18532-0250）	25g	￥40,100

p-エトキシフェノール
p-Ethoxyphenol

警告

$C_2H_5OC_6H_4OH$...138.16
CAS RN® ［622-62-8］ bp246℃～247℃†

14674-32	>98.0%(GC)	25g	￥2,400
40967-1A	TFS（40967-0250）	25g	￥5,800
40967-2A	TFS（40967-0050）	5g	￥2,200

4-(4-エトキシフェニルアゾ)-*m*-フェニレンジアミン一塩酸塩
4-(4-Ethoxyphenylazo)-*m*-phenylenediamine monohydrochloride

$C_{14}H_{16}N_4O$·HCl...292.76 ［危］5-AZ-1-I
CAS RN® ［74367-87-6］ mp215℃▲

40968-1A	TFS（40968-0100）	10g	￥26,900

2-エトキシフェニルボロン酸
2-Ethoxyphenylboronic acid

警告

$C_8H_{11}BO_3$...165.98 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［213211-69-9］ mp97℃～102℃▲

14248-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥12,500
14248-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,300
37767-1A	TFS（37767-0100）			10g	￥28,200

3-エトキシフェニルボロン酸
3-Ethoxyphenylboronic acid

警告

$C_8H_{11}BO_3$...165.98 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［90555-66-1］ mp139℃～146℃†

14666-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥10,000
14666-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥4,000

4-エトキシフェニルボロン酸
4-Ethoxyphenylboronic acid

警告

$C_8H_{11}BO_3$...165.98 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［22237-13-4］ mp121℃～128℃▲

35931-2A	TFS（35931-0010）			1g	￥6,800

5-(2-エトキシフェニル)-1-メチル-3-*n*-プロピル-1,6-ジヒドロ-7*H*-ピラゾロ[4,3-d]-7-ピリミジノン
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-*n*-propyl-1,6-dihydro-7*H*-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone

$C_{17}H_{20}N_4O_2$...312.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［139756-21-1］

14113-32	>95.0%(HLC)		G	25g	￥10,000
14113-52	>95.0%(HLC)		G	5g	￥4,000

1-エトキシ-2-プロパノール
1-Ethoxy-2-propanol

$C_5H_{12}O_2$...104.14 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1569-02-4］ bp132℃▲ d0.897▲

25905-1A	TFS（25905-0010）			1L	￥21,000
25905-2A	TFS（25905-0025）			2.5L	￥28,000

3-エトキシプロピルアミン
3-Ethoxypropylamine

危険

$C_2H_5OCH_2CH_2CH_2NH_2$...103.16 ［危］4-2-S-III
CAS RN® ［6291-85-6］ bp136℃～138℃† d0.861†

14615-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,100

2-エトキシピリジン
2-Ethoxypyridine

警告

C_7H_9NO...123.15 ［危］4-2-III
CAS RN® ［14529-53-4］

14169-52	>98.0%(GC)		G	5g	￥7,000
14169-62	>98.0%(GC)		G	1g	￥4,000

2-エトキシピリジン-5-ボロン酸
2-Ethoxypyridine-5-boronic acid

$C_7H_{10}BNO_3$...166.97 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［612845-44-0］

14265-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥22,000
14265-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥7,500

エトキシキン標準品
Ethoxyquin standard

危険

$C_{14}H_{19}NO$...217.30 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［91-53-2］

49801-33	DES（CA13310000）	残留農薬試験用		250mg	￥11,000

エトキシスルフロン標準品
Ethoxysulfuron standard

$C_{15}H_{18}N_4O_7S$...398.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［126801-58-9］

49829-82	DES（C13311000）	残留農薬試験用		100mg	￥25,000

3-エトキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

$C_9H_{10}BF_3O_3$...233.98 ［PRTR］1-405 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［871332-96-6］

14249-65		>97.0%(HLC)		1g	￥14,000

6-エトキシ-2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン標準品 → エトキシキン標準品

エトキシトリメチルシラン
Ethoxytrimethylsilane

$C_5H_{14}OSi$...118.24 ［危］4-1-II
CAS RN® ［1825-62-3］ bp75℃～76℃▲ d0.75▲

31382-1A	TFS（31382-0250）			25g	￥3,900
31382-2A	TFS（31382-0050）			5g	￥2,200

エチクロゼート標準品
Ethychlozate standard

危険

$C_{11}H_{11}ClN_2O_2$...238.66 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［27512-72-7］ mp76.6℃～78.1℃†

14634-96		>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	200mg	￥20,000
49866-96	DES（C13315000）		残留農薬試験用	100mg	￥36,000

エチクロゼート(フリーアシッド)標準品
Ethychlozate (free acid) standard

$C_9H_7N_2O_2Cl$...210.61 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［27328-68-3］

49867-17	DES（C13315200）		残留農薬試験用	25mg	￥29,000

エチクロゼート代謝物B標準品 → エチクロゼート(フリーアシッド)標準品

エチラール → ジエトキシメタン

エチルアルコール → エタノール

エチルアルコール → エタノール

エチルアルコール(95) → エタノール(95)

エチルアルコール(99.5) → エタノール(99.5)

エチルアルコール(99.5) → 無水エタノール(UE)

エチルアルコール標準原液 → エタノール標準原液

エチルアルコール CRM4001-b → エタノール CRM4001-b

エチルアルコール(脱水) → エタノール(脱水)

70%エチルアミン溶液
70% Ethylamine solution

危険

$CH_3CH_2NH_2$...45.08 ［危］4-SI-S-I［労］57,57-2
CAS RN® ［75-04-7］bp38℃† Fp-24℃†

14041-02	68.0%～72.0%(T)	G	500mL	￥2,800
14041-32	68.0%～72.0%(T)	G	25mL	￥1,900

エチル-2,2,2-d_3-アミン塩酸塩
Ethyl-2,2,2-d_3-amine hydrochloride

$CD_3CH_2NH_2$·HCl...84.56
CAS RN® ［64585-12-2］

49127-05 CDN（D-1968）	98 atom% D		250mg	￥55,000

エチルアミン塩酸塩
Ethylamine hydrochloride

$C_2H_5NH_2$･HCl...81.54
CAS RN® [557-66-4] mp105℃～108℃

21425-1A	TFS（21425-0025）		2.5kg	￥59,400
21425-3A	TFS（21425-5000）		500g	￥12,900

エチル-d_5-アミン塩酸塩
Ethyl-d_5-amine hydrochloride

$CD_3CD_2NH_2$･HCl...86.57
CAS RN® [284474-81-3]

49127-06	CDN（D-16）	99 atom% D	1g	￥91,300

2-エチルアミノエタノール
2-Ethylaminoethanol

危険

$C_2H_5NHCH_2CH_2OH$...89.13 ［危］4-3-S-III
CAS RN® [110-73-6] bp169℃～170℃† mp-90℃† d(20℃) 0.914† Fp71℃†

14047-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥8,500
14047-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,900

2-エチルアミノエタノール
2-Ethylaminoethanol

危険

$C_2H_5NHCH_2CH_2OH$...89.13 ［危］4-3-S-III
CAS RN® [110-73-6] bp169℃～170℃† mp-90℃† d(20℃) 0.914† Fp71℃†

14047-76	>98.0%(GC)	ｱﾙｶﾘﾌｫｽﾌｧﾀｰｾﾞ測定用	G	3L	☆

2-エチルアミノエタノール
2-Ethylaminoethanol

危険

$C_2H_5NHCH_2CH_2OH$...89.13 ［危］4-3-S-III
CAS RN® [110-73-6] bp167℃ mp6℃ d0.91 Fp78℃

16873-1A	TFS（16873-0010）		1kg	￥7,800

(±)-2-(エチル-d_5-アミノ)プロピオフェノン塩酸塩
(±)-2-(Ethyl-d_5-amino)propiophenone hydrochloride

$C_6H_5COCH(CH_3)NHCD_2CD_3$·HCl...182.27
CAS RN® [1189879-32-0]

49146-31	CDN（D-7094）	99 atom% D	50mg	￥61,600

3-エチルアニリン
3-Ethylaniline

$C_2H_5C_6H_4NH_2$...121.17 ［危］4-3-III
CAS RN® [587-02-0] bp212℃▲ mp-8℃▲ d0.975▲

17455-1A	TFS（17455-0100）	10g	￥8,200
17455-2A	TFS（17455-0500）	50g	￥28,500

4-エチルアニリン-d_{11}
4-Ethylaniline-d_{11}

$C_8D_{11}N$...132.24 ［危］4-3-III
CAS RN® [1219802-96-6]

49139-46	CDN（D-6036）	98 atom% D	500mg	￥61,600

N-エチルアニリン
N-Ethylaniline

危険

$C_6H_5NHC_2H_5$...121.17 ［劇］III ［危］4-3-III ［PRTR］2-9
CAS RN® [103-69-5] bp206℃† mp-63℃† d(20℃) 0.963† Fp85℃†

14049-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥2,900
14049-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,500

o-エチルアニリン
o-Ethylaniline

警告

$C_2H_5C_6H_4NH_2$...121.17 ［危］4-3-III
CAS RN® [578-54-1] bp214℃† mp-44℃† d(20/20℃) 0.98▲

14050-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥4,100
11805-1A	TFS（11805-2500）			250g	￥6,000
11805-3A	TFS（11805-0050）			5g	￥4,600
11805-2A	TFS（11805-0010）			1kg	￥21,400

p-エチルアニリン
p-Ethylaniline

警告

$C_2H_5C_6H_4NH_2$...121.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［589-16-2］ bp216℃† mp-5℃† d(20/20℃) 0.97▲

14516-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥5,100
11806-1A	TFS（11806-5000）				500g	￥22,100
11806-2A	TFS（11806-0050）				5g	￥3,600
11806-3A	TFS（11806-1000）				100g	￥5,900

N-エチルアニリン臭化水素酸塩
N-Ethylaniline hydrobromide

［劇］III

49009-65	昭化（0507-2350）				500g	￥140,000
49009-66	昭化（0507-1380）				15kg	☆

N-エチルアニリン塩酸塩
N-Ethylaniline hydrochloride

$C_6H_5NHC_2H_5$･HCl...157.63 ［劇］III
CAS RN® ［4348-19-0］ mp172℃～175℃▲

49008-34	昭化（0507-4150）	98.5%			500g	￥139,400
49008-35	昭化（0507-4380）	98.5%			15kg	☆

エチルベンゼン
Ethylbenzene

危険

$C_2H_5C_6H_5$...106.16 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53
CAS RN® ［100-41-4］ bp136.25℃† mp-95℃† d(25/25℃) 0.866† Fp21℃†

14052-00		>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥1,300
9635-1M	M（1.09635.0005）		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		5mL	￥27,900

エチルベンゼン
Ethylbenzene

危険

$C_2H_5C_6H_5$...106.16 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53
CAS RN®［100-41-4］bp136℃ mp95℃ d0.86 Fp15℃

11808-2A	TFS（11808-0025）		2.5L	￥17,600
11808-3A	TFS（11808-0250）		25mL	￥3,200
11808-4A	TFS（11808-5000）		500mL	￥5,300

エチルベンゼン標準品
Ethylbenzene standard

危険

$C_2H_5C_6H_5$...106.16 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［100-41-4］bp136.25℃† d(25/25℃) 0.866†

49827-89	DES（C13320000）	環境分析用	1mL	￥15,000

エチルベンゼン CRM4021-a
Ethylbenzene, CRM4021-a

$C_2H_5C_6H_5$...106.16 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［100-41-4］

Certified value:99.88±0.03%

49002-49	NMI（CRM4021-a）	認証標準物質	15mL	☆

エチルベンゼン-2,3,4,5,6-d_5
Ethylbenzene-2,3,4,5,6-d_5

$C_6D_5CH_2CH_3$...111.19 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53
CAS RN®［20302-26-5］

49127-13	CDN（D-1903）	98 atom% D	1g	￥35,200

エチルベンゼン-d_{10}(重水素化率99%以上)
Ethylbenzene-d_{10}, 99+ atom % D

$C_6D_5C_2D_5$...116.22 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53
CAS RN®［25837-05-2］bp134.5℃▲ d0.94▲

32136-1A	TFS（32136-0010）		1mL	￥7,700

エチル-d_5-ベンゼン
Ethyl-d_5-benzene

$C_6H_5CD_2CD_3$...111.19 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53
CAS RN® ［38729-11-2］

49127-12	CDN（D-5381）	98 atom% D	1g	￥39,600

エチル-α,α-d_2-ベンゼン
Ethyl-α,α-d_2-benzene

$C_6H_5CD_2CH_3$...108.17 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53
CAS RN® ［1861-01-4］

49127-10	CDN（D-1905）	98 atom% D	500mg	￥57,200

エチル-α,α-d_2-ベンゼン-d_5
Ethyl-α,α-d_2-benzene-d_5

$C_6D_5CD_2CH_3$...113.20 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53
CAS RN® ［84272-90-2］

49127-14	CDN（D-1904）	98 atom% D	250mg	￥52,800

エチル-β,β,β-d_3-ベンゼン
Ethyl-β,β,β-d_3-benzene

$C_6H_5CH_2CD_3$...109.18 ［危］4-2-III［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-53
CAS RN® ［2618-00-0］

49127-11	CDN（D-5452）	96 atom% D	1g	￥48,400

エチルベンゼンボロン酸 → 2-エチルフェニルボロン酸

4-エチル安息香酸
4-Ethylbenzoic acid

警告

$C_9H_{10}O_2$...150.17
CAS RN® ［619-64-7］

14237-32	>98.0%(HLC)	G	25g	￥10,500
14237-52	>98.0%(HLC)	G	5g	￥3,500

4-エチルベンゾイルクロリド
4-Ethylbenzoyl chloride

$C_2H_5C_6H_4COCl$...168.61 ［危］4-3-III
CAS RN® ［16331-45-6］ bp235℃～236℃▲ d1.147▲

30573-1A	TFS（30573-0050）		5g	￥7,900

N-エチルベンジルアミン
N-Ethylbenzylamine

$C_9H_{13}N$...135.20 ［危］4-2-III
CAS RN® ［14321-27-8］ bp191℃～194℃▲ d0.90▲

34371-1A	TFS（34371-0250）		25g	￥5,000
34371-2A	TFS（34371-1000）		100g	￥12,700

4-エチルビフェニル-4′-カルボン酸
4-Ethylbiphenyl-4′-carboxylic acid

$C_{15}H_{14}O_2$...226.26
CAS RN® ［5731-13-5］ mp220℃～222℃▲

24048-1A	TFS（24048-0050）		5g	￥16,800

4′-エチルビフェニル-4-オール
4′-Ethylbiphenyl-4-ol

$C_{14}H_{14}O$...198.25
CAS RN® ［21345-28-8］

14192-52	>95.0%(HLC)		5g	￥15,000
14192-62	>95.0%(HLC)		1g	￥5,400

エチルボロン酸
Ethylboronic acid

警告

$C_2H_7BO_2$...73.88 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［4433-63-0］

14250-35	>95.0%(GC)	Organics		25g	￥25,000
14250-55	>95.0%(GC)	Organics		5g	￥7,500
37086-1A	TFS（37086-0010）			1g	￥8,000

N-エチル-*n*-ブチルアミン
N-Ethyl-*n*-butylamine

$CH_3(CH_2)_3NHC_2H_5$...101.19 ［危］4-1-II
CAS RN® ［13360-63-9］ bp108℃▲ d0.74▲

15823-1A	TFS（15823-2500）		250g	￥7,200

塩化2-エチルブチリル
2-Ethylbutyryl chloride

$(C_2H_5)_2CHCOCl$...134.60
CAS RN® ［2736-40-5］ bp138℃▲ d0.983▲

40982-1A	TFS（40982-1000）		100g	￥28,700
40982-2A	TFS（40982-0050）		5g	￥4,300

N-エチル-3-カルバゾールカルボキシアルデヒド
N-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde

$C_{15}H_{13}NO$...223.26 ［変］ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［7570-45-8］ mp85℃～87℃▲

16603-1A	TFS（16603-0250）	tech.	25g	￥16,000
16603-2A	TFS（16603-1000）	tech.	100g	￥42,900

エチルカルビトール → 2-(2-エトキシエトキシ)エタノール

エチルセロソルブ → 2-エトキシエタノール

エチルセルロース(10cP)
Ethyl cellulose(10cP)

CAS RN® ［9004-57-3］

ethoxy content:48.0%～49.5%△

14076-01	鹿1級	C	500g	￥9,500
14076-31	鹿1級	G	25g	￥1,800

エチルセルロース(45cP)
Ethyl cellulose(45cP)

CAS RN® [9004-57-3]

ethoxy content:48.0%～49.5%△

14543-01	鹿1級	C	500g	￥9,000
14543-31	鹿1級	G	25g	￥1,800

エチルセルロース(100cP)
Ethyl cellulose(100cP)

CAS RN® [9004-57-3]

ethoxy content:48.0%～49.5%△

14544-01	鹿1級	C	500g	￥10,500
14544-31	鹿1級	G	25g	￥2,000

エチルセルロース10cP
Ethyl cellulose 10cP

CAS RN® [9004-57-3]

19096-2A	TFS（19096-2500）	250g	￥10,200
19096-3A	TFS（19096-5000）	500g	￥18,800

エチルセルロース22cP
Ethyl cellulose 22cP

CAS RN® [9004-57-3]

ethoxy content:48%

19097-1A	TFS（19097-2500）	250g	￥10,500
19097-2A	TFS（19097-5000）	500g	￥15,400

エチルセルロース300cP
Ethyl cellulose 300cP

CAS RN®［9004-57-3］

ethoxy content:48%

23270-1A	TFS（23270-5000）		500g	￥18,100

6-エチルクリセン標準品
6-Ethylchrysene standard

$C_{20}H_{16}$...256.33
CAS RN®［2732-58-3］

49797-04	ACC（H-264N）	環境分析用	10mg	￥7,500

エチルシクロヘキサン
Ethylcyclohexane

$C_6H_{11}C_2H_5$...112.21 ［危］4-1-II
CAS RN®［1678-91-7］bp130℃～132℃† d0.788†

11831-1A	TFS（11831-1000）		100mL	￥13,300
11831-2A	TFS（11831-0250）		25mL	￥4,500

t r a n s-4-エチルシクロヘキサンカルボン酸
trans-4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid

$C_9H_{16}O_2$...156.22
CAS RN®［6833-47-2］

14007-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,500
14007-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,100

エチル4,4′-ジクロロベンジレート標準品 → クロロベンジレート標準品

N-エチルジシクロヘキシルアミン
N-Ethyldicyclohexylamine

$C_{14}H_{27}N$...209.37
CAS RN®［7175-49-7］ d0.9000▲

31473-1A	TFS（31473-0050）		5g	￥7,700

N-エチルジエタノールアミン
N-Ethyldiethanolamine

警告

$C_6H_{15}NO_2$...133.18 ［危］4-3-III ［化兵］-2
CAS RN® ［139-87-7］

14234-02	>98.0%(GC)		500mL	￥5,000
14234-32	>98.0%(GC)		25mL	￥2,700

N-エチルジイソプロピルアミン
N-Ethyldiisopropylamine

危険

$[(CH_3)_2CH]_2NC_2H_5$...129.24 ［危］4-1-II
CAS RN® ［7087-68-5］ bp127℃† mp<-50℃† d0.752～0.758△ Fp10℃†

14338-02	>98.0%(GC)		500mL	￥12,000
14338-32	>98.0%(GC)		25mL	￥3,300

1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩
1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride

警告

$(CH_3)_2NCH_2CH_2CH_2N{:}C{:}NC_2H_5$·HCl...191.70 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［25952-53-8］ mp112℃～116℃△

11078-60		>98.0%(T)	鹿特級	1g	￥6,800
17144-1A	TFS（17144-0100）			10g	￥17,000
17144-2A	TFS（17144-0010）			1g	￥4,000
17144-3A	TFS（17144-0500）			50g	￥62,500
17144-4A	TFS（17144-1000）			100g	￥108,200
17144-5A	TFS（17144-5000）			500g	￥398,800

1-エチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_9H_{13}F_6N_3O_4S_2$...405.34
CAS RN® ［174899-90-2］

49515-53	ILT（IL-0106-HP）	99%	100g	￥67,000
49515-52	ILT（IL-0106-HP）	99%	25g	￥29,000

1-エチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムブロミド
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium bromide

$C_7H_{13}BrN_2$...205.09
CAS RN® [98892-76-3] mp141℃▲

49515-55	ILT（IL-0135-HP）	99%	100g	￥37,000
49515-54	ILT（IL-0135-HP）	99%	25g	￥20,000

1-エチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate

$C_7H_{13}F_6N_2P$...270.15
CAS RN® [292140-86-4]

49515-57	ILT（IL-0139-HP）	99%	100g	￥81,000
49515-56	ILT（IL-0139-HP）	99%	25g	￥41,000

1-エチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate

$C_7H_{13}BF_4N_2$...211.99 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [307492-75-7]

49515-59	ILT（IL-0001-HP）	>98.0%	100g	￥79,000
49515-58	ILT（IL-0001-HP）	>98.0%	25g	￥39,000

1-エチル-2,3-ジメチルイミダゾリウムトリフラート
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium triflate

$C_8H_{13}F_3N_2O_3S$...274.26
CAS RN® [174899-72-0]

49515-61	ILT（IL-0002-HP）	99%	100g	￥132,000
49515-60	ILT（IL-0002-HP）	99%	25g	￥66,000

エチル *N*-(ジフェニルメチレン)グリシナート → *N*-(ジフェニルメチレン)グリシンエチルエステル

O-エチル *S*, *S*-ジフェニルホスホロジチオエート標準品 → エジフェンホス標準品

O-エチル *S*, *S*-ジプロピルホスホロジチオエート標準品 → エトプロホス標準品

O-エチル *S*, *S*-ジプロピルホスホロジチオエート標準液 → エトプロホス標準液

エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛標準品 → ジネブ標準品

[エチレンビス(オキシエチレンニトリロ)]四酢酸 → エチレンジオキシビス(エチルアミン)-*N*, *N*, *N*′, *N*′-四酢酸

エチレンビス(オキシエチレンニトリロ)四酢酸
Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid

$C_{14}H_{24}N_2O_{10}$...380.34
CAS RN® [67-42-5] mp240℃～244℃▲

40991-1A	TFS（40991-0250）	25g	￥13,000
40991-2A	TFS（40991-1000）	100g	￥34,400
40991-3A	TFS（40991-5000）	500g	￥126,200

エチレンビス(トリフェニルホスフィン)白金(0)
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)

$C_{38}H_{34}P_2Pt$...747.70 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [12120-15-9] mp129℃～132℃(dec.)▲

36936-1A	TFS（36936-2500）	250mg	￥21,500
36936-2A	TFS（36936-0010）	1g	￥61,100

エチレンブロモヒドリン → 2-ブロモエタノール

塩化エチレン → 1,2-ジクロロエタン

塩化エチレン標準原液 → 1,2-ジクロロエタン標準原液

塩化エチレン CRM4004-a → 1,2-ジクロロエタン CRM4004-a

塩化エチレン(脱水) -Super- → 1,2-ジクロロエタン(脱水) -Super-

塩化エチレン-d_4 → 1,2-ジクロロエタン-d_4

塩化エチレン-d_4標準品 → 1,2-ジクロロエタン-d_4標準品

エチレンクロロブロミド → 1-ブロモ-2-クロロエタン

エチレンクロロヒドリン → 2-クロロエタノール

エチレンシアノヒドリン → 3-ヒドロキシプロピオノニトリル

1mol/Lエチレンジアミン溶液
1mol/L Ethylenediamine solution

危険

$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot H_2O$...78.11 ［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-59
CAS RN®［107-15-3］

14608-13	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	P	250mL	￥5,100

500mg/mLエチレンジアミン溶液
500mg/mL Ethylenediamine solution

危険

$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot H_2O$...78.11 ［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-59
CAS RN®［107-15-3］

14350-96	水質試験用		2mL×5	￥6,300

エチレン-d_4-ジアミン
Ethylene-d_4-diamine

$H_2NCD_2CD_2NH_2$...64.12 ［危］4-2-III ［労］57,57-2［PRTR］1-59
CAS RN®［37164-19-5］

49127-22	CDN（D-982）	98 atom% D	500mg	￥51,700

エチレンジアミン一水和物
Ethylenediamine monohydrate

危険

$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot H_2O$...78.11 ［危］4-2-S-III［労］57,57-2［PRTR］1-59
CAS RN®［6780-13-8］bp118℃† mp10℃† d(20/4℃) 0.963†

14091-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500mL	￥6,000
14091-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25mL	￥1,800

エチレンジアミン(無水)
Ethylenediamine, anhydrous

危険

$NH_2CH_2CH_2NH_2$...60.09 ［劇］III［危］4-2-S-III［労］57,57-2［PRTR］1-59
CAS RN®［107-15-3］bp116℃～117℃† mp8.5℃† d(20℃) 0.90† Fp34℃▲

14090-00	>99.0%(T)	鹿特級	G	500mL	￥2,100
14090-30	>99.0%(T)	鹿特級	G	25mL	￥1,500
14090-70	>99.0%(T)	鹿特級	G	3L	￥7,500
14090-01	>98.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥2,000
14090-71	>98.0%(T)	鹿1級	G	3L	￥7,000

エチレンジアミン-d_8
Ethylenediamine-d_8

$D_2NCD_2CD_2ND_2$...68.14 ［危］4-2-III［労］57,57-2［PRTR］1-59
CAS RN®［34281-22-6］

49127-23	CDN（D-5548）	97 atom% D	100mg	￥52,800

エチレン-d_4-ジアミン-1-*N*- *t* -Boc
Ethylene-d_4-diamine-1-*N*-*t*-Boc

$C_7H_{12}D_4N_2O_2$...164.23 ［危］4-3-III
CAS RN®［509148-73-6］

49146-34	CDN（D-6845）	98 atom% D	100mg	￥48,400

エチレン-d_4-ジアミン二塩酸塩
Ethylene-d_4-diamine dihydrochloride

$H_2NCD_2CD_2NH_2 \cdot 2HCl$...137.04
CAS RN® [34334-71-9]

49127-24	CDN（D-3263）	98 atom% D			1g	￥74,800

エチレンジアミン二塩酸塩
Ethylenediamine dihydrochloride

$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot 2HCl$...133.01
CAS RN® [333-18-6] mp>300℃ †

14092-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,100
18765-1A	TFS（18765-5000）				500g	￥9,800
18765-3A	TFS（18765-1000）				100g	￥2,900

エチレンジアミン二塩酸塩
Ethylenediamine dihydrochloride

$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot {}_2HCl$...133.01
CAS RN® [333-18-6]

49009-67	昭化（0511-7350）				500g	￥12,000
49009-68	昭化（0511-7380）				15kg	☆

エチレンジアミン硫酸塩
Ethylenediamine sulfate

危険

$NH_2CH_2CH_2NH_2 \cdot H_2SO_4$...158.18
CAS RN® [22029-36-3]

14094-32		>95.0%(T)		G	25g	￥2,800

エチレンジアミン四酢酸
Ethylenediaminetetraacetic acid

危険

$[CH_2N(CH_2COOH)_2]_2$...292.24 [PRTR] 1-60
CAS RN® [60-00-4] mp240℃(dec.) †

14096-00		>99.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥6,900
14096-30		>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,500
14110-08		>99.0%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥8,000

エチレンジアミン四酢酸
Ethylenediaminetetraacetic acid

$C_{10}H_{16}N_2O_8$...292.24 ［PRTR］1-60
CAS RN® ［60-00-4］

8417-1M	M（1.08417.0100）	99.4%～100.6%(T)	Titriplex^R		100g	￥5,960

エチレンジアミン四酢酸-d_{16}
Ethylenediaminetetraacetic acid-d_{16}

$(DOOCCD_2)_2NCD_2CD_2N(CD_2COOD)_2$...308.34 ［PRTR］1-60
CAS RN® ［203805-96-3］

49127-27	CDN（D-5406）	98 atom% D			100mg	￥29,700

エチレンジアミン四酢酸-d_{12}
Ethylenediaminetetraacetic-d_{12} acid

$(HOOCCD_2)_2NCD_2CD_2N(CD_2COOH)_2$...304.31 ［PRTR］1-60
CAS RN® ［203806-08-0］

49127-26	CDN（D-4197）	98 atom% D			100mg	￥29,700

エチレンジアミン四酢酸二カリウム二水和物
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate

$C_{10}H_{14}N_2O_8K_2 \cdot 2H_2O$...404.45
CAS RN® ［25102-12-9］ mp272℃(dec.)†

14352-01		>97.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥11,000
14352-31		>97.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,100
20974-1A	TFS（20974-1000）				100g	￥6,100
20974-3A	TFS（20974-5000）				500g	￥26,500

エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムカルシウム *n* 水和物
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium calcium salt *n*-hydrate

$C_{10}H_{12}N_2O_8Na_2Ca \cdot nH_2O$
CAS RN® ［62-33-9］

14100-30		>90.0%(as anhydrous)(T)	鹿特級	G	25g	￥3,000

エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム銅四水和物
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium copper salt tetrahydrate

$C_{10}H_{12}N_2O_8Na_2Cu \cdot 4H_2O$...469.79 ［労］57,57-2
CAS RN® ［39208-15-6(anhydr)］

14102-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥7,500
14102-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,900

エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムマグネシウム四水和物
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt tetrahydrate

$C_{10}H_{12}N_2O_8Na_2Mg \cdot 4H_2O$...430.55
CAS RN® ［14402-88-1］

14104-30	>96.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,000

エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム二水和物 → エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物

エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate

$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$...372.23
CAS RN® ［6381-92-6］ mp252℃

14785-1A	TFS（14785-0010）	1kg	￥22,000
14785-2A	TFS（14785-0050）	5kg	￥77,500
14785-3A	TFS（14785-1000）	100g	￥6,100
14785-4A	TFS（14785-5000）	500g	￥14,900

0.01mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 → 0.01mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液

0.025mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 → 0.025mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液

0.02mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液 → 0.02mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液

0.05mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 → 0.05mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液

0.05mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液 → 0.05mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液

0.1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 → 0.1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液

0.1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液 → 0.1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液

0.1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム液(1L調製用濃縮液) → 0.1mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(1L調製用濃縮液)

0.25mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 → 0.25mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液

0.2mol/Lエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 → 0.2mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液

エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛 *n* 水和物
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt *n*-hydrate

$C_{10}H_{12}N_2O_8Na_2Zn \cdot nH_2O$ ［PRTR］1-1
CAS RN®［14025-21-9(anhydr)］

14108-30	13.0%～14.5%(as Zn)(T)	鹿特級	G	25g	￥3,200

エチレンジアミン四酢酸鉄ナトリウム三水和物
Ethylenediaminetetraacetic acid ferric sodium salt trihydrate

$C_{10}H_{12}FeN_2O_8Na \cdot 3H_2O$...421.09
CAS RN®［15708-41-5］

30468-1A	TFS（30468-2500）	250g	￥11,400
30468-2A	TFS（30468-0010）	1kg	￥39,900

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム四水和物
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt tetrahydrate

警告

$C_{10}H_{12}N_2O_8Na_4 \cdot 4H_2O$...452.23
CAS RN® [13235-36-4]

14109-00	>99.5%(T)	鹿特級	P	500g	￥5,300
14109-30	>99.5%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,200

エチレンジアミン四酢酸三カリウム二水和物
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate

$C_{10}H_{13}N_2O_8K_3 \cdot 2H_2O$...442.54
CAS RN® [17572-97-3]

14353-20	>98.0%(T)	鹿特級	G	100g	￥7,500
14353-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,500

trans-1,2-エチレンジカルボン酸 → フマル酸

二塩化エチレン標準原液 → 1,2-ジクロロエタン標準原液

二塩化エチレン CRM4004-a → 1,2-ジクロロエタン CRM4004-a

二塩化エチレン-d_4 → 1,2-ジクロロエタン-d_4

二塩化エチレン-d_4標準品 → 1,2-ジクロロエタン-d_4標準品

エチレンジグリコール → ジエチレングリコール

エチレンジニトリル → こはく酸ニトリル

(エチレンジニトリロ)四酢酸 → エチレンジアミン四酢酸

(エチレンジニトリロ)四酢酸(4H) → エチレンジアミン四酢酸

エチレンジオキシビス(エチルアミン)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-四酢酸
Ethylenedioxybis(ethylamine)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetraacetic acid (EGTA)

$[CH_2OCH_2CH_2N(CH_2COOH)_2]_2$...380.34
CAS RN® [67-42-5] mp241℃(dec.)†

14115-50	>96.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥4,100
14115-60	>96.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥2,700

2,2′-エチレンジオキシビス(エチルイミノ二酢酸) → エチレンジオキシビス(エチルアミン)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-四酢酸

3,4-エチレンジオキシチオフェン
3,4-Ethylenedioxythiophene

警告

$C_6H_6O_2S$...142.17 [危] 4-3-III [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [126213-50-1]

14089-32	>98.0%(GC)		G	25g	￥10,000
14089-52	>98.0%(GC)		G	5g	￥3,500

エチレングリコール
Ethylene glycol

危険

$HOCH_2CH_2OH$...62.06 [危] 4-3-S-III [労] 57,57-2
CAS RN® [107-21-1] bp197.6℃† mp-13℃† d(20/4℃) 1.114† Fp111.1℃†

14114-00	>99.5%(GC)	特級	G	500mL	￥1,600
14114-70	>99.5%(GC)	特級	G	3L	￥5,800
14114-80	>99.5%(GC)	特級	M	20kg	☆
14114-01	>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥1,400
14114-71	>99.0%(GC)	鹿1級	G	3L	￥5,600
14114-81	>99.0%(GC)	鹿1級	M	20kg	☆
14093-08	>99.5%(GC)	RoHS2対応用	G	500mL	￥4,600
14093-84	>99.5%(GC)	RoHS2対応用	M	20kg	☆

エチレングリコール
Ethylene glycol

危険

$HOCH_2CH_2OH$...62.06 ［危］4-3-S-III［労］57,57-2
CAS RN® ［107-21-1］bp196℃～198℃ mp13℃ d1.113 Fp116℃

14675-1A	TFS（14675-0010）	1L	￥8,400
14675-2A	TFS（14675-0025）	2.5L	￥10,900
14675-3A	TFS（14675-0250）	25L	￥97,900

エチレングリコール-$(OD)_2$
Ethylene glycol-$(OD)_2$

$DOCH_2CH_2OD$...64.08 ［危］4-3-S-III［労］57,57-2
CAS RN® ［2219-52-5］

49127-28	CDN（D-110）	98 atom% D	10g	￥46,200

エチレングリコール-d_6
Ethylene glycol-d_6

$DOCD_2CD_2OD$...68.10 ［危］4-3-S-III［労］57,57-2
CAS RN® ［15054-86-1］

49127-31	CDN（D-1155）	98 atom% D	1g	￥26,400

エチレン-d_4グリコール
Ethylene-d_4 glycol

$HOCD_2CD_2OH$...66.09 ［危］4-3-S-III［労］57,57-2
CAS RN® ［2219-51-4］

49127-30	CDN（D-339）	98 atom% D	1g	￥26,400

エチレングリコールビス(2-アミノエチルエーテル)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-四酢酸 → エチレンジオキシビス(エチルアミン)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-四酢酸

エチレングリコールジアセタート → 二酢酸エチレン

エチレングリコールジ-*n*-ブチルエーテル
Ethylene glycol di-*n*-butyl ether

警告

$CH_3(CH_2)_3OCH_2CH_2O(CH_2)_3CH_3$...174.28 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-48-1］ bp203.1℃† d(20℃) 0.837† Fp85℃†

14522-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥3,800

エチレングリコールジエチルエーテル
Ethylene glycol diethyl ether

警告

$C_2H_5OCH_2CH_2OC_2H_5$...118.17 ［危］4-2-S-III
CAS RN® ［629-14-1］ bp121.4℃† mp-74℃† d0.838～0.844△ Fp35℃†

14120-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥3,800

エチレングリコールジメチルエーテル
Ethylene glycol dimethyl ether

危険

$CH_3OCH_2CH_2OCH_3$...90.12 ［危］4-1-S-II
CAS RN® ［110-71-4］ bp82℃～83℃† mp-58℃† d0.864～0.869▲ Fp0℃†

14121-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,700
14121-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,000
14121-80	>99.0%(GC)	鹿特級	M	15kg	☆
14121-08	>99.5%(GC)	電気化学用	G	500mL	￥9,500
14121-23	>99.5%(GC)	電気化学用	G	100mL	￥4,300

エチレングリコールジメチルエーテル(脱水)
Ethylene glycol dimethyl ether, dehydrated

危険

$CH_3OCH_2CH_2OCH_3$...90.12 ［危］4-1-S-II
CAS RN® ［110-71-4］ bp82℃～83℃† d0.864～0.869△ Fp0℃†

water:0.005%max△

14122-75	>99.0%(GC)	Organics	G	3L	￥27,500

エチレングリコールジメチルエーテル(脱水) -Super-
Ethylene glycol dimethyl ether, dehydrated -Super-

危険

$CH_3OCH_2CH_2OCH_3$...90.12 ［危］4-1-S-II
CAS RN® ［110-71-4］ bp82℃～83℃† d0.864～0.869△ Fp0℃†

(Packed under Ar)、water:0.001%max

14122-05	>99.0%(GC)	Organics	G	500mL	￥10,500
14122-25	>99.0%(GC)	Organics	G	100mL	￥3,200
14122-85	>99.0%(GC)	Organics	S	15kg	☆

エチレングリコールモノアセタート → 酢酸2-ヒドロキシエチル

エチレングリコールモノアリルエーテル
Ethylene glycol monoallyl ether

警告

$C_5H_{10}O_2$...102.13 ［危］4-2-S-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［111-45-5］

14116-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥5,100
14116-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥1,800

エチレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテル → 2-*n*-ブトキシエタノール

エチレングリコールモノ-*n*-ブチルエーテルアセタート → 酢酸2-*n*-ブトキシエチル

エチレングリコールモノエチルエーテル → 2-エトキシエタノール

エチレングリコールモノエチルエーテルアセタート → 酢酸2-エトキシエチル

エチレングリコールモノ(2-エチルヘキシル)エーテル
Ethylene glycol mono(2-ethylhexyl) ether

警告

$C_{10}H_{22}O_2$...174.28 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1559-35-9］

14119-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥3,500
14119-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥1,900

エチレングリコールモノヘキシルエーテル
Ethylene glycol monohexyl ether

危険

$C_8H_{18}O_2$...146.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-25-4］

14118-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥4,900
14118-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥1,400

エチレングリコールモノメタクリレート → メタクリル酸2-ヒドロキシエチル

エチレングリコールモノメチルエーテル → 2-メトキシエタノール

エチレングリコールモノメチルエーテル(脱水) → 2-メトキシエタノール(脱水)

エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート → 酢酸2-メトキシエチル

エチレングリコールモノフェニルエーテル → 2-フェノキシエタノール

エチレンチオ尿素-d_4
Ethylene-d_4 thiourea

$C_3H_2D_4N_2S$...106.18 ［労］57-2［PRTR］1-42
CAS RN® ［352431-28-8］

49127-32	CDN（D-5348）	98 atom% D	100mg	￥39,600

エチレンチオ尿素 → 2-イミダゾリジンチオン

エチレンチオ尿素標準品
Ethylenethiourea standard

危険

$C_3H_6N_2S$...102.16 ［労］57,57-2［PRTR］1-42 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［96-45-7］

49802-67	DES（C13330000）	残留農薬試験用	250mg	￥8,000

エチレン尿素 → 2-イミダゾリジノン

エルカ酸エチル標準品
Ethyl erucate standard

［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［37910-77-3］

49789-61	ACC（FAEE-011N）	食品分析用	100mg	￥4,500

N-エチルエタノールアミン → 2-エチルアミノエタノール

N-エチルエタノールアミン → 2-エチルアミノエタノール

エチルエーテル → ジエチルエーテル

エチルエーテル(脱水) → ジエチルエーテル(脱水)

4-エトキシ安息香酸エチル
Ethyl 4-ethoxybenzoate

$C_{11}H_{14}O_3$...194.22 ［危］4-3-III
CAS RN®［23676-09-7］ d1.071▲

34659-1A	TFS（34659-0050）		5g	￥7,100

(エトキシメチレン)シアノ酢酸エチル
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate

$C_8H_{11}NO_3$...169.17 ［劇］III
CAS RN® ［94-05-3］ mp49℃～53℃▲

11848-1A	TFS（11848-1000）	100g	￥6,800
11848-2A	TFS（11848-5000）	500g	￥27,600

(エトキシメチレン)シアノ酢酸エチル
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate

$C_8H_{11}NO_3$...169.17 ［劇］III
CAS RN® ［94-05-3］

14000-02	>95.0%(GC)	500g	￥26,000
14000-32	>95.0%(GC)	25g	￥3,800

2-エチルアセト酢酸エチル
Ethyl 2-ethylacetoacetate

警告

$C_8H_{14}O_3$...158.19 ［危］4-2-III
CAS RN® ［607-97-6］

14328-32	>95.0%(GC)	G	25g	￥10,500
14328-52	>95.0%(GC)	G	5g	￥4,100

N-エチルエチレンジアミン
N-Ethylethylenediamine

$C_4H_{12}N_2$...88.15 ［危］4-2-III
CAS RN® ［110-72-5］ bp128℃～130℃▲ d0.83▲

15555-1A	TFS（15555-0050）	5g	￥2,300
15555-2A	TFS（15555-0500）	50g	￥12,100

5-エチルインドール-2-カルボン酸エチル
Ethyl 5-ethylindole-2-carboxylate

$C_{13}H_{15}NO_2$...217.26 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［37033-94-6］

14659-62	>98.0%(GC)	G	1g	￥10,000

エチルエチニルエーテル,40%ヘキサン溶液
Ethyl ethynyl ether, 40% in hexane

C_4H_6O...70.08 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-392 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［927-80-0］ d0.718▲

30739-1A	TFS（30739-0050）	5g	￥12,600
30739-2A	TFS（30739-0010）	1g	￥4,400

2-エチルヘキサナール
2-Ethylhexanal

警告

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CHO$...128.21 ［危］4-2-III
CAS RN® ［123-05-7］ bp163℃† d(20℃) 0.820† Fp50℃†

31016-01	>95.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥15,000
31016-31	>95.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥1,800

2-エチルヘキサナール
2-Ethylhexanal

警告

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CHO$...128.21 ［危］4-2-III
CAS RN® ［123-05-7］ bp162℃～165℃ mp76℃ d0.8195 Fp50℃

41009-1A	TFS（41009-0010）	1kg	￥19,700
41009-3A	TFS（41009-2500）	250g	￥6,300

2-エチルヘキサンアルデヒド → 2-エチルヘキサナール

2-エチル-1,3-ヘキサンジオール
2-Ethyl-1,3-hexanediol

警告

$CH_3CH_2CH_2CH(OH)CH(C_2H_5)CH_2OH$...146.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［94-96-2］ bp243.2℃† mp-40℃† d(20℃) 0.94† Fp127℃†

14141-01	>97.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥8,500
14141-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥1,300
11851-1A	TFS（11851-2500）			250mL	￥4,900
11851-2A	TFS（11851-0010）			1L	￥17,600

2-エチルヘキサン酸
2-Ethylhexanoic acid

危険

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)COOH$...144.21 ［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-51
CAS RN®［149-57-5］bp226.9℃† d(20℃) 0.9077† Fp118℃†

14142-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥2,500
14142-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,300

2-エチルヘキサン酸
2-Ethylhexanoic acid

危険

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)COOH$...144.21 ［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-51
CAS RN®［149-57-5］bp228℃ mp59℃ d0.906 Fp114℃

11852-2A	TFS（11852-0011）		1kg	￥5,100
11852-3A	TFS（11852-0025）		2.5kg	￥10,900
11852-6A	TFS（11852-5000）		500g	￥3,300

2-エチルヘキサン酸-d_{15}
2-Ethylhexanoic-d_{15} acid

$CD_3(CD_2)_3CD(CD_2CD_3)COOH$...159.30 ［危］4-3-III［労］57,57-2［PRTR］1-51
CAS RN®［352431-38-0］

49127-34	CDN（D-5246）	98 atom% D	500mg	￥34,100

2-エチルヘキサノール
2-Ethylhexanol

警告

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2OH$...130.22 ［危］4-3-III
CAS RN®［104-76-7］bp184℃～185℃† mp-76℃† d(20/20℃) 0.834†

31015-01	>99.0%((GC)	鹿1級	G	500mL	￥1,400
31015-71	>99.0%((GC)	鹿1級	G	3L	￥5,300
31015-81	>99.0%((GC)	鹿1級	M	14kg	☆

2-エチルヘキサノール
2-Ethylhexanol

警告

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2OH$...130.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［104-76-7］bp184℃ mp76℃ d0.833 Fp77℃

11853-1A	TFS（11853-0010）	1L	￥4,600
11853-2A	TFS（11853-0025）	2.5L	￥8,600
11853-4A	TFS（11853-0250）	25L	￥39,300

2-エチルヘキシルアルコール → 2-エチルヘキサノール

2-エチルヘキシル-d_{17}アルコール
2-Ethylhexyl-d_{17} alcohol

C_8HOD_{17}...147.33 ［危］4-3-III
CAS RN® ［202480-75-9］

49127-35	CDN（D-5247）	98 atom% D	250mg	￥78,100

2-エチルヘキシルアルデヒド → 2-エチルヘキサナール

2-エチルヘキシルアミン
2-Ethylhexylamine

危険

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2NH_2$...129.24 ［危］4-2-III
CAS RN® ［104-75-6］bp169.1℃† mp-76℃† d0.786～0.791△ Fp50℃†

31017-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥7,500
31017-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,900

2-エチルヘキシルアミン
2-Ethylhexylamine

危険

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2NH_2$...129.24 ［危］4-2-III
CAS RN® ［104-75-6］bp169℃ mp76℃ d0.78 Fp50℃

27166-1A	TFS（27166-0010）	1L	￥12,900
27166-3A	TFS（27166-1000）	100mL	￥3,200
27166-4A	TFS（27166-2500）	250mL	￥6,200

2-エチルヘキシルアミンアジピン酸塩
2-Ethylhexylamine adipate

49009-69	昭化（0548-5350）		500g	￥136,000

2-エチルヘキシルアミン臭化水素酸塩
2-Ethylhexylamine hydrobromide

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2NH_2$･HBr...210.15
CAS RN® ［88358-65-0］ mp90℃～92℃▲

49008-39	昭化（0518-3350）	98.5%	500g	￥73,400
49008-40	昭化（0518-1389）	98.5%	15kg	☆

2-エチルヘキシルアミン塩酸塩
2-Ethylhexylamine hydrochloride

$CH_3(CH_2)_3CH(C_2H_5)CH_2NH_2$･HCl...165.70
CAS RN® ［26392-49-4］ mp116℃▲

49008-42	昭化（0518-5350）	98.5%	500g	￥136,500
49008-43	昭化（0518-4380）	98.5%	15kg	☆

2-エチルヘキシルアミンよう化水素酸塩
2-Ethylhexylamine hydroiodide

［労］57,57-2

49009-70	昭化（0518-8350）		500g	￥165,000
49009-71	昭化（0518-8380）		15kg	☆

N-エチル-*N*-ヒドロキシエチルアニリン
N-Ethyl-*N*-hydroxyethylaniline

$C_{10}H_{15}NO$...165.23
CAS RN® ［92-50-2］ bp276℃▲ mp33℃▲ d1.023▲

32522-1A	TFS（32522-1000）		100g	￥12,100

エチル2-ヒドロキシエチルスルフィド
Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide

$C_2H_5SCH_2CH_2OH$...106.18 ［危］4-3-III
CAS RN® ［110-77-0］ bp180℃～184℃▲ d1.02▲

11855-1A	TFS（11855-1000）			100g	￥6,700
11855-2A	TFS（11855-0050）			5g	￥4,500

2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol

$C_2H_5C(CH_2OH)_3$...134.17
CAS RN® ［77-99-6］ bp295℃† mp59℃†

40302-01	>98.0%(GC)	鹿1級	G	500g	￥3,300
40302-31	>98.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥1,700

2-エチル-3-ヒドロキシ-6-メチルピリジン
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine

警告

$C_8H_{11}NO$...137.17
CAS RN® ［2364-75-2］

14170-52	>98.0%(HLC)		G	5g	￥10,000
14170-62	>98.0%(HLC)		G	1g	￥4,100

1-エチル-3-ヒドロキシピペリジン
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine

$C_7H_{15}NO$...129.20
CAS RN® ［13444-24-1］

14071-52	>98.0%(GC)		G	5g	￥4,500
14071-62	>98.0%(GC)		G	1g	￥3,700

エチリデンジエチルエーテル → アセタール

1-エチルイミダゾール
1-Ethylimidazole

警告

$C_5H_8N_2$...96.13 ［危］4-3-III
CAS RN® ［7098-07-9］ d1.00▲

14140-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥26,500
14140-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥3,000

2-エチルイミダゾール
2-Ethylimidazole

$C_5H_8N_2$...96.13
CAS RN® ［1072-62-4］ bp268℃▲ mp79℃～80℃▲

21928-1A	TFS（21928-1000）	100g	￥3,100
21928-2A	TFS（21928-5000）	500g	￥9,900

1-エチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Ethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_7H_9F_6N_3O_4S_2$...377.29
CAS RN® ［353239-10-8］

49519-39	ILT（IL-0269-SG-0100）	98%	100g	￥63,000
49519-38	ILT（IL-0269-SG-0025）	98%	25g	￥36,000

1-エチルイミダゾリウムブロミド
1-Ethylimidazolium bromide

$C_5H_9BrN_2$...177.04
CAS RN® ［501693-36-3］

49519-49	ILT（IL-0276-SG-0100）	98%	100g	￥34,000
49519-48	ILT（IL-0276-SG-0025）	98%	25g	￥21,000

1-エチルイミダゾリウムクロリド
1-Ethylimidazolium chloride

$C_5H_9ClN_2$...132.59
CAS RN® ［81505-35-3］

49519-47	ILT（IL-0275-SG-0100）	98%	100g	￥30,000
49519-46	ILT（IL-0275-SG-0025）	98%	25g	￥17,000

1-エチルイミダゾリウムトリフルオロメタンスルホン酸塩
1-Ethylimidazolium trifluoromethanesulfonate

$C_6H_9F_3N_2O_3S$...246.21
CAS RN®［501693-46-5］

49519-43	ILT（IL-0271-SG-0100）	98%		100g	￥88,000
49519-42	ILT（IL-0271-SG-0025）	98%		25g	￥51,000

5-エチルインドール
5-Ethylindole

$C_{10}H_{11}N$...145.20 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［68742-28-9］

14621-97			G	500mg	￥28,000

5-エチルインドール-3-酢酸
5-Ethylindole-3-acetic acid

$C_{12}H_{13}NO_2$...203.23 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［52531-12-1］

14657-97		>99.0%(T)	G	200mg	￥15,500

5-エチルインドール-2-カルボン酸
5-Ethylindole-2-carboxylic acid

$C_{11}H_{11}NO_2$...189.21 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［37033-93-5］

14658-97		>97.0%(T)	G	500mg	￥14,000

5-エチルインドール-2-カルボン酸エチルエステル → 5-エチルインドール-2-カルボン酸エチル

エチルケトン → 3-ペンタノン

エチルケトン-1,1,1,5,5,5-d_6 → 3-ペンタノン-1,1,1,5,5,5-d_6

エチルケトン-2,2,4,4-d_4 → 3-ペンタノン-2,2,4,4-d_4

エチルケトン-d_{10} → 3-ペンタノン-d_{10}

塩化エチルマグネシウム,テトラヒドロフラン溶液
Ethylmagnesium chloride, in tetrahydrofuran

危険

C_2H_5MgCl...88.81 ［危］3-OM-2-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［2386-64-3］

air/moisture sensitive

14617-25		abt 1mol/L(T)	Organics		100mL	￥9,500

N-エチルマレイミド-d_5
N-Ethyl-d_5-maleimide

$C_6H_2D_5NO_2$...130.15
CAS RN®［360768-37-2］

49139-52	CDN（D-6141）	99 atom% D			10mg	￥37,400

N-エチルマレイミド
N-Ethylmaleimide

危険

$C_4H_2N(C_2H_5)O_2$...125.12 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［128-53-0］bp210℃▲ mp42℃～47℃△

14323-50		>98.0%(T)	鹿特級	G	5g	￥8,000
15610-1A	TFS（15610-0100）				10g	￥12,600
15610-2A	TFS（15610-0050）				5g	￥7,500
15610-3A	TFS（15610-0500）				50g	￥37,300

エチル-2,2,2-d_3-マロン酸
Ethyl-2,2,2-d_3-malonic acid

$CD_3CH_2CH(COOH)_2$...135.13
CAS RN®［70907-93-6］

49127-37	CDN（D-5145）	98 atom% D			100mg	￥49,500

エチル-d_5-マロン酸
Ethyl-d_5-malonic acid

$CD_3CD_2CH(COOH)_2$...137.14
CAS RN® [66311-22-6]

49127-38	CDN（D-5146）	98 atom% D		50mg	￥63,800

エチルマロン酸
Ethylmalonic acid

$C_5H_8O_4$...132.11
CAS RN® [601-75-2] mp109℃～114℃▲

14681-1A	TFS（14681-0100）			10g	￥12,800

エチルマロニルクロリド
Ethyl malonyl chloride

$ClCOCH_2COOCH_2CH_3$...150.55 ［危］4-2-III
CAS RN® [36239-09-5] d1.176†

17269-1A	TFS（17269-0250）	tech.		25g	￥28,700
17269-2A	TFS（17269-0050）	tech.		5g	￥7,600

N-エチル-4-メンタン-3-カルボキサミド
N-Ethyl-4-menthane-3-carboxamide

警告

$C_{13}H_{25}NO$...211.34
CAS RN® [39711-79-0] mp87℃～102℃†

14640-96	>95.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥4,100

エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム
Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt

$C_9H_9HgO_2SNa$...404.81 ［毒］II ［PRTR］1-237
CAS RN® [54-64-8] mp232℃～233℃▲

11868-1A	TFS（11868-0050）			5g	￥9,100
11868-2A	TFS（11868-0250）			25g	￥27,100
11868-3A	TFS（11868-1000）			100g	￥89,700
11868-4A	TFS（11868-5000）			500g	￥310,800

塩化エチル水銀(II)標準品
Ethylmercury(II) chloride standard

危険

CH_3CH_2HgCl...265.10 ［毒］II ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-237
CAS RN® ［107-27-7］ mp195℃ †

14627-97	>94.0%(GC)	環境分析用	G	100mg	￥9,500

4-エチル-d_5-2-メトキシフェノール
4-Ethyl-d_5-2-methoxyphenol

$C_9H_7D_5O_2$...157.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219803-12-9］

49139-53	CDN（D-6037）	98 atom% D		50mg	￥70,400

6-エチル-4-メトキシピラン-2-オン
6-Ethyl-4-methoxypyran-2-one

$C_8H_{10}O_3$...154.16
CAS RN® ［106950-13-4］

14197-52	>95.0%(HLC)		G	5g	￥15,500
14197-62	>95.0%(HLC)		G	1g	￥5,700

エチル-1,1-d_2-メチルアミン
Ethyl-1,1-d_2-methylamine

$C_3H_7D_2N$...61.12 ［危］4-SI-I ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［223459-63-0］

49139-54	CDN（D-6416）	98 atom% D		500mg	￥83,600

エチル-d_5-メチルアミン
Ethyl-d_5-methylamine

$C_3H_4D_5N$...64.14 ［危］4-SI-I ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1219804-73-5］

49139-56	CDN（D-6939）	98 atom% D		500mg	￥88,000

エチルメチル-d_3-アミン
Ethylmethyl-d_3-amine

$C_3H_6D_3N$...62.12 ［危］4-SI-I ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［223459-64-1］

49139-55	CDN（D-6704）	99 atom% D		1g	￥57,200

N-エチルメチルアミン
N-Ethylmethylamine

危険

$C_2H_5NHCH_3$...59.11 ［危］4-SI-I ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［624-78-2］ bp36℃～37℃▲ d0.688▲

14539-32		>95.0%(GC)	G	25mL	￥8,500
31468-1A	TFS（31468-0050）			5g	￥8,000

2-エチル-6-メチルアニリン標準品
2-Ethyl-6-methylaniline standard

$C_9H_{13}N$...135.20 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［24549-06-2］ bp231℃▲ mp-24℃▲ d0.968▲ Fp105℃▲

49865-66	DES（C13348000）	残留農薬試験用		250mg	￥12,000

2-エチル-6-メチルアニリン-d_{13}
2-Ethyl-6-methylaniline-d_{13}

$C_9D_{13}N$...148.28 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219794-93-0］

49127-39	CDN（D-5919）	98 atom% D		250mg	￥52,800

エチル2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸標準品 → MCPA-エチルエステル標準品

2-エチル-4-メチル-1*H*-イミダゾール-5-カルバルデヒド
2-Ethyl-4-methyl-1*H*-imidazole-5-carbaldehyde

$C_7H_{10}N_2O$...138.16
CAS RN® ［88634-80-4］ mp104℃～105℃▲

49257-71	TFS（SB01365DA）	97%		1g	￥12,300

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムアセート
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate

$C_8H_{14}N_2O_2$...170.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［143314-17-4］

49514-03	ILT（IL-0189-TG）	95%		100g	￥45,000
49514-02	ILT（IL-0189-TG）	95%		25g	￥25,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(フルオロスルホニル)イミド
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis (fluorosulfonyl)imide

$C_6H_{11}F_2N_3O_4S_2$...291.30
CAS RN® ［235789-75-0］ mp-14℃▲ d1.45▲

14697-35		素材研究用	G	25mL	￥32,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(パーフルオロエチルスルホニル)イミド
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(perfluoroethylsulfonyl)imide

$C_{10}H_{11}F_{10}N_3O_4S_2$...491.33
CAS RN® ［216299-76-2］

49520-28	ILT（IL-0320-HP）	>98%		1g	￥36,000
49520-30	ILT（IL-0320-HP）	>98%		5g	☆

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_8H_{11}F_6N_3O_4S_2$...391.31
CAS RN® ［174899-82-2］ mp-16℃▲ d1.52▲

49514-05	ILT（IL-0023-HP）	99%		100g	￥39,000
49514-04	ILT（IL-0023-HP）	99%		25g	￥17,000
49517-97	ILT（IL-0023-UP-0100）	99.5%		100g	￥62,000
49517-96	ILT（IL-0023-UP-0025）	99.5%		25g	￥27,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムブロミド
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide

警告

$C_6H_{11}BrN_2$...191.06
CAS RN® [65039-08-9] mp74℃▲

14609-33		素材研究用		25g	￥23,000
14609-53		素材研究用	G	5g	￥7,500
35667-1A	TFS（35667-0250）			25g	￥10,200
35667-2A	TFS（35667-0050）			5g	￥3,800

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムクロリド
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride

$C_6H_{11}ClN_2$...146.61
CAS RN® [65039-09-0] mp77℃～79℃▲

35408-1A	TFS（35408-0250）			25g	￥12,400
35408-2A	TFS（35408-0050）			5g	￥4,900
35408-3A	TFS（35408-1000）			100g	￥24,800
49514-09	ILT（IL-0093-HP）	>98.0%		100g	￥39,000
49514-08	ILT（IL-0093-HP）	>98.0%		25g	￥22,000
49528-13	ILT（IL-0093-UP）			25g	￥34,000

塩化1-エチル-3-メチルイミダゾリウム/塩化アルミニウム(1:1.5)
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride and Aluminum chloride(1:1.5), [EMIMCl + $AlCl_3$ (1:1.5)]

49527-67	ILT（EP-0001-HP）			25g	￥20,000
49527-68	ILT（EP-0001-HP）			100g	￥37,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジブチルホスフェート
1-Ethyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate

$C_{14}H_{29}N_2O_4P$...320.36
CAS RN® [869858-84-4]

49529-12	ILT（IL-0323-HP）			25g	￥50,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミド
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide

$C_8H_{11}N_5$...177.20
CAS RN® [370865-89-7] mp-12℃▲ d1.1062▲

49514-11	ILT（IL-0003-HP）	>98.0%	100g	￥41,000
49514-10	ILT（IL-0003-HP）	>98.0%	25g	￥20,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジシアナミド
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide

$C_8H_{11}N_5$...177.20
CAS RN® [370865-89-7]

49527-87	ILT（IL-0003-UP）		25g	￥104,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジエチルホスフェート
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate

$C_{10}H_{21}N_2O_4P$...264.25
CAS RN® [848641-69-0] mp19℃～20℃▲ d1.16▲

49514-13	ILT（IL-0052-HP）	>98.0%	100g	￥40,000
49514-12	ILT（IL-0052-HP）	>98.0%	25g	￥17,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムジメチルホスフェート
1-Ethyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate

$C_8H_{17}N_2O_4P$...236.20
CAS RN® [945611-27-8]

49518-38	ILT（IL-0220-HP-0100）	98%	100g	￥74,000
49518-37	ILT（IL-0220-HP-0025）	98%	25g	￥31,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムエチルスルフェート
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate

$C_8H_{16}N_2O_4S$...236.29
CAS RN® [342573-75-5] d1.2285▲

49514-15	ILT（IL-0033-HP）	98%	100g	￥22,000
49514-14	ILT（IL-0033-HP）	98%	25g	￥10,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

$C_6H_{11}F_6N_2P$...256.12
CAS RN® [155371-19-0] mp62℃▲ d1.56▲

14643-33			素材研究用	25g	￥24,000
14643-53			素材研究用	5g	￥8,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムヨージド
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide

$C_6H_{11}IN_2$...238.06 [労] 57,57-2
CAS RN® [35935-34-3]

14669-25			素材研究用	G	100g	￥55,000
14669-35			素材研究用	G	25g	￥24,000
49514-21	ILT（IL-0048-HP）	>98.0%			100g	￥56,000
49514-20	ILT（IL-0048-HP）	>98.0%			25g	￥27,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムメタンスルホナート
1-Ethyl-3-methylimidazolium methanesulfonate

$C_7H_{14}N_2O_3S$...206.26
CAS RN® [145022-45-3] mp39℃▲ d1.25▲

49514-23	ILT（IL-0004-HP）	99%		100g	￥65,000
49514-22	ILT（IL-0004-HP）	99%		25g	￥26,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムメチルカルボナート,30%メタノール溶液
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylcarbonate, 30% in methanol

[危] 4-1-II [労] 有-2,57,57-2

49529-26	ILT（IN-0027-SG）		25g	￥6,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウム メチルホスホネート
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylphosphonate

$C_7H_{15}N_2O_3P$...206.17 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1137959-66-0]

14670-25			素材研究用	G	100mL	￥58,000
14670-35			素材研究用	G	25mL	￥26,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムメチルスルフェート
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulfate

$C_7H_{14}N_2O_4S$...222.26
CAS RN® [516474-01-4]

49514-25	ILT（IL-0112-HP）	98%		100g	￥45,000
49514-24	ILT（IL-0112-HP）	98%		25g	￥20,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

危険

$CH_3C_3H_3N_2C_2H_5BF_4$...197.97 ［劇］II ［PRTR］1-405
CAS RN® [143314-16-3] mp14.6℃▲ d1.279▲

14644-33		素材研究用	G	25mL	￥33,000
14644-53		素材研究用	G	5mL	￥11,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

$C_6H_{11}BF_4N_2$...197.97 ［劇］II ［PRTR］1-405
CAS RN® [143314-16-3]

49527-90	ILT（IL-0006-UP）		25g	￥43,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムチオシアネート
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate

$C_7H_{11}N_3S$...169.25
CAS RN® [331717-63-6] d1.11▲

49514-32	ILT（IL-0007-HP）	>98.0%	100g	￥29,000
49514-31	ILT（IL-0007-HP）	>98.0%	25g	￥16,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムトシラート
1-Ethyl-3-methylimidazolium tosylate

$C_{13}H_{18}N_2O_3S$...282.36
CAS RN® [328090-25-1]

49514-34	ILT（IL-0008-HP）	99%	100g	￥41,000
49514-33	ILT（IL-0008-HP）	99%	25g	￥17,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウム トリシアノメタニド
1-Ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide

$C_{10}H_{11}N_5$...201.22 ［劇］III
CAS RN® ［666823-18-3］

49527-43	ILT（IL-0316-HP）	98%	25g	￥33,000
49527-44	ILT（IL-0316-HP）	98%	100g	￥85,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムトリフラート
1-Ethyl-3-methylimidazolium triflate

$C_7H_{11}F_3N_2O_3S$...260.23
CAS RN® ［145022-44-2］ mp-10℃▲

49514-36	ILT（IL-0009-HP）	99%	100g	￥47,000
49514-35	ILT（IL-0009-HP）	99%	25g	￥17,000

1-エチル-3-メチルイミダゾリウムトリフルオロアセタート
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate

$C_8H_{11}N_2F_3O_2$...224.18
CAS RN® ［174899-65-1］ mp-15℃▲ d1.29▲

49518-03	ILT（IL-0027-SG-0100）	>97.0%	100g	￥61,000
49518-02	ILT（IL-0027-SG-0025）	>97.0%	25g	￥27,000

エチルメチルケトン → 2-ブタノン

エチルメチルマロン酸 → メチルマロン酸ジエチル

N-エチル-*N*-メチル-*N*-プロピルアンモニウムペルフルオロブタンスルホナート
N-Ethyl-*N*-methyl-*N*-propylammonium perfluorobutanesulfonate

$C_{10}H_{16}F_9NO_3S$...401.29

49529-23	ILT（IL-0338-HP）		25g	￥58,000

1-エチル-2-メチルピリジニウムビス(トリフルオロスルホニル)イミド
1-Ethyl-2-methylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{10}H_{12}F_6N_2O_4S_2$...402.33
CAS RN® [712354-99-9]

49519-00	ILT（IL-0247-HP-0100）	99%	100g	￥84,000
49518-97	ILT（IL-0247-HP-0025）	99%	25g	￥36,000

1-エチル-3-メチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Ethyl-3-methylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{10}H_{12}F_6N_2O_4S_2$...402.33
CAS RN® [841251-37-4]

49516-25	ILT（IL-0214-HP）	99%	100g	￥62,000
49516-24	ILT（IL-0214-HP）	99%	25g	￥27,000

1-エチル-4-メチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Ethyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{10}H_{12}F_6N_2O_4S_2$...402.33
CAS RN® [712355-03-8]

49516-27	ILT（IL-0217-HP）	99%	100g	￥61,000
49516-26	ILT（IL-0217-HP）	99%	25g	￥27,000

1-エチル-2-メチルピリジニウムブロミド
1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide

$C_8H_{12}BrN$...202.09
CAS RN® [32354-50-7]

49518-48	ILT（IL-0225-HP-0100）	99%	100g	￥49,000
49518-47	ILT（IL-0225-HP-0025）	99%	25g	￥27,000

1-エチル-3-メチルピリジニウムブロミド
1-Ethyl-3-methylpyridinium bromide

$C_8H_{12}BrN$...202.09
CAS RN® [54778-76-6]

49518-50	ILT（IL-0226-HP-0100）	99%	100g	￥49,000
49518-49	ILT（IL-0226-HP-0025）	99%	25g	￥27,000

1-エチル-4-メチルピリジニウムブロミド
1-Ethyl-4-methylpyridinium bromide

$C_8H_{12}BrN$...202.09
CAS RN® [32353-49-4]

49518-52	ILT（IL-0227-HP-0100）	99%	100g	￥49,000
49518-51	ILT（IL-0227-HP-0025）	99%	25g	￥27,000

1-エチル-3-メチルピリジニウムパーフルオロブタンスルホナート
1-Ethyl-3-methylpyridinium perfluorobutanesulfonate

$C_{12}H_{12}F_9NO_3S$...421.28
CAS RN® [1015420-87-7]

49520-19	ILT（IL-0313-HP-0100）	>99%	100g	￥107,000
49520-18	ILT（IL-0313-HP-0025）	>99%	25g	￥60,000

1-エチル-1-メチルピロリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_9H_{16}F_6N_2O_4S_2$...394.36
CAS RN® [223436-99-5]

49517-22	ILT（IL-0167-HP）	99%	100g	￥57,000
49517-21	ILT（IL-0167-HP）	99%	25g	￥26,000

1-エチル-1-メチルピロリジニウムブロミド
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide

$C_7H_{16}BrN$...194.11
CAS RN® [69227-51-6]

49517-24	ILT（IL-0163-HP）	99%	100g	￥31,000
49517-23	ILT（IL-0163-HP）	99%	25g	￥17,000

1-エチル-1-メチルピロリジニウムヘキサフルオロホスフェート
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate

$C_7H_{16}F_6NP$...259.17
CAS RN® [121057-90-7]

49517-26	ILT（IL-0166-HP）	99%	100g	￥90,000
49517-25	ILT（IL-0166-HP）	99%	25g	￥49,000

1-エチル-1-メチルピロリジニウムヨージド
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium iodide

$C_7H_{16}IN$...241.11 ［労］57,57-2
CAS RN® ［4186-68-9］

49517-28	ILT（IL-0164-HP）	>98.0%	100g	￥84,000
49517-27	ILT（IL-0164-HP）	>98.0%	25g	￥42,000

1-エチル-1-メチルピロリジニウムテトラフルオロボラート
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate

$C_7H_{16}BF_4N$...201.01 ［劇］II ［PRTR］1-405
CAS RN® ［117947-85-0］

49517-31	ILT（IL-0165-HP）	>98.0%	100g	￥106,000
49517-30	ILT（IL-0165-HP）	>98.0%	25g	￥60,000
49528-25	ILT（IL-0165-UP）		25g	￥70,000

1-エチル-1-メチルピロリジニウムトリフラート
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium triflate

$C_8H_{16}F_3NO_3S$...263.28
CAS RN® ［893443-18-0］

49517-33	ILT（IL-0168-HP）	99%	100g	￥112,000
49517-32	ILT（IL-0168-HP）	99%	25g	￥56,000

1-エチル-1-メチルピロリジニウムトリフルオロメタンスルホナート
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate

$C_8H_{16}F_3NO_3S$...263.28
CAS RN® ［8893443-18-0］

49210-11	SOLVI（PYR0205B10）	99.5%	10g	￥69,000

N-エチルモルホリン
N-Ethylmorpholine (*N*=4)

危険

$C_2H_5C_4H_8NO$...115.17 ［危］4-2-S-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［100-74-3］ bp138℃† mp-63℃† d0.910～0.915△ Fp29.0℃†

14160-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,500
14160-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,500

N-エチルモルホリン塩酸塩
N-Ethylmorpholine hydrochloride

$C_6H_{13}NO \cdot HCl$...151.63
mp203℃～211℃▲

49008-45	昭化（0521-1350）	98%		500g	￥140,500
49008-46	昭化（0521-1300）	98%		15kg	☆

1-エチルナフタレン標準品
1-Ethylnaphthalene standard

$C_{12}H_{12}$...156.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1127-76-0］

49834-64	DES（C20793100）		環境分析用	10mg	￥13,000

2-エチル-d_5-ナフタレン
2-Ethyl-d_5-naphthalene

$C_{12}H_7D_5$...161.25 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219805-14-7］

49146-40	CDN（D-7199）	99 atom% D		500mg	￥57,200

2-エチルナフタレン標準品
2-Ethylnaphthalene standard

$C_{12}H_{12}$...156.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［939-27-5］

49834-65	DES（C20793200）		環境分析用	50mg	￥27,000

エチルオキサリルクロリド
Ethyl oxalyl chloride

$ClCOCO_2C_2H_5$...136.53 ［危］4-2-III
CAS RN® ［4755-77-5］bp135℃▲ d1.222▲

11878-1A	TFS（11878-1000）			100mL	￥10,500
11878-2A	TFS（11878-0250）			25mL	￥4,600

2-エチル-2-オキサゾリン
2-Ethyl-2-oxazoline

C_5H_9NO...99.13 ［危］4-2-III
CAS RN® ［10431-98-8］ bp128.4℃▲ d0.982▲

15998-2A	TFS（15998-1000）		100g	￥5,400
15998-3A	TFS（15998-5000）		500g	￥22,200

3-(エチル-1,1-d_2)-3-ペンタノール-2,2,4,4-d_4
3-(Ethyl-1,1-d_2)-3-pentanol-2,2,4,4-d_4

$C_7H_{10}D_6O$...122.23 ［危］4-2-III

49149-91	CDN（D-8073）		50mg	￥26,400

S-エチルペルヒドロアゼピン-1-カルボチオエート標準品 → モリネート標準品

2-エチルフェノール標準品
2-Ethylphenol standard

$C_8H_{10}O$...122.16 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［90-00-6］

49860-12	DES（C13350000）	環境分析用	500mg	￥9,500

2-エチルフェノール-d_{10}
2-Ethylphenol-d_{10}

$CD_3CD_2C_6D_4OD$...132.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［721429-63-6］

49146-44	CDN（D-7181）	99 atom% D	100mg	￥49,500

3-エチルフェノール標準品
3-Ethylphenol standard

$C_8H_{10}O$...122.16 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［620-17-7］

49860-13	DES（C13351000）	環境分析用	500mg	￥8,500

4-エチルフェノール標準品
4-Ethylphenol standard

$C_8H_{10}O$...122.16 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［123-07-9］

49860-14	DES（C13352000）		環境分析用	500mg	￥8,000

4-エチルフェノール-2,3,5,6-d_4,OD
4-Ethylphenol-2,3,5,6-d_4, OD

$CH_3CH_2C_6D_4OD$...127.19
CAS RN® ［340256-40-8］

49127-42	CDN（D-1284）	98 atom% D		1g	￥48,400

4-エチルフェノール-d_{10}
4-Ethylphenol-d_{10}

$CD_3CD_2C_6D_4OD$...132.22
CAS RN® ［352431-18-6］

49127-41	CDN（D-5328）	98 atom% D		500mg	￥44,000

m-エチルフェノール
m-Ethylphenol

危険

$C_2H_5C_6H_4OH$...122.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［620-17-7］bp214℃† d(20/20℃) 1.01▲

14533-41	>96.0%(GC)	鹿1級	G	10mL	￥7,000

o-エチルフェノール
o-Ethylphenol

危険

$C_2H_5C_6H_4OH$...122.16 ［危］4-3-III
CAS RN® ［90-00-6］bp204.52℃† mp-3.4℃† d(20/20℃) 1.01▲

14181-50	>97.0%(GC)	鹿特級	G	5mL	￥5,000

p-エチルフェノール
p-Ethylphenol

危険

$C_2H_5C_6H_4OH$...122.16
CAS RN® [123-07-9] bp219℃† mp42℃～45℃△

14182-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,400

p-エチルフェノール
p-Ethylphenol

$C_2H_5C_6H_4OH$...122.16
CAS RN® [123-07-9] bp218℃～219℃ mp41℃～46℃ Fp100℃

11882-2A	TFS（11882-0050）			5g	￥3,700
11882-3A	TFS（11882-2500）			250g	￥6,600

N-エチルフェニルアミン → *N*-エチルアニリン

2-エチルフェニルボロン酸
2-Ethylphenylboronic acid

警告

$C_8H_{11}BO_2$...149.98 [PRTR] 1-405
CAS RN® [90002-36-1]

14667-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥8,000
14667-65	>97.0%(HLC)	Organics	G	1g	￥3,800

4-エチルフェニルボロン酸
4-Ethylphenylboronic acid

警告

$C_8H_{11}BO_2$...149.98 [PRTR] 1-405 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [63139-21-9] mp130℃～132℃▲

14251-35	>97.0%(HLC)	Organics	G	25g	￥17,500
14251-55	>97.0%(HLC)	Organics	G	5g	￥6,100
35932-1A	TFS（35932-0010）			1g	￥3,200

エチルフェニルエーテル → フェネトール

エチルフェニルケトン → プロピオフェノン

エチルフェニルスルホン
Ethyl phenyl sulfone

$C_8H_{10}O_2S$...170.23
CAS RN® [599-70-2] mp39℃～43℃▲

35101-1A	TFS（35101-0010）	1g	￥4,400

エチルホスファイト → 亜りん酸ジエチル

エチル 1-ピペラジン-d_8-酢酸二塩酸塩
Ethyl 1-piperazine-d_8-acetate dihydrochloride

$C_8H_{10}D_8Cl_2N_2O_2$...253.19

49149-92	CDN（D-8058）	10mg	￥24,200

N-エチルピペリジン
N-Ethylpiperidine (*N*=1)

危険

$C_5H_{10}NC_2H_5$...113.20 ［危］4-1-II
CAS RN® [766-09-6] bp128℃～129℃† d(20℃) 0.824† Fp17℃†

14190-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥4,200

N-エチルピペリジン
N-Ethylpiperidine (*N*=1)

危険

$C_5H_{10}NC_2H_5$...113.20 ［危］4-1-II
CAS RN® [766-09-6] bp128℃～129℃† d(20℃) 0.824† Fp17℃†

11888-1A	TFS（11888-5000）	500mL	￥13,800

エチルプロペニルエーテル
Ethyl propenyl ether

$C_5H_{10}O$...86.13 ［危］4-1-II
CAS RN®［928-55-2］bp70℃▲ d0.7700▲

mixture of *cis*- and *trans*-isomers

41037-1A	TFS（41037-0250）	25g	￥13,500
41037-2A	TFS（41037-0100）	10g	￥5,900
41037-3A	TFS（41037-1000）	100g	￥41,900

4′-エチルプロピオフェノン
4′-Ethylpropiophenone

$C_{11}H_{14}O$...162.22 ［危］4-3-III
CAS RN®［27465-51-6］

14017-02	>95.0%(HLC)	G	500mL	￥15,000

1-エチル-3-プロピルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Ethyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{10}H_{15}F_6N_3O_4S_2$...419.37
CAS RN®［347882-21-7］

49519-67	ILT（IL-0285-HP-0100）	98%	100g	￥71,000
49519-66	ILT（IL-0285-HP-0025）	98%	25g	￥32,000

1-エチル-3-プロピルイミダゾリウムブロミド
1-Ethyl-3-propylimidazolium bromide

$C_8H_{15}BrN_2$...219.12
CAS RN®［637348-59-5］

49519-61	ILT（IL-0282-HP-0100）	98%	100g	￥48,000
49519-60	ILT（IL-0282-HP-0025）	98%	25g	￥23,000

1-エチル-3-プロピルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート
1-Ethyl-3-propylimidazolium hexafluorophosphate

$C_8H_{15}F_6N_2P$...284.18

49519-65	ILT（IL-0284-HP-0100）	98%	100g	￥66,000
49519-64	ILT（IL-0284-HP-0025）	98%	25g	￥33,000

1-エチル-3-プロピルイミダゾリウムテトラフルオロボラート
1-Ethyl-3-propylimidazolium tetrafluoroborate

$C_8H_{15}BF_4N_2$...226.02 ［劇］II ［PRTR］1-405

49519-63	ILT（IL-0283-HP-0100）	98%	100g	￥90,000
49519-62	ILT（IL-0283-HP-0025）	98%	25g	￥45,000

2-エチル-3-プロピル-1,3-プロパンジオール → 2-エチル-1,3-ヘキサンジオール

2-エチル-α,α-d_2-ピラジン-3,5,6-d_3
2-Ethyl-α,α-d_2-pyrazine-3,5,6-d_3

$C_6H_5D_3N_2$...111.15 ［危］4-2-III

49146-45	CDN（D-7325）	98 atom% D	100mg	￥48,400

1-エチルピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル
1-Ethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester

$C_{11}H_{19}BN_2O_2$...222.09 ［PRTR］1-405
CAS RN® ［847818-70-6］

14267-55	>97.0%(GC)	Organics	G	5g	￥34,000
14267-65	>97.0%(GC)	Organics	G	1g	￥10,000

5-エチル-2-ピリジンエタノール
5-Ethyl-2-pyridineethanol

警告

$C_9H_{13}NO$...151.20 ［危］4-3-III
CAS RN® ［5223-06-3］

14171-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥10,500
14171-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥5,100

1-エチルピリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Ethylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_9H_{10}F_6N_2O_4S_2$...388.31
CAS RN® ［712354-97-7］ mp22℃▲

49515-83	ILT（IL-0211-HP）	99%	100g	￥88,000
49515-82	ILT（IL-0211-HP）	99%	25g	￥39,000

1-エチルピリジニウムヘキサフルオロホスフェート
1-Ethylpyridinium hexafluorophosphate

$C_7H_{10}F_6NP$...253.12
CAS RN® [103173-73-5] mp106℃▲

49515-87	ILT（IL-0172-HP）	99%	100g	￥97,000
49515-86	ILT（IL-0172-HP）	99%	25g	￥55,000

1-エチルピリジニウムテトラフルオロボラート
1-Ethylpyridinium tetrafluoroborate

$C_7H_{10}BF_4N$...194.96 [劇] II [PRTR] 1-405
CAS RN® [350-48-1] mp46℃▲

49515-91	ILT（IL-0107-HP）	>98.0%	100g	￥114,000
49515-90	ILT（IL-0107-HP）	>98.0%	25g	￥64,000

1-エチルピリジニウムトリフラート
1-Ethylpyridinium triflate

$C_8H_{10}F_3NO_3S$...257.23
CAS RN® [3878-80-6] mp<25℃▲

49515-93	ILT（IL-0186-HP）	99%	100g	￥123,000
49515-92	ILT（IL-0186-HP）	99%	25g	￥69,000

2-エチルピロール
2-Ethylpyrrole

C_6H_9N...95.14 [危] 4-2-III
CAS RN® [1551-06-0] bp164℃～165℃(754mm)▲ d0.929▲

30877-1A	TFS（30877-0010）		1g	￥15,900

1-エチル-2-ピロリジノン
1-Ethyl-2-pyrrolidinone

危険

$C_6H_{11}NO$...113.15 [危] 4-3-III
CAS RN® [2687-91-4] d0.992†

14536-32		>98.0%(GC)	G	25mL	￥4,600
16393-1A	TFS（16393-1000）			100g	￥12,600
16393-2A	TFS（16393-0250）			25g	￥5,500

1-エチル-2-ピロリドン → 1-エチル-2-ピロリジノン

4-エチルレソルシノール
4-Ethylresorcinol

$C_8H_{10}O_2$...138.16
CAS RN® [2896-60-8] mp95℃～98℃▲

11895-1A	TFS（11895-0050）	5g	￥5,800
11895-2A	TFS（11895-0250）	25g	￥19,300

エチルスクシニルクロリド
Ethyl succinyl chloride

$C_6H_9ClO_3$...164.58 [危] 4-3-III
CAS RN® [14794-31-1] d1.158▲

18409-1A	TFS（18409-0250）	25g	￥5,600
18409-3A	TFS（18409-1000）	100g	￥15,800

(4*S*,2*RS*)-2-エチルチアゾリジン-4-カルボン酸
(4*S*,2*RS*)-2-Ethylthiazolidine-4-carboxylic acid

$C_6H_{11}NO_2S$...161.22
CAS RN® [205985-92-8] mp158℃～162℃†

29288-1A	TFS（29288-0025）	2.5g	￥10,700

エチルチオエーテル → 硫化ジエチル

エチルチオメトン標準品 → ジスルホトン標準品

5-エチルチオ-1*H*-テトラゾール
5-Ethylthio-1*H*-tetrazole

$C_3H_6N_4S$...130.17 [危] 5-AZ-2-II
CAS RN® [89797-68-2]

14283-52	>95.0%	G	5g	￥12,000
14283-62	>95.0%	G	1g	￥4,200

(エチルチオ)トリメチルシラン
(Ethylthio)trimethylsilane

$C_5H_{14}SSi$...134.31 ［危］4-1-II
CAS RN® ［5573-62-6］ d0.83▲

34500-1A	TFS（34500-0010）		tech.	1g	￥6,200
34500-2A	TFS（34500-0100）		tech.	10g	￥34,500

N-エチル-*o*-トルイジン
N-Ethyl-*o*-toluidine

$C_9H_{13}N$...135.20 ［劇］II ［危］4-3-III
CAS RN® ［94-68-8］

14048-52		>98.0%(GC)	G	5g	￥4,200
14048-62		>98.0%(GC)	G	1g	￥3,200

(1-エチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-5-イル)メタノール
(1-Ethyl-1*H*-1,2,4-triazol-5-yl)methanol

$C_5H_9N_3O$...127.14
CAS RN® ［215868-81-8］ mp82℃～84℃▲

49258-01	TFS（MO08364DE）	97%		5g	￥98,700
49258-02	TFS（MO08364DA）	97%		1g	￥27,400

エチルビニルエーテル
Ethyl vinyl ether

危険

$C_2H_5OCH{:}CH_2$...72.10 ［危］4-SI-I
CAS RN® ［109-92-2］ bp35.5℃† mp-116℃† d(25℃) 0.754† Fp17.8℃†

stabilized with potassium hydroxide

14541-01		>98.0%(GC)	鹿1級	500mL	￥7,500
14541-31		>98.0%(GC)	鹿1級	25mL	￥3,100

1-エチル-3-ビニルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
1-Ethyl-3-vinylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_9H_{11}F_6N_3O_4S_2$...403.32
CAS RN® [204854-22-8]

49519-79	ILT（IL-0291-HP-0100）	98%	100g	￥131,000
49519-78	ILT（IL-0291-HP-0025）	98%	25g	￥58,000

1-エチル-3-ビニルイミダゾリウムブロミド
1-Ethyl-3-vinylimidazolium bromide

$C_7H_{11}BrN_2$...203.07
CAS RN® [34311-88-1]

49519-77	ILT（IL-0290-HP-0100）	98%	100g	￥109,000
49519-76	ILT（IL-0290-HP-0025）	98%	25g	￥51,000

エチルキサント酸カリウム
Ethylxanthic acid potassium salt

$C_3H_5KOS_2$...160.30
CAS RN® [140-89-6] mp209℃～214℃▲

41050-1A	TFS（41050-0250）		25g	￥4,000
41050-2A	TFS（41050-1000）		100g	￥7,700
41050-3A	TFS（41050-5000）		500g	￥34,500

4-エチニル安息香酸
4-Ethynylbenzoic acid

$C_9H_6O_2$...146.14
CAS RN® [10602-00-3]

14281-52		>95.0%(HLC)	5g	￥39,000
14281-62		>95.0%(HLC)	1g	￥11,000

1-エチニル-1-シクロヘキサノール
1-Ethynyl-1-cyclohexanol

$C_8H_{12}O$...124.18 ［危］4-3-III
CAS RN® [78-27-3] bp180℃▲ mp30℃～32℃▲

11910-2A	TFS（11910-1000）		100g	￥5,300
11910-3A	TFS（11910-5000）		500g	￥17,900

エチニルシクロプロパン
Ethynylcyclopropane

C_5H_6...66.10 ［危］4-1-II
CAS RN® ［6746-94-7］ bp52℃～65℃▲ d0.7801▲

36913-1A	TFS（36913-0010）		1g	￥2,300
36913-2A	TFS（36913-0100）		10g	￥7,300

4-エチニル-1,2-ジメトキシベンゼン
4-Ethynyl-1,2-dimethoxybenzene

$C_{10}H_{10}O_2$...162.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［4302-52-7］

14257-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥40,000
14257-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,000

17α-エチニル-$^{13}C_2$-エストラジオール
17α-Ethynyl-$^{13}C_2$-estradiol

$^{13}C_2$ $C_{18}H_{24}O_2$...298.38

49139-61	CDN（C-4277）		10mg	￥88,000

17α-エチニルエストラジオール-2,4,16,16-d_4
17α-Ethynylestradiol-2,4,16,16-d_4

$C_{20}H_{20}D_4O_2$...300.42
CAS RN® ［350820-06-3］

49127-46	CDN（D-4319）	98 atom% D	10mg	￥39,600

17α-エチニルエストラジオール-16,16-$d_{2\ 3}$-メチルエーテル
17α-Ethynylestradiol-16,16-$d_{2\ 3}$-methyl ether

$C_{21}H_{24}D_2O_2$...312.44

49148-88	CDN（D-5990）	97 atom% D	10mg	￥42,900

17α-エチニルエストラジオール-2,4,16,16-d_4 3-メチルエーテル
17α-Ethynylestradiol-2,4,16,16-d_4 3-methyl ether

$C_{21}H_{22}D_4O_2$...314.45

49139-62	CDN（D-6142）	98 atom% D	10mg	￥83,600

9-エチニル-9-フルオレノール
9-Ethynyl-9-fluorenol

$C_{15}H_{10}O$...206.23
CAS RN®［13461-74-0］ mp107℃～110℃▲

38154-1A	TFS（38154-0010）			1g	￥3,300

1-エチニル-4-フルオロベンゼン
1-Ethynyl-4-fluorobenzene

C_8H_5F...120.12 ［危］4-2-III
CAS RN®［766-98-3］ mp27℃～28℃▲ d1.0480▲

37137-1A	TFS（37137-0010）			1g	￥7,400

5-(4-エチニルフェニル)-1,3-オキサゾール
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole

$C_{11}H_7NO$...169.17
CAS RN®［501944-63-4］ mp76℃～77℃▲

49258-07	TFS（CC14547DA）	97%		1g	￥55,100
49258-08	TFS（CC14547CB）	97%		250mg	￥21,100

2-エチニルピリジン
2-Ethynylpyridine

警告

C_7H_5N...103.12 ［危］4-2-III
CAS RN®［1945-84-2］ d1.0200▲

14632-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥17,500
14632-62		>95.0%(HLC)	G	1g	￥6,000
29567-1A	TFS（29567-0010）			1g	￥5,100

6-エチニルキノキサリン
6-Ethynylquinoxaline

$C_{10}H_6N_2$...154.16
CAS RN®［442517-33-1］ mp98℃▲

49258-09	TFS（CC11747DA）	97%		1g	☆
49258-10	TFS（CC11747CB）	97%		250mg	￥41,100

2-(5-エチニルチエン-2-イル)ピリジン
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine

$C_{11}H_7NS$...185.24
CAS RN®［132464-90-5］ mp109℃～111℃▲

49258-11	TFS（CC02247DA）	97%	1g	￥60,300
49258-12	TFS（CC02247CB）	97%	250mg	￥23,300

エトベンザニド標準品
Etobenzanid standard

$C_{16}H_{15}Cl_2NO_3$...340.19 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［79540-50-4］

49865-42	DES（C13360000）	残留農薬試験用	50mg	￥41,000

(±)-エトドラク-d_3 (1-エチル-2,2,2-d_3)
(±)-Etodolac-d_3 (1-ethyl-2,2,2-d_3)

［冷］ 0℃～6℃

49146-47	CDN（D-7296）	99 atom% D	5mg	￥55,000

エトフェンプロックス標準品
Etofenprox standard

危険

$C_{25}H_{28}O_3$...376.48 ［労］57,57-2［PRTR］1-64 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［80844-07-1］

49833-27	DES（C13363000）	残留農薬試験用	100mg	￥34,000

エトフェンプロックス-d_5標準液(エチル-d_5)
Etofenprox-d_5 (ethyl-d_5) standard solution

$C_{25}H_{23}D_5O_3$...381.51 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［1705649-55-3］

100mg/L アセトン溶液

49835-40	DES（XA13363010AC）	残留農薬試験用	1.1mL	￥34,000

エトキサゾール標準品
Etoxazole standard

$C_{21}H_{23}F_2NO_2$...359.40 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［153233-91-1］ mp101℃～102℃▲

49831-34	DES（C13368000）	残留農薬試験用	50mg	￥26,000

エトリジアゾール標準品
Etridiazole standard

$C_2H_5OC_2SN_2CCl_3$...247.53 ［危］4-3-III ［PRTR］2-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2593-15-9］ mp19.9℃†

49861-27	DES（C13370000）	残留農薬試験用	100mg	￥15,000

エトリジアゾール標準液
Etridiazole standard solution

$C_2H_5OC_2SN_2CCl_3$...247.53 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2593-15-9］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49833-59	DES（L13370000CY）	残留農薬試験用	10mL	￥12,000

エトリムホス標準品
Etrimfos standard

危険

$C_{10}H_{17}N_2O_4PS$...292.29 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［38260-54-7］

49801-34	DES（CA13380000）	残留農薬試験用	100mg	￥24,000

エトリムホス標準液
Etrimfos standard solution

$C_{10}H_{17}N_2O_4PS$...292.29 ［危］4-1-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［38260-54-7］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49828-18	DES（L13380000CY）	残留農薬試験用	10mL	￥14,000

塩化ユウロピウム(III)六水和物,3N5
Europium(III) chloride hexahydrate, 3N5

警告

$EuCl_3 \cdot 6H_2O$...366.41 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［13759-92-7］

14606-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥62,000
14606-53	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	5g	￥19,000

エバンスブルー
Evans blue

警告

$C_{34}H_{24}N_6Na_4O_{14}S_4$...960.81
CAS RN® ［314-13-6］

14220-52			G	5g	￥5,000
19555-1A	TFS（19555-0050）			5g	￥4,100
19555-2A	TFS（19555-0250）			25g	￥13,200

エボジアミン
Evodiamine

$C_{19}H_{17}N_3O$...303.35 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［518-17-2］

49063-13	PHY（89662）	天然物化学研究用		10mg	￥44,000

エキソヌクレアーゼ I (E. coli)
Exonuclease I (E. coli)

［劇］II ［凍］ -20℃以下

20,000units/mL

49886-16	NEB（M0293S）			3000units	￥13,200
49886-17	NEB（M0293L）			15000units	￥52,900

エキソヌクレアーゼIII (E. coli)
Exonuclease III (E. coli)

［凍］ -20℃以下

100,000units/mL

49884-67	NEB（M0206S）	5000units	￥11,700
49884-68	NEB（M0206L）	25000units	￥46,700

エキソヌクレアーゼ VII
Exonuclease VII

［劇］II ［凍］ -20℃以下

49899-15	NEB（M0379S）	200units	￥32,100
49899-16	NEB（M0379L）	1000units	￥128,600

エキソヌクレアーゼ I反応バッファー
Exonuclease I Reaction Buffer

［劇］II ［凍］ -20℃以下

49882-16	NEB（B0293S）	6mL	￥3,300

エキソヌクレアーゼ T
Exonuclease T

［凍］ -20℃以下

5,000units/mL

49885-63	NEB（M0265S）	250units	￥13,200
49885-64	NEB（M0265L）	1250units	￥53,100

エルリッヒカツオエキス
Extract Ehrlich

49400-00	極東（01200）	500g	☆

エキストランAP11(弱アルカリ性)
Extran[R] AP 11

mildly alkaline

7558-4M	M（1.07558.2000）	2kg	￥15,100
7558-3M	M（1.07558.9025）	25kg	￥99,200

エキストランAP12(アルカリ性)
Extran[R] AP 12

［劇］II ［労］57-2

alkaline

7563-2M	M（1.07563.2000）	2kg	￥10,500

エキストランAP21(酸性)
Extran[R] AP 21

［労］57-2

acidic with phosphoric acid

7559-1M	M（1.07559.2500）	2.5L	￥11,000

エキストランAP22(酸性)
Extran[R] AP 22

［労］57-2

acidic with citric acid

7561-1M	M（1.07561.2500）	2.5L	￥9,040

エキストランAP41(医療器具洗浄用)
Extran[R] AP 41

enzymatic

7570-2M	M（1.07570.2000）	2kg	￥17,200

エキストランMA01(アルカリ性)
Extran[R] MA 01

alkaline

7555-4M	M（1075553000）	3L	￥4,810
7555-3M	M（1075559020）	20L	￥26,400

エキストランMA02(中性)
Extran[R] MA 02

neutral

7553-4M	M（10755330001566）	3L	￥5,790
7553-3M	M（10755390201566）	20L	￥28,200

エキストランMA05(無りん)
Extran[R] MA 05

phosphate-free

40000-4M	M（14000030001566）	3L	￥5,790
40000-3M	M（14000090201566）	20L	￥28,200

塩化2-フルオロベンゼンスルホニル
2-Fluorobenzenesulfonyl chloride

$C_6H_4ClFO_2S$...194.61 ［変］
CAS RN® ［2905-21-7］

16004-32	>95.0%(HLC)	G	25g	￥18,000
16004-52	>95.0%(HLC)	G	5g	￥5,800

塩化4-フルオロベンゾイル
4-Fluorobenzoyl chloride

C_7H_4ClFO...158.55 ［危］4-3-III
CAS RN® ［403-43-0］

16870-02	>97.0%(GC)	G	500g	￥32,000
16870-32	>97.0%(GC)	G	25g	￥4,500
15295-1A	TFS（15295-0250）		25mL	￥6,200
15295-2A	TFS（15295-1000）		100mL	￥17,700

塩化4-フルオロベンジル
4-Fluorobenzyl chloride

C_7H_6ClF...144.57 ［危］4-2-III
CAS RN® ［352-11-4］bp181.2℃▲ d1.207▲

11943-1A	TFS（11943-0250）	25mL	￥5,300
11943-2A	TFS（11943-1000）	100mL	￥15,600

塩化4-フルオロベンジル-2,3,5,6-d_4
4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d_4 chloride

$C_7H_2ClD_4F$...148.59 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1219804-10-0］

49139-75	CDN（D-6078）	98 atom% D	250mg	￥47,300

塩化4-フルオロベンジル-d_6
4-Fluorobenzyl-d_6 chloride

$FC_6D_4CD_2Cl$...150.60 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1219804-13-3］

49146-51	CDN（D-6079）	98 atom% D	250mg	￥57,200

塩化4-フルオロベンジル-α,α-d_2
4-Fluorobenzyl-α,α-d_2 chloride

$FC_6H_4CD_2Cl$...146.58 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1219804-18-8］

49148-89	CDN（D-6077）	98 atom% D	500mg	￥39,600

塩酸ホルメタネート標準品
Formetanate hydrochloride standard

$C_{11}H_{16}ClN_3O_2$...257.71 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［23422-53-9］

49827-51	DES（C13910000）	残留農薬試験用	100mg	￥11,000

塩基性フクシン
Fuchsine basic

警告

［労］特-2,57,57-2
CAS RN®［632-99-5］ mp>200℃(dec.)†

16067-31		鹿1級	25g	￥8,000
15937-1M	M（1.15937.0025）	顕微鏡用(Certistain®)	25g	￥11,800
15937-2M	M（1.15937.0100）	顕微鏡用	100g	￥28,500

塩化フマリル → 二塩化フマリル

塩化2-フロイル
2-Furoyl chloride

$C_5H_3O_2Cl$...130.52 ［危］4-3-III
CAS RN®［527-69-5］bp173℃～174℃ mp2℃ d1.32 Fp85℃

16538-1A	TFS（16538-0250）	25mL	￥3,400
16538-2A	TFS（16538-1000）	100mL	￥10,500

D(+)-グルコサミン塩酸塩(塩酸 *D*(+)-グルコサミン)
D(+)-Glucosamine hydrochloride

$C_6H_{13}O_5N \cdot HCl$...215.63
CAS RN®［66-84-2］ mp190℃～194℃

11990-1A	TFS（11990-0100）	10g	￥2,500
11990-2A	TFS（11990-1000）	100g	￥8,700
11990-3A	TFS（11990-5000）	500g	￥32,400

グリシンエチルエステル塩酸(塩酸グリシンエチルエステル)
Glycine ethyl ester hydrochloride

警告

$NH_2CH_2COOC_2H_5$·HCl...139.57
CAS RN® [623-33-6] mp145℃～148℃

12009-2A	TFS（12009-1000）		100g	￥4,300
12009-3A	TFS（12009-5000）		500g	￥8,700

塩化金(III)酸四水和物 → テトラクロリド金(III)酸四水和物

塩化ナトリウム金(III)二水和物 → テトラクロロ金(III)酸ナトリウム二水和物

塩化グアニジニウム → グアニジン塩酸塩(塩酸グアニジン)

塩酸ハルマロール
Harmalol hydrochloride

$C_{12}H_{12}N_2O$·HCl...236.69
CAS RN® [6028-07-5]

49064-11	PHY（89701）	天然物化学研究用	50mg	￥40,000

塩化ヘプタノイル
Heptanoyl chloride

$CH_3(CH_2)_5COCl$...148.62 [危] 4-2-III
CAS RN® [2528-61-2] bp173℃▲ d0.96▲

16426-1A	TFS（16426-1000）		100g	￥11,700
16426-2A	TFS（16426-0250）		25g	￥6,500
16426-3A	TFS（16426-5000）		500g	￥57,100

塩化ヘキサアンミンルテニウム(III)
Hexaammineruthenium(III) chloride

$H_{18}Cl_3N_6Ru$...309.61 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [14282-91-8]

36334-1A	TFS（36334-0010）		1g	￥17,700

塩化白金(IV)酸六水和物 → ヘキサクロロ白金(IV)酸六水和物

塩化 *n*-ヘキサデカノイル → 塩化パルミトイル

塩化1- *n*-ヘキサデシルピリジニウム一水和物
1-*n*-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate

危険

$(C_5H_5NC_{16}H_{33})Cl \cdot H_2O$...358.00
CAS RN® [6004-24-6] mp77℃～83℃†

07200-11		>98.0%(T)	鹿1級	G	250g	￥21,000
07200-31		>98.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥3,600
22699-1A	TFS（22699-1000）				100g	￥8,600
22699-3A	TFS（22699-5000）				500g	￥33,900

塩化ヘキサデシル-d_{33}-トリメチルアンモニウム
Hexadecyl-d_{33}-trimethylammonium chloride

$C_{16}D_{33}N(CH_3)_3Cl$...353.19 ［PRTR］1-389

49140-15	CDN（D-6147）	98 atom% D			100mg	￥61,600

塩化ヘキサデシルトリメチルアンモニウム-d_{42}
Hexadecyltrimethylammonium-d_{42} chloride

$C_{19}ClD_{42}N$...362.25 ［PRTR］1-389

49140-16	CDN（D-6148）	98 atom% D			100mg	￥57,200

塩化 *n*-ヘキサデシルトリメチルアンモニウム
n-Hexadecyltrimethylammonium chloride

警告

$[C_{16}H_{33}N(CH_3)_3]Cl$...319.99 ［PRTR］1-389
CAS RN® [112-02-7] mp232℃～234℃†

07202-11		>95.0%(T)	鹿1級	G	250g	￥26,000
07202-31		>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥5,200
07202-51		>95.0%(T)	鹿1級	G	5g	￥2,700
41141-1A	TFS（41141-0050）				5g	￥22,300
41141-2A	TFS（41141-0250）				25g	￥87,400

塩化 *n*-ヘキサノイル
n-Hexanoyl chloride

危険

$CH_3(CH_2)_4COCl$...134.60 ［危］4-2-III
CAS RN® ［142-61-0］ bp151℃～153℃† d0.975～0.985△

07130-32		>96.0%(GC)		25g	￥2,800

塩化 *n*-ヘキサノイル
n-Hexanoyl chloride

$CH_3(CH_2)_4COCl$...134.60 ［危］4-2-III
CAS RN® ［142-61-0］ bp151℃～153℃ mp87℃ d0.95 Fp53℃

16904-1A	TFS（16904-0050）			5g	￥3,000
16904-2A	TFS（16904-1000）			100g	￥6,600
16904-3A	TFS（16904-5000）			500g	￥22,700

塩化 *n*-ヘキシル → 1-クロロヘキサン

塩化1-ヘキシルピリジニウム
1-Hexylpyridinium chloride

$C_{11}H_{18}ClN$...199.71
CAS RN® ［6220-15-1］ mp26℃～39℃▲

49516-15	ILT（IL-0131-HP）	>98.0%		100g	￥154,000
49516-14	ILT（IL-0131-HP）	>98.0%		25g	￥87,000

塩化ホルミウム六水和物,3N5
Holmium chloride hexahydrate, 3N5

$HoCl_3 \cdot 6H_2O$...379.37
CAS RN® ［14914-84-2］ mp718℃†

18642-23		>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	100g	￥25,500
18642-33		>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	25g	￥11,500

塩酸ヒドラジン → 塩化ヒドラジニウム

塩化ヒドラジニウム
Hydrazinium dichloride

危険

$N_2H_6Cl_2$...104.96 ［危］5-HY-2-II
CAS RN® ［5341-61-7］ mp198℃ †

18070-00		>98.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥5,800
18070-20		>98.0%(T)	鹿特級	G	100g	￥3,800
18070-30		>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,300
18070-80		>98.0%(T)	鹿特級		10kg	☆
18070-01		>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥5,700
18070-81		>95.0%(T)	鹿1級		10kg	☆

塩酸
Hydrochloric acid

危険

HCl...36.46 ［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［7647-01-0］

18078-00		35.0%～37.0%(T)	特級	G	500mL	￥950
18078-70		35.0%～37.0%(T)	特級	P	4kg	￥3,600
18078-80		35.0%～37.0%(T)	特級	P	23kg	☆
18078-02			特級(医薬品試験用)	G	500mL	￥1,200
18078-01		35.0%～37.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥800
18078-71		35.0%～37.0%(T)	鹿1級	P	4kg	￥3,500
18078-81		35.0%～37.0%(T)	鹿1級	P	23kg	☆
18721-08		35.0%～37.0%(T)	RoHS2対応用	G	500mL	￥1,900
18721-84		35.0%～37.0%(T)	RoHS2対応用	P	23kg	☆
18078-09		35.0%～37.0%(T)	鉄試験用	G	500mL	￥3,300
18078-08		35.0%～37.0%(T)	ひ素分析用	G	500mL	￥1,300
18078-06		35.0%～37.0%(T)	ｱﾐﾉ酸分析用	G	500mL	￥2,300
18078-07		35.0%～37.0%(T)	PCB分析用	G	500mL	￥2,400
18078-1B		abt 31.0%(T)	Ultrapur™	T	250mL	￥23,000
18078-4B		35.0%～37.0%(T)	Ultrapur™-100	P	500mL	￥6,400
18079-09		35.0%～37.0%(T)	金属分析用	G	500mL	￥3,000
318-1M	M（1.00318.0250）	>30.0%(T)	Suprapur®		250mL	￥11,200

塩酸
Hydrochloric acid

危険

HCl...36.46 ［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［7647-01-0］

18079-08	35.0%～38.0%(T)	医薬部外品原料規格	G	500mL	￥2,800
18079-84	35.0%～38.0%(T)	医薬部外品原料規格	P	23kg	☆

0.01mol/L塩酸(*N*/100)
0.01mol/L Hydrochloric acid (*N*/100)

HCl...36.46
CAS RN® ［7647-01-0］

18600-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥1,600

0.02mol/L塩酸(*N*/50)
0.02mol/L Hydrochloric acid (*N*/50)

危険

HCl...36.46
CAS RN® ［7647-01-0］

18599-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥1,800

0.05mol/L塩酸(*N*/20)
0.05mol/L Hydrochloric acid (*N*/20)

危険

HCl...36.46 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7647-01-0］

(ISO/IEC 17025)対応

18598-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥1,500

0.1mol/L塩酸(*N*/10)
0.1mol/L Hydrochloric acid (*N*/10)

危険

HCl...36.46 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7647-01-0］

18595-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥1,200
18595-76	容量分析用滴定液	P	3L	￥5,700
18595-79	容量分析用滴定液	P	1L	￥2,500
18603-08	医薬品試験用	P	500mL	￥1,800
18603-23	医薬品試験用	P	100mL	￥1,500

0.1mol/L塩酸(*N*/10)(2-プロパノール性)
0.1mol/L Hydrochloric acid (*N*/10), 2-propanolic

危険

HCl...36.46 ［危］4-AL-S-II ［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
Fp11.7℃†

18597-08		G	500mL	￥4,100

0.1mol/L塩酸(*N*/10)(アルコール性)
0.1mol/L Hydrochloric acid (*N*/10), alcoholic

危険

HCl...36.46 ［危］4-AL-S-II ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
Fp14℃†

18596-08		G	500mL	￥4,200

0.1mol/L塩酸(1L調製用濃縮液)
0.1mol/L Hydrochloric acid, Titrisol®

HCl...36.46 ［労］特-3,57,57-2

9973-1M	M（1.09973.0001）		1amp	￥4,370

0.2mol/L塩酸(*N*/5)
0.2mol/L Hydrochloric acid (*N*/5)

危険

HCl...36.46 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7647-01-0］

18594-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥1,300
18602-08	医薬品試験用	P	500mL	￥2,200
18602-23	医薬品試験用	P	100mL	￥1,900

0.5mol/L塩酸(*N*/2)
0.5mol/L Hydrochloric acid (*N*/2)

危険

HCl...36.46 ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7647-01-0］

18593-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥1,500
18593-76	容量分析用滴定液	P	3L	￥6,300
18601-08	医薬品試験用	P	500mL	￥2,200
18601-23	医薬品試験用	P	100mL	￥1,900

0.5mol/L塩酸(*N*/2)(アルコール性)
0.5mol/L Hydrochloric acid (*N*/2), alcoholic

危険

HCl...36.46 ［危］4-AL-S-II ［労］特-3,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
Fp14℃†

18623-08		G	500mL	￥6,300

1mol/L塩酸(1 *N*)
1mol/L Hydrochloric acid (1 *N*)

危険

HCl...36.46 ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7647-01-0］

18591-08	容量分析用滴定液		500mL	￥1,200
18591-79	容量分析用滴定液		1L	￥2,400
18604-08	土壌分析用		500mL	￥2,500
18604-76	土壌分析用		3L	￥11,000
18585-08	医薬品試験用		500mL	￥1,800
18585-23	医薬品試験用		100mL	￥1,500

1mol/L塩酸(1L調製用濃縮液)
1mol/L Hydrochloric acid, Titrisol®

HCl...36.46 ［劇］II ［労］特-3,57,57-2

9970-1M	M（1.09970.0001）	1amp	￥4,930

2mol/L塩酸(2 *N*)
2mol/L Hydrochloric acid (2*N*)

危険

HCl...36.46 ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7647-01-0］

18590-08	容量分析用滴定液		500mL	￥1,500

5mol/L塩酸(5 *N*)
5mol/L Hydrochloric acid (5*N*)

危険

HCl...36.46 ［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［7647-01-0］

18589-08	容量分析用滴定液		500mL	￥2,000

6mol/L塩酸(6 *N*)
6mol/L Hydrochloric acid (6*N*)

危険

HCl...36.46 ［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［7647-01-0］

18588-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥1,700

3%塩酸アルコール溶液
3% Hydrochloric acid alcohol solution

危険

HCl...36.46 ［危］4-AL-S-II ［労］特-3,57,57-2
Fp14℃†

18629-23	細菌検査用	G	100mL	￥1,900

塩酸(1+1)
Hydrochloric acid (1+1)

危険

HCl...36.46 ［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［7647-01-0］

18641-08		P	500mL	￥1,700

塩酸(1+16)
Hydrochloric acid (1+16)

危険

HCl...36.46 ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7647-01-0］

18645-02		P	500mL	￥3,100

塩酸(UE-E)
Hydrochloric acid (UE-E)

危険

HCl...36.46 ［劇］II ［労］特-3,57,57-2 ［麻］麻薬等原料
CAS RN® ［7647-01-0］

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

塩酸エタノール(Tbカラー用)
Hydrochloric acid in ethanol

［危］4-2-III［労］57-2

327-1M	M（1.00327.1000）	顕微鏡用	1L	￥6,890

塩化3-フェニルプロピオニル
3-Phenylpropionyl chloride

$C_6H_5CH_2CH_2COCl$...168.61 ［危］4-3-III
CAS RN® ［645-45-4］bp107℃ mp6℃ d1.137 Fp108℃

13438-1A	TFS（13438-0250）	25g	￥8,200
13438-2A	TFS（13438-1000）	100g	￥24,600

塩化ヒドロけい皮酸 → 塩化3-フェニルプロピオニル

塩化水素-1-ブタノール溶液(10)
Hydrogen chloride-1-butanol solution (10)

危険

［危］4-2-III［労］特-3,有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
Fp35℃†

in 1-butanol

18614-96	5.0%～10.0%(T)	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1mL×5	￥4,800

塩化水素-メタノール溶液(10)
Hydrogen chloride-methanol solution (10)

危険

［危］4-AL-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
Fp12℃†

in methanol

18615-08	5.0%～10.0%(T)	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	500mL	￥25,000
18615-33	5.0%～10.0%(T)	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	25mL	￥11,000

塩化水素-メタノール溶液(5)
Hydrogen chloride-methanol solution (5)

危険

［危］4-AL-S-II［労］特-3,有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
Fp12℃†

in methanol

18616-96	2.0%～5.5%(T)	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		1mL×5	￥4,400

塩化2-ヒドロキシエチルアンモニウム → 2-アミノエタノール塩酸塩

塩化2-ヒドロキシエチルアンモニウム → 2-アミノエタノール塩酸塩

塩化2-ヒドロキシエチルトリメチルアンモニウム → 塩化コリン

塩酸ヒドロキシルアミン → 塩化ヒドロキシルアンモニウム

塩酸ヒドロキシルアミン
Hydroxylamine hydrochloride

危険

$HONH_3Cl$...69.49 ［劇］III［危］5-HS-2-II
CAS RN® ［5470-11-1］ mp155℃～158℃

17036-1A	TFS（17036-0010）	1kg	￥15,100
17036-2A	TFS（17036-1000）	100g	￥3,300
17036-3A	TFS（17036-5000）	500g	￥7,400

塩酸ヒドロキシルアミン
Hydroxylamine hydrochloride

危険

$HONH_3Cl$...69.49 ［劇］III［危］5-HS-2-II
CAS RN® ［5470-11-1］ mp155℃～158℃

27010-1A	TFS（27010-0010）	1kg	￥19,100
27010-2A	TFS（27010-0050）	5kg	￥40,000
27010-3A	TFS（27010-1000）	100g	￥3,300
27010-4A	TFS（27010-2500）	250g	￥5,000

塩酸ヒドロキシルアミン
Hydroxylamine hydrochloride

危険

$HONH_3Cl$...69.49 ［劇］III ［危］5-HS-2-II
CAS RN® ［5470-11-1］ mp155℃～158℃

41205-1A	TFS（41205-0025）	2.5kg	￥65,900
41205-3A	TFS（41205-1000）	100g	￥4,700
41205-4A	TFS（41205-5000）	500g	￥15,000

塩化ヒドロキシルアンモニウム
Hydroxylammonium chloride

危険

$HONH_3Cl$...69.49 ［劇］III ［危］5-HS-2-II
CAS RN® ［5470-11-1］ mp152℃(dec.)†

18115-00	>98.0%(T)	特級	G	500g	￥5,500
18115-20	>98.0%(T)	特級	G	100g	￥2,500
18115-30	>98.0%(T)	特級	G	25g	￥1,800
18115-01	>96.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥5,000
18115-33	>98.0%(T)	鉄試験用	G	25g	￥4,200
18115-1B	>98.0%(T)	有害金属測定用	G	100g	￥6,200
18115-2B	>98.0%(T)	原子吸光分析用	G	500g	￥11,000

塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液(80g/L)
Hydroxylammonium chloride solution

警告

$HONH_3Cl$...69.49 ［劇］III
CAS RN® ［5470-11-1］

36523-08		水銀分析用	G	500mL	￥5,500

塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液(100g/L)
Hydroxylammonium chloride solution

警告

$HONH_3Cl$...69.49 ［劇］III

18800-09		鉄試験用		500mL	￥11,000

2-イミダゾリジンチオン
2-Imidazolidinethione

危険

$C_3H_6N_2S$...102.16 ［労］57,57-2［PRTR］1-42
CAS RN®［96-45-7］ mp197℃～201℃ Fp252℃

12203-1A	TFS（12203-0010）			1kg	￥20,400
12203-3A	TFS（12203-2500）			250g	￥8,800

塩化インジウム(III)四水和物,3N5
Indium(III) chloride tetrahydrate, 3N5

危険

$InCl_3 \cdot 4H_2O$...293.23 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-44
CAS RN®［22519-64-8］

20286-08	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	500g	￥79,000
20286-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥9,000

塩化イリジウム(III)
Iridium(III) chloride

警告

$IrCl_3$...298.57
CAS RN®［10025-83-9］ mp763℃(dec.)†

20067-62	>99.0%			1g	￥11,000

塩化イリジウム(III)三水和物(三塩化イリジウム三水和物)
Iridium(III) chloride trihydrate

警告

$Cl_3Ir \cdot 3H_2O$...352.61
CAS RN®［13569-57-8］

moisture sensitive

20068-35	90.0%(T)	Organics		25g	￥147,000
20068-55	90.0%(T)	Organics	G	5g	￥40,500
20068-65	90.0%(T)	Organics	G	1g	￥10,000

塩化ナトリウムイリジウム(III) *n* 水和物 → ヘキサクロロイリジウム(III)酸ナトリウム *n* 水和物 (ナトリウムヘキサクロロイリダート(III))

塩化ナトリウムイリジウム(IV)六水和物 → ヘキサクロロイリジウム(IV)酸ナトリウム六水和物 (ナトリウムヘキサクロロイリダート(IV))

塩化鉄(II)四水和物(塩化第一鉄四水和物)
Iron(II) chloride tetrahydrate

危険

$FeCl_2 \cdot 4H_2O$...198.81 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13478-10-9］

16033-00		99.0%～102.0%(T)	特級	P	500g	￥3,700
16033-30		99.0%～102.0%(T)	特級	G	25g	￥1,900
16033-01		99.0%～102.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥3,300
3861-2M	M（1.03861.1000）		EMSURE®		1kg	￥18,600

塩化鉄(III)六水和物(塩化第二鉄)
Iron(III) chloride hexahydrate

危険

$FeCl_3 \cdot 6H_2O$...270.29 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-71
CAS RN® ［10025-77-1］ mp37℃†

16018-00		>99.0%(T)	特級	P	500g	￥2,900
16018-30		>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,600
16018-01		>97.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥2,100
16018-81		>97.0%(T)	鹿1級	B	20kg	☆

塩化鉄(III)六水和物,3N(塩化第二鉄)
Iron(III) chloride hexahydrate, 3N

危険

$FeCl_3 \cdot 6H_2O$...270.29 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-71
CAS RN® ［10025-77-1］

16018-08		>99.9%(Im.S.)	高純度試薬	P	500g	￥5,700

塩化鉄(III)溶液
Iron(III) chloride solution

危険

［労］57,57-2［PRTR］1-71
CAS RN®［7705-08-0］ d(20/4℃) 1.36†

16020-01	34.0%～36.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥2,100

塩化鉄(III)溶液(BOD測定用D液)
Iron(III) chloride solution (Solution D)

CAS RN®［10025-77-1］

20501-08		BOD測定用	G	500mL	￥2,600

塩化鉄(III)無水(塩化第二鉄)
Iron(III) chloride, anhydrous

危険

$FeCl_3$...162.20 ［労］57,57-2［PRTR］1-71
CAS RN®［7705-08-0］ mp300℃†

16019-02	>96.0%(T)		P	500g	￥2,900

塩化鉄(III)無水(塩化第二鉄)
Iron(III) chloride, anhydrous

危険

$FeCl_3$...162.20 ［労］57,57-2［PRTR］1-71
CAS RN®［7705-08-0］

16943-1A	TFS（16943-0010）			1kg	￥6,900
16943-2A	TFS（16943-0025）			2.5kg	￥14,800
16943-3A	TFS（16943-0050）			5g	￥3,300

塩化鉄(III)の色の比較原液
Iron(III) chloride colorimetric stock solution

危険

［労］特-3,57,57-2［PRTR］1-71

45.0g/L～46.0g/L $FeCl_3 \cdot 6H_2O$(in HCl)

20317-23		医薬品試験用	G	100mL	￥5,500

塩化鉄(III)の色の比較原液(E)
Iron(III) chloride colorimetric stock solution (E)

危険

［労］特-3,57,57-2［PRTR］1-71

45.0g/L～46.0g/L $FeCl_3$・$6H_2O$(in HCl)

20353-23	医薬品試験用	G	100mL	￥5,500

塩化鉄(III)六水和物(塩化第二鉄)
Iron(III) chloride hexahydrate

危険

$FeCl_3$･$6H_2O$...270.29 ［労］57,57-2［PRTR］1-71
CAS RN® ［10025-77-1］ bp280℃～285℃ mp37℃

21709-1A	TFS（21709-0025）	2.5kg	￥52,200
21709-2A	TFS（21709-1000）	100g	￥4,700
21709-3A	TFS（21709-5000）	500g	￥15,500

塩化鉄(II)四水和物(塩化第一鉄四水和物)
Iron(II) chloride tetrahydrate

危険

$FeCl_2$･$4H_2O$...198.81 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13478-10-9］ mp105℃～110℃

20508-1A	TFS（20508-0010）	1kg	￥21,400
20508-2A	TFS（20508-0050）	5g	￥5,200
20508-3A	TFS（20508-2500）	250g	￥9,400

塩化イソブチル → 1-クロロ-2-メチルプロパン

塩化イソブチリル
Isobutyryl chloride

危険

C_4H_7ClO...106.54 ［危］4-1-II
CAS RN® ［79-30-1］ bp91℃～93℃▲ d1.01▲

16066-1A	TFS（16066-2500）	250mL	￥7,300
16066-2A	TFS（16066-0010）	1L	￥18,600
16066-3A	TFS（16066-0100）	10mL	￥5,300

塩化イソニコチノイル塩酸塩
Isonicotinoyl chloride hydrochloride

$C_6H_4ClNO \cdot HCl$...178.01
CAS RN® ［39178-35-3］ mp159℃～161℃†

21168-1A	TFS（21168-1000）	100g	￥23,900
21168-2A	TFS（21168-0250）	25g	￥7,800

二塩化[[2-(イソプロポキシ)-5-(*N*,*N*-ジメチルアミノスルホニル)フェニル]メチレン](トリシクロヘキシルホスフィン)ルテニウム(II)
[[2-(Isopropoxy)-5-(*N*,*N*-dimethylaminosulfonyl)phenyl]methylene](tricyclohexylphosphine)ruthenium(II) dichloride

$C_{30}H_{50}Cl_2NO_3PRuS$...707.73
CAS RN® ［918871-44-0］

20348-65	>90.0%(as Ru)	Organics	1g	￥29,000

塩化イソプロピル → 2-クロロプロパン

塩化イソプロピルマグネシウム-塩化リチウム錯体,テトラヒドロフラン溶液
Isopropylmagnesium chloride-lithium chloride complex, in tetrahydrofuran

危険

$C_3H_7MgCl \cdot LiCl$...145.26 ［危］3-OM-2-II ［労］有-2,57,57-2
CAS RN® ［745038-86-2］

20344-05	1.1mol/L～1.4mol/L	Organics		500mL	￥34,000
20344-25	1.1mol/L～1.4mol/L	Organics		100mL	￥15,000

塩化イソバレリル
Isovaleryl chloride

C_5H_9ClO...120.57 ［危］4-1-II
CAS RN® ［108-12-3］ bp115℃～117℃▲ d0.98▲

16928-1A	TFS（16928-0250）	25g	￥4,100
16928-2A	TFS（16928-1000）	100g	￥8,400
16928-3A	TFS（16928-5000）	500g	￥36,900

(*R*)-α-エチルアラニン一水和物
(*R*)-α-Ethylalanine monohydrate

$C_5H_{11}NO_2 \cdot H_2O$...135.16
CAS RN® ［3059-97-0］ mp276℃～278℃

38803-1A	TFS（38803-2500）	250mg	￥61,900

塩化ランタン七水和物
Lanthanum chloride heptahydrate

$LaCl_3 \cdot 7H_2O$...371.36
CAS RN® ［10025-84-0］ mp91℃(dec.)†

24010-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥2,500

塩化ランタン七水和物,4N
Lanthanum chloride heptahydrate, 4N

$LaCl_3 \cdot 7H_2O$...371.36
CAS RN® ［10025-84-0］

24010-13	>99.99%(Im.S.)	高純度試薬	P	250g	￥28,000

塩化ランタン溶液
Lanthanum chloride solution

危険

［労］57-2

in 0.04mol/L HCl

24238-1B	9.7%～10.3%(as La)(T)	原子吸光分析用	P	100mL	￥6,000

塩化ラウロイル
Lauroyl chloride

危険

$CH_3(CH_2)_{10}COCl$...218.76 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-16-3］ d(20/20℃) 0.92▲ Fp140℃†

24171-00	>95.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥8,000
24171-30	>95.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,900

塩化ラウリル → 1-クロロドデカン

塩化ラウリルトリメチルアンモニウム → 塩化 *n*-ドデシルトリメチルアンモニウム

塩基性酢酸鉛
Lead acetate, basic

危険

approx.$Pb(CH_3COO)_2 \cdot Pb(OH)_2$ ［劇］III ［労］鉛,57,57-2［PRTR］特1-305
CAS RN® ［1335-32-6］

24083-00	>33.0%(as PbO)(T)	鹿特級	P	500g	￥12,000
24083-01	>33.0%(as PbO)(T)	鹿1級	P	500g	￥10,500

塩化鉛(II)
Lead(II) chloride

危険

$PbCl_2$...278.10 ［劇］III ［労］鉛,57,57-2［PRTR］特1-305
CAS RN® ［7758-95-4］ mp501℃†

24047-00	>99.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥7,500
24047-30	>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,900
24047-01	>98.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥4,800

塩化鉛(II),3N
Lead(II) chloride, 3N

危険

$PbCl_2$...278.10 ［劇］III ［労］鉛,57,57-2［PRTR］特1-305
CAS RN®［7758-95-4］

24047-08	>99.9%(Im.S.)	高純度試薬	P	500g	￥8,000

鉛丹 → 酸化鉛(IV),鉛(II)

塩化リチウム
Lithium chloride

警告

LiCl...42.42
CAS RN®［7447-41-8］ mp605℃†

24122-00	>99.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥11,000
24122-20	>99.0%(T)	鹿特級	G	100g	￥3,900
24122-30	>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,000
24122-01	>98.2%(T)	鹿1級	P	500g	￥8,000
24122-34	>99.0%	分子生物学用		25g	￥2,800

塩化リチウム
Lithium chloride

警告

ClLi...42.42
CAS RN®［7447-41-8］bp1382℃ mp605℃ d2.06

41327-1A	TFS（41327-0025）	2.5kg	￥76,500
41327-2A	TFS（41327-0050）	5g	￥3,800
41327-3A	TFS（41327-1000）	100g	￥5,200
41327-4A	TFS（41327-5000）	500g	￥19,500

塩化リチウム,3N5
Lithium chloride, 3N5

警告

LiCl...42.42
CAS RN® [7447-41-8]

24122-08	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	P	500g	￥24,000
24122-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥5,000

塩化リチウム
Lithium chloride, anhydrous

警告

ClLi...42.42
CAS RN® [7447-41-8] bp1382℃ mp605℃ d2.06

19988-1A	TFS（19988-0020）			2kg	￥27,600
19988-3A	TFS（19988-1000）			100g	￥6,100
19988-4A	TFS（19988-5000）			500g	￥11,900

(塩基性)炭酸マグネシウム → 炭酸水酸化マグネシウム(塩基性炭酸マグネシウム)

塩化マグネシウム
Magnesium chloride

$MgCl_2 \cdot 6H_2O$...203.30
CAS RN® [7791-18-6] mp117℃†

58013-17	95.0%～103.0%(T)	食品添加物	P	500g	￥1,800

塩化マグネシウム六水和物
Magnesium chloride hexahydrate

$MgCl_2 \cdot 6H_2O$...203.30
CAS RN® [7791-18-6] mp117℃†

25009-00	>99.0%(T)	特級	P	500g	￥1,600
25009-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,200
25009-80	>99.0%(T)	特級		15kg	☆
25009-01	>98.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥1,400
25009-81	>98.0%(T)	鹿1級	B	15kg	☆

塩化マグネシウム六水和物 → 塩化マグネシウム

0.05mol/L塩化マグネシウム溶液
0.05mol/L Magnesium chloride solution

$MgCl_2 \cdot 6H_2O$...203.30
CAS RN®［7791-18-6］

25889-08		容量分析用滴定液	P	500mL	￥2,800

塩化マグネシウム ($MgCl_2$) 溶液
Magnesium Chloride ($MgCl_2$) Solution

$MgCl_2 \cdot 6H_2O$...203.30 ［凍］ -20℃以下

25mM

49882-84	NEB（B9021S）			1.5mL×4	￥3,300

塩化マンガン(II)四水和物
Manganese(II) chloride tetrahydrate

危険

$MnCl_2 \cdot 4H_2O$...197.90 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-412
CAS RN®［13446-34-9］ mp58℃†

25061-00	>99.0%(T)	特級	P	500g	￥4,100
25061-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥1,700
25061-01	>98.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥3,900

エチレンビス(ジチオカルバメート)マンガン(II)標準品 → マンネブ標準品

塩化水銀(I)(塩化第一水銀)(甘汞)
Mercury(I) chloride

危険

HgCl...236.04 ［劇］III ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-237
CAS RN®［10112-91-1］

25136-31	>98.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥5,500

塩化水銀(II)(塩化第二水銀)
Mercury(II) chloride

危険

$HgCl_2$...271.49 ［毒］II ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-237
CAS RN® ［7487-94-7］ mp277℃ †

25110-00	>99.5%(T)	特級	G	500g	☆
25110-20	>99.5%(T)	特級	G	100g	☆
25110-30	>99.5%(T)	特級	G	25g	☆

塩化水銀(II)(塩化第二水銀)
Mercury(II) chloride

危険

$HgCl_2$...271.49 ［毒］II ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-237
CAS RN® ［7487-94-7］bp302℃ mp277℃

42393-1A	TFS（42393-0025）	2.5kg	￥123,900
42393-3A	TFS（42393-1000）	100g	￥7,800
42393-4A	TFS（42393-5000）	500g	￥30,700

塩化メタコリン
Methacholine chloride

警告

$[CH_3COOCH(CH_3)CH_2N(CH_3)_3]Cl$...195.68 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［62-51-1］ mp170℃～173℃ †

01615-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥8,500

塩化メタリル → 3-クロロ-2-メチルプロペン

塩化メタンスルホニル
Methanesulfonyl chloride

危険

CH_3SO_2Cl...114.55 ［毒］II［危］4-3-III
CAS RN® ［124-63-0］ d1.473～1.478△ Fp110℃ †

25348-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500mL	￥4,500
25348-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25mL	￥2,200

塩化4-メトキシベンゾイル → 塩化 *p*-アニソイル

塩化β-メトキシエトキシメチル
β-Methoxyethoxymethyl chloride

$CH_3OCH_2CH_2OCH_2Cl$...124.56 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［3970-21-6］ d1.091†

18598-1A	TFS（18598-0250）		25g	￥15,800
18598-2A	TFS（18598-0100）		10g	￥10,500

塩化4-メトキシフェナシル
4-Methoxyphenacyl chloride

$H_3COC_6H_4COCH_2Cl$...184.61
CAS RN® ［2196-99-8］ mp98℃～100℃▲

42526-1A	TFS（42526-0010）		1g	￥8,600

塩化2-メチルベンゾイル
2-Methylbenzoyl chloride (2=*o*)

$CH_3C_6H_4COCl$...154.59 ［危］4-3-III
CAS RN® ［933-88-0］ bp213℃†

15337-2A	TFS（15337-1000）		100g	￥9,700
15337-3A	TFS（15337-0050）		5g	￥3,900

塩化 *p*-メチルベンゾイル → 塩化 *p*-トルオイル

塩化4-メチルベンジル → α-クロロ-*p*-キシレン

塩化2-メチルブチリル-d_9
2-Methylbutyryl-d_9 chloride

$CD_3CD_2CD(CD_3)COCl$...129.63
CAS RN® ［1219795-10-4］

49130-13	CDN（D-5463）	98 atom% D	1g	￥96,800

塩化3-メチルブチリル-d_9
3-Methylbutyryl-d_9 chloride

C_5ClD_9O...129.63
CAS RN® [1219803-46-9]

49141-46	CDN（D-6608）	98 atom% D		500mg	￥47,300

塩化 *D L*-2-メチルブチリル
DL-2-Methylbutyryl chloride

危険

$CH_3CH_2CH(CH_3)COCl$...120.57 ［危］4-1-II
CAS RN® [57526-28-0] bp117℃～121℃† d(20/20℃) 0.99▲

25740-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥38,500

塩化 *D L*-2-メチルブチリル
DL-2-Methylbutyryl chloride

危険

$CH_3CH_2CH(CH_3)COCl$...120.57 ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [57526-28-0] bp116℃～118℃ d0.98 Fp20℃

41415-1A	TFS（41415-0010）			1g	￥4,000
41415-2A	TFS（41415-0050）			5g	￥8,600
41415-3A	TFS（41415-0250）			25g	￥34,500
41415-4A	TFS（41415-1000）			100g	￥83,700

c i s-11,14-エイコサジエン酸メチル
Methyl *cis*-11,14-eicosadienoate

$C_{21}H_{38}O_2$...322.52 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® [2463-02-7]

49051-41	MTR（1193）	99%		100mg	☆

c i s-11,14-エイコサジエン酸メチル標準品
Methyl *cis*-11,14-eicosadienoate standard

$C_{21}H_{38}O_2$...322.52 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [2463-02-7]

49866-85	DES（C13112560）	食品分析用		100mg	￥45,000

エイコサン酸メチル
Methyl eicosanoate

$C_{21}H_{42}O_2$...326.55
CAS RN® [1120-28-1]

49050-24	MTR（1031）	99%		500mg	☆

エイコサン酸メチル標準品
Methyl eicosanoate standard

$C_{21}H_{42}O_2$...326.55 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1120-28-1] mp47℃～48℃▲

49862-05	DES（C13112840）		食品分析用	100mg	￥11,000

5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸メチル標準品
Methyl 5,8,11,14,17-eicosapentaenoate standard

$C_{21}H_{32}O_2$...316.47 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2734-47-6]

49789-53	ACC（UFA-025N）		食品分析用	100mg	￥28,500

エイコサペンタエン酸メチル
Methyl eicosapentaenoate

$C_{21}H_{32}O_2$...316.47 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2734-47-6]

49051-42	MTR（1194）	99%		25mg	☆

ｃｉｓ-5,8,11,14-エイコサテトラエン酸メチル
Methyl *cis*-5,8,11,14-eicosatetraenoate

$C_{21}H_{34}O_2$...318.49 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2566-89-4]

49050-27	MTR（1034）	99%		100mg	☆

ｃｉｓ-5,8,11,14-エイコサテトラエン酸メチル標準品
Methyl *cis*-5,8,11,14-eicosatetraenoate standard

$C_{21}H_{34}O_2$...318.49 [凍] -20℃以下
CAS RN® [2566-89-4] d0.91▲

49789-52	ACC（UFA-024N）		食品分析用	100mg	￥22,500

5,8,11-エイコサトリエン酸メチル
Methyl 5,8,11-eicosatrienoate

$C_{21}H_{36}O_2$...320.50 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-392 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［14602-39-2］

1mg/mL in hexane

49051-34	MTR（1179）		1mL	☆

8,11,14-エイコサトリエン酸メチル
Methyl 8,11,14-eicosatrienoate

$C_{21}H_{36}O_2$...320.50 ［凍］ -20℃以下

49051-84	MTR（1269）	99%	50mg	☆

c i s-11,14,17-エイコサトリエン酸メチル標準品
Methyl *cis*-11,14,17-eicosatrienoate standard

$C_{21}H_{36}O_2$...320.50 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［55682-88-7］ mp94℃～96℃▲ d0.89▲

49789-51	ACC（UFA-023N）	食品分析用	100mg	￥15,000

c i s-8,11,14-エイコサトリエン酸メチル標準品
Methyl *cis*-8,11,14-eicosatrienoate standard

$C_{21}H_{36}O_2$...320.50 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［21061-10-9］ d0.89▲

49789-50	ACC（UFA-022N）	食品分析用	100mg	￥36,000

c i s-11-エイコセン酸メチル
Methyl *cis*-11-eicosenoate

$C_{21}H_{40}O_2$...324.54 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［2390-09-2］

49050-26	MTR（1033）	99%	100mg	☆

c i s-11-エイコセン酸メチル標準品
Methyl *cis*-11-eicosenoate standard

$C_{21}H_{40}O_2$...324.54 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［2390-09-2］ mp-15℃▲ Fp113℃▲

49789-46	ACC（UFA-018N）	食品分析用	100mg	￥9,000

ｃ ｉ ｓ-5-エイコセン酸メチル標準品
Methyl *cis*-5-eicosenoate standard

$C_{21}H_{40}O_2$...324.54 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［20839-34-3］ bp401℃～405℃▲ d0.91▲

49789-47	ACC（UFA-019N）	食品分析用	100mg	￥18,000

ｃ ｉ ｓ-8-エイコセン酸メチル標準品
Methyl *cis*-8-eicosenoate standard

$C_{21}H_{40}O_2$...324.54 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［69119-99-9］ bp400℃▲ mp98℃～100℃▲ d0.87▲

49789-45	ACC（UFA-017N）	食品分析用	100mg	￥28,500

ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-11-エイコセン酸メチル標準品
Methyl *trans*-11-eicosenoate standard

$C_{21}H_{40}O_2$...324.54 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［69119-90-0］

49789-44	ACC（UFA-016N）	食品分析用	100mg	￥22,500

エライジン酸メチル標準品 → ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-9-オクタデセン酸メチル標準品

塩化メチレン → ジクロロメタン

塩化メチレン-ペール缶- → ジクロロメタン-ペール缶-

塩化メチレン標準原液 → ジクロロメタン標準原液

塩化メチレン CRM4005-a → ジクロロメタン CRM4005-a

塩化メチレン(脱水) → ジクロロメタン(脱水)

塩化メチレン(脱水) -Super- → ジクロロメタン(脱水) -Super-

塩化メチレン(脱水) -Super^2- → ジクロロメタン(脱水) -Super^2-

塩化メチレン-d_2(重水素化率99.5%) → ジクロロメタン-d_2(重水素化率99.5%)

塩化メチレン-d_2(重水素化率99.8%) → ジクロロメタン-d_2(重水素化率99.8%)

塩化メチレン-d_2(重水素化率99.8%以上) → ジクロロメタン-d_2(重水素化率99.8%以上)

エルカ酸メチル → *cis*-13-ドコセン酸メチル

4-エトキシ安息香酸メチル
Methyl 4-ethoxybenzoate

$CH_3CH_2OC_6H_4CO_2CH_3$...180.20
CAS RN® [23676-08-6]

29080-1A	TFS（29080-0250）		25g	￥19,600

塩化1-メチルイミダゾリウム
1-Methylimidazolium chloride

$C_4H_7ClN_2$...118.56
CAS RN® [35487-17-3]

49518-16	ILT（IL-0094-SG-0100）	98%	100g	￥28,000
49518-15	ILT（IL-0094-SG-0025）	98%	25g	￥16,000

塩化メチルマグネシウム,テトラヒドロフラン溶液
Methylmagnesium chloride, in tetrahydrofuran

危険

CH_3MgCl...74.79 ［危］3-OT-2-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN® [676-58-4]

25859-25	1.8mol/L～2.2mol /L	Organics	G	100mL	￥15,000

塩化メチルマロニル
Methyl malonyl chloride

$C_4H_5ClO_3$...136.53 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［37517-81-0］ d1.2730▲

41451-1A	TFS（41451-0050）	5g	￥7,000
41451-2A	TFS（41451-0250）	25g	￥21,700

塩化メチル水銀(II)標準品
Methylmercury(II) chloride standard

危険

CH_3ClHg...251.07 ［毒］II ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-237
CAS RN® ［115-09-3］ mp170℃～173℃†

26803-97	>95.0%(GC)	環境分析用	G	100mg	￥13,000

塩化2-メチル-3-ニトロベンジル
2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride

$CH_3C_6H_3(NO_2)CH_2Cl$...185.60
CAS RN® ［60468-54-4］ mp42℃～46℃▲

18740-1A	TFS（18740-0010）	1g	￥4,000

塩化1-メチル-3-オクタデシルイミダゾリウム
1-Methyl-3-octadecylimidazolium chloride

$C_{22}H_{43}ClN_2$...371.04
CAS RN® ［171058-19-8］ mp71℃▲

49515-41	ILT（IL-0160-HP）	>98.0%	100g	￥146,000
49515-40	ILT（IL-0160-HP）	>98.0%	25g	￥68,000

塩化1-メチル-3-オクチルイミダゾリウム
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride

$C_{12}H_{23}ClN_2$...230.77
CAS RN® ［64697-40-1］ d1.0124▲

49514-90	ILT（IL-0072-HP）	99%	100g	￥55,000
49514-89	ILT（IL-0072-HP）	99%	25g	￥24,000

塩化メチルローザニリン → ゲンチアナバイオレットB

塩化メチルスルホニル → 塩化メタンスルホニル

塩化メチルトリオクチルアンモニウム(R=C_8-C_{10})
Methyltrioctylammonium chloride(R=C_8-C_{10})

危険

$[(C_8H_{17})_3NCH_3]Cl$...404.15 ［危］4-3-III
CAS RN® ［63393-96-4］ Fp132℃†

25760-12	>70.0%(T)	G	250g	￥15,500
25760-32	>70.0%(T)	G	25g	￥3,900

エロコッカス ビリダンス KWIK-STIK™
Aerococcus viridans KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49824-94	MBL（0263P）	ATCC10400	2pack	￥11,500
49841-03	MBL（0276P）	ATCC11563	2pack	￥11,500
49824-95	MBL（0746P）	ATCC700406	2pack	￥13,500

エロモナス ヒドロフィラ KWIK-STIK™
Aeromonas hydrophila KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49841-04	MBL（0290P）	ATCC7965	2pack	￥11,500
49821-14	MBL（0870P）	ATCC7966	2pack	￥11,500
49821-16	MBL（0910P）	ATCC35654	2pack	￥11,500
49821-17	MBL（0637P）	ATCC49140	2pack	￥11,500

エドワードシエラ タルダ KWIK-STIK™
Edwardsiella tarda KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49822-06	MBL（0845P）	ATCC15947	2pack	￥11,500

エゲルセラ レンタ KWIK-STIK™
Eggerthella lenta KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49822-57	MBL（0936P）	ATCC43055	2pack	￥13,500

エイケネラ コローデンス KWIK-STIK™
Eikenella corrodens KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49841-35	MBL（0189P）	ATCCBAA-1152	2pack	￥11,500

エリザベスキンギア メニンゴセプチカ KWIK-STIK™
Elizabethkingia meningoseptica KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49821-74	MBL（0971P）	ATCC13253	2pack	￥11,500

エンテロバクター クロアカ KWIK-STIK™
Enterobacter cloacae KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49945-17	MBL（01202P）	ATCCBAA-2341	2pack	￥11,500
49944-14	MBL（01111P）	NCTC13406	2pack	￥13,500
49944-15	MBL（01105P）	NCTC13464	2pack	￥13,500

エンテロバクター クロアカ EZ-Accu Shot™
Enterobacter cloacae subsp.cloacae EZ-Accu Shot™

［冷］ 2℃～8℃

49946-06	MBL（0323A）	ATCC13047	5test	￥51,000

エンテロバクター クロアカ KWIK-STIK™
Enterobacter cloacae subsp.cloacae KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49822-09	MBL（0323P）	ATCC13047	2pack	￥9,500
49822-10	MBL（0313P）	ATCC23355	2pack	￥9,500
49822-11	MBL（0388P）	ATCC35030	2pack	￥9,500
49822-13	MBL（0639P）	ATCC49141	2pack	￥11,500
49844-53	MBL（01018P）	ATCCBAA-1143	2pack	￥13,500

エンテロバクター ゲルゴビエ KWIK-STIK™
Enterobacter gergoviae KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49843-97	MBL（0703P）	ATCC33028	2pack	￥14,500

エンテロバクター ホルメシェイ KWIK-STIK™
Enterobacter hormaechei KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49825-35	MBL（0755P）	ATCC700323	2pack	￥11,500

エンテロバクター ホルメシェイ KWIK-STIK™ Plus
Enterobacter hormaechei KWIK-STIK™ Plus

［冷］ 2℃～8℃

49945-72	MBL（0755X）	ATCC700323	2pack	￥45,000

エンテロコッカス カセリフラブス KWIK-STIK™
Enterococcus casseliflavus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49825-37	MBL（0761P）	ATCC700327	2pack	￥9,500

エンテロコッカス カセリフラブス KWIK-STIK™ Plus
Enterococcus casseliflavus KWIK-STIK™ Plus

［冷］ 2℃～8℃

49945-73	MBL（0761X）	ATCC700327	2pack	￥45,000

エンテロコッカス デュランス KWIK-STIK™
Enterococcus durans KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49822-19	MBL（0651P）	ATCC6056	2pack	￥11,500
49822-20	MBL（0623P）	ATCC11576	2pack	￥11,500

エンテロコッカス フェカーリス EZ-Accu Shot™
Enterococcus faecalis EZ-Accu Shot™

［冷］ 2℃～8℃

49820-70	MBL（0366A）	ATCC29212	5test	￥51,000

エンテロコッカス フェカリス EZ-CFU™
Enterococcus faecalis EZ-CFU™

［冷］ 2℃～8℃

49820-08	MBL（0366C）	ATCC29212	10test	￥99,000

エンテロコッカス フェカリス EZ-CFU™ One Step
Enterococcus faecalis EZ-CFU™ One Step

［冷］ 2℃～8℃

49842-64	MBL（0366Z）	ATCC29212	10test	￥100,000

エンテロコッカス フェカリス KWIK-STIK™
Enterococcus faecalis KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49822-24	MBL（0497P）	ATCC7080	2pack	￥11,500
49841-38	MBL（0181P）	ATCC14506	2pack	￥11,500
49822-25	MBL（0367P）	ATCC19433	2pack	￥11,500
49822-26	MBL（0366P）	ATCC29212	2pack	￥11,500
49841-39	MBL（0197P）	ATCC33186	2pack	￥14,500
49822-32	MBL（0959P）	ATCC51299	2pack	￥11,500
49843-72	MBL（0472P）	NCTC775	2pack	￥11,500
49844-00	MBL（0714P）	NCTC13379	2pack	￥16,500
49944-16	MBL（01089P）	ATCC51575	2pack	￥14,500
49944-17	MBL（0336P）	NCIMB13280	2pack	￥11,500

エンテロコッカス フェカリス KWIK-STIK™ Plus
Enterococcus faecalis KWIK-STIK™ Plus

［冷］ 2℃～8℃

49840-73	MBL（0366X）	ATCC29212	5pack	￥45,000

エンテロコッカス フェシウム KWIK-STIK™
Enterococcus faecium KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49820-31	MBL（01052P）	ATCC6057	2pack	￥14,500
49822-33	MBL（0677P）	ATCC6569	2pack	￥13,500
49822-34	MBL（0679P）	ATCC27270	2pack	￥14,500
49822-35	MBL（0968P）	ATCC35667	2pack	￥11,500
49844-34	MBL（01000P）	ATCC700221	2pack	￥11,500
49945-90	MBL（01260P）	ATCC8459	2pack	￥13,500
49944-18	MBL（01143P）	NCTC12204	2pack	￥11,500

エンテロコッカス ガリナルム KWIK-STIK™
Enterococcus gallinarum KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49822-37	MBL（0895P）	ATCC49573	2pack	￥11,500

エンテロコッカス ヒラエ EZ-Accu Shot™
Enterococcus hirae EZ-Accu Shot™

［冷］ 2℃～8℃

49946-07	MBL（0650A）	ATCC8043	5test	￥51,000

エンテロコッカス ヒラエ KWIK-STIK™
Enterococcus hirae KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49822-38	MBL（0650P）	ATCC8043	2pack	￥11,500
49822-39	MBL（0678P）	ATCC10541	2pack	￥14,500

エンテロコッカス ヒラエ KWIK-STIK™ Plus
Enterococcus hirae KWIK-STIK™ Plus

［冷］ 2℃～8℃

49820-40	MBL（0650X）	ATCC8043	5pack	￥45,000
49842-39	MBL（0678X）	ATCC10541	5pack	￥45,000

エンテロコッカス ラフィノスス KWIK-STIK™
Enterococcus raffinosus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49822-17	MBL（0857P）	ATCC49464	2pack	￥11,500

エンテロコッカス サッカロリティクス KWIK-STIK™
Enterococcus saccharolyticus KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49825-41	MBL（0223P）	ATCC43076	2pack	￥11,500

エシェリキア コリ EZ-Accu Shot™
Escherichia coli EZ-Accu Shot™

［冷］ 2℃～8℃

49844-64	MBL（0483A）	ATCC8739	5test	￥51,000
49946-08	MBL（0680A）	ATCC10536	5test	￥51,000
49946-09	MBL（0681A）	ATCC11229	5test	￥51,000
49946-20	MBL（0335A）	ATCC25922	5test	￥51,000

エシェリキア コリ EZ-CFU™
Escherichia coli EZ-CFU™

［冷］ 2℃～8℃

49820-09	MBL（0483C）	ATCC8739	10test	￥99,000

エシェリキア コリ EZ-CFU™ One Step
Escherichia coli EZ-CFU™ One Step

［冷］ 2℃～8℃

49840-90	MBL（0483Z）	ATCC8739	10test	￥100,000

エシェリキア コリ EZ-PEC™
Escherichia coli EZ-PEC™

［冷］ 2℃～8℃

49820-61	MBL（0483PEC）	ATCC8739	10piece	￥125,000
49944-86	MBL（0581-PEC）	NCIMB8545	10test	￥125,000

エシェリキア コリ KWIK-STIK™
Escherichia coli KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49822-42	MBL（0433P）	ATCC4157	2pack	￥11,500
49822-43	MBL（0483P）	ATCC8739	2pack	￥11,500
49822-44	MBL（0680P）	ATCC10536	2pack	￥13,500
49844-86	MBL（01050P）	ATCC10799	2pack	￥14,500
49822-45	MBL（0681P）	ATCC11229	2pack	￥11,500
49841-40	MBL（0502P）	ATCC11303	2pack	￥14,500
49822-46	MBL（0465P）	ATCC11775	2pack	￥11,500
49825-42	MBL（0747P）	ATCC13706	2pack	￥11,500
49843-03	MBL（0543P）	ATCC14169	2pack	￥11,500
49825-45	MBL（0203P）	ATCC23848	2pack	￥11,500
49822-49	MBL（0335P）	ATCC25922	2pack	￥8,500
49825-46	MBL（0204P）	ATCC33876	2pack	￥11,500
49822-53	MBL（0495P）	ATCC35218	2pack	￥11,500
49822-56	MBL（0422P）	ATCC35421	2pack	￥11,500
49822-54	MBL（0869P）	ATCC51446	2pack	￥11,500
49822-55	MBL（0860P）	ATCC51755	2pack	￥13,500
49825-44	MBL（0791P）	ATCC51813	2pack	￥13,500
49844-02	MBL（0706P）	NCTC10538	2pack	￥9,500
49945-18	MBL（01229P）	ATCCBAA-2523	2pack	￥11,500
49945-19	MBL（01233P）	ATCC51739	2pack	￥11,500
49945-21	MBL（01242P）	ATCCBAA-2452	2pack	￥11,500
49945-22	MBL（01193P）	NCTC13167	2pack	￥11,500
49945-23	MBL（01192P）	NCTC13216	2pack	￥11,500
49945-24	MBL（01244P）	NCTC13846	2pack	￥13,500
49945-91	MBL（01261P）	ATCCBAA-1429	2pack	￥13,500
49945-92	MBL（01259P）	CDCAR-0346	2pack	￥13,500
49945-93	MBL（01265P）	NCTC13353	2pack	￥11,500
49944-19	MBL（01037P）	ATCC15597	2pack	￥14,500
49944-23	MBL（01113P）	ATCCBAA-2469	2pack	￥14,500
49944-25	MBL（01085P）	NCTC13351	2pack	￥13,500
49944-26	MBL（01136P）	NCTC13476	2pack	￥13,500

エシェリキア コリ KWIK-STIK™ Plus
Escherichia coli KWIK-STIK™ Plus

［冷］ 2℃～8℃

49839-06	MBL（0483X）	ATCC8739	5pack	￥45,000
49842-40	MBL（0335X）	ATCC25922	5pack	￥45,000

エルシニア エンテロコリチカ KWIK-STIK™
Yersinia enterocolitica KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49946-18	MBL（01213P）	NCTC11174	2pack	￥14,500

エルシニア エンテロコリチカ KWIK-STIK™
Yersinia enterocolitica subsp.enterocolitica KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49824-86	MBL（0938P）	ATCC9610	2pack	￥13,500
49824-87	MBL（0316P）	ATCC23715	2pack	￥11,500
49824-88	MBL（0909P）	ATCC27729	2pack	￥11,500

エムクァント™アルミニウムテスト,10-250mg/L Al^{3+}
MQuant® aluminium test, 10-250mg/L Al^{3+}

［劇］II ［労］57-2

range 10mg/L～250mg/L Al^{3+} 試薬,容器入り

10015-1M	M（1.10015.0001）	1pack(100枚)	￥10,600

エムクァント™アンモニウムテスト(試薬,容器入り),10-400mg/L NH_4^+
MQuant® ammonium test, 10-400mg/L NH_4^+

［毒］II ［労］特-2,57,57-2 ［PRTR］1-237

range 10mg/L～400mg/L NH_4^+ 試薬,容器入り

10024-1M	M（1.10024.0001）	1pack(100枚)	￥8,360

エムクァント™ヒ素テスト(超高感度タイプ),0.005-0.5mg/L $As^{3+}/^{5+}$
MQuant® arsenic test, 0.005-0.5mg/L $As^{3+}/^{5+}$

［毒］II ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-237 保存 15℃～25℃

range 0.005mg/L～0.5mg/L $As^{3+}/^{5+}$

17927-1M	M（1.17927.0001）	1pack(100枚)	￥22,600

エムクァント™ヒ素テスト(高感度タイプ),0.02-3mg/L $As^{3+}/^{5+}$
MQuant® arsenic test, 0.02-3mg/L $As^{3+}/^{5+}$

［毒］II ［労］57-2

range 0.02mg/L～3mg/L $As^{3+}/^{5+}$

17917-1M	M（1.17917.0001）	1pack(100枚)	￥17,300

エムクァント™アスコルビン酸テスト,50-2000mg/L
MQuant® ascorbic acid test, 50-2000mg/L

range 50mg/L～2000mg/L

10023-1M	M（1.10023.0001）	1pack(100枚)	￥5,280

エムクァント™カルシウムテスト,10-100mg/L Ca^{2+}
MQuant® calcium test, 10-100mg/L Ca^{2+}

［劇］II ［労］57-2 ［冷］ 2℃～8℃

range 10mg/L～100mg/L Ca^{2+} 試薬,容器入り

10083-1M	M（1.10083.0001）	1pack(60枚)	￥12,000

エムクァント™炭酸塩硬度テスト,4-24°d
MQuant® carbonate hardness test, 4-24°d

保存 15℃～25℃

range 4°d～24°d

10648-1M	M（1.10648.0001）	1pack(100枚)	￥5,620

エムクァント™塩化物テスト,500-3000mg/L Cl^-
MQuant® chloride test, 500-3000mg/L Cl^-

［劇］III ［労］57-2［PRTR］1-88 ［冷］ 2℃～8℃

range 500mg/L～3000mg/L Cl^-

10079-1M	M（1.10079.0001）	1pack(100枚)	￥7,570

エムクァント™塩素テスト,0.5-20mg/L Cl_2
MQuant® chlorine test, 0.5-20mg/L Cl_2

［冷］ 2℃～8℃

range 0.5mg/L～20mg/L Cl_2

17925-1M	M（1.17925.0001）	1pack(75枚)	￥5,160

エムクァント™塩素テスト,25-500mg/L Cl_2
MQuant® chlorine test, 25-500mg/L Cl_2

［冷］ 2℃～8℃

range 25mg/L～500mg/L Cl_2

17924-1M	M（1.17924.0001）	1pack(100枚)	￥5,160

エムクァント™クロム酸テスト,3-100mg/L CrO_4^{2-}
MQuant® chromate test, 3-100mg/L CrO_4^{2-}

［劇］II ［労］特-3,57,57-2

range 3mg/L～100mg/L CrO_4^{2-} 試薬,容器入り

10012-1M	M（1.10012.0001）	1pack(100枚)	￥6,750

エムクァント™コバルトテスト,10-1000mg/L Co^{2+}
MQuant® cobalt test, 10-1000mg/L Co^{2+}

range 10mg/L～1000mg/L Co^{2+}

10002-1M	M（1.10002.0001）	1pack(100枚)	￥6,750

エムクァント™銅テスト,10-300mg/L Cu^{+}/Cu^{2+}
MQuant® copper test, 10-300mg/L Cu^{+}/Cu^{2+}

range 10mg/L～300mg/L Cu^{+}/Cu^{2+}

10003-1M	M（1.10003.0001）	1pack(100枚)	￥5,850

エムクァント™シアン化物テスト,1-30mg/L CN^{-}
MQuant® cyanide test, 1-30mg/L CN^{-}

［危］4-2-S-III［労］57-2［PRTR］1-342

range 1mg/L～30mg/L CN^{-}試薬,容器入り

10044-1M	M（1.10044.0001）	1pack(100枚)	￥12,000

エムクァント™ホルムアルデヒドテスト,10-100mg/L HCHO
MQuant® formaldehyde test, 10-100mg/L HCHO

［劇］II［労］57-2［冷］2℃～8℃

range 10mg/L～100mg/L HCHO 試薬、容器入り

10036-1M	M（1.10036.0001）	1pack(100枚)	￥9,390

エムクァント™グルコーステスト,10-500mg/L
MQuant® glucose test, 10-500mg/L

［冷］2℃～8℃

range 10mg/L～500mg/L

17866-1M	M（1.17866.0001）	1pack(50枚)	￥6,190

エムクァント™鉄テスト,3-500mg/L Fe^{2+}
MQuant® iron test, 3-500mg/L Fe^{2+}

range 3mg/L～500mg/L Fe^{2+}

10004-1M	M（1.10004.0001）	1pack(100枚)	￥4,830

エムクァント™鉛テスト,20-500mg/L Pb^{2+}
MQuant® lead test, 20-500mg/L Pb^{2+}

［労］57-2

range 20mg/L～500mg/L Pb^{2+}試薬,容器入り

10077-1M	M（1.10077.0001）	1pack(100枚)	￥10,100

エムクァント™マンガンテスト,2-100mg/L Mn^{2+}
MQuant® manganese test, 2-100mg/L Mn^{2+}

［労］57-2

range 2mg/L～100mg/L Mn^{2+}試薬,容器入り

10080-1M	M（1.10080.0001）	1pack(100枚)	￥14,800

エムクァント™モリブデンテスト,5-250mg/L Mo^{6+}
MQuant® molybdenum test, 5-250mg/L Mo^{6+}

［労］57-2［PRTR］1-1

range 5mg/L～250mg/L Mo^{6+}試薬,容器入り

10049-1M	M（1.10049.0001）	1pack(100枚)	￥11,600

エムクァント™ニッケルテスト,10-500mg/L Ni^{2+}
MQuant® nickel test, 10-500mg/L Ni^{2+}

range 10mg/L～500mg/L Ni^{2+}

10006-1M	M（1.10006.0001）	1pack(100枚)	￥4,710

エムクァント™硝酸テスト,10-500mg/L NO_3^-
MQuant® nitrate test, 10-500mg/L NO_3^-

［冷］ 2℃～8℃

range 10mg/L～500mg/L NO_3^-

10020-1M	M（1.10020.0001）	1pack(100枚)	￥4,490
10020-2M	M（1.10020.0002）	1pack(25枚)	￥2,860

エムクァント™亜硝酸テスト,0.1-3g/L NO_2^-
MQuant® nitrite test, 0.1-3g/L NO_2^-

［劇］III ［冷］ 2℃～8℃

range 0.1g/L～3g/L NO_2^-

10022-1M	M（1.10022.0001）	1pack(100枚)	￥5,160

エムクァント™亜硝酸テスト,0.5-10mg/L NO_2^-
MQuant® nitrite test, 0.5-10mg/L NO_2^-

［冷］ 2℃～8℃

range 0.5mg/L～10mg/L NO_2^-

10057-1M	M（1.10057.0001）	1pack(75枚)	￥4,250

エムクァント™亜硝酸テスト,2-80mg/L NO_2^-
MQuant® nitrite test, 2-80mg/L NO_2^-

［冷］ 2℃～8℃

range 2mg/L～80mg/L NO_2^-

10007-1M	M（1.10007.0001）	1pack(100枚)	￥4,480
10007-2M	M（1.10007.0002）	1pack(25枚)	￥2,860

エムクァント™過酢酸テスト,100-500mg/L
MQuant® peracetic acid test, 100-500mg/L

［冷］ 2℃～8℃

range 100mg/L～500mg/L

10001-1M	M（1.10001.0001）	1pack(100枚)	￥6,550

エムクァント™過酢酸テスト,500-2000mg/L Peracetic acid
MQuant® peracetic acid test, 500-2000mg/L Peracetic acid

［冷］ 2℃～8℃

range 500mg/L～2000mg/L Peracetic acid

17922-1M	M（1.17922.0001）	1pack(100枚)	￥6,550

エムクァント™過酢酸テスト,5-50mg/L Peracetic acid
MQuant® peracetic acid test, 5-50mg/L Peracetic acid

［冷］ 2℃～8℃

range 5mg/L～50mg/L Peracetic acid

10084-1M	M（1.10084.0001）	1pack(100枚)	￥6,550

エムクァント™過酸化物テスト, 活性
MQuant® peroxidase test, activity

［冷］ 2℃～8℃

活性(++,+,-) 試薬,容器入り

17828-1M	M（1.17828.0001）	1pack(100枚)	￥9,620

エムクァント™過酸化物テスト,0.5-25mg/L H_2O_2
MQuant® peroxide test, 0.5-25mg/L H_2O_2

［冷］ 2℃～8℃

range 0.5mg/L～25mg/L H_2O_2

10011-1M	M（1.10011.0001）	1pack(100枚)	￥4,480
10011-2M	M（1.10011.0002）	1pack(25枚)	￥2,860

エムクァント™過酸化物テスト,100-1000mg/L H_2O_2
MQuant® peroxide test, 100-1000mg/L H_2O_2

［冷］ 2℃～8℃

range 100mg/L～1000mg/L H_2O_2

10337-1M	M（1.10337.0001）	1pack(100枚)	￥6,430

エムクァント™過酸化物テスト,1-100mg/L H_2O_2
MQuant® peroxide test, 1-100mg/L H_2O_2

［冷］ 2℃～8℃

range 1mg/L～100mg/L H_2O_2

10081-1M	M（1.10081.0001）	1pack(100枚)	￥4,480

エムクァント™りん酸テスト,10-500mg/L PO_4^{3-}
MQuant® phosphate test, 10-500mg/L PO_4^{3-}

［劇］II ［労］特-3,57,57-2［PRTR］1-453

range 10mg/L～500mg/L PO_4^{3-} 試薬,容器入り

10428-1M	M（1.10428.0001）	1pack(100枚)	￥8,590

エムクァント™カリウムイオンテスト, 250-1500mg/L K^+
MQuant® potassium test, 250-1500mg/L K^+

range 250mg/L～1500mg/L K^+ 試薬,容器入り

17985-1M	M（1.17985.0001）	1pack(100枚)	￥11,000

エムクァント™第4級アンモニウム塩テスト,10-500mg/L Benzalkonium chloride
MQuant® quaternary ammonium compounds test, 10-500mg/L Benzalkonium chloride

保存 15℃～25℃

range 10mg/L～500mg/L Benzalkonium chloride

17920-1M	M（1.17920.0001）	1pack(100枚)	￥5,160

エムクァント™硫酸テスト,200-1600mg/L SO_4^{2-}
MQuant® sulfate test, 200-1600mg/L SO_4^{2-}

range 200mg/L～1600mg/L SO_4^{2-}

10019-1M	M（1.10019.0001）	1pack(100枚)	￥5,620

エムクァント™亜硫酸テスト,10-400mg/L SO_3^{2-}
MQuant® sulfite test, 10-400mg/L SO_3^{2-}

［冷］ 2℃～8℃

range 10mg/L～400mg/L SO_3^{2-}

10013-1M	M（1.10013.0001）	1pack(100枚)	￥4,580

エムクァント™すずテスト,10-200mg/L Sn^{2+}
MQuant® tin test, 10-200mg/L Sn^{2+}

［劇］II ［労］特-3,57,57-2

range 10mg/L～200mg/L Sn^{2+} 試薬,容器入り

10028-1M	M（1.10028.0001）	1pack(50枚)	￥11,400

エムクァント™総硬度テスト,<150,150-250,>250mg/L
MQuant® total hardness test, <150, 150-250, >250 mg/L

17934-1M	M（1.17934.0001）	1pack(100枚)	￥4,490

エムクァント™総硬度テスト,50-400mg/L
MQuant® total hardness test, 50-400mg/L

10029-1M	M（1.10029.0001）	1pack(5000枚)	￥86,500
10032-1M	M（1.10032.0001）	1pack(1000枚)	￥50,700

エムクァント™総硬度テスト,70-400mg/L
MQuant® total hardness test, 70-400mg/L

range 70mg/L～400mg/L

10025-1M	M（1.10025.0001）	1pack(100枚)	￥5,050

エムクァント™総硬度テスト,90-450mg/L
MQuant® total hardness test, 90-450mg/L

range 90mg/L～450mg/L

10046-1M	M（1.10046.0001）	1pack(100枚)	￥5,050

エムクァント™亜鉛テスト, 4-50mg/L Zn^{2+}
MQuant® zinc test, 4-50mg/L Zn^{2+}

［劇］II ［労］57-2

range 4mg/L～50mg/L Zn^{2+} 試薬,容器入り

17953-1M	M（1.17953.0001）	1pack(100枚)	￥7,910

塩化ミリストイル
Myristoyl chloride

危険

$CH_3(CH_2)_{12}COCl$...246.81 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-64-1］ mp-1℃† d0.911～0.917△

25387-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥14,000

塩化ミリスチルジメチルベンジルアンモニウム → 塩化テトラデシルジメチルベンジルアンモニウム

塩化ナフタレン-2-カルボニル → 塩化2-ナフトイル

塩化2-ナフタレンスルホニル
2-Naphthalenesulfonyl chloride

$C_{10}H_7ClO_2S$...226.68
CAS RN® ［93-11-8］ mp74℃～78℃▲

15844-1A	TFS（15844-0250）	25g	￥9,000
15844-2A	TFS（15844-1000）	100g	￥30,000

塩化1-ナフトイル
1-Naphthoyl chloride (1=α)

危険

$C_{10}H_7COCl$...190.62
CAS RN® [879-18-5] mp17℃† d(20/20℃) 1.27▲

28004-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥21,500

塩化1-ナフトイル
1-Naphthoyl chloride (1=α)

$C_{10}H_7COCl$...190.62
CAS RN® [879-18-5] bp190℃ mp16℃～19℃ d1.26 Fp>110℃

27038-1A	TFS（27038-0100）			10g	￥7,400
27038-2A	TFS（27038-0500）			50g	￥26,700

塩化2-ナフトイル
2-Naphthoyl chloride

危険

$C_{11}H_7ClO$...190.62
CAS RN® [2243-83-6]

28018-32	>97.0%(T)		G	25g	￥11,000
28018-52	>97.0%(T)		G	5g	￥5,400

塩化ネオジム六水和物,3N5
Neodymium chloride hexahydrate, 3N5

警告

$NdCl_3 \cdot 6H_2O$...358.69 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [13477-89-9] mp124℃†

28501-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥14,500

塩化ニッケル(II)六水和物
Nickel(II) chloride hexahydrate

危険

$NiCl_2 \cdot 6H_2O$...237.68 ［労］57,57-2［PRTR］特1-309 保存 30℃以下
CAS RN®［7791-20-0］

28115-00	>98.0%(T)	特級	P	500g	￥4,800
28115-20	>98.0%(T)	特級	G	100g	￥2,700
28115-30	>98.0%(T)	特級	G	25g	￥2,100
28115-80	>98.0%(T)	特級	B	20kg	☆
28115-01	>97.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥4,100
28115-81	>97.0%(T)	鹿1級	B	20kg	☆
28210-08	>98.0%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥5,800

塩化ニッケル(II)六水和物,3N5
Nickel(II) chloride hexahydrate, 3N5

危険

$NiCl_2 \cdot 6H_2O$...237.68 ［労］57,57-2［PRTR］特1-309 保存 30℃以下
CAS RN®［7791-20-0］

28115-08	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	P	500g	￥17,500
28115-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥4,300

塩化ニッケル(II)(無水)
Nickel(II) chloride, anhydrous

危険

$NiCl_2$...129.59 ［労］特-2,57,57-2［PRTR］特1-309
CAS RN®［7718-54-9］

28116-00	>96.0%(T)	鹿特級	P	500g	￥18,500
28116-01	>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥16,500

塩化ニッケル(II)六水和物
Nickel(II) chloride hexahydrate

危険

$NiCl_2 \cdot 6H_2O$...237.68 ［労］57,57-2 ［PRTR］特1-309
CAS RN® ［7791-20-0］

19357-1A	TFS（19357-0050）	5g	￥8,000
19357-2A	TFS（19357-0250）	25g	￥25,800
19357-3A	TFS（19357-1000）	100g	￥74,800

塩化ニッケル(II)六水和物
Nickel(II) chloride hexahydrate

危険

$NiCl_2 \cdot 6H_2O$...237.68 ［労］57,57-2 ［PRTR］特1-309
CAS RN® ［7791-20-0］

27051-1A	TFS（27051-0010）	1kg	￥21,100
27051-2A	TFS（27051-2500）	250g	￥8,500

塩化ニコチノイル塩酸塩
Nicotinoyl chloride hydrochloride

$C_5H_4NCOCl \cdot HCl$...178.01
CAS RN® ［20260-53-1］ bp151℃～157℃†

28531-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥14,500
33841-1A	TFS（33841-0050）			5g	￥4,100
33841-2A	TFS（33841-0250）			25g	￥13,400

塩化ニオブ(V)
Niobium(V) chloride

危険

$NbCl_5$...270.16
CAS RN® ［10026-12-7］ mp204.7℃▲

28503-52	>95.0%(G)			5g	￥9,000

塩化ニオブ(V)
Niobium(V) chloride

危険

$NbCl_5$...270.16
CAS RN®［10026-12-7］bp254℃ mp204.7℃～209.5℃

20169-1A	TFS（20169-0100）			10g	￥8,600
20169-2A	TFS（20169-0500）			50g	￥27,600

塩化2-ニトロベンゼンスルホニル
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride (2=*o*)

危険

$NO_2C_6H_4SO_2Cl$...221.62
CAS RN®［1694-92-4］ mp64℃～69℃△

28205-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥4,300

塩化4-ニトロベンゼンスルホニル
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride

$NO_2C_5H_4SO_2Cl$...221.62 ［危］5-NC-1-I
CAS RN®［98-74-8］ mp75.5℃～78.5℃▲

41585-1A	TFS（41585-1000）			100g	￥21,800
41585-2A	TFS（41585-0050）			5g	￥3,300
41585-3A	TFS（41585-0250）			25g	￥7,400

塩化4-ニトロベンゼンスルホニル
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride (4=*p*)

危険

$NO_2C_6H_4SO_2Cl$...221.62
CAS RN®［98-74-8］ mp78℃▲

28207-52	>95.0%(T)		G	5g	￥5,000

塩化2-ニトロベンゾイル
2-Nitrobenzoyl chloride

$O_2NC_6H_4COCl$...185.56 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［610-14-0］ bp148℃～149℃(9mm)▲ mp17℃～20℃▲ d1.404▲

23231-1A	TFS（23231-0250）		25g	￥19,300
23231-2A	TFS（23231-0050）		5g	￥6,400

塩化 *p*-ニトロベンゾイル
4-Nitrobenzoyl chloride (4=*p*)

危険

$NO_2C_6H_4COCl$...185.56 ［変］
CAS RN® ［122-04-3］ mp75℃†

28225-30		>97.0%(T)	鹿特級	25g	￥3,000
15043-1A	TFS（15043-5000）			500g	￥13,800
15043-2A	TFS（15043-0050）			5g	￥8,200
15043-3A	TFS（15043-1000）			100g	￥9,400
15043-4A	TFS（15043-2500）			250g	￥9,800

塩化 *m*-ニトロベンジル → *α*-クロロ-*m*-ニトロトルエン

塩化 *p*-ニトロベンジル → *α*-クロロ-*p*-ニトロトルエン

塩化ニトロブルーテトラゾリウム
Nitro blue tetrazolium chloride

$C_{40}H_{30}N_{10}O_6Cl_2$...817.63 ［危］5-NC-2-II ［冷］ 2℃～8℃
CAS RN® ［298-83-9］

24823-1M	M（1.24823.0500）	顕微鏡用	500mg	￥27,000

塩化 *p*-ニトロテトラゾリウムブルー → 塩化ニトロブルーテトラゾリウム

塩化 *n*-ノナノイル
n-Nonanoyl chloride

$CH_3(CH_2)_7COCl$...176.68 ［危］4-3-III
CAS RN® ［764-85-2］ d(20/20℃) 0.94▲

28374-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥5,200

塩化 *n*-オクタデカノイル → 塩化ステアロイル

塩化 *n*-オクタデシル → 1-クロロオクタデカン

塩化 *n*-オクタノイル
n-Octanoyl chloride

危険

$CH_3(CH_2)_6COCl$...162.65 ［危］4-3-III
CAS RN® ［111-64-8］ bp183℃～212℃† d0.946～0.952△

07135-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,600
12943-1A	TFS（12943-5000）			500g	￥10,200
12943-3A	TFS（12943-1000）			100g	￥3,900

塩化 *n*-オクチル → 1-クロロオクタン

塩化オレオイル
Oleoyl chloride

危険

$CH_3(CH_2)_7CH{:}CH(CH_2)_7COCl$...300.90 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-77-6］ d0.910† Fp171℃†

31106-32	>80.0%(GC)		G	25g	￥3,400

塩化オレイル → 1-クロロ-9-オクタデセン

塩化オキサリル,ジクロロメタン溶液
Oxalyl chloride, in dichloromethane

$C_2Cl_2O_2$...126.92 ［労］特-2(特有),57,57-2［PRTR］1-186 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［79-37-8］ d1.3350▲

2.0mol/L

36918-1A	TFS（36918-1000）	100mL	￥7,100
36918-2A	TFS（36918-8000）	800mL	￥28,900

塩化アンモニウムパラジウム(II) → 塩化パラジウム(II)アンモニウム

塩化パラジウム(II)
Palladium(II) chloride

危険

$PdCl_2$...177.32
CAS RN®［7647-10-1］ mp678℃～680℃†

32009-60		>99.0%(T)	特級	G	1g	￥10,500
49001-59	小島	>59.0%(as Pd)			25g	☆
49001-60	小島	>59.0%(as Pd)			100g	☆

塩化パラジウム(II)カリウム → テトラクロロパラジウム(II)酸カリウム(カリウムテトラクロロパラダート(II))

塩化パラジウム(II)ナトリウム
Palladium(II) sodium chloride

危険

2NaCl･$PdCl_2$...294.20
CAS RN®［13820-53-6］

32013-62	>95.0%(T)		G	1g	￥10,500

塩化パルミトイル
Palmitoyl chloride

危険

$CH_3(CH_2)_{14}COCl$...274.86 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-67-4］ mp11℃～12℃† d0.906†

32531-41		>98.0%(T)	鹿1級	G	10g	￥1,800
30429-1A	TFS（30429-5000）				500mL	￥19,800
30429-3A	TFS（30429-1000）				100mL	￥7,700

塩化パラローズアニリン
Pararosaniline chloride

$C_{19}H_{17}N_3$･HCl...323.81 ［労］特-2,57,57-2
CAS RN® ［569-61-9］ mp268℃～270℃▲

high purity biological stain

22788-1A	TFS（22788-1000）	100g	￥20,300
22788-2A	TFS（22788-0050）	5g	￥4,700
22788-3A	TFS（22788-0250）	25g	￥6,600

塩化ペラルゴニル → 塩化 *n*-ノナノイル

塩化(ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III),ダイマー → (ペンタメチルシクロペンタジエニル)イリジウム(III)ジクロリド,ダイマー

塩化ペンタノイル
Pentanoyl chloride

危険

$CH_3(CH_2)_3COCl$...120.57 ［危］4-2-S-III
CAS RN® ［638-29-9］ bp125℃～127℃†

16912-1A	TFS（16912-1000）	100g	￥6,900

塩化 *n*-ペンチル → 1-クロロペンタン

塩化フェナシル → α-クロロアセトフェノン

塩化1,10-フェナントロリニウム一水和物 → 1,10-フェナントロリン塩酸塩一水和物

塩化フェネチル → (2-クロロエチル)ベンゼン

塩化フェニルアセチル
Phenylacetyl chloride

危険

$C_6H_5CH_2COCl$...154.59 ［危］4-3-III
CAS RN®［103-80-0］bp94℃～95℃(12mm)▲ d1.169▲

32227-02			G	500mL	￥13,500
32227-32			G	25mL	￥2,200
13030-2A	TFS（13030-1000）			100g	￥4,000
13030-3A	TFS（13030-5000）			500g	￥16,400

塩化フェニルヒドラジニウム → フェニルヒドラジン塩酸塩

塩化フェニルメタンスルホニル → 塩化α-トルエンスルホニル

塩化3-フェニルプロペノイル → 塩化シンナモイル

塩化3-フェニルプロピオニル
3-Phenylpropionyl chloride

$C_6H_5CH_2CH_2COCl$...168.61 ［危］4-3-III
CAS RN®［645-45-4］ mp-7℃～-5℃† d(20/20℃) 1.14▲

32566-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥15,000

塩化フェニルセレニル
Phenylselenyl chloride

危険

C_6H_5SeCl...191.52 ［毒］I ［労］57,57-2［PRTR］1-242
CAS RN® ［5707-04-0］ bp120℃(20mm)▲ mp61℃～65℃▲

17951-1A	TFS（17951-0100）		10g	￥16,500
17951-2A	TFS（17951-0010）		1g	￥4,500
17951-3A	TFS（17951-0250）		25g	￥37,900
17951-4A	TFS（17951-0500）		50g	￥67,100

塩化ホスゲンイミニウム
Phosgene iminium chloride

$[Cl_2C{:}N(CH_3)_2]Cl$...162.44 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［33842-02-3］ mp183℃～187℃(dec.)†

17221-2A	TFS（17221-0250）		25g	￥15,600
17221-3A	TFS（17221-0050）		5g	￥5,100

塩化りん(V)
Phosphorus(V) chloride

危険

PCl_5...208.23 ［毒］II ［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® ［10026-13-8］

32194-01	96.0%～103.0%(T) 鹿1級	G	500g	￥4,100

塩化りん(V)
Phosphorus pentachloride

危険

PCl_5...208.23 ［毒］II ［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® ［10026-13-8］ bp160℃ mp167℃ d1.6

16946-1A	TFS（16946-0010）		1kg	￥14,900
16946-2A	TFS（16946-0025）		2.5kg	￥33,700
16946-4A	TFS（16946-1000）		100g	￥5,200

塩化ホスホリル
Phosphoryl chloride

危険

$POCl_3$...153.32 ［毒］II ［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® ［10025-87-3］ bp105.8℃† mp1.25℃† d1.645†

32192-00	99.0%～100.5%(T) 鹿特級	G	500g	￥4,600
32192-20	99.0%～100.5%(T) 鹿特級	G	100g	￥2,700
32192-01	98.5%～100.5%(T) 鹿1級	G	500g	￥4,300

塩化ホスホリルコリン-d_9カルシウム塩(*N*,*N*,*N*-トリメチル-d_9)
Phosphoryl choline-d_9 chloride calcium salt (*N*,*N*,*N*-trimethyl-d_9)

$CaO_2P(O)OCH_2CH_2N(CD_3)_3Cl$...266.72

49132-58	CDN（D-2135）	99 atom% D		100mg	￥39,600

塩化2-フタルイミドエタンスルホニル
2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride

危険

$C_{10}H_8ClNO_4S$...273.69
CAS RN® ［4403-36-5］

32567-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥16,500
32567-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥5,700

塩化2-ピコリル塩酸塩
2-Picolyl chloride hydrochloride

$C_6H_6ClN \cdot HCl$...164.03
CAS RN® ［6959-47-3］ mp122℃～126℃†

32322-52	>97.0%	G	5g	￥6,700
32322-62	>97.0%	G	1g	￥3,800
17212-1A	TFS（17212-1000）		100g	￥28,100
17212-2A	TFS（17212-0250）		25g	￥11,000
17212-3A	TFS（17212-0050）		5g	￥4,000

塩化3-ピコリル塩酸塩
3-Picolyl chloride hydrochloride

$C_6H_6ClN \cdot HCl$...164.03
CAS RN® [6959-48-4] mp138℃～143℃▲

13119-1A	TFS（13119-0250）	25g	￥20,500
13119-2A	TFS（13119-0050）	5g	￥6,400

塩化4-ピコリル塩酸塩
4-Picolyl chloride hydrochloride

$C_6H_6ClN \cdot HCl$...164.03
CAS RN® [1822-51-1] mp160℃～163℃▲

13120-1A	TFS（13120-0100）	10g	￥5,500
13120-2A	TFS（13120-1000）	100g	￥37,800

塩化ピペリジニウム → ピペリジン塩酸塩(塩酸ピペリジン)

エアーリークテスター (マイクロピペット用)
Pipette leak testing unit

70061-00	BRA（703970）	ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ用	1台	￥280,000

塩化ピバロイル
Pivaloyl chloride

危険

$(CH_3)_3CCOCl$...120.57 ［毒］II ［危］4-1-II ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [3282-30-2] bp105℃† d(20℃) 0.98† Fp13℃†

40597-20	>98.0%(GC)	鹿特級	G	100g	￥5,000
40597-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,300

塩化白金(IV)(無水)
Platinum(IV) chloride anhydrous

$PtCl_4$...336.89 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13454-96-1］

19540-1A	TFS（19540-0010）	1g	￥23,700
19540-2A	TFS（19540-0050）	5g	￥78,700
19540-3A	TFS（19540-2500）	250mg	￥10,200

塩化白金(II)カリウム(塩化第一白金酸カリウム) → テトラクロロ白金(II)酸カリウム

塩化白金(IV)カリウム(塩化第二白金カリウム) → ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム

塩化白金(IV)ナトリウム六水和物(塩化第二白金酸ナトリウム) → ヘキサクロロ白金(IV)酸ナトリウム六水和物

塩素酸カリウム
Potassium chlorate

危険

$KClO_3$...122.54 ［劇］III ［危］1-C-1-I
CAS RN® ［3811-04-9］ mp356℃ †

32325-00	>99.5%(T)	特級	P	500g	￥4,800
32325-30	>99.5%(T)	特級	G	25g	￥1,500
32325-01	>99.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥4,300

塩化カリウム
Potassium chloride

警告

KCl...74.55
CAS RN® [7447-40-7] mp770℃ †

32326-00		>99.5%(T)	特級	P	500g	￥1,400
32326-30		>99.5%(T)	特級	G	25g	￥1,000
32326-80		>99.5%(T)	特級	M	20kg	☆
32326-01		>99.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥1,200
32326-81		>99.0%(T)	鹿1級	M	20kg	☆
32326-23		>99.5%(T)	UGR	G	100g	￥2,400
32057-08		>99.5%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥2,000
32326-33		>99.9%(T)	電気伝導率測定用	G	25g	￥1,700
32326-34		>99.9%(T)	赤外分光分析用	G	25g	￥2,600
32326-24		>99.5%	分子生物学用	P	100g	￥1,500
58028-17		>99.0%(T)	食品添加物	P	500g	￥1,700
4938-1M	M（1.04938.0050）	>99.999%(Im.S.)	Suprapur®		50g	￥17,000

塩化カリウム
Potassium chloride

警告

KCl...74.55
CAS RN® [7447-40-7] mp770℃ †

32326-08		>99.0%(T)	医薬部外品原料規格	P	500g	￥1,600
32326-84		>99.0%(T)	医薬部外品原料規格	M	20kg	☆

塩化カリウム
Potassium chloride

警告

KCl...74.55
CAS RN® [7447-40-7] bp1420℃ mp770℃

42409-1A	TFS（42409-0010）				1kg	￥11,000
42409-2A	TFS（42409-0050）				5kg	￥33,800
42409-3A	TFS（42409-0250）				25g	￥4,200

塩化カリウム, 99.99%
Potassium chloride, 99.99%

警告

KCl...74.55
CAS RN® [7447-40-7] mp770℃†

32678-96	>99.99%(Im.S.)	Primepure(M)	P	50g	￥11,000

0.01mol/L塩化カリウム溶液(*N*/100)
0.01mol/L Potassium chloride solution (*N*/100)

KCl...74.55
CAS RN® [7447-40-7]

32887-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥2,900

0.02mol/L塩化カリウム溶液(*N*/50)
0.02mol/L Potassium chloride solution (*N*/50)

KCl...74.55
CAS RN® [7447-40-7]

32837-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥2,700

0.1mol/L塩化カリウム溶液(*N*/10)
0.1mol/L Potassium chloride solution (*N*/10)

KCl...74.55
CAS RN® [7447-40-7]

32836-08	容量分析用滴定液	P	500mL	￥2,600

3.3mol/L塩化カリウム溶液
3.3mol/L Potassium chloride solution

警告

KCl...74.55
CAS RN® [7447-40-7]

32888-08		P	500mL	￥2,200

塩化カリウム飽和溶液
Potassium chloride saturated solution

警告

KCl...74.55
CAS RN® [7447-40-7]

32895-08	P	500mL	￥2,500
32895-23	P	100mL	￥2,000

塩化白金酸カリウム → ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム

塩化銅(II)カリウム二水和物 → テトラクロロジアクア銅(II)酸カリウム

エチルキサント酸カリウム → ジチオ炭酸 *O*-エチルカリウム(エチルジチオ炭酸カリウム)

エチルキサントゲン酸カリウム → ジチオ炭酸 *O*-エチルカリウム(エチルジチオ炭酸カリウム)

塩化カリウムパラジウム(II) → テトラクロロパラジウム(II)酸カリウム(カリウムテトラクロロパラダート(II))

塩化カリウム白金(II) → テトラクロロ白金(II)酸カリウム

塩化カリウム白金(IV) → ヘキサクロロ白金(IV)酸カリウム

塩化プラセオジム(III)七水和物,3N5
Praseodymium(III) chloride heptahydrate, 3N5

警告

$PrCl_3 \cdot 7H_2O$...373.37 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [10025-90-8]

32636-23	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	100g	￥20,500
32636-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥10,500

塩化プロパノイル → 塩化プロピオニル

塩化プロピオニル
Propionyl chloride

危険

CH_3CH_2COCl...92.52 ［危］4-1-II
CAS RN® ［79-03-8］bp80℃† mp-94℃† d(20/20℃) 1.06▲

32430-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥4,300
32430-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥2,300

塩化プロピオニル
Propionyl chloride

危険

CH_3CH_2COCl...92.52 ［危］4-1-II
CAS RN® ［79-03-8］bp77℃～79℃ mp94℃ d1.06 Fp11℃

13153-1A	TFS（13153-0250）		25g	￥2,800
13153-2A	TFS（13153-2500）		250g	￥3,500
13153-3A	TFS（13153-5000）		500g	￥5,500

塩化プロピオニル-3,3,3-d_3
Propionyl-3,3,3-d_3 chloride

CD_3CH_2COCl...95.54 ［危］4-1-S-II
CAS RN® ［75695-44-2］

49133-21	CDN（D-5211）	99 atom% D	1g	￥61,600

塩化プロピオニル-d_5
Propionyl-d_5 chloride

CD_3CD_2COCl...97.55 ［危］4-1-S-II
CAS RN® ［352439-04-4］

49133-22	CDN（D-5212）	98 atom% D	1g	￥35,200

塩化 *i s o*-プロピル → 2-クロロプロパン

塩化 *n*-プロピル → 1-クロロプロパン

塩化 *i s o*-プロピルスルホニル
iso-Propylsulfonyl chloride

危険

$C_3H_7ClO_2S$...142.60 ［危］4-3-III
CAS RN® ［10147-37-2］

32112-45	Organics	10mL	￥11,500

塩化3-ピリジンカルボニル → 塩化ニコチノイル塩酸塩

エコPリザーバー8ch(未滅菌)
Reagent reservoir for 8ch(Non-sterilized)

49118-77 ニッピ（893221）		1pack(100枚)	￥8,000

塩化ロジウム(III)三水和物
Rhodium(III) chloride trihydrate

危険

$RhCl_3 \cdot 3H_2O$...263.30 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13569-65-8］

36018-62	>74.0%(as $RhCl_3$)(T)	G	1g	☆

塩化ロジウム(III)ナトリウム *n* 水和物 → ヘキサクロロロジウム(III)酸ナトリウム *n* 水和物(ナトリウムヘキサクロロローダート(III))

塩化ルビジウム
Rubidium chloride

RbCl...120.91
CAS RN® ［7791-11-9］ mp715℃†

36035-52	>95.0%	G	5g	￥4,800

塩化ルビジウム
Rubidium chloride

ClRb...120.91
CAS RN® [7791-11-9] bp1390℃ mp718℃

20126-1A	TFS（20126-0100）			10g	￥10,000
20126-2A	TFS（20126-0500）			50g	￥34,500

塩化ルテニウム(III) *n* 水和物,3N
Ruthenium chloride *n*-hydrate, 3N

警告

$RuCl_3 \cdot nH_2O$
CAS RN® [14898-67-0]

36502-43	>99.9%(Im.S.)	高純度試薬	G	10g	￥93,000
36502-63	>99.9%(Im.S.)	高純度試薬	G	1g	￥12,500

塩化ルテニウム(III) *n* 水和物
Ruthenium(III) chloride *n*-hydrate

警告

$RuCl_3 \cdot nH_2O$
CAS RN® [14898-67-0]

36502-62	>80.0%(as $RuCl_3$)(T)		G	1g	￥8,500
36502-35	>80.0%(as $RuCl_3$)(T)	Organics	G	25g	￥98,000
36502-55	>80.0%(as $RuCl_3$)(T)	Organics	G	5g	￥26,000
36502-65	>80.0%(as $RuCl_3$)(T)	Organics	G	1g	￥7,000

塩化ルテニウム(III)三水和物(三価調製品)
Ruthenium(III) chloride trihydrate (processed product)

警告

$RuCl_3 \cdot 3H_2O$...261.47
CAS RN® [13815-94-6]

moisture sensitive

36503-35	>98.0%	Organics	G	25g	￥80,000
36503-55	>98.0%	Organics	G	5g	￥19,000
36503-65	>98.0%	Organics	G	1g	￥5,500

塩化ルテニウム(III)水和物
Ruthenium(III) chloride hydrate

警告

$RuCl_3 \cdot nH_2O$
CAS RN®［14898-67-0］

19548-1A	TFS（19548-0010）			1g	￥4,700
19548-2A	TFS（19548-0050）			5g	￥20,100

塩化サマリウム(III)六水和物,3N5
Samarium(III) chloride hexahydrate, 3N5

警告

$SmCl_3 \cdot 6H_2O$...364.80 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［13465-55-9］

37988-13	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	P	250g	￥48,000
37988-33	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	25g	￥8,500

泳動用緩衝液(10×SDS-PAGE) → 10×SDS-PAGE泳動用緩衝液

塩化セバコイル
Sebacoyl chloride

$C_{10}H_{16}Cl_2O_2$...239.13 ［危］4-3-III
CAS RN®［111-19-3］ mp-2.5℃▲ d1.12▲

29490-1A	TFS（29490-2500）	tech.	250g	￥19,300
29490-2A	TFS（29490-0500）	tech.	50g	￥6,000
29490-3A	TFS（29490-5000）	tech.	500g	￥28,300

塩化セバシル → 二塩化セバコイル

セミカルバジド塩酸塩(塩酸セミカルバジド)
Semicarbazide hydrochloride

$NH_2NHCONH_2$･HCl...111.53 ［危］5-HY-2-II
CAS RN® ［563-41-7］ mp170℃～178℃

13264-2A	TFS（13264-1000）			100g	￥2,900
13264-3A	TFS（13264-5000）			500g	￥7,500

塩化銀(I)
Silver(I) chloride

AgCl...143.32
CAS RN® ［7783-90-6］ mp455℃†

37065-00	>99.5%(T)	鹿特級	P	500g	￥90,000
37065-30	>99.5%(T)	鹿特級	G	25g	￥13,500
37065-31	>99.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥12,000

塩素酸ナトリウム
Sodium chlorate

危険

$NaClO_3$...106.44 ［劇］III［危］1-C-1-I
CAS RN® ［7775-09-9］ mp248℃～261℃†

37143-00	>99.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥5,300
37143-30	>99.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,200
37143-01	>98.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥5,000

塩化ナトリウム
Sodium chloride

警告

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5] mp801℃†

37144-00		>99.5%(T)	特級	P	500g	￥1,100
37144-86		>99.5%(T)	特級	P	5kg	￥8,500
37144-80		>99.5%(T)	特級	B	20kg	☆
37144-02			特級(医薬品試験用)	P	500g	￥1,600
37144-01		>99.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥900
37144-88		>99.0%(T)	鹿1級	P	5kg	￥8,000
37144-81		>99.0%(T)	鹿1級	B	20kg	☆
37062-08		>99.5%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥1,800
37144-96		>99.95%(T)	容量分析用標準物質	G	50g	￥4,600
37144-1B		>99.5%(T)	残留農薬試験・PCB試験用	G	500g	￥7,500
37144-09		>99.5%(T)	ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ試験用	G	500g	￥8,500
37504-08		>99.5%(T)	Biopur	P	500g	￥3,000
37144-23		>99.5%	分子生物学用	P	100g	￥2,000
6406-1M	M（1.06406.0050）	>99.99%(Im.S.)	Suprapur®		50g	￥15,400

塩化ナトリウム
Sodium chloride

警告

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5] bp1461℃ mp801℃

42429-1A	TFS（42429-0010）	1kg	￥8,800
42429-2A	TFS（42429-0050）	5kg	￥18,700
42429-3A	TFS（42429-0250）	25g	￥3,700
42429-4A	TFS（42429-0251）	25kg	￥58,100
42429-5A	TFS（42429-5000）	500g	￥4,500

塩化ナトリウム
Sodium chloride

警告

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5] bp1461℃ mp801℃

20779-1A	TFS（20779-0010）	1kg	￥6,400
20779-2A	TFS（20779-0050）	5kg	￥18,000
20779-3A	TFS（20779-0250）	25kg	￥38,900

塩化ナトリウム(UE-E)
Sodium chloride (UE-E)

警告

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5] mp801℃†

本品は製造専用医薬品のため、購入に際しましては医薬品医療機器等法上ライセンス及び用途の確認が必要になります。

38129-08	99.0%～100.5%(T)	日本薬局方(製造専用)	G	500g	☆
38129-84	99.0%～100.5%(T)	日本薬局方(製造専用)	M	10kg	☆

塩化ナトリウム, 99.995%
Sodium chloride, 99.995%

警告

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5]

37505-96	>99.995%(Im.S.)	Primepure(M)	P	50g	￥24,000

塩化ナトリウム
Sodium chloride, DNAse, RNAse and Protease free

警告

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5] bp1461℃ mp801℃

32730-1A	TFS（32730-0010）	1kg	￥8,100
32730-2A	TFS（32730-0025）	2.5kg	￥16,000

0.01mol/L塩化ナトリウム溶液(*N*/100)
0.01mol/L Sodium chloride solution (*N*/100)

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5]

37836-08	容量分析用滴定液		500mL	￥2,500

0.02mol/L塩化ナトリウム溶液(*N*/50)
0.02mol/L Sodium chloride solution (*N*/50)

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5]

37835-08	容量分析用滴定液		500mL	￥3,000

0.05mol/L塩化ナトリウム溶液(*N*/20)
0.05mol/L Sodium chloride solution(*N*/20)

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5]

37918-08	容量分析用滴定液		500mL	￥3,000

0.1mol/L塩化ナトリウム溶液(*N*/10)
0.1mol/L Sodium chloride solution (*N*/10)

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5]

(ISO/IEC 17025)対応

37834-08	容量分析用滴定液		500mL	￥2,200

0.2mol/L塩化ナトリウム試液
0.2mol/L Sodium chloride test solution

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5]

38018-79	医薬品試験用		1L	￥4,200

1mol/L塩化ナトリウム溶液(1 *N*)
1mol/L Sodium chloride solution (1*N*)

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5]

37926-08	容量分析用滴定液		500mL	￥2,500

5%塩化ナトリウム溶液
5% Sodium chloride solution

NaCl...58.44
CAS RN® [7647-14-5]

37897-82	P	18L	☆

エキリン-2,4,16,16-d_4 硫酸ナトリウム
Sodium equilin-2,4,16,16-d_4 sulfate

$C_{18}H_{15}D_4O_5SNa$...374.42 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [285979-81-9]

49152-77	CDN（D-5285）	97 atom% D	20mg	￥94,600

17β-エストラジオール-16,16,17-d_3 3-グルクロニドナトリウム
Sodium 17β-estradiol-16,16,17-d_3 3-glucuronide

$C_{24}H_{28}D_3O_8Na$...473.50 [冷] 0℃～6℃

49143-53	CDN（D-6867）	99 atom% D	5mg	￥101,200

17β-エストラジオール-2,4,16,16-d_4 3-硫酸ナトリウム
Sodium 17β-estradiol-2,4,16,16-d_4 3-sulfate

$C_{18}H_{19}D_4O_5SNa$...378.45 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [352431-50-6]

49152-78	CDN（D-5287）	98 atom% D	20mg	￥86,900

エストロン-2,4,16,16-d_4 硫酸ナトリウム
Sodium estrone-2,4,16,16-d_4 sulfate

$C_{18}H_{17}D_4O_5SNa$...376.43 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [285979-80-8]

49152-79	CDN（D-5272）	98 atom% D	100mg	￥94,600

1,2-エタンジスルホン酸二ナトリウム
di-Sodium 1,2-ethanedisulfonate

$NaO_3SCH_2CH_2SO_3Na$...234.16
CAS RN® [5325-43-9]

11011-32	G	25g	￥8,000

エチルキサント酸ナトリウム → ジチオ炭酸 *O*-エチルナトリウム(エチルジチオ炭酸ナトリウム)

エチルキサントゲン酸ナトリウム → ジチオ炭酸 *O*-エチルナトリウム(エチルジチオ炭酸ナトリウム)

塩化金(III)ナトリウム二水和物 → テトラクロロ金(III)酸ナトリウム二水和物

塩化イリジウム(III)ナトリウム *n* 水和物 → ヘキサクロロイリジウム(III)酸ナトリウム *n* 水和物(ナトリウムヘキサクロロイリダート(III))

塩化イリジウム(IV)ナトリウム六水和物 → ヘキサクロロイリジウム(IV)酸ナトリウム六水和物(ナトリウムヘキサクロロイリダート(IV))

塩化ナトリウムパラジウム(II) → 塩化パラジウム(II)ナトリウム

塩化ナトリウム白金(IV)六水和物 → ヘキサクロロ白金(IV)酸ナトリウム六水和物

塩化ナトリウムロジウム(III) *n* 水和物 → ヘキサクロロロジウム(III)酸ナトリウム *n* 水和物(ナトリウムヘキサクロロローダート(III))

塩化ステアロイル
Stearoyl chloride

危険

$CH_3(CH_2)_{16}COCl$...302.92 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-76-5］ mp7℃† Fp165℃†

37440-31	>95.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥6,500

塩化ステアリル → 1-クロロオクタデカン

塩化ストロンチウム六水和物
Strontium chloride hexahydrate

警告

$SrCl_2 \cdot 6H_2O$...266.61
CAS RN® [10025-70-4]

37340-00	>99.0%(T)	特級	P	500g	￥6,000
37340-30	>99.0%(T)	特級	G	25g	￥2,100
37340-01	>98.5%(T)	鹿1級	P	500g	￥5,900
37340-1B	>99.0%(T)	原子吸光分析用	G	100g	￥7,500

塩化ストロンチウム溶液
Strontium chloride solution

危険

$SrCl_2$...158.52 [労] 57,57-2

37877-1B	9.9g/L～10.1g/L(as Sr)	原子吸光分析用	P	500mL	￥6,500

塩化ストロンチウム(無水)
Strontium chloride, anhydrous

$SrCl_2$...158.52
CAS RN® [10476-85-4] mp874℃ †

37404-01	>98.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥13,500

塩化ストロンチウム六水和物
Strontium chloride hexahydrate

警告

$SrCl_2 \cdot 6H_2O$...266.61
CAS RN® [10025-70-4] mp115℃

31508-1A	TFS（31508-1000）			100g	￥3,700
31508-2A	TFS（31508-5000）			500g	￥14,000

塩化スクシニル → 二塩化スクシニル

塩化タンタル(V)
Tantalum(V) chloride

危険

$TaCl_5$...358.20
CAS RN® [7721-01-9]

40003-32	>97.0%(T)		G	25g	￥21,000

塩化タンタル(V)
Tantalum(V) chloride

危険

$TaCl_5$...358.20
CAS RN® [7721-01-9] bp242℃ mp221℃

20391-1A	TFS（20391-0050）			5g	￥8,600
20391-2A	TFS（20391-0250）			25g	￥25,000
20391-3A	TFS（20391-1000）			100g	￥77,000

塩化テルビウム(III)六水和物,3N5
Terbium(III) chloride hexahydrate, 3N5

警告

$TbCl_3 \cdot 6H_2O$...373.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [13798-24-8]

41009-23	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	100g	￥65,000
41009-43	>99.95%(Im.S.)	高純度試薬	G	10g	￥14,000

塩化テトラ-*n*-アミルアンモニウム → 塩化テトラ-*n*-ペンチルアンモニウム

塩化テトラブチルアンモニウム
Tetrabutylammonium chloride

$[CH_3(CH_2)_3]_4NCl$...277.91
CAS RN® [1112-67-0]

17412-1A	TFS（17412-0250）	tech.		25g	￥17,000
17412-2A	TFS（17412-1000）	tech.		100g	￥60,000
17412-3A	TFS（17412-0050）	tech.		5g	￥5,900
17412-4A	TFS（17412-5000）	tech.		500g	￥237,000

塩化 *n*-テトラデカノイル → 塩化ミリストイル

塩化テトラデシルジメチルベンジルアンモニウム
Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride

危険

$C_{23}H_{42}NCl$...368.03
CAS RN® [139-08-2]

40862-53	>89.0%(T)	水質試験用	G	5g	￥5,600

塩化テトラエチルアンモニウム水和物
Tetraethylammonium chloride hydrate

$C_8H_{20}ClN \cdot nH_2O$
CAS RN® [56-34-8]

15090-1A	TFS（15090-1000）			100g	￥16,200
15090-2A	TFS（15090-0250）			25g	￥5,400
15090-3A	TFS（15090-5000）			500g	￥66,600

塩化テトラエチルアンモニウム一水和物
Tetraethylammonium chloride monohydrate

$(C_2H_5)_4NCl \cdot H_2O$...183.71 保存 25℃以下
CAS RN® [68696-18-4]

40053-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥6,000

塩化テトラヒドロフルフリル
Tetrahydrofurfuryl chloride

C_5H_9ClO...120.57 ［危］4-2-III
CAS RN® [3003-84-7] bp150℃～151℃▲ d1.11▲

27950-1A	TFS（27950-1000）			100g	￥18,300

塩化テトラメチルアンモニウム
Tetramethylammonium chloride

危険

$(CH_3)_4NCl$...109.59
CAS RN® [75-57-0] mp230℃(dec.)†

40527-00		>96.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥9,500
40527-30		>96.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,900
13833-1A	TFS（13833-1000）				100g	￥4,000
13833-3A	TFS（13833-2500）				250g	￥7,800

塩化テトラメチル-d_{12}-アンモニウム
Tetramethyl-d_{12}-ammonium chloride

$(CD_3)_4NCl$...121.67
CAS RN® [23789-03-9]

49134-54	CDN（D-1147）	99 atom% D			500mg	￥25,300

塩化テトラ-*n*-ペンチルアンモニウム
Tetra-*n*-pentylammonium chloride

警告

$[CH_3(CH_2)_4]_4NCl$...334.02
CAS RN® [4965-17-7]

40509-51		>96.0%(T)	鹿1級	G	5g	￥14,000

塩化テトラフェニルアルソニウム一水和物
Tetraphenylarsonium chloride monohydrate

危険

$(C_6H_5)_4AsCl \cdot H_2O$...436.80 [毒] II [労] 特-2,57,57-2
CAS RN® [104170-16-3] mp204℃～208℃(dec.)†

40536-52		>98.0%(T)		G	5g	￥38,000
40536-62		>98.0%(T)		G	1g	￥13,000

塩化テトラフェニルホスホニウム
Tetraphenylphosphonium chloride

$[(C_6H_5)_4P]Cl$...374.83
CAS RN® [2001-45-8] mp275℃～280℃▲

20403-1A	TFS（20403-0500）		50g	￥32,900
20403-2A	TFS（20403-0100）		10g	￥9,600

塩化テトラプロピルアンモニウム
Tetrapropylammonium chloride

$C_{12}H_{28}ClN$...221.80
CAS RN® [5810-42-4] mp223℃▲

42071-1A	TFS（42071-0250）		25g	￥11,900

塩化テトラプロピル-d_{28}-アンモニウム
Tetrapropyl-d_{28}-ammonium chloride

$(CD_3CD_2CD_2)_4NCl$...249.98

49134-70	CDN（D-5812）	98 atom% D	50mg	￥74,800

塩化チオニル
Thionyl chloride

危険

$SOCl_2$...118.97 ［劇］I ［労］57,57-2 ［化兵］-2
CAS RN® [7719-09-7] bp76℃† mp-105℃† d(15/15℃) 1.64～1.67△

40131-00	鹿特級	G	500mL	￥3,700
40131-01	鹿1級	G	500mL	￥2,900

塩化2-チオフェンアセチル
2-Thiopheneacetyl chloride

C_6H_5ClOS...160.62 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [39098-97-0] d1.30▲

23223-1A	TFS（23223-0500）		50g	￥13,700
23223-2A	TFS（23223-0050）		5g	￥2,900

塩化2-チオフェンカルボニル
2-Thiophenecarbonyl chloride

C_5H_3ClOS...146.59 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［5271-67-0］ bp205℃～208℃▲ d1.372▲

18777-1A	TFS（18777-0250）	25mL	￥4,500
18777-2A	TFS（18777-1000）	100mL	￥14,100

塩化2-チオフェンスルホニル
2-Thiophenesulfonyl chloride

$C_4H_3ClO_2S_2$...182.65
CAS RN® ［16629-19-9］ mp27℃～29℃▲

42089-2A	TFS（42089-0050）	5g	￥9,500

塩化すず(II)二水和物(塩化第一すず二水和物)
Tin(II) chloride dihydrate

危険

$SnCl_2 \cdot 2H_2O$...225.64 ［劇］III ［労］57,57-2 保存 30℃以下
CAS RN® ［10025-69-1］ mp38℃†

37318-00	>97.0%(T)	特級	G	500g	￥8,500
37318-20	>97.0%(T)	特級	G	100g	￥3,000
37318-30	>97.0%(T)	特級	G	25g	￥2,100
37318-01	>93.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥7,000
37318-1B	>97.0%(T)	有害金属測定用	G	100g	￥3,300

塩化すず(II)二水和物(塩化第一すず二水和物)
Tin(II) chloride dihydrate

危険

$SnCl_2 \cdot 2H_2O$...225.64 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［10025-69-1］ bp652℃ mp37℃～38℃

42448-1A	TFS（42448-0025）	2.5kg	￥64,000
42448-2A	TFS（42448-0050）	5g	￥3,700
42448-3A	TFS（42448-1000）	100g	￥7,500
42448-4A	TFS（42448-5000）	500g	￥18,500

塩化すず(II)溶液
Tin(II) chloride solution

危険

［労］特-3,57,57-2

100g $SnCl_2 \cdot 2H_2O$/L

36522-08		水銀分析用	G	500mL	￥6,200

塩化すず(II)(無水)(塩化第一すず)
Tin(II) chloride, anhydrous

危険

$SnCl_2$...189.61 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［7772-99-8］bp652℃† mp246℃†

37503-01	>90.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥10,000

塩化すず(II)(無水)(塩化第一すず)
Tin(II) chloride, anhydrous

危険

$SnCl_2$...189.61 ［劇］III ［労］57,57-2
CAS RN® ［7772-99-8］bp652℃ mp246℃ d3.95

19698-1A	TFS（19698-0025）			2.5kg	￥69,000
19698-2A	TFS（19698-0250）			25g	￥4,300
19698-3A	TFS（19698-1000）			100g	￥8,400
19698-4A	TFS（19698-5000）			500g	￥20,900

塩化すず(IV)五水和物(塩化第二すず五水和物)
Tin(IV) chloride pentahydrate

危険

$SnCl_4 \cdot 5H_2O$...350.59 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［10026-06-9］

37313-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥6,700
37313-20	>98.0%(T)	鹿特級	G	100g	￥3,600
37313-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,500
37313-01	>98.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥6,400
37313-81	>98.0%(T)	鹿1級	B	25kg	☆

塩化すず(IV)(無水)(塩化第二すず)
Tin(IV) chloride, anhydrous

危険

$SnCl_4$...260.51 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［7646-78-8］bp114℃† mp-33℃† d2.226†

37312-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥9,500
37312-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,100
37312-01	>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥9,000

塩化すず(IV)(無水)(塩化第二すず)
Tin(IV) chloride, anhydrous

危険

$SnCl_4$...260.51 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［7646-78-8］bp114℃ mp33℃ d2.22

19751-1A	TFS（19751-0010）	1L		￥37,600
19751-2A	TFS（19751-0100）	10mL		￥4,900
19751-3A	TFS（19751-1000）	100mL		￥6,400

塩化すず(IV)五水和物(塩化第二すず五水和物)
Tin(IV) chloride pentahydrate

$SnCl_4 \cdot 5H_2O$...350.59 ［劇］II ［労］57,57-2
CAS RN® ［10026-06-9］ mp56℃

22369-2A	TFS（22369-1000）	100g		￥5,900
22369-3A	TFS（22369-5000）	500g		￥19,100

塩化チタン(III)溶液
Titanium(III) chloride solution

危険

$TiCl_3$...154.22 ［劇］III ［労］特-3,57,57-2
CAS RN® ［7705-07-9］

40172-01	>20.0%(T)	鹿1級	G	500mL	￥4,700
40172-96	>20.0%(T)	ｱﾐﾉ酸分析用		7.5mL×5	￥9,000

塩化チタン(IV)
Titanium(IV) chloride

危険

$TiCl_4$...189.67
CAS RN® [7550-45-0] bp135℃～136℃† mp-25℃† d1.730†

40171-00	>99.0%(G)	鹿特級	G	500g	￥5,700
40171-01	>98.0%(G)	鹿1級	G	500g	￥5,200

塩化チタン(III)-テトラヒドロフラン錯体
Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex

$C_{12}H_{24}Cl_3O_3Ti$...370.53 ［労］57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [18039-90-2] mp>250℃▲

37516-1A	TFS（37516-0010）	1g	￥8,800
37516-2A	TFS（37516-0100）	10g	￥37,400

塩化4-トルエンスルホニル
4-Toluenesulfonyl chloride (4=*p*)

危険

$CH_3C_6H_4SO_2Cl$...190.64
CAS RN® [98-59-9] mp68℃†

40192-01	>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥3,800
40192-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,600
13903-1A	TFS（13903-0250）			25g	￥4,000
13903-3A	TFS（13903-1000）			100g	￥4,100
13903-4A	TFS（13903-5000）			500g	￥6,200
13903-2A	TFS（13903-0020）			2kg	￥17,400

塩化α-トルエンスルホニル
α-Toluenesulfonyl chloride

警告

$C_6H_5CH_2SO_2Cl$...190.64
CAS RN® [1939-99-7] mp92℃†

17049-1A	TFS（17049-0050）	5g	￥5,600
17049-2A	TFS（17049-0250）	25g	￥18,000

塩化 *m*-トルオイル
m-Toluoyl chloride

$CH_3C_6H_4COCl$...154.59 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1711-06-4］ d1.173▲

15341-2A	TFS（15341-1000）	100g	￥5,600
15341-3A	TFS（15341-0050）	5g	￥3,200

塩化 *o*-トルオイル → 塩化2-メチルベンゾイル

塩化 *p*-トルオイル
p-Toluoyl chloride

危険

$CH_3C_6H_4COCl$...154.59 ［危］4-3-III
CAS RN® ［874-60-2］ bp225℃～227℃† mp-4℃～-2℃† d1.164～1.169△

40777-00	>97.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥19,000
40777-30	>97.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥2,600

塩化トシル → 塩化4-トルエンスルホニル

塩化トリ-*n*-ブチル-d_{27}-すず
Tri-*n*-butyl-d_{27}-tin chloride

$C_{12}D_{27}ClSn$...352.66 ［審］-2 ［劇］III ［危］4-3-III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239
CAS RN® ［1257647-76-9］

49144-08	CDN（D-5575）	98 atom% D	100mg	￥48,400

塩化トリ-*n*-ブチルすず標準原液
Tri-*n*-butyltin chloride standard stock solution

危険

$C_{12}H_{27}ClSn$...325.50 ［危］4-1-II ［労］有-2,57,57-2 ［PRTR］1-300 ［麻］麻薬等原料

1mg/mL トルエン溶液

40013-96	環境分析用		5mL	￥5,500

塩化トリカプリルメチルアンモニウム(R=C_8-C_{10}) → 塩化メチルトリオクチルアンモニウム(R=C_8-C_{10})

塩酸トリエチルアミン
Triethylamine hydrochloride

$(C_2H_5)_3N \cdot HCl$...137.65
CAS RN® [554-68-7] mp254℃～260℃

27067-1A	TFS（27067-0010）	1kg	￥19,400
27067-3A	TFS（27067-2500）	250g	￥5,700

1,1,2-エタントリカルボン酸トリエチル
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate

$C_{11}H_{18}O_6$...246.25
CAS RN® [7459-46-3] bp99℃(0.5mm)▲ d1.074▲

13961-1A	TFS（13961-0250）	25g	￥9,500
13961-3A	TFS（13961-1000）	100g	￥29,600

1,1,2-エタントリカルボン酸トリエチル
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate

$C_{11}H_{18}O_6$...246.25 ［危］4-3-III
CAS RN® [7459-46-3]

40098-32		>95.0%(GC)	25mL	￥14,000
40098-52		>95.0%(GC)	5mL	￥4,800

塩化トリゴネリン
Trigonelline chloride

$C_7H_8NO_2Cl$...173.59
CAS RN® [6138-41-6]

49068-44	PHY（80548）	天然物化学研究用	25mg	￥43,000

塩化2,4,6-トリイソプロピルベンゼンスルホニル
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride

危険

$[(CH_3)_2CH]_3C_6H_2SO_2Cl$...302.86
CAS RN® [6553-96-4] mp92℃～94℃†

40975-32		>97.0%(HLC)	G	25g	￥8,500
40975-52		>97.0%(HLC)	G	5g	￥3,700
15279-1A	TFS（15279-1000）			100g	￥22,900
15279-2A	TFS（15279-0250）			25g	￥8,400

塩化トリメチルアセチル → 塩化ピバロイル

塩化トリメチルすず
Trimethyltin chloride

危険

$(CH_3)_3SnCl$...199.26 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239
CAS RN® [1066-45-1] bp148℃† mp42℃† Fp97℃†

moisture sensitive

40945-55		>98.0%(GC)	Organics	G	5g	￥7,500
16399-1A	TFS（16399-0100）				10g	￥12,300

塩化トリフェニルメチル → トリチルクロリド

塩化2,3,5-トリフェニル-2*H*-テトラゾリウム → 2,3,5-トリフェニルテトラゾリウム塩酸塩

塩化トリフェニルすず標準品
Triphenyltin chloride standard

危険

$C_{18}H_{15}ClSn$...385.47 ［審］-2 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-239 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [639-58-7]

49829-25	DES（C13601000）	環境分析用		250mg	￥7,500

塩化トリフェニルすず-d_{15}
Triphenyltin chloride-d_{15}

危険

$(C_6D_5)_3ClSn$...400.56［審］-2［劇］III ［労］57,57-2［PRTR］1-239
CAS RN®［358731-94-9］

49144-34	CDN（D-5565）	99 atom% D	100mg	￥39,600

塩化トリフェニルすず標準原液
Triphenyltin chloride standard stock solution

危険

$C_{18}H_{15}ClSn$...385.47 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2［PRTR］1-300［麻］麻薬等原料
CAS RN®［639-58-7］

1mg/mL トルエン溶液

40014-96	環境分析用		5mL	￥5,600

塩化トリス(2,2′-ビピリジル)ルテニウム(II)六水和物
Tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate

$C_{30}H_{24}Cl_2N_6Ru\cdot 6H_2O$...748.61
CAS RN®［50525-27-4］ mp>300℃▲

abt 13.5%(as Ru)

20875-1A	TFS（20875-0010）		1g	￥12,900

塩化タングステン(VI)
Tungsten(VI) chloride

警告

WCl_6...396.55 ［労］57,57-2
CAS RN®［13283-01-7］bp347℃† mp275℃†

40342-32	>90.0%(G)		25g	￥13,000

塩化タングステン(VI)
Tungsten(VI) chloride

警告

WCl_6...396.55 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13283-01-7］ bp347℃ mp275℃

22143-1A	TFS（22143-0100）	10g	￥6,400
22143-2A	TFS（22143-1000）	100g	￥30,700

塩化10-ウンデセノイル
10-Undecenoyl chloride

$C_{11}H_{19}ClO$...202.71 ［危］4-3-III
CAS RN® ［38460-95-6］ bp120℃～122℃(10mm)▲ d0.944▲

17158-1A	TFS（17158-1000）	100mL	￥13,100
17158-2A	TFS（17158-5000）	500mL	￥56,600

塩化バレロイル → 塩化ペンタノイル

塩化バレリル → 塩化ペンタノイル

塩化4-ビニルベンジル
4-Vinylbenzyl chloride

$CH_2CHC_6H_4CH_2Cl$...152.61 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1592-20-7］ d1.08▲

stabilized with 60ppm *tert*-butylcatechol

42252-1A	TFS（42252-1000）	tech.	100g	￥15,800
42252-2A	TFS（42252-0250）	tech.	25g	￥6,500

塩化ビニルベンジルトリメチルアンモニウム
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride

$C_{12}H_{18}ClN$...211.72 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［26616-35-3］

60:40 *p*-:*m*- mixture

42256-1A	TFS（42256-0250）	25g	￥9,800

塩化ビニルモノマー標準溶液(50mg/L)
Vinyl chloride monomer standard solution (VCM) (50mg/L)

危険

CH_2:CHCl...62.49 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN®［75-01-4］ Fp14℃(as Ethanol)†

50mg/L エタノール溶液

44069-43	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ分析用		10mL	￥5,300

塩化ビニルモノマー標準溶液(10mg/L)
Vinyl chloride monomer standard solution (VCM) (10mg/L)

危険

CH_2:CHCl...62.49 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN®［75-01-4］ Fp14℃(as Ethanol)†

10mg/L エタノール溶液

44070-43	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ分析用		10mL	￥5,300

塩化ビニルモノマー標準溶液(1mg/L)
Vinyl chloride monomer standard solution (VCM) (1mg/L)

危険

CH_2:CHCl...62.49 ［危］4-AL-S-II［労］57,57-2
CAS RN®［75-01-4］ Fp14℃(as Ethanol)†

1mg/L エタノール溶液

44071-43	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ分析用		10mL	￥5,300

塩化ビニル標準原液
Vinyl chloride standard stock solution

危険

CH_2:CHCl...62.49 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［75-01-4］

0.1mg/mL メタノール溶液

44064-96	水質試験用		2mL×5	￥9,000

塩化ビニル-d_3標準原液
Vinyl chloride-d_3 standard stock solution

危険

C_2D_3CL...65.51 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［6745-35-3］

0.1mg/mL メタノール溶液

44066-96		水質試験用		2mL×5	￥35,000

塩化ビニル,ポリマー
Vinyl chloride, polymer

$(ClCHCH_2)_n$(n=800～1200)
CAS RN®［9002-86-2］

44038-02			P	500g	￥2,200

塩化ビニリデンモノマー標準溶液
Vinylidene chloride monomer standard solution (VDCM)

危険

$C_2H_2Cl_2$...96.94［審］-2［劇］II ［労］有-1,57,57-2［PRTR］1-149
CAS RN®［75-35-4］

本品は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律により、試験研究および分析の用途以外には使用できません。30μg/mL 四塩化炭素溶液

44072-43		塩化ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝﾓﾉﾏｰ分析用		10mL	￥5,300

塩化ビニルマグネシウム,テトラヒドロフラン溶液
Vinylmagnesium chloride, in tetrahydrofuran

危険

CH_2:CHMgCl...86.80 ［危］3-OM-2-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［3536-96-7］ Fp-17.2℃(as Tetrahydrofuran)†

air/moisture sensitive

44095-05	abt 1.4mol/L(T)	Organics		500mL	￥30,000
44095-25	abt 1.4mol/L(T)	Organics		100mL	￥10,000

エルシニア選択寒天基礎培地
Yersinia selective agar base

711653-5	Oxd（CM0653B）	500g	￥18,000

エルシニア選択サプリメント
Yersinia selective supplement

警告

［冷］ 2℃～8℃

713109-1	Oxd（SR0109E）	10vial	￥11,000

エソトキシンナトリウム塩標準液
Yessotoxin standard di-sodium salt solution

$C_{55}H_{82}O_{21}S_2Na_2$...1189.34 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［112514-54-2］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。7.91 μg/g メタノール溶液

49917-11	CIF（CRM-00-YTX）	0.5mL	☆

エソトキシン標準液
Yessotoxin standard solution

$C_{55}H_{82}O_{21}S_2$...1143.36 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［112514-54-2］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。メタノール溶液

49915-10	NRC（NRC-CRM-YTX）	0.5mL	☆

塩化イットリウム六水和物,4N
Yttrium chloride hexahydrate, 4N

警告

$YCl_3 \cdot 6H_2O$...303.35 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［10025-94-2］ mp100℃(dec.)▲

47014-13	>99.99%(lm.S.)	高純度試薬	P	250g	￥48,000
47014-33	>99.99%(lm.S.)	高純度試薬	G	25g	￥8,500

塩化イットリウム六水和物
Yttrium chloride hexahydrate

$YCl_3 \cdot 6H_2O$...303.35 ［労］57,57-2
CAS RN® ［10025-94-2］ mp100℃

19918-1A	TFS（19918-0500）	50g	￥15,500
19918-2A	TFS（19918-2500）	250g	￥58,500

塩化アンモニウム亜鉛 → 塩化亜鉛アンモニウム

塩化亜鉛
Zinc chloride

危険

$ZnCl_2$...136.28 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-1
CAS RN® ［7646-85-7］ mp293℃▲

48020-00		>98.0%(T)	特級	P	500g	￥3,400
48020-20		>98.0%(T)	特級	G	100g	￥2,400
48020-30		>98.0%(T)	特級	G	25g	￥2,100
48020-80		>98.0%(T)	特級		10kg	☆
48020-01		>95.0%(T)	鹿1級	P	500g	￥3,300
48021-08		>98.0%(T)	RoHS2対応用	P	500g	￥4,300
8816-1M	M（1.08816.0250）	>98.0%(T)	EMSURE®		250g	￥5,940

塩化亜鉛
Zinc chloride

危険

$ZnCl_2$...136.28 ［劇］III ［労］57,57-2 ［PRTR］1-1
CAS RN® ［7646-85-7］ bp732℃ mp293℃

19684-1A	TFS（19684-0010）	1kg	￥10,900
19684-2A	TFS（19684-0025）	2.5kg	￥23,000
19684-3A	TFS（19684-0050）	5g	￥2,600

0.01mol/L塩化亜鉛溶液
0.01mol/L Zinc chloride solution

警告

$ZnCl_2$...136.28 ［労］57-2
CAS RN® ［7646-85-7］

48105-08		容量分析用滴定液	P	500mL	￥2,900

0.1mol/L塩化亜鉛溶液
0.1mol/L Zinc chloride solution

危険

$ZnCl_2$...136.28 ［労］57,57-2
CAS RN® ［7646-85-7］

48100-08		容量分析用滴定液	P	500mL	￥2,900

N-エチル-*N*-フェニルジチオカルバミン酸亜鉛
Zinc *N*-ethyl-*N*-phenyldithiocarbamate

警告

$[C_6H_5(C_2H_5)NCS_2]_2Zn$...458.01
CAS RN® ［14634-93-6］ mp195℃～203℃ †

48029-31	>90.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥1,600

塩化ジルコニウム(IV)
Zirconium(IV) chloride

警告

$ZrCl_4$...233.03 ［労］57,57-2
CAS RN® ［10026-11-6］

48060-52	>97.0%		G	5g	￥5,300
48060-62	>97.0%		G	1g	￥2,900

塩化ジルコニウム(IV)(無水)
Zirconium(IV) chloride, anhydrous

$ZrCl_4$...233.03 ［労］57,57-2
CAS RN® ［10026-11-6］

20641-1A	TFS（20641-1000）			100g	￥9,800
20641-2A	TFS（20641-0050）			5g	￥6,100
20641-3A	TFS（20641-5000）			500g	￥36,100

塩化酸化ジルコニウム八水和物
Zirconium chloride oxide octahydrate

危険

$ZrCl_2O \cdot 8H_2O$...322.25 ［労］57,57-2 ［PRTR］1-307
CAS RN® ［13520-92-8］

48065-00	>99.0%(G)	鹿特級	G	500g	￥8,500
48065-20	>99.0%(G)	鹿特級	G	100g	￥4,300
48065-30	>99.0%(G)	鹿特級	G	25g	￥2,300

塩化酸化ジルコニウム八水和物,3N5
Zirconium chloride oxide octahydrate, 3N5

危険

$ZrCl_2O \cdot 8H_2O$...322.25 ［労］57,57-2
CAS RN® ［13520-92-8］

48065-08	>99.95%(lm.S.)	高純度試薬	P	500g	￥38,000
48065-33	>99.95%(lm.S.)	高純度試薬	G	25g	￥5,200

塩化ジルコニル八水和物 → 塩化酸化ジルコニウム八水和物

塩化ジルコニル八水和物,3N5 → 塩化酸化ジルコニウム八水和物,3N5

オレイン酸アルミニウム
Aluminium oleate

警告

approx.$Al(C_{17}H_{33}COO)_3$
CAS RN® ［688-37-9］

01171-01	>5.0%(as Al_2O_3)(T)	鹿1級	P	500g	￥43,500

オーラミン
Auramine (Auramine O)

危険

$C_{17}H_{21}N_3$･HCl･H_2O...321.84 ［労］特-2,57,57-2
CAS RN® ［2465-27-2］

01456-41	>80.0%(T)(as anhydrous)	鹿1級	G	10g	￥7,000

オーラミンO
Auramine O

$C_{17}H_{21}N_3$･HCl...303.82 ［労］特-2,57,57-2
CAS RN® ［2465-27-2］

22752-1A	TFS（22752-0500）			50g	￥15,100
1301-1M	M（1.01301.0050）	顕微鏡用		50g	￥9,450

3-オキソピペラジン-1-カルボン酸ベンジル
Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate

$C_{12}H_{14}N_2O_3$...234.25
CAS RN® ［78818-15-2］ mp112℃～115℃▲

49244-27	TFS（KM07871EB）	97%		25g	☆
49244-28	TFS（KM07871DE）	97%		5g	￥29,900

4-オキソ-1-ピペリジンカルボン酸ベンジル
Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate

警告

$C_{13}H_{15}NO_3$...233.26
CAS RN® ［19099-93-5］

04560-32	>94.0%(HLC)		G	25g	￥12,000
04560-52	>94.0%(HLC)		G	5g	￥4,600

オキシ硝酸ビスマス → 硝酸水酸化ビスマス(III)

4-オキソピロリジン-1,2-二カルボン酸水素(2*S*)-1-*tert*-ブチル
(2*S*)-1-*tert*-Butyl hydrogen 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate

$C_{10}H_{15}NO_5$...229.22
CAS RN® [876317-19-0] mp155℃～156℃▲

49250-15	TFS（MO07783DE）	97%	5g	￥45,300
49250-16	TFS（MO07783DA）	97%	1g	￥15,900
49250-17	TFS（MO07783CB）	97%	250mg	￥8,200

n-オクタデカン酸 *n*-ブチル → ステアリン酸 *n*-ブチル

オレイン酸 *n*-ブチル
n-Butyl oleate

警告

$C_{17}H_{33}COOCH_2(CH_2)_2CH_3$...338.56 ［危］4-4-III
CAS RN® [142-77-8] d0.863～0.869△

04422-02	>70.0%(GC)	G	500mL	￥7,500
04422-32	>70.0%(GC)	G	25mL	￥1,400

3-オキソ-8-アザビシクロ[3.2.1]オクタン-8-カルボン酸 *tert*-ブチル
tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate

$C_{12}H_{19}NO_3$...225.28
CAS RN® [185099-67-6] mp58℃～59℃▲

49250-56	TFS（MO07066DE）	97%	5g	￥8,000
49250-57	TFS（MO07066DA）	97%	1g	￥2,700

オレイン酸カルシウム
Calcium oleate

警告

approx.$Ca(C_{17}H_{33}COO)_2$
CAS RN® [142-17-6] mp83℃～84℃†

07085-01	5.0%～7.5%(as Ca)(T)	鹿1級	P	500g	￥43,000

オクタデカン酸コレステリル-2,2,3,4,4,6-d_6
Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-d_6-octadecanoate

$C_{45}H_{74}D_6O_2$...659.15 ［冷］ 0℃～6℃

49123-94	CDN（D-5823）	98 atom% D		50mg	￥123,200

オレイン酸コバルト
Cobalt oleate

危険

approx.Co($C_{17}H_{33}COO)_2$ ［労］57,57-2［PRTR］1-132
CAS RN® ［19192-71-3］

07409-02	>8.0%(as Co)(T)			500g	￥43,000

オレイン酸銅(II)(オレイン酸第二銅)
Copper(II) oleate

approx.Cu($C_{17}H_{33}COO)_2$ ［労］57,57-2
CAS RN® ［1120-44-1］

07501-01	>7.0%(as Cu)(T)	鹿1級		500g	￥16,000

オキシン酸銅標準品 → オキシン銅標準品

11mm オートクリンパ リチウムバッテリ付
Crimper, electronic, with lithium battery, for 11mm caps

95253-52	ATI（5191-5616）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

20mm オートクリンパ リチウムバッテリ付
Crimper, electronic, with lithium battery, for 20mm caps

95253-53	ATI（5191-5615）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

高性能オートクリンパヘッドセット 11mm
Crimper jaw set, 11mm, for high power electronic crimping tool

95253-41	ATI（5190-4062）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1個)	￥51,000

高性能オートクリンパヘッドセット 20mm
Crimper jaw set, 20mm, for high power electronic crimping tool

95253-43	ATI（5190-4064）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1個)	￥46,000

7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane

危険

$C_6H_{10}O$...98.14 ［危］4-2-III
CAS RN® ［286-20-4］ bp129℃～130℃ mp40℃ d0.97 Fp27℃

11121-1A	TFS（11121-1000）	100mL	￥5,200
11121-2A	TFS（11121-5000）	500mL	￥12,800

11mm オートデキャッパ リチウムバッテリ付
Decapper, electronic, with lithium battery, for 11mm caps

95253-54	ATI（5191-5614）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

20mm オートデキャッパ リチウムバッテリ付
Decapper, electronic, with lithium battery, for 20mm caps

95253-55	ATI（5191-5613）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥108,000

高性能オートデキャッパヘッドセット 11mm
Decapper jaw set, 11mm, for high power electronic crimping tool

95253-42	ATI（5190-4063）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1個)	￥46,000

高性能オートデキャッパヘッドセット 20mm
Decapper jaw set, 20mm, for high power electronic crimping tool

95253-44	ATI（5190-4065）	ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack(1個)	￥44,000

大麦(デオキシニバレノール分析用、高濃度)
Deoxynivalenol in Barley, high level

［冷］ 0℃～6℃

植物検疫対象のため通関時開封の可能性がございます。「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。569±60μg/mL for Quality Control Materials.

49161-04	B.P.（10003614）	ｶﾋﾞ毒分析用	100g	￥65,000

オキサロ酢酸ジエチルナトリウム
Diethyl oxalacetate sodium salt

$C_8H_{11}NaO_5$...210.15
CAS RN® ［40876-98-0］

40737-2A	TFS（40737-1000）	pract.	100g	￥6,300

(2-オキソプロピル)ホスホン酸ジエチル
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate

$C_7H_{15}O_4P$...194.16
CAS RN® ［1067-71-6］ d1.11▲

12369-1A	TFS（12369-0050）		5g	￥10,600

2,2′-オキシ二酢酸
2,2′-Oxydiacetic acid

警告

$O(CH_2COOH)_2$...134.08
CAS RN® ［110-99-6］ mp141℃～145℃

16226-1A	TFS（16226-0025）		2.5kg	￥143,400
16226-3A	TFS（16226-1000）		100g	￥9,000
16226-4A	TFS（16226-5000）		500g	￥39,300

(2-オキソプロピル)ホスホン酸ジメチル
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate

$C_5H_{11}O_4P$...166.11 ［危］4-3-III
CAS RN® ［4202-14-6］ bp76℃～79℃(3mm)▲

17761-1A	TFS（17761-0050）				5g	￥11,000
17761-2A	TFS（17761-0250）				25g	￥42,700

n-オクタデカン酸エチル → ステアリン酸エチル

n-オクタデカン酸エチル標準品 → ステアリン酸エチル標準品

オクタデカン酸エチル-d_{35}
Ethyl octadecanoate-d_{35}

$CD_3(CD_2)_{16}COOCH_2CH_3$...347.74
CAS RN® ［1219795-49-9］

49146-41	CDN（D-7062）	99 atom% D			250mg	￥41,800

n-オクタン酸エチル
Ethyl *n*-octanoate

警告

$CH_3(CH_2)_6COOC_2H_5$...172.26 ［危］4-3-III
CAS RN® ［106-32-1］ bp208℃† mp-48℃～-47℃† d0.863～0.868△ Fp75℃†

14074-00		>98.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥6,600
14074-30		>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,900
15051-1A	TFS（15051-1000）				100mL	￥2,800
15051-2A	TFS（15051-0050）				5mL	￥2,400
15051-3A	TFS（15051-5000）				500mL	￥9,200

オクタン酸エチル標準品
Ethyl octanoate standard

$CH_3(CH_2)_6COOC_2H_5$...172.26 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［106-32-1］ bp208℃▲ mp-48℃～-47℃▲ d0.863～0.868▲ Fp75℃▲

49862-22	DES（C15711070）		食品分析用		250mg	￥9,000

オクタン酸エチル-d15
Ethyl octanoate-d15

$CD_3(CD_2)_6COOCH_2CH_3$...187.35 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219798-38-5］

49146-42	CDN（D-7063）	98 atom% D		250mg	￥44,000

オレイン酸エチル
Ethyl oleate

$CH_3(CH_2)_7CH{:}CH(CH_2)_7COOC_2H_5$...310.51 ［危］4-3-III
CAS RN® ［111-62-6］ mp-32℃† d(20/20℃) 0.87▲

14175-02		>75.0%(GC)	G	500mL	￥3,800

オレイン酸エチル
Ethyl oleate

$CH_3(CH_2)_7CH{:}CH(CH_2)_7COOC_2H_5$...310.51 ［危］4-3-III
CAS RN® ［111-62-6］ bp190℃～210℃ d0.86 Fp160℃

41029-1A	TFS（41029-0010）			1kg	￥8,200
41029-4A	TFS（41029-2500）			250g	￥3,600

オレイン酸エチル標準品
Ethyl oleate standard

$CH_3(CH_2)_7CH{:}CH(CH_2)_7COOC_2H_5$...310.51 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［111-62-6］ bp215℃▲ mp-32℃▲ d(20/20℃) 0.87▲ Fp113℃▲

49789-60	ACC（FAEE-014N）	食品分析用		100mg	￥4,500

オルトぎ酸エチル → オルトぎ酸トリエチル

オキサム酸エチル
Ethyl oxamate

$C_4H_7NO_3$...117.10
CAS RN® ［617-36-7］ mp112℃～115℃▲

11879-1A	TFS（11879-0250）			25g	￥3,200

3-オキソブタン酸エチル
Ethyl 3-oxobutanate

警告

$CH_3COCH_2COOC_2H_5$...130.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［141-97-9］ bp180.8℃† mp-43℃† d(25/4℃) 1.021† Fp84.4℃†

14030-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥4,700
14030-01	>99.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥2,500

2-オキソシクロペンタンカルボン酸エチル
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate

(O:)$C_5H_7CO_2C_2H_5$...156.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［611-10-9］ bp102℃～104℃(11mm)▲ d1.054▲

17358-1A	TFS（17358-1000）	tech.	100g	￥15,700
17358-2A	TFS（17358-0250）	tech.	25g	￥5,300
17358-3A	TFS（17358-5000）	tech.	500g	￥61,800

2-オキソシクロペンチル酢酸エチル
Ethyl 2-oxocyclopentylacetate

$C_9H_{14}O_3$...170.20 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［20826-94-2］

12304-1A	TFS（12304-0010）	1g	￥24,400

2-(3-オキソ-2-ピペラジニル)酢酸エチル
Ethyl 2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate

$C_8H_{14}N_2O_3$...186.20
CAS RN® ［33422-35-4］ mp102℃～105℃▲

49257-89	TFS（CD11371DA）	97%	1g	￥9,100

4-オキソピペリジン-3-カルボン酸エチル塩酸塩 → 3-カルベトキシ-4-ピペリドン塩酸塩

3-オキソ-3-(4-ピリジル)プロピオン酸エチル
Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate

$C_{10}H_{11}NO_3$...193.19
CAS RN® [26377-17-3]

14277-52	>95.0%	G	5g	￥23,000
14277-62	>95.0%	G	1g	￥7,000

オイゲノール
Eugenol

警告

CH_2:$CHCH_2C_6H_3(OCH_3)OH$...164.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [97-53-0] bp255℃† mp-9℃† d(20/4℃) 1.064† Fp110℃†

14218-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,200

オイゲノール
Eugenol

警告

CH_2:$CHCH_2C_6H_3(OCH_3)OH$...164.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [97-53-0] bp254℃ mp12℃～10℃ d1.06 Fp>112℃

11911-1A	TFS（11911-0050）		5g	￥4,000
11911-2A	TFS（11911-1000）		100g	￥4,500
11911-3A	TFS（11911-5000）		500g	￥15,000

オイゲノール
Eugenol

警告

$C_{10}H_{12}O_2$...164.20 [危] 4-3-III
CAS RN® [97-53-0]

49872-87	PHY（80715）	天然物化学研究用	100mg	￥22,500

オイゲノール標準品
Eugenol standard

$C_{10}H_{12}O_2$...164.20 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［97-53-0］

49828-96	DES（C13395000）	残留農薬試験用	100mg	￥12,000

オイパリチン
Eupalitin

$C_{17}H_{14}O_7$...330.28
CAS RN® ［29536-41-2］

49063-07	PHY（82534）	天然物化学研究用	10mg	￥115,000

オイパリチン3-ガラクトシド
Eupalitin 3-galactoside

$C_{23}H_{24}O_{12}$...492.42
CAS RN® ［35399-32-7］

49063-08	PHY（80450）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

オイパチリン
Eupatilin

$C_{18}H_{16}O_7$...344.31
CAS RN® ［22368-21-4］

49063-09	PHY（80337）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

オイパトリン
Eupatorin

$C_{18}H_{16}O_7$...344.31
CAS RN® ［855-96-9］

49063-11	PHY（80451）	天然物化学研究用	20mg	￥55,000

オイホルビアステロイド
Euphorbiasteroid

$C_{32}H_{40}O_8$...552.65
CAS RN® ［28649-59-4］

49063-12	PHY（89661）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

オイロピン塩酸塩
Europine hydrochloride

$C_{16}H_{27}NO_6$･HCl...329.38 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［570-19-4］

49869-33	PHY（83237）	天然物化学研究用	10mg	￥100,000

オイロピン *N*-オキシド
Europine *N*-oxide

$C_{16}H_{27}NO_7$...345.38 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［65582-53-8］

49869-34	PHY（83238）	天然物化学研究用	10mg	￥100,000

オレンジ・ゲルローディングダイ (6X)
Gel Loading Dye, Orange(6X)

49882-60	NEB（B7022S）		4mL	￥8,300

Great Lakes Chemical DE-79™ オクタブロモジフェニルオキシド
Great Lakes Chemical DE-79™ Octabromodiphenyl Oxide

［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。100μg/mL トルエン溶液.

49849-14	Wel（TBDE-79）	環境分析用	1.2mL	☆

オープンクリーンベンチ KOACH C 645-F
KOACH C 645-F

49785-00	興研（901016）		1ｾｯﾄ	☆

オープンクリーンベンチ KOACH C 900-F
KOACH C 900-F

49785-01	興研（901024）		1ｾｯﾄ	☆

オレイン酸鉛
Lead oleate

危険

approx.$Pb(C_{17}H_{33}COO)_2$ ［劇］III ［PRTR］特1-305
CAS RN® ［1120-46-3］

24069-01	81.7%～100.3%(as lead oleate)(T)	鹿1級	P	500g	￥28,500

2-オキソプロパン酸リチウム一水和物 → ピルビン酸リチウム一水和物

オレイン酸マグネシウム
Magnesium oleate

approx.$Mg(C_{17}H_{33}COO)_2$
CAS RN® ［1555-53-9］

25016-01	3.0%～5.0%(as Mg)(T)	鹿1級	P	500g	￥44,000

オスエルボー NPT1/4 チューブ外径1/8 溶媒側
Male elbow NPT1/4,tube outer diameter 1/8,solvent side

96946-32	有機合成用	1pack		￥3,200

オスエルボー NPT1/8 チューブ外径1/8 ガス側
Male elbow NPT1/8,tube outer diameter 1/8,gas side

96946-31	有機合成用	1pack		￥3,000

オスエルボー PT1/2 チューブ外径1/4 溶媒側
Male elbow PT1/2,tube outer diameter 1/4,solvent side

96946-34	有機合成用	1pack		￥5,300

オスエルボー PT3/8 チューブ外径1/4 ガス側
Male elbow PT3/8,tube outer diameter 1/4,gas side

96946-33	有機合成用		1pack	￥4,600

オキシシアン化水銀(II)
Mercury(II) oxycyanide

危険

$HgO \cdot Hg(CN)_2$...469.21 ［毒］II ［労］特-2,57,57-2［PRTR］1-144,1-237
CAS RN® ［1335-31-5］

$HgO \cdot Hg(CN)_2$:$Hg(CN)_2$=1:2

25121-32	82.0%～87.0%(as $Hg(CN)_2$)(T)	G	25g	￥11,500

オクタコサン酸メチル
Methyl octacosanoate

$C_{29}H_{58}O_2$...438.76
CAS RN® ［55682-92-3］

49055-66	MTR（1271）	98%	50mg	☆

10(*E*),12(*Z*)-オクタデカジエン酸メチル
Methyl 10(*E*),12(*Z*)-octadecadienoate

$C_{19}H_{34}O_2$...294.47 ［凍］ -20℃以下

49051-71	MTR（1254）	98%	25mg	☆

9(*E*),11(*E*)-オクタデカジエン酸メチル
Methyl 9(*E*),11(*E*)-octadecadienoate

$C_{19}H_{34}O_2$...294.47 ［凍］ -20℃以下

49051-74	MTR（1257）	98%	25mg	☆

9(*Z*),11(*E*)-オクタデカジエン酸メチル
Methyl 9(*Z*),11(*E*)-octadecadienoate

$C_{19}H_{34}O_2$...294.47 ［凍］ -20℃以下
mp40℃～42℃ †

49051-72	MTR（1255）	98%	25mg	☆

9(*Z*),11(*Z*)-オクタデカジエン酸メチル
Methyl 9(*Z*),11(*Z*)-octadecadienoate

$C_{19}H_{34}O_2$...294.47 ［凍］ -20℃以下

49051-73	MTR（1256）	96%	25mg	☆

c i s-9,12-オクタデカジエン酸メチル標準品
Methyl *cis*-9,12-octadecadienoate standard

$C_{19}H_{34}O_2$...294.47 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［112-63-0］bp207℃～208℃▲ d(20℃) 0.886▲ Fp>109℃▲

49862-67	DES（CA14635450）	食品分析用	100mg	￥17,000

t r a n s-9,12-オクタデカジエン酸メチル標準液
Methyl *trans*-9,12-octadecadienoate standard solution

$C_{19}H_{34}O_2$...294.47 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2566-97-4］

10mg/L メタノール溶液

49862-68	DES（L14635550ME）	食品分析用	10mL	￥15,000

オクタデカン酸メチル → ステアリン酸メチル

オクタデカン酸メチル → ステアリン酸メチル

オクタデカン酸メチル標準品 → ステアリン酸メチル標準品

オクタデカン酸メチル-d_{35}
Methyl octadecanoate-d_{35}

$CD_3(CD_2)_{16}COOCH_3$...333.71
CAS RN® ［29823-25-4］

49130-57	CDN（D-5851）	98 atom% D	250mg	￥52,800

ｃｉｓ-6,9,12-オクタデカトリエン酸メチル
Methyl *cis*-6,9,12-octadecatrienoate

$C_{19}H_{32}O_2$...292.45 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［16326-32-2］

49051-20	MTR（1154）	99%		100mg	☆

ｃｉｓ-6,9,12-オクタデカトリエン酸メチル標準品
Methyl *cis*-6,9,12-octadecatrienoate standard

$C_{19}H_{32}O_2$...292.45 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［16326-32-2］ bp385℃▲ d0.9▲

49789-49	ACC（UFA-015N）	食品分析用		100mg	￥12,000

ｃｉｓ-9,12,15-オクタデカトリエン酸メチル標準品
Methyl *cis*-9,12,15-octadecatrienoate standard

$C_{19}H_{32}O_2$...292.45 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［301-00-8］ bp207℃▲ d(20℃) 0.895▲ Fp113℃▲

49862-69	DES（C14635900）	食品分析用		100mg	￥15,000

ｃｉｓ-11-オクタデセン酸メチル標準品
Methyl *cis*-11-octadecenoate standard

$C_{19}H_{36}O_2$...296.48 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1937-63-9］ bp162℃～164℃▲ d(23℃) 0.88▲ Fp62℃▲

49862-60	DES（C15710460）	食品分析用		10mg	￥22,000

ｃｉｓ-9-オクタデセン酸メチル → オレイン酸メチル

ｃｉｓ-9-オクタデセン酸メチル標準品 → オレイン酸メチル標準品

ｔｒａｎｓ-11-オクタデセン酸メチル標準液
Methyl *trans*-11-octadecenoate standard solution

$C_{19}H_{36}O_2$...296.48 ［危］4-1-II［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［6198-58-9］

10mg/L シクロヘキサン溶液

49862-61	DES（L15710470CY）	食品分析用		10mL	￥11,000

ｔ ｒ ａ ｎ ｓ-9-オクタデセン酸メチル標準品
Methyl *trans*-9-octadecenoate standard

$C_{19}H_{36}O_2$...296.48 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［1937-62-8］

49862-59	DES（C13115060）		食品分析用	100mg	￥9,500

n-オクタン酸メチル
Methyl *n*-octanoate

警告

$CH_3(CH_2)_6COOCH_3$...158.23 ［危］4-3-III
CAS RN® ［111-11-5］ bp194℃～195℃† d0.874～0.879△

25220-00	>99.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥10,500
25220-30	>99.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,800

n-オクタン酸メチル
Methyl *n*-octanoate

警告

$CH_3(CH_2)_6COOCH_3$...158.23 ［危］4-3-III
CAS RN® ［111-11-5］ bp194℃～195℃† d0.874～0.879△

49051-47	MTR（1199）	99%		1g	☆

オクタン酸メチル標準品
Methyl octanoate standard

$CH_3(CH_2)_6COOCH_3$...158.23 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［111-11-5］ bp194℃～195℃▲ d0.874～0.879▲ Fp69℃▲

49861-91	DES（C15711090）		食品分析用	1mL	￥12,000

オクタン酸メチル-d_{15}
Methyl octanoate-d_{15}

$CD_3(CD_2)_6COOCH_3$...173.32 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219798-91-0］

49147-24	CDN（D-7005）	98 atom% D		250mg	￥60,500

2-オクチン酸メチル標準品
Methyl 2-Octynoic acid standard

$C_9H_{14}O_2$...154.20 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［111-12-6］ bp217℃～220℃▲ d0.92▲ Fp88℃▲

49866-75	DES（C15715700）	環境分析用		250mg	￥12,000

オレイン酸メチル
Methyl oleate

$C_{17}H_{33}COOCH_3$...296.48 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-62-9］ mp-19℃† d(18/4℃) 0.79†

25304-02		>65.0%(GC)	G	500mL	￥3,300
25304-32		>65.0%(GC)	G	25mL	￥1,700
9743-1M	M（1.09743.0005）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		5mL	￥34,300

オレイン酸メチル
Methyl oleate

$C_{17}H_{33}COOCH_3$...296.48 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［112-62-9］ bp186℃ mp20℃ d0.87 Fp180℃

41464-2A	TFS（41464-0010）		1kg	￥5,800
41464-3A	TFS（41464-0050）		5kg	￥20,700

オレイン酸メチル標準品
Methyl oleate standard

$C_{17}H_{33}COOCH_3$...296.48 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［112-62-9］ bp168℃～170℃▲ mp-19℃▲ d(18/4℃) 0.79▲ Fp113℃▲

49862-58	DES（C15727060）	食品分析用	100mg	￥11,000

オロチン酸メチル
Methyl orotate

$C_6H_6N_2O_4$...170.12
CAS RN® ［6153-44-2］ mp244℃(dec.)▲

20878-1A	TFS（20878-0250）		25g	￥60,600

オルトぎ酸メチル → オルトぎ酸トリメチル

2-オキソシクロヘキサンカルボン酸メチル
Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate

$C_8H_{12}O_3$...156.17 ［危］4-3-III
CAS RN® ［41302-34-5］ d1.109▲

36701-1A	TFS（36701-0100）		10mL	￥26,200
36701-2A	TFS（36701-0500）		50mL	￥111,500

3-オキソペンタン酸メチル
Methyl 3-oxopentanoate

$C_6H_{10}O_3$...130.14 ［危］4-3-III
CAS RN® ［30414-53-0］ d1.03▲

24316-1A	TFS（24316-0250）		25mL	￥10,000

4-(3-オキソ-3-フェニル-1-プロペニル)安息香酸メチル
Methyl 4-(3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)benzoate

$C_{17}H_{14}O_3$...266.29
CAS RN® ［98258-72-1］ mp119℃～120℃▲

42474-1A	TFS（42474-0010）		1g	￥13,600

オクロバクトラム アンスロピ KWIK-STIK™
Ochrobactrum anthropi KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49841-74	MBL（0132P）	ATCCBAA-749	2pack	￥11,500

オリゲラ ウレオリティカ KWIK-STIK™
Oligella ureolytica KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49823-39	MBL（0868P）	ATCC43534	2pack	￥11,500

オリゲラ ウレスラリス KWIK-STIK™
Oligella urethralis KWIK-STIK™

［冷］ 2℃～8℃

49823-41	MBL（0621P）	ATCC17960	2pack	￥11,500

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 1000K
Minimate™ TFF capsule with 1000K Omega™ membrane

97006-77	PALL（OA990C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 100K
Minimate™ TFF capsule with 100K Omega™ membrane

97006-74	PALL（OA100C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 10K
Minimate™ TFF capsule with 10K Omega™ membrane

97006-70	PALL（OA010C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 1K
Minimate™ TFF capsule with 1K Omega™ membrane

97006-67	PALL（OA001C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 300K
Minimate™ TFF capsule with 300K Omega™ membrane

97006-75	PALL（OA300C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 30K
Minimate™ TFF capsule with 30K Omega™ membrane

97006-71	PALL（OA030C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 3K
Minimate™ TFF capsule with 3K Omega™ membrane

97006-68	PALL（OA003C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 500K
Minimate™ TFF capsule with 500K Omega™ membrane

97006-76	PALL（OA500C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 50K
Minimate™ TFF capsule with 50K Omega™ membrane

97006-72	PALL（OA050C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 5K
Minimate™ TFF capsule with 5K Omega™ membrane

97006-69	PALL（OA005C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガ膜 ミニメイト TFFカプセル 70K
Minimate™ TFF capsule with 70K Omega™ membrane

97006-73	PALL（OA070C12）	分離精製用	1pack	￥27,100

オメガメンブレンナノセップ遠心ろ過デバイズ 10K ブルー
Nanosep® centrifugal devices with Omega™ membrane 10K blue

97006-32	PALL（OD010C33）	分離精製用	1pack(24個)	￥12,800
97006-33	PALL（OD010C34）	分離精製用	1pack(100個)	￥42,000
97006-34	PALL（OD010C35）	分離精製用	1pack(500個)	￥187,800

オメガメンブレンナノセップ遠心ろ過デバイズ 100K クリア
Nanosep[R] centrifugal devices with Omega[TM] membrane 100K clear

97006-38	PALL（OD100C33）	分離精製用	1pack(24個)	￥12,800
97006-39	PALL（OD100C34）	分離精製用	1pack(100個)	￥42,000
97006-40	PALL（OD100C35）	分離精製用	1pack(500個)	￥187,800

オメガメンブレンナノセップ遠心ろ過デバイズ 3K グレイ
Nanosep[R] centrifugal devices with Omega[TM] membrane 3K gray

97006-28	PALL（OD003C33）	分離精製用	1pack(24個)	￥12,800
97006-30	PALL（OD003C34）	分離精製用	1pack(100個)	￥42,000
97006-31	PALL（OD003C35）	分離精製用	1pack(500個)	￥187,800

オメガメンブレンナノセップ遠心ろ過デバイズ 300K オレンジ
Nanosep[R] centrifugal devices with Omega[TM] membrane 300K orange

97006-41	PALL（OD300C33）	分離精製用	1pack(24個)	￥12,800
97006-42	PALL（OD300C34）	分離精製用	1pack(100個)	￥42,000
97006-43	PALL（OD300C35）	分離精製用	1pack(500個)	￥187,800

オメガメンブレンナノセップ遠心ろ過デバイズ 30K レッド
Nanosep[R] centrifugal devices with Omega[TM] membrane 30K red

97006-35	PALL（OD030C33）	分離精製用	1pack(24個)	￥12,800
97006-36	PALL（OD030C34）	分離精製用	1pack(100個)	￥42,000
97006-37	PALL（OD030C35）	分離精製用	1pack(500個)	￥187,800

オバクノン
Obacunone

$C_{26}H_{30}O_7$...454.51
CAS RN®［751-03-1］

49065-96	PHY（80509）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

オベスタチン ヒト EIAキット
Obestatin Human EIA Kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-45	矢内（YK231）		1kit	￥76,000

オベスタチン マウス/ラット EIAキット
Obestatin Mouse/Rat EIA Kit

［冷］ 2℃～8℃

49103-44	矢内（YK230）		1kit	￥76,000

オブツシフォリン
Obtusifolin

$C_{16}H_{12}O_5$...284.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［477-85-0］

49874-39	PHY（83880）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

$^{13}C_{20}$-オクラトキシンA標準液
$^{13}C_{20}$-Ochratoxin A standard solution

$^{13}C_{20}H_{18}ClNO_6$...423.66 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10mg/L アセトニトリル溶液

49150-57	B.P.（10002812）	ｶﾋﾞ毒分析用	1.2mL	☆

オクラトキシンA
Ochratoxin A

$C_{20}H_{18}ClNO_6$...403.81 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［303-47-9］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

22740-1A	TFS（22740-0050）		5mg	￥67,500

オクラトキシンA標準品
Ochratoxin A standard

$C_{20}H_{18}ClNO_6$...403.81 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［303-47-9］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49150-85	B.P.（10000324）	ｶﾋﾞ毒分析用	10mg	￥130,000
49150-84	B.P.（10000307）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mg	￥73,000

オクラトキシンA標準液
Ochratoxin A standard solution

危険

$C_{20}H_{18}ClNO_6$...403.81 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［303-47-9］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10mg/L アセトニトリル溶液

49150-01	B.P.（10000346）	ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥63,000
49150-49	B.P.（10003658）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥38,000

オクラトキシンA標準原液
Ochratoxin A standard stock solution

危険

$C_{20}H_{18}ClNO_6$...403.81 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［303-47-9］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10mg/L アセトニトリル溶液

31542-96		ｶﾋﾞ毒分析用	5mL	￥40,000

オクラトキシン-α標準液
Ochratoxin-α standard solution

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10mg/L アセトニトリル溶液

49160-04	B.P.（10003675）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥60,000

オクラトキシンB標準液
Ochratoxin B standard solution

［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。10mg/L アセトニトリル溶液

49160-03	B.P.（10003674）	ｶﾋﾞ毒分析用	1mL	￥60,000

2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-オクタブロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octabromo[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_2Br_8$...797.28 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 50%トルエン-ノナン混合溶液.

49857-18	Wel（MBB-194）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-オクタブロモビフェニル
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octabromobiphenyl

$C_{12}H_2Br_8$...785.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［67889-00-3］

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49819-44	Wel（BB-194）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3,3′,4,4′,5,5′,6-オクタブロモビフェニル
2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octabromobiphenyl

$C_{12}H_2Br_8$...785.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL 10%トルエン-ノナン混合溶液.

49819-45	Wel（BB-205）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49848-80	Wel（BDE-194）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49789-38 ACC（BDE-194S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49847-15 Wel（BDE-196） 環境分析用 1.2mL ☆

2,2′,3,3′,4,4′,5,6-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,4,4′,5,6-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49857-83 Wel（BDE-195） 環境分析用 1.2mL ☆

2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49796-65 ACC（BDE-196S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2′,3,3′,4,4′,5,6-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,3′,4,4′,5,6-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49789-39 ACC（BDE-195S） RoHS対応用 1mL ￥75,000

2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-オクタブロモ[$^{13}C_{12}$]ジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-Octabromo[$^{13}C_{12}$]diphenyl ether

$^{13}C_{12}H_2OBr_8$...813.28 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49847-67	Wel（MBDE-197）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49847-16	Wel（BDE-197）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49796-66	ACC（BDE-197S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,2′,3,3′,4,5,5′,6′-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,4,5,5′,6′-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49858-34	Wel（BDE-199）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,4,5,5′,6-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,4,5,5′,6-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49858-33	Wel（BDE-198）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,4,5,5′,6-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,3′,4,5,5′,6-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49796-28	ACC（BDE-198S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,2′,3,3′,4,5,6,6′-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,4,5,6,6′-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49849-38	Wel（BDE-200）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49848-81	Wel（BDE-201）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49789-40	ACC（BDE-201S）	RoHS対応用	1mL	￥75,000

2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49849-39	Wel（BDE-202）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49789-41	ACC（BDE-202S）	RoHS対応用	1mL	￥75,000

2,2′,3,4,4′,5,5′,6-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,4,4′,5,5′,6-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49848-82	Wel（BDE-203）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,4,4′,5,5′,6-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,4,4′,5,5′,6-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49796-30	ACC（BDE-203S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,2′,3,4,4′,5,6,6′-オクタブロモジフェニルエーテル
2,2′,3,4,4′,5,6,6′-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49848-83	Wel（BDE-204）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,4,4′,5,6,6′-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,2′,3,4,4′,5,6,6′-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49796-31	ACC（BDE-204S）	RoHS対応用	1mL	￥60,000

2,3,3′,4,4′,5,5′,6-オクタブロモ[$^{13}C_{12}$]ジフェニルエーテル
2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octabromo[$^{13}C_{12}$]diphenyl ether

$^{13}C_{12}H_2OBr_8$...813.28 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49848-88 Wel（MBDE-205） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,3′,4,4′,5,5′,6-オクタブロモジフェニルエーテル
2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octabromodiphenyl ether

$C_{12}H_2OBr_8$...801.37 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49848-87 Wel（BDE-205） 環境分析用 1.2mL ☆

2,3,3′,4,4′,5,5′,6-オクタブロモジフェニルエーテル標準液
2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octabromodiphenyl ether standard solution

$C_{12}H_2Br_8O$...801.37 ［危］4-1-II［労］57,57-2

50μg/mL イソオクタン溶液

49796-32 ACC（BDE-205S） RoHS対応用 1mL ￥60,000

2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-オクタクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_2Cl_8$...441.67［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49814-53 Wel（MBP-194） 環境分析用 1.2mL ☆

2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′,4,4′,5,5′-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［35694-08-7］

100μg/mL イソオクタン溶液.「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-05 ACC（C-194S-TP） PCB分析用 1mL ￥9,000

2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［42740-50-1］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-07	ACC（C-196S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,3′,4,4′,5,6-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′,4,4′,5,6-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［52663-78-2］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-06	ACC（C-195S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′,4,4′,6,6′-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［33091-17-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-08	ACC（C-197S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,3′,4,5,5′,6′-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′,4,5,5′,6′-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［52663-75-9］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-10	ACC（C-199S-TP-R1）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,3′,4,5,5′,6-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′,4,5,5′,6-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［68194-17-2］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-09	ACC（C-198S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,3′,4,5,6,6′-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′,4,5,6,6′-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［52663-73-7］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-11	ACC（C-200S-TP-R1）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［40186-71-8］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-12	ACC（C-201S-TP-R1）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-オクタクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-Octachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_2Cl_8$...441.67［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 10% トルエン-ノナン混合溶液.

49816-73	Wel（MBP-202）	環境分析用	1.2mL	☆

2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［2136-99-4］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-13	ACC（C-202S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,4,4′,5,5′,6-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,4,4′,5,5′,6-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［52663-76-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-14	ACC（C-203S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,2′,3,4,4′,5,6,6′-オクタクロロビフェニル標準液
2,2′,3,4,4′,5,6,6′-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［74472-52-9］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-15	ACC（C-204S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

2,3,3′,4,4′,5,5′,6-オクタクロロ[$^{13}C_{12}$]ビフェニル
2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octachloro[$^{13}C_{12}$]biphenyl

$^{13}C_{12}H_2Cl_8$...441.67［審］-1 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。50μg/mL 5%トルエン-ノナン混合溶液.

49818-94	Wel（MBP-205）	環境分析用	1.2mL	☆

2,3,3′,4,4′,5,5′,6-オクタクロロビフェニル標準液
2,3,3′,4,4′,5,5′,6-Octachlorobiphenyl standard solution

$C_{12}H_2Cl_8$...429.75［審］-1 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN®［74472-53-0］

100μg/mL イソオクタン溶液. 「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49799-16	ACC（C-205S-TP）	PCB分析用	1mL	￥9,000

オクタクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾ-*p*-ダイオキシン
Octachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzo-*p*-dioxin

$^{13}C_{12}O_2Cl_8$...471.65 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49813-65	Wel（MDD-12346789）	環境分析用	1.2mL	☆

オクタクロロジベンゾ-*p*-ダイオキシン
Octachlorodibenzo-*p*-dioxin

$C_{12}O_2Cl_8$...459.74 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［3268-87-9］

50μg/mL トルエン溶液.

49813-55	Wel（DD-12346789-S）	環境分析用	1.2mL	☆

オクタクロロ[$^{13}C_{12}$]ジベンゾフラン
Octachloro[$^{13}C_{12}$]dibenzofuran

$^{13}C_{12}OCl_7$...420.20 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2

50μg/mL トルエン溶液.

49813-79	Wel（MDF-12346789）	環境分析用	1.2mL	☆

オクタクロロジベンゾフラン
Octachlorodibenzofuran

$C_{12}OCl_8$...443.74 ［危］4-1-II［労］有-2,57,57-2
CAS RN®［39001-02-0］

50μg/mL トルエン溶液.

49813-30	Wel（DF-12346789-S）	環境分析用	1.2mL	☆

オクタクロロナフタレン標準品
Octachloronaphthalene standard

危険

$C_{10}Cl_8$...403.72［審］-1 ［労］57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2234-13-1］

「化審法」に基づき「第一種特定化学物質」を使用するための確認書が必要です。

49834-95	DES（C20425800）	環境分析用	5mg	￥16,000

オクタクロロスチレン標準品
Octachlorostyrene standard

C_8Cl_8...379.70 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［29082-74-4］

49802-62	DES（C15710000）	環境分析用	25mg	￥38,000

n-オクタコサン
n-Octacosane

$CH_3(CH_2)_{26}CH_3$...394.75 ［労］57,57-2
CAS RN®［630-02-4］ mp64℃～65℃†

31111-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥18,500
31111-50	>98.0%(GC)	鹿特級	G	5g	￥6,000

n-オクタコサン
n-Octacosane

$CH_3(CH_2)_{26}CH_3$...394.75 ［労］57,57-2
CAS RN®［630-02-4］ bp440℃ mp61℃～64℃ d0.8067 Fp227℃

12927-1A	TFS（12927-0050）	5g	￥2,500
12927-2A	TFS（12927-0250）	25g	￥6,800
12927-3A	TFS（12927-1000）	100g	￥22,300

n-オクタコサン-d_{58}
n-Octacosane-d_{58}

$CD_3(CD_2)_{26}CD_3$...453.11
CAS RN®［16416-33-4］

49131-52	CDN（D-959）	98 atom% D	500mg	￥48,400

オクタコサン酸標準品
Octacosanoic acid standard

$C_{28}H_{56}O_2$...424.74 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［506-48-9］ mp91℃～93℃▲

49861-82	DES（C15710060）		食品分析用	50mg	￥27,000

10(*E*),12(*Z*)-オクタデカジエン酸
10(*E*),12(*Z*)-Octadecadienoic acid

$C_{18}H_{32}O_2$...280.44 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［2420-44-2］

49051-66	MTR（1249）	98%		25mg	☆

9(*Z*),11(*E*)-オクタデカジエン酸
9(*Z*),11(*E*)-Octadecadienoic acid

$C_{18}H_{32}O_2$...280.44 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［2540-56-9］

49051-59	MTR（1245）	98%		25mg	☆

9(*Z*),11(*Z*)-オクタデカジエン酸
9(*Z*),11(*Z*)-Octadecadienoic acid

$C_{18}H_{32}O_2$...280.44 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［544-40-7］ mp40℃～42℃▲

49051-64	MTR（1248）	96%		25mg	☆

9,12-オクタデカジエン酸 → リノール酸

9,12-オクタデカジエン酸標準品 → リノール酸標準品

n-オタデカン酸アミド → ステアリン酸アミド

n-オクタデカン
n-Octadecane

$CH_3(CH_2)_{16}CH_3$...254.49
CAS RN® [593-45-3] bp318℃† mp27.5℃† d(28/4℃) 0.777†

31107-10	>98.0%(GC)	鹿特級	G	250g	￥27,000
31107-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥4,800

n-オクタデカン
n-Octadecane

$CH_3(CH_2)_{16}CH_3$...254.49
CAS RN® [593-45-3] bp317℃ mp28℃～31℃ d0.777 Fp166℃

12929-1A	TFS（12929-0050）	5mL	￥3,500
12929-2A	TFS（12929-2500）	250mL	￥16,600

n-オクタデカン-d_{38}
n-Octadecane-d_{38}

$CD_3(CD_2)_{16}CD_3$...292.72
CAS RN® [16416-31-2]

49131-53	CDN（D-956）	98 atom% D	1g	￥37,400

1-オクタデカン-d_{37}-チオール
1-Octadecane-d_{37}-thiol

$C_{18}HD_{37}S$...323.78
CAS RN® [668433-57-6]

49142-32	CDN（D-6744）	98 atom% D	100mg	￥74,800

n-オクタデカンチオール
n-Octadecanethiol

警告

$CH_3(CH_2)_{16}CH_2SH$...286.56
CAS RN® [2885-00-9] mp28℃† d0.847†

31502-01	>97.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥35,500
31502-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥2,800

n-オクタデカン酸 → ステアリン酸

n-オクタデカン酸 → ステアリン酸

オクタデカン酸標準品 → ステアリン酸標準品

オクタデカン酸-12-d_1
Octadecanoic-12-d_1 acid

$CH_3(CH_2)_5CHD(CH_2)_{10}COOH$...285.48
CAS RN® [62163-41-1]

49149-25	CDN（D-5513）	99 atom% D	100mg	￥35,200

オクタデカン酸-16,16,17,17,18,18,18-d_7
Octadecanoic-16,16,17,17,18,18,18-d_7 acid

$C_{18}H_{29}D_7O_2$...291.51
CAS RN® [951209-59-9]

49142-33	CDN（D-6777）	98 atom% D	100mg	￥35,200

オクタデカン酸-17,17,18,18,18-d_5
Octadecanoic-17,17,18,18,18-d_5 acid

$CD_3CD_2(CH_2)_{15}COOH$...289.50
CAS RN® [211443-83-3]

49131-56	CDN（D-5400）	99 atom% D	100mg	￥39,600

オクタデカン酸-18,18,18-d_3
Octadecanoic-18,18,18-d_3 acid

$CD_3(CH_2)_{16}COOH$...287.49
CAS RN® [62163-39-7]

49131-55	CDN（D-1825）	99 atom% D	100mg	￥28,600

オクタデカン酸-2,2-d_2
Octadecanoic-2,2-d_2 acid

$CH_3(CH_2)_{15}CD_2COOH$...286.48
CAS RN® [19905-58-9]

49131-54	CDN（D-1767）	98 atom% D	1g	￥61,600

オクタデカン酸-9,9,10,10-d_4
Octadecanoic-9,9,10,10-d_4 acid

$CH_3(CH_2)_7(CD_2)_2(CH_2)_7COOH$...288.50
CAS RN® [130048-57-6]

49149-26	CDN（D-1100）	99 atom% D	250mg	￥88,000

オクタデカン酸-d_{35}
Octadecanoic-d_{35} acid

$CD_3(CD_2)_{16}COOH$...319.69
CAS RN® [17660-51-4]

49131-57	CDN（D-2007）	98 atom% D	1g	￥48,400

n-オクタデカン酸エチルエステル → ステアリン酸エチル

オクタデカン酸エチルエステル標準品 → ステアリン酸エチル標準品

オクタデカン酸メチルエステル → ステアリン酸メチル

オクタデカン酸メチルエステル → ステアリン酸メチル

オクタデカン酸メチルエステル標準品 → ステアリン酸メチル標準品

1-オクタデカノール → *n*-オクタデシルアルコール

オクタデカノイル-*L*-カルニチン-d_3塩酸塩
Octadecanoyl-*L*-carnitine-d_3 hydrochloride

［冷］ 0℃～6℃

49142-34	CDN（D-6650）	99 atom% D	10mg	￥39,600

9,12,15-オクタデカトリエン酸 → リノレン酸

9,12,15-オクタデカトリエン酸標準品 → リノレン酸標準品

オクタデカトリエン酸
Octadecatrienoic acid

$C_{18}H_{30}O_2$...278.42 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［506-26-3］

all *cis*-6,9,12

49051-19	MTR（1153）	99%	100mg	☆

ｃｉｓ-9-オクタデセンアミド → オレイン酸アミド

1-オクタデセン
1-Octadecene

$CH_3(CH_2)_{15}CH{:}CH_2$...252.47 ［危］4-3-III
CAS RN®［112-88-9］ mp15℃～17℃† d(20/4℃) 0.788† Fp148℃†

31001-02	>90.0%(GC)	G	500mL	￥11,000
31001-32	>90.0%(GC)	G	25mL	￥2,300

1-オクタデセン
1-Octadecene

$CH_3(CH_2)_{15}CH{:}CH_2$...252.47 ［危］4-3-III
CAS RN®［112-88-9］bp178℃～180℃ mp17.5℃～18.3℃ d0.789 Fp154℃

12931-1A	TFS（12931-0010）	1L	￥3,800

ｃｉｓ-9-オクタデセン酸 → オレイン酸

ｃｉｓ-9-オクタデセン酸標準品 → オレイン酸標準品

ｃｉｓ-11-オクタデセン酸メチルエステル標準品 → *ｃｉｓ*-11-オクタデセン酸メチル標準品

ｔｒａｎｓ-11-オクタデセン酸メチルエステル標準液 → *ｔｒａｎｓ*-11-オクタデセン酸メチル標準液

c i s-9-オクタデセン-1-オール → オレイルアルコール

n-オクタデシルアルコール
n-Octadecyl alcohol

$CH_3(CH_2)_{17}OH$...270.49
CAS RN® [112-92-5] mp57.0℃～62.0℃△ d(59/4℃) 0.812†

31002-01	>98.0%(G)	鹿1級	P	500g	￥3,600

n-オクタデシル-1,1-d_2アルコール
n-Octadecyl-1,1-d_2 alcohol

$CH_3(CH_2)_{16}CD_2OH$...272.50
CAS RN® [86369-69-9]

49131-59	CDN（D-5337）	99 atom% D		500mg	￥29,700

n-オクタデシル-d_{37}アルコール
n-Octadecyl-d_{37} alcohol

$CD_3(CD_2)_{17}OH$...307.71
CAS RN® [204259-62-1]

49131-60	CDN（D-4012）	98 atom% D		250mg	￥39,600

n-オクタデシルアミン
n-Octadecylamine

警告

$CH_3(CH_2)_{16}CH_2NH_2$...269.50
CAS RN® [124-30-1] mp50℃～52℃†

31003-32	>90.0%(GC)		G	25g	￥2,600
12932-1A	TFS（12932-5000）	tech.		500g	￥6,000
12932-2A	TFS（12932-0010）	tech.		1kg	￥9,700

n-オクタデシルアミン塩酸塩
n-Octadecylamine hydrochloride

警告

$CH_3(CH_2)_{17}NH_2$·HCl...305.96
CAS RN® [1838-08-0]

31108-32	>98.0%(T)		G	25g	￥22,500

オクタデシルベンゼン
Octadecylbenzene

$C_{24}H_{42}$...330.58
CAS RN®［4445-07-2］ mp32℃～36℃▲

12470-1A	TFS（12470-0010）	1g	￥20,200
12470-2A	TFS（12470-0100）	10g	￥87,900

n-オクタデカンチオール
n-Octadecanethiol

警告

$CH_3(CH_2)_{16}CH_2SH$...286.56
CAS RN®［2885-00-9］bp366℃ mp25℃～35℃ Fp185℃

35498-1A	TFS（35498-0250）	25g	￥5,400
35498-2A	TFS（35498-1000）	100g	￥11,500
35498-3A	TFS（35498-5000）	500g	￥36,900

n-オクタデシルメルカプタン → *n*-オクタデカンチオール

オクタデシルトリクロロシラン
Octadecyltrichlorosilane

$CH_3(CH_2)_{17}SiCl_3$...387.92 ［危］4-3-III
CAS RN®［112-04-9］ d0.984†

14740-1A	TFS（14740-1000）	100mL	￥13,300
14740-2A	TFS（14740-0250）	25mL	￥4,800

オクタデシルトリメトキシシラン
Octadecyltrimethoxysilane

$C_{21}H_{46}O_3Si$...374.67 ［危］4-3-III
CAS RN®［3069-42-9］bp170℃(0.1mm)▲ mp13℃～17℃▲ d0.880▲

31360-1A	TFS（31360-0250）	tech.	25mL	￥13,700

1,7-オクタジエン
1,7-Octadiene

C_8H_{14}...110.19 ［危］4-1-II
CAS RN®［3710-30-3］bp114℃～121℃▲ d0.746▲

12935-2A	TFS（12935-1000）	100mL	￥9,600

1,7-オクタジイン
1,7-Octadiyne

C_8H_{10}...106.16 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［871-84-1］ bp135℃～136℃▲ d0.80▲

17134-1A	TFS（17134-0100）	10g	￥10,000
17134-2A	TFS（17134-0500）	50g	￥33,200

オクタフルオロナフタレン
Octafluoronaphthalene

$C_{10}F_8$...272.09
CAS RN® ［313-72-4］ mp86℃～88℃▲

29153-1A	TFS（29153-0010）	1g	￥7,000

オクタフルオロトルエン
Octafluorotoluene

危険

C_7F_8...236.06 ［危］4-1-II
CAS RN® ［434-64-0］ d1.68▲

31105-32	>98.0%(GC)	G	25g	￥14,500
31105-52	>98.0%(GC)	G	5g	￥5,000

(*R*)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-オクタヒドロ-1,1′-ビ-2-ナフトール
(*R*)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-bi-2-naphthol

$C_{20}H_{22}O_2$...294.38
CAS RN® ［65355-14-8］

49213-64	ダイセル（100671-001G）	1g	￥14,600

(*S*)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-オクタヒドロ-1,1′-ビ-2-ナフトール
(*S*)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-bi-2-naphthol

$C_{20}H_{22}O_2$...294.38
CAS RN® ［65355-00-2］

49213-65	ダイセル（100672-001G）	1g	￥14,600

(*R*)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-オクタヒドロ-3,3′-ビス[2,4,6-トリス(1-メチルエチル)フェニル]-[1,1′-ビナフタレン]-2,2′-ジオール
(*R*)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-3,3′-bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diol

$C_{50}H_{66}O_2$...699.05
CAS RN® [1522367-79-8]

49213-68　ダイセル（134912-100MG）　100mg　￥42,700

(*S*)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-オクタヒドロ-3,3′-ビス[2,4,6-トリス(1-メチルエチル)フェニル]-[1,1′-ビナフタレン]-2,2′-ジオール
(*S*)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-3,3′-bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diol

$C_{50}H_{66}O_2$...699.05
CAS RN® [1197214-47-3]

49213-69　ダイセル（134913-100MG）　100mg　￥42,700

(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(3,5-ジ-*tert*-ブチル-4-メトキシフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-methoxyphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{50}H_{65}O_6P$...793.01

49216-35　ダイセル（137661-100MG）　100mg　￥44,400

(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(3,5-ジ-*tert*-ブチル-4-メトキシフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-methoxyphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{50}H_{65}O_6P$...793.01

49216-36　ダイセル（137662-100MG）　100mg　￥44,400

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(4-メトキシフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(4-methoxyphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{34}H_{33}O_6P$...568.59
CAS RN® [1011465-27-2]

49216-22 ダイセル（137551-100MG） 100mg ￥33,600

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(4-メトキシフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(4-methoxyphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{34}H_{33}O_6P$...568.59

49216-23 ダイセル（137552-100MG） 100mg ￥33,600

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(4-ニトロフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(4-nitrophenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{32}H_{27}N_2O_8P$...598.53
CAS RN® [791616-68-7]

49216-24 ダイセル（137571-100MG） 100mg ￥35,000

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(4-ニトロフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(4-nitrophenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{32}H_{27}N_2O_8P$...598.53

49216-25 ダイセル（137572-100MG） 100mg ￥35,000

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス([1,1′:3′,1′′-ターフェニル]-5′-イル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis([1,1′:3′,1′′-terphenyl]-5′-yl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{56}H_{45}O_4P$...812.92
CAS RN® [1569807-15-3]

49216-18 ダイセル（137471-100MG） 100mg ￥52,200

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス([1,1′:3′,1′′-ターフェニル]-5′-イル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis([1,1′:3′,1′′-terphenyl]-5′-yl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{56}H_{45}O_4P$...812.92
CAS RN® [1496637-09-2]

49216-19 ダイセル（137472-100MG） 100mg ￥52,200

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{34}H_{27}F_6O_4P$...644.53
CAS RN® [791616-70-1]

49216-20 ダイセル（137521-100MG） 100mg ￥33,600

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{34}H_{27}F_6O_4P$...644.53

49216-21 ダイセル（137522-100MG） 100mg ￥33,600

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{38}H_{41}O_4P$...592.70
CAS RN® [1011465-23-8]

49216-33 ダイセル（137651-100MG） 100mg ￥46,000

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{38}H_{41}O_4P$...592.70

49216-34 ダイセル（137652-100MG） 100mg ￥46,000

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(トリフェニルシリル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(triphenylsilyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{56}H_{49}O_4PSi_2$...873.12
CAS RN® [957790-94-2]

49214-31 ダイセル（121201-100MG） 100mg ￥54,600

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス(トリフェニルシリル)-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis(triphenylsilyl)-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{56}H_{49}O_4PSi_2$...873.12
CAS RN® [1157989-25-7]

49214-32 ダイセル（121212-100MG） 100mg ￥54,600

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス[2,4,6-トリス(1-メチルエチル)フェニル]-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{50}H_{65}O_4P$...761.02
CAS RN® [929294-27-9]

49214-48 ダイセル（134954-100MG） 100mg ￥51,000

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ビス[2,4,6-トリス(1-メチルエチル)フェニル]-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{50}H_{65}O_4P$...761.02
CAS RN® [878111-20-7]

49214-49 ダイセル（134955-100MG） 100mg ￥51,000

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-1-ナフタレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-di-1-naphthalenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{40}H_{33}O_4P$...608.65
CAS RN® [1242066-20-1]

49214-20 ダイセル（111451-100MG） 100mg ￥35,400

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-2-ナフタレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-di-2-naphthalenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{40}H_{33}O_4P$...608.65
CAS RN® [922711-75-9]

49215-19 ダイセル（110261-100MG） 100mg ￥33,800

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-1-ナフタレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-di-1-naphthalenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{40}H_{33}O_4P$...608.65

49214-21 ダイセル（111452-100MG） 100mg ￥35,400

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-2-ナフタレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-di-2-naphthalenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{40}H_{33}O_4P$...608.65

49214-13 ダイセル（110262-100MG） 100mg ￥35,200

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-9-フェナントレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-di-9-phenanthrenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{48}H_{37}O_4P$...708.77
CAS RN® [934201-93-1]

49215-74 ダイセル（135629-100MG） 100mg ￥48,200

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-9-フェナントレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-di-9-phenanthrenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{48}H_{37}O_4P$...708.77
CAS RN® [1028416-47-8]

49215-75 ダイセル（135630-100MG） 100mg ￥48,200

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジフェニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-diphenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{32}H_{29}O_4P$...508.54
CAS RN® [791616-65-4]

49214-93 ダイセル（135625-100MG） 100mg ￥31,800

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジフェニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-diphenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{32}H_{29}O_4P$...508.54
CAS RN® [945852-48-2]

49214-94 ダイセル（135626-100MG） 100mg ￥31,800

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-1-ピレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-di-1-pyrenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{52}H_{37}O_4P$...756.81
CAS RN® [1225195-02-7]

49216-37 ダイセル（137671-100MG） 100mg ￥45,400

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-2,6-ジ-1-ピレニル-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-2,6-di-1-pyrenyl-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{52}H_{37}O_4P$...756.81

49216-38	ダイセル（137672-100MG）	100mg	￥45,400

(11b *R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*R*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{20}H_{21}O_4P$...356.35
CAS RN® [297752-25-1]

49213-66	ダイセル（100691-100MG）	100mg	￥22,500

(11b *S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-オクタヒドロ-4-ヒドロキシ-4-オキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン
(11b*S*)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin

$C_{20}H_{21}O_4P$...356.35
CAS RN® [1193697-61-8]

49213-67	ダイセル（100692-100MG）	100mg	￥22,500

(2 *S*,3 *a S*,7 *a S*)-オクタヒドロ-1 *H*-インドール-2-カルボン酸
(2*S*,3*aS*,7*aS*)-Octahydro-1*H*-indole-2-carboxylic acid

$C_9H_{15}NO_2$...169.22
CAS RN® [80875-98-5]

31023-52	>95.0%	G	5g	￥22,500
31023-62	>95.0%	G	1g	￥8,500

オクタメチルシクロテトラシロキサン
Octamethylcyclotetrasiloxane

警告

$C_8H_{24}O_4Si_4$...296.61 ［危］4-2-III
CAS RN® [556-67-2] bp175℃～176℃▲ mp17℃～18℃▲ d0.956▲

31068-02	>98.0%(GC)	G	500mL	￥13,500
31068-32	>98.0%(GC)	G	25mL	￥2,500

オクタメチルシクロテトラシロキサン
Octamethylcyclotetrasiloxane

$C_8H_{24}O_4Si_4$...296.61 ［危］4-2-III
CAS RN® ［556-67-2］ bp175℃～176℃▲ mp17℃～18℃▲ d0.956▲

21647-1A	TFS（21647-0250）	25g	￥4,100
21647-2A	TFS（21647-1000）	100g	￥10,400

オクタナール-d16
Octanal-d_{16}

$C_8D_{16}O$...144.30 ［危］4-2-III
CAS RN® ［1219794-66-7］

49142-35	CDN（D-6929）	98 atom% D	250mg	￥74,800

i s o-オクタン → 2,2,4-トリメチルペンタン

n-オクタン
n-Octane

危険

$CH_3(CH_2)_6CH_3$...114.22 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN® ［111-65-9］ bp125.6℃† mp-57℃† d(20/4℃) 0.703† Fp15.6℃†

31004-01		>95.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥5,800
31004-31		>95.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥2,200
9716-1M	M（1.09716.0005）		ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用		5mL	￥40,700

n-オクタン
n-Octane

危険

$CH_3(CH_2)_6CH_3$...114.22 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN® ［111-65-9］ bp125℃～127℃ mp57℃ d0.708 Fp13℃

12937-1A	TFS（12937-0020）	2mL	￥5,400
12937-2A	TFS（12937-0025）	2.5L	￥41,700
12937-3A	TFS（12937-0250）	25L	￥475,100
12937-4A	TFS（12937-5000）	500mL	￥12,700

n-オクタン-d_{18}
n-Octane-d_{18}

$CD_3(CD_2)_6CD_3$...132.33 ［危］4-1-II［労］57,57-2
CAS RN® ［17252-77-6］

49147-47	CDN（D-451）	99 atom% D	1g	￥19,800

1,8-オクタン二酸
1,8-Octanedioic acid

$C_8H_{14}O_4$...174.19
CAS RN® ［505-48-6］

31114-02		>95.0%	500g	￥28,000
31114-32		>95.0%	25g	￥3,400

1,8-オクタンジオン酸-2,2,7,7-d_4
1,8-Octanedioic-2,2,7,7-d_4 acid

$HOOCCD_2(CH_2)_4CD_2COOH$...178.21
CAS RN® ［19031-57-3］

49131-61	CDN（D-2008）	98 atom% D	1g	￥52,800

1,8-オクタンジオン酸-d_{12}
1,8-Octanedioic-d_{12} acid

$HOOC(CD_2)_6COOH$...186.26
CAS RN® ［169397-99-3］

49131-62	CDN（D-5338）	98 atom% D	250mg	￥42,900

1,2-オクタンジオール
1,2-Octanediol

$C_8H_{18}O_2$...146.22
CAS RN® ［1117-86-8］bp131℃～132℃(10mm)▲ mp36℃～38℃▲

20014-1A	TFS（20014-0500）		50g	￥11,100
20014-2A	TFS（20014-0100）		10g	￥3,500

1,8-オクタンジチオール
1,8-Octanedithiol

$HS(CH_2)_8SH$...178.36 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1191-62-4］ bp269℃～270℃▲ d0.962▲

31062-1A	TFS（31062-0050）	5g	￥14,700

1-オクタンスルホン酸ナトリウム一水和物
1-Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate

$C_8H_{17}NaO_3S \cdot H_2O$...234.29
CAS RN® ［207596-29-0］ mp>300℃▲

20614-1A	TFS（20614-0050）	5g	￥6,800
20614-2A	TFS（20614-0250）	25g	￥26,100

1-オクタンスルホン酸ナトリウム
1-Octanesulfonic acid, sodium salt

$CH_3(CH_2)_7SO_3Na$...216.27
CAS RN® ［5324-84-5］ mp300℃

38477-1A	TFS（38477-0050）	5g	￥9,700
38477-2A	TFS（38477-0250）	25g	￥33,800
38477-3A	TFS（38477-1000）	100g	￥95,000

オクタン-1-スルホン酸ナトリウム → 1-オクタンスルホン酸ナトリウム

1-オクタン-d_{17}-チオール
1-Octane-d_{17}-thiol

$C_8HD_{17}S$...163.40 ［危］4-2-III
CAS RN® ［226999-68-4］

49142-36	CDN（D-6581）	98 atom% D	250mg ￥70,400

1-オクタンチオール
1-Octanethiol

警告

$CH_3(CH_2)_6CH_2SH$...146.29 ［危］4-2-III
CAS RN® ［111-88-6］ bp197℃～200℃† d(20/4℃) 0.843† Fp68℃†

07134-00	>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥5,200
07134-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥2,000

1-オクタンチオール
1-Octanethiol

警告

$CH_3(CH_2)_6CH_2SH$...146.29 ［危］4-2-III
CAS RN® ［111-88-6］ bp197℃～200℃ mp49℃ d0.84 Fp68℃

15748-1A	TFS（15748-0010）			1kg	￥6,500
15748-2A	TFS（15748-0025）			2.5kg	￥13,300
15748-4A	TFS（15748-2500）			250g	￥4,600

n-オクタン酸
n-Octanoic acid

危険

$CH_3(CH_2)_6COOH$...144.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［124-07-2］ bp239.7℃† mp15℃～17℃† d(20/4℃) 0.910† Fp132℃†

07132-10	>98.0%(GC)	鹿特級	G	250g	￥2,500
07132-33	>99.0%(GC)	ｱﾐﾉ酸分析用	G	25g	￥2,600

n-オクタン酸
n-Octanoic acid

危険

$CH_3(CH_2)_6COOH$...144.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［124-07-2］ bp239.7℃† mp15℃～17℃† d(20/4℃) 0.910† Fp132℃†

49051-46	MTR（1198）	99%		1g	☆

オクタン酸標準品
Octanoic acid standard

$CH_3(CH_2)_6COOH$...144.21 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［124-07-2］ bp239.7℃▲ mp15℃～17℃▲ d(20/4℃) 0.910▲ Fp132℃▲

49861-62	DES（CA15711050）	食品分析用		250mg	￥9,500

オクタン酸-2,2-d_2
Octanoic-2,2-d_2 acid

$CH_3(CH_2)_5CD_2COOH$...146.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［64118-36-1］

49131-63	CDN（D-5339）	98 atom% D	1g	￥30,800

オクタン酸-8,8,8-d_3
Octanoic-8,8,8-d_3 acid

$CD_3(CH_2)_6COOH$...147.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［156779-05-4］

49131-64	CDN（D-3992）	99 atom% D	500mg	￥49,500

オクタン酸-d_{15}
Octanoic-d_{15} acid

$CD_3(CD_2)_6COOH$...159.30 ［危］4-3-III
CAS RN® ［69974-55-6］

49131-65	CDN（D-1948）	98 atom% D	500mg	￥27,500

n-オクタン酸エチルエステル → *n*-オクタン酸エチル

オクタン酸エチルエステル標準品 → オクタン酸エチル標準品

オクタン酸メチルエステル標準品 → オクタン酸メチル標準品

オクタン酸ナトリウム → *n*-オクタン酸ナトリウム

γ-オクタン酸ラクトン
γ-Octanoic lactone

$C_8H_{14}O_2$...142.19 ［危］4-3-III
CAS RN® ［104-50-7］bp234℃▲ d0.981▲

12940-1A	TFS（12940-0250）	25g	￥6,100
12940-2A	TFS（12940-1000）	100g	￥21,200

1-オクタノール
1-Octanol

危険

$CH_3(CH_2)_6CH_2OH$...130.22 ［危］4-3-III ［PRTR］1-73
CAS RN® ［111-87-5］ bp194℃～195℃† mp-15℃† d(20/4℃) 0.827† Fp91℃†

31013-00	>98.0%(GC)	特級	G	500mL	￥3,300
31013-70	>98.0%(GC)	特級	G	3L	￥12,000
31013-01	>98.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥2,500
31013-81	>98.0%(GC)	鹿1級	M	14kg	☆
31013-08	>99.5%(GC)	分配係数測定用	G	500mL	￥8,500
31013-76	>99.5%(GC)	分配係数測定用	G	3L	￥24,000

1-オクタノール-1,1-d_2
1-Octanol-1,1-d_2

$CH_3(CH_2)_6CD_2OH$...132.24 ［危］4-3-III ［PRTR］1-73
CAS RN® ［78510-02-8］

49131-67	CDN（D-5055）	99 atom% D	1g	￥57,200

1-オクタノール-d_{17}
1-Octanol-d_{17}

$CD_3(CD_2)_7OH$...147.33 ［危］4-3-III ［PRTR］1-73
CAS RN® ［153336-13-1］

49131-68	CDN（D-1947）	98 atom% D	500mg	￥52,800

2-オクタノール
2-Octanol

警告

$CH_3CHOH(CH_2)_5CH_3$...130.22 ［危］4-3-III ［労］57,57-2
CAS RN® ［123-96-6］ bp178℃～179℃† d(15/4℃) 0.820† Fp82℃†

31014-01	>97.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥2,500
31014-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥1,500

D L-3-オクタノール
DL-3-Octanol

$C_8H_{18}O$...130.22 ［危］4-3-III
CAS RN® ［589-98-0］bp174℃～176℃▲ d0.825▲

20377-1A	TFS（20377-0500）			50mL	￥6,600

L (-)-2-オクタノール
L(-)-2-Octanol

警告

$C_8H_{18}O$...130.22 ［危］4-3-III［労］57,57-2
CAS RN® ［5978-70-1］bp175℃▲ d0.83▲

31080-32		>97.0%(GC)	G	25mL	￥38,500
16459-1A	TFS（16459-0050）			5g	￥17,000
16459-2A	TFS（16459-0010）			1g	￥5,600
16459-3A	TFS（16459-0100）			10g	￥32,600

2-オクタノン
2-Octanone

警告

$CH_3CO(CH_2)_5CH_3$...128.21 ［危］4-2-III
CAS RN® ［111-13-7］bp172℃～173℃† mp-16℃† d(20/4℃) 0.820† Fp56℃†

31006-31		>97.0%(GC)	鹿1級	G	25g	￥2,600

2-オクタノン
2-Octanone

警告

$CH_3CO(CH_2)_5CH_3$...128.21 ［危］4-2-III
CAS RN® ［111-13-7］bp173℃ mp16℃ d0.819 Fp55℃

12942-1A	TFS（12942-0025）		2.5L	￥23,000
12942-3A	TFS（12942-0250）		25mL	￥3,000
12942-4A	TFS（12942-5000）		500mL	￥6,800

オクタノフェノン
Octanophenone

$C_{14}H_{20}O$...204.30 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1674-37-9］ mp21.5℃～23.5℃▲ d0.93▲

27936-1A	TFS（27936-0250）		25g	￥12,700
27936-2A	TFS（27936-0050）		5g	￥3,800

オクタノイル-*L*-カルニチン-d_3塩酸塩(*N*-メチル-d_3)
Octanoyl-*L*-carnitine-d_3 hydrochloride (*N*-methyl-d_3)

$C_{15}H_{27}ClD_3NO_4$...326.87 ［冷］ 0℃～6℃

49142-37	CDN（D-6651）	99 atom% D	10mg	￥39,600

N-オクタノイルグリシン-2,2-d_2
N-Octanoylglycine-2,2-d_2

$CH_3(CH_2)_6CONHCD_2COOH$...203.27
CAS RN® ［1219805-51-2］

49147-48	CDN（D-7267）	98 atom% D	10mg	￥20,900

n-オクタトリアコンタン-d_{78}
n-Octatriacontane-d_{78}

$CD_3(CD_2)_{36}CD_3$...613.50
CAS RN® ［1219803-25-4］

49147-49	CDN（D-7017）	98 atom% D	100mg	￥48,400

1-オクテン
1-Octene

危険

$CH_3(CH_2)_5CH{:}CH_2$...112.21 ［危］4-1-II
CAS RN® ［111-66-0］ bp121.3℃† mp-101℃† d(20/4℃) 0.715† Fp13℃†

31008-00		>97.0%(GC)	鹿特級	G	500mL	￥3,300
31008-30		>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥1,200
30125-1A	TFS（30125-1000）				100mL	￥4,700
30125-4A	TFS（30125-5000）				500mL	￥4,800
30125-2A	TFS（30125-0025）				2.5L	￥15,900

1-オクテン-2-d_1
1-Octene-2-d_1

$C_8H_{15}D$...113.21 ［危］4-1-II
CAS RN® ［56975-78-1］

49152-32	CDN（D-7953）			10mg	￥48,400

2-オクテン
2-Octene

$CH_3(CH_2)_4CH{:}CHCH_3$...112.21 ［危］4-2-III
CAS RN® ［111-67-1］ bp124.5℃～127℃† d0.722～0.728△

cis and *trans* mixture

31009-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥4,600

オクテニルこはく酸無水物
Octenylsuccinic anhydride

警告

$C_{12}H_{18}O_3$...210.26 ［危］4-3-III
CAS RN® ［26680-54-6］

31112-02	>97.0%		G	500mL	￥9,500
31112-32	>97.0%		G	25mL	￥1,600

オクチリノン標準品
Octhilinone standard

$C_{11}H_{19}NOS$...213.34 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［26530-20-1］

49864-80	DES（C15711500）	残留農薬試験用		100mg	￥32,000

(±)-*p*-オクトパミン-α,β,β-d_3塩酸塩
(±)-*p*-Octopamine-α,β,β-d_3 hydrochloride

$C_8H_8D_3NO_2$·HCl...192.65
CAS RN® ［1219803-62-9］

49142-38	CDN（D-1774）	98 atom% D		10mg	￥52,800

オクトパミン塩酸塩
Octopamine hydrochloride

$C_8H_{11}NO_2$･HCl...189.63
CAS RN® [770-05-8]

31082-32	>97.0%	G	25g	￥12,500
31082-52	>97.0%	G	5g	￥4,600

n-オクチルアルコール → 1-オクタノール

sec-オクチルアルコール → 2-オクタノール

オクチルアルデヒド
Octyl aldehyde

$C_8H_{16}O$...128.21 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [124-13-0] mp12℃～15℃▲ d0.821▲

12948-1A	TFS（12948-1000）	100mL	￥3,900
12948-2A	TFS（12948-5000）	500mL	￥9,300

n-オクチルアミン
n-Octylamine

危険

$CH_3(CH_2)_6CH_2NH_2$...129.24 ［危］4-2-III
CAS RN® [111-86-4] bp170℃～179℃† mp-5℃～-1℃† d0.779～0.784△ Fp63℃†

31519-31		>96.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥2,200
12949-1A	TFS（12949-5000）				500g	￥9,700
12949-2A	TFS（12949-0050）				5g	￥2,500

n-オクチル-d_{17}-アミン
n-Octyl-d_{17}-amine

$C_8H_2D_{17}N$...146.34 ［危］4-2-III
CAS RN® [1173022-14-4]

49142-39	CDN（D-6345）	98 atom% D	100mg	￥83,600

ｔｅｒｔ-オクチルアミン
tert-Octylamine

危険

$C_8H_{19}N$...129.24 ［危］4-2-III
CAS RN® ［107-45-9］ bp137℃～143℃▲ d0.805▲

31081-02		>98.0%(GC)	G	500mL	￥10,500
12950-1A	TFS（12950-0050）			5g	￥4,300
12950-2A	TFS（12950-5000）			500g	￥6,700

ｔｅｒｔ-オクチルアミン臭化水素酸塩
tert-Octylamine hydrobromide

$(CH_3)_3CCH_2C(CH_3)_2NH_2$･HBr...210.15
mp246℃～247℃▲

49008-90	昭化（1500-4150）	98.5%	500g	￥143,700
49008-91	昭化（1500-4380）	98.5%	15kg	☆

n-オクチルアミンほうふっ化水素酸塩
n-Octylamine hydrofluoroboride

［劇］II ［PRTR］1-405

49009-92	昭化（1502-0150）		500g	￥14,000
49009-93	昭化（1502-0380）		15kg	☆

4-*n*-オクチル-d_{17}-アニソール
4-*n*-Octyl-d_{17}-anisole

$C_{15}H_7D_{17}O$...237.45
CAS RN® ［1219794-56-5］

49142-40	CDN（D-6108）	98 atom% D	250mg	￥61,600

4-オクチルベンズアルデヒド
4-Octylbenzaldehyde

$C_{15}H_{22}O$...218.33
CAS RN® ［49763-66-8］

36888-1A	TFS（36888-0050）		5g	￥39,400

n-オクチルベンゼン-2,3,4,5,6-d_5
n-Octylbenzene-2,3,4,5,6-d_5

$C_{14}H_{17}D_5$...195.35 ［危］4-3-III

49142-41	CDN（D-6738）	98 atom% D	500mg	￥48,400

n-オクチルベンゼン-d_{22}
n-Octylbenzene-d_{22}

$C_6D_5(CD_2)_7CD_3$...212.45 ［危］4-3-III
CAS RN® ［1219799-28-6］

49147-50	CDN（D-6740）	98 atom% D	500mg	￥35,200

オクチレン → 1-オクテン

1-*O*-*n*-オクチル-β-*D*-グルコピラノシド
1-*O*-*n*-Octyl-β-*D*-glucopyranoside

$C_{14}H_{28}O_6$...292.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［29836-26-8］

23034-1A	TFS（23034-2500）		250mg	￥4,600
23034-2A	TFS（23034-0010）		1g	￥11,600

1-*O*-オクチル-d_{17}-β-*D*-グルコピラノシド
1-*O*-Octyl-d_{17}-β-*D*-glucopyranoside

$C_{14}H_{11}D_{17}O_6$...309.47 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［129522-81-2］

mixture of 94% β,6% α

49131-69	CDN（D-5260）	98 atom% D	10mg	￥22,000

n-オクチル-α-*D*-グルコピラノシド
n-Octyl-α-*D*-glucopyranoside

$C_{14}H_{28}O_6$...292.36

n-オクチル-β-*D*-グルコピラノシド
n-Octyl-β-*D*-glucopyranoside

$C_{14}H_{28}O_6$...292.36
CAS RN® [29836-26-8]

31063-53	>98.0%(HLC)	生化学用	G	5g	￥25,500

n-オクチルメルカプタン → 1-オクタンチオール

1-オクチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート
1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate

$C_{12}H_{23}N_2 \cdot PF_6$...340.28
CAS RN® [304680-36-2] d1.2345▲

35676-1A	TFS（35676-0250）		25g	￥28,200
35676-2A	TFS（35676-0050）		5g	￥7,800

4-*n*-オクチル-d_{17}-フェノール
4-*n*-Octyl-d_{17}-phenol

$C_{14}H_5D_{17}O$...223.42 [PRTR] 1-74
CAS RN® [1219794-55-4]

49142-42	CDN（D-6102）	98 atom% D	100mg	￥44,000

4-*n*-オクチルフェノール標準品
4-*n*-Octylphenol standard

警告

$CH_3(CH_2)_7C_6H_4OH$...206.32 [危] 4-3-III [PRTR] 1-74
CAS RN® [1806-26-4] mp44℃～45℃†

31061-96	>97.0%(GC)	環境分析用	G	500mg	￥8,500

4-*tert*-オクチルフェノール
4-*tert*-Octylphenol

警告

$(CH_3)_3CCH_2C(CH_3)_2C_6H_4OH$...206.32 [PRTR] 1-74 [変]
CAS RN® [140-66-9] mp83.5℃～84℃†

31060-96	>97.0%(GC)	環境分析用	G	500mg	￥9,000

4-オクチルフェノールジエトキシレート標準液
4-Octylphenol diethoxylate standard solution

危険

$C_{18}H_{30}O_3$...294.42 ［危］4-1-S-II［労］有-2,57,57-2 ［麻］麻薬等原料 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［51437-90-2］

10mg/L アセトン溶液

49826-35	DES（LA15712803AC）	環境分析用	1mL	￥26,000

4-オクチルフェノールエトキシレート標準品
4-Octylphenol ethoxylate standard

警告

［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［26636-32-8］

49826-33	DES（C15712800）	環境分析用	250mg	￥14,000

オクチル硫酸ナトリウム
Octyl sodium sulfate

$CH_3(CH_2)_7OSO_3Na$...232.27
CAS RN® ［142-31-4］

41650-1A	TFS（41650-0250）	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	25g	￥93,100

3-オクチルチオフェン
3-Octylthiophene

$C_{12}H_{20}S$...196.35 ［危］4-3-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［65016-62-8］ d0.910†

29614-1A	TFS（29614-0100）		10g	￥21,900

オクチルトリクロロシラン
Octyltrichlorosilane

$CH_3(CH_2)_7SiCl_3$...247.66 ［危］4-1-II
CAS RN® ［5283-66-9］ bp233℃(731mm)▲ d1.07▲

21650-1A	TFS（21650-1000）		100g	￥7,400

n-オクチルトリエトキシシラン
n-Octyltriethoxysilane

$C_{14}H_{32}O_3Si$...276.48 ［危］4-3-III
CAS RN® ［2943-75-1］ bp98℃▲ d0.88▲

33808-1A	TFS（33808-0250）	25mL	￥4,400
33808-2A	TFS（33808-1000）	100mL	￥9,300

オクチルトリエチルアンモニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
Octyltriethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

$C_{16}H_{32}F_6N_2O_4S_2$...494.56
CAS RN® ［210230-48-1］

49529-15	ILT（IL-0328-HP）	25g	￥28,000

1-オクチン
1-Octyne

$CH_3(CH_2)_5C{\equiv}CH$...110.19 ［危］4-1-II
CAS RN® ［629-05-0］ bp127℃～128℃† d0.747†

22351-1A	TFS（22351-0250）	25mL	￥7,500

4-オクチン
4-Octyne

$CH_3(CH_2)_2C{\equiv}C(CH_2)_2CH_3$...110.19 ［危］4-2-III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1942-45-6］ bp131℃～132℃† d0.751†

22352-1A	TFS（22352-0100）	10mL	￥8,500

オフロキサシン標準品
Ofloxacin standard

$C_{18}H_{20}FN_3O_4$...361.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［82419-36-1］ mp260℃～270℃(dec.)†

31025-96	>99.5%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥8,000

オフロキサシン塩酸塩-d_3標準品
Ofloxacin hydrochloride-d_3 standard

$C_{18}H_{17}D_3FN_3O_4$·HCl...400.84 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1173021-78-7］

49836-95	DES（C15717010）	食品分析用	10mg	￥110,000

オフレース標準品
Ofurace standard

$C_{14}H_{16}ClNO_3$...281.73 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［58810-48-3］

49838-55	DES（C15718000）	残留農薬試験用	100mg	￥36,000

オイルレッドIV → ズダンIV

オイルレッドO
Oil red O

$C_{26}H_{24}N_4O$...408.49
CAS RN® ［1320-06-5］

5230-1M	M（1.05230.0025）	顕微鏡用(Certistain®)	25g	￥14,200

オカダ酸
Okadaic acid

$C_{44}H_{68}O_{13}$...805.00 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［78111-17-8］ mp164℃～166℃▲

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

32837-1A	TFS（32837-0001）	0.1mg	￥135,400

オカダ酸標準液
Okadaic acid standard solution

$C_{44}H_{68}O_{13}$...805.00 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［78111-17-8］ mp164℃～166℃†

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。メタノール溶液

49915-09	NRC（NRC-CRM-OA）	0.5mL	￥29,000

オカダ酸標準液 CRM6206-b
Okadaic Acid Standard Solution, CRM6206-b

$C_{44}H_{68}O_{13}$...805.00 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［78111-17-8］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

49875-26	NMI（CRM6206-b）	認証標準物質	1mL	☆

オカダ酸ナトリウム
Okadaic acid sodium salt

$C_{44}H_{67}O_{13}Na$...826.98 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［209266-80-8］

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。

32840-1A	TFS（32840-0001）		0.1mg	￥87,300

オカダ酸ナトリウム塩標準液
Okadaic acid sodium salt standard solution

$C_{44}H_{68}O_{13}Na$...827.99 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［209266-80-8］ mp164℃～166℃†

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。24.92μg/g メタノール溶液

49917-09	CIF（CRM-00-OA）		0.5mL	☆

オラキンドックス標準品
Olaquindox standard

$C_{12}H_{13}N_3O_4$...263.24 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［23696-28-8］

49867-45	DES（C15724000）	食品分析用	100mg	￥32,000

オレアセイン
Oleacein

$C_{17}H_{20}O_6$...320.33 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［149183-75-5］

49874-40	PHY（83881）	天然物化学研究用	10mg	￥35,000

オレイン酸アミド
Oleamide

$CH_3(CH_2)_7CH:CH(CH_2)_7CONH_2$...281.47
CAS RN® [301-02-0] mp73℃～77℃△

31523-00	鹿特級	G	500g	￥6,000
31523-30	鹿特級	G	25g	￥2,000

オレアンドマイシンりん酸塩標準液
Oleandomycin phosphate standard solution

危険

$C_{35}H_{61}NO_{12}·H_3PO_4·2H2O$...805.88 [劇] II [危] 4-1-S-II [労] 57,57-2 [PRTR] 1-13 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [7060-74-4]

100mg/L アセトニトリル溶液

49831-71	DES（XA15726000AL）	食品分析用	1mL	￥20,000

オレアンドリン
Oleandrin

$C_{32}H_{48}O_9$...576.71
CAS RN® [465-16-7]

49066-02	PHY（89744）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

オレアノール酸
Oleanolic acid

$C_{30}H_{48}O_3$...456.69
CAS RN® [508-02-1]

49066-03	PHY（89383）	天然物化学研究用	50mg	￥45,000

オレアノリン酸
Oleanonic acid

$C_{30}H_{46}O_3$...454.68
CAS RN® [17990-42-0]

49874-41	PHY（84246）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

オレイン酸
Oleic acid

$CH_3(CH_2)_7CH:CH(CH_2)_7COOH$...282.46 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-80-1］ mp<10℃▲ d(25/25℃) abt 0.895† Fp189℃†

31028-01		鹿1級	G	500mL	￥1,900
31028-81		鹿1級	M	15kg	☆
27029-1A	TFS（27029-0050）			5g	￥10,600

オレイン酸標準品
Oleic acid standard

$CH_3(CH_2)_7CH:CH(CH_2)_7COOH$...282.46 ［危］4-3-III ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［112-80-1］ bp194℃～195℃▲ mp<10℃▲ d(25/25℃) abt 0.895▲ Fp189℃▲

49862-44	DES（C15727000）	食品分析用	500mg	￥14,000

オレイン酸エチルエステル → オレイン酸エチル

オレイン酸エチルエステル標準品 → オレイン酸エチル標準品

オレイン酸メチルエステル → オレイン酸メチル

オレイン酸メチルエステル標準品 → オレイン酸メチル標準品

オレイン酸ナトリウム塩 → オレイン酸ナトリウム

オレオカンタール
Oleocanthal

$C_{17}H_{20}O_5$...304.33 ［凍］ -20℃以下
CAS RN® ［289030-99-5］

49874-42	PHY（83882）	天然物化学研究用	5mg	￥35,000

オレオシド11-メチルエステル
Oleoside 11-methyl ester

$C_{17}H_{24}O_{11}$...404.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［60539-23-3］

49066-04	PHY（89652）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

N-オレオイル-2-アミノ-1,3-プロパン-d_5-ジオール
N-Oleoyl-2-amino-1,3-propane-d_5-diol

$C_{21}H_{36}D_5NO_3$...360.58 ［冷］ 0℃～6℃

49152-33	CDN（D-8112）	10mg	￥22,000

3-オレオイルエストロン-2,4,16,16-d_4
3-Oleoylestrone-2,4,16,16-d_4

［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［443791-75-1］

49142-44	CDN（D-6348）	10mg	￥48,400

オロイロペイン
Oleuropein

$C_{25}H_{32}O_{13}$...540.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［32619-42-4］

49066-05	PHY（89338）	天然物化学研究用	10mg	￥43,000

オレウロシド
Oleuroside

$C_{25}H_{32}O_{13}$...540.51 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［116383-31-4］

49874-43	PHY（85762）	天然物化学研究用	5mg	￥42,000

オレイルアルコール
Oleyl alcohol

警告

$CH_3(CH_2)_7CH{:}CH(CH_2)_8OH$...268.47 ［危］4-3-III
CAS RN® ［143-28-2］ mp13℃～19℃† d0.849†

31030-02	>70.0%(GC)	G	500mL	￥3,700
31030-32	>70.0%(GC)	G	25mL	￥1,600

オレイルアミン
Oleylamine

危険

$CH_3(CH_2)_7CH:CH(CH_2)_8NH_2$...267.49 ［危］4-3-III
CAS RN® ［112-90-3］ mp15℃～22℃† d0.813†

31021-02		G	500mL	￥5,200
31021-32		G	25mL	￥1,800
12954-1A	TFS（12954-0010）		1L	￥18,300
12954-2A	TFS（12954-0050）		5mL	￥4,300

オリゴ (dT)25マグネティック・ビーズ
Oligo (dT)25 Magnetic Beads

［冷］ 0℃～6℃

5mg/mL

49896-35	NEB（S1419S）	25mg	￥55,700

オリゴ d(T)18 mRNAプライマー
Oligo d(T)18 mRNA Primer

［凍］ -20℃以下

49896-19	NEB（S1316S）	5A260units	￥19,900

オリゴ糖0601
Oligosaccharide 0601

$C_{44}H_{76}N_4O_{31}$...1157.08 ［冷］ 0℃～6℃

31119-96	>95.0%(HLC)	糖鎖生物学用	20μg	￥19,000

オリゴ糖0602
Oligosaccharide 0602

$C_{42}H_{73}N_3O_{30}$...1100.03 ［冷］ 0℃～6℃

31120-96	>95.0%(HLC)	糖鎖生物学用	20μg	￥25,500

オリゴ糖0603
Oligosaccharide 0603

$C_{42}H_{73}N_3O_{30}$...1100.03 ［冷］ 0℃～6℃

31121-96		>95.0%(HLC)	糖鎖生物学用	20μg	￥25,500

オリゴ糖0604
Oligosaccharide 0604

$C_{40}H_{70}N_2O_{29}$...1042.97 ［冷］ 0℃～6℃

31122-96		>95.0%(HLC)	糖鎖生物学用	20μg	￥41,500

オリゴ糖0701
Oligosaccharide 0701

$C_{50}H_{86}N_4O_{35}$...1303.22 ［冷］ 0℃～6℃

31123-96		>95.0%(HLC)	糖鎖生物学用	20μg	￥41,500

オリゴ糖0702
Oligosaccharide 0702

$C_{48}H_{83}N_3O_{34}$...1246.17 ［冷］ 0℃～6℃

31124-96		>95.0%(HLC)	糖鎖生物学用	20μg	￥67,000

オリゴ d(T)23VN
Oligo d(T)23VN

［凍］ -20℃以下

49896-20	NEB（S1327S）			1A260units	￥18,900

オリーブ油
Olive oil

CAS RN® ［8001-25-0］ d(15/15℃) 0.914～0.919†

31032-01			鹿1級	500mL	￥2,500

オリーブ油
Olive oil

CAS RN®［8001-25-0］ d0.9135 Fp225℃

41653-1A	TFS（41653-0025）		2.5L	￥26,500
41653-2A	TFS（41653-0250）		25mL	￥3,200
41653-3A	TFS（41653-5000）		500mL	￥8,900

オリーブ油
Olive oil

CAS RN®［8001-25-0］ d0.9135 Fp225℃

41654-1A	TFS（41654-0250）		25mL	￥3,000
41654-2A	TFS（41654-5000）		500mL	￥11,200

(-)-オリビル
(-)-Olivil

$C_{20}H_{24}O_7$...376.39 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［2955-23-9］

49874-44	PHY（83883）	天然物化学研究用	10mg	￥85,000

(±)-オメプラゾール-d_3
(±)-Omeprazole-d_3

$C_{17}H_{16}D_3N_3O_3S$...348.43
CAS RN®［934293-92-2］

49142-45	CDN（D-6264）	98 atom% D	10mg	￥92,400

オメプラゾール-d_3 スルホン(ベンズイミダゾール-4,6,7-d_3)
Omeprazole-d_3 sulfone (benzimidazole-4,6,7-d_3)

$C_{17}H_{16}D_3N_3O_4S$...364.43

49152-34	CDN（D-7143）		5mg	￥125,400

オメトエート標準品
Omethoate standard

$C_5H_{12}NO_4PS$...213.19 ［凍］ -20℃
CAS RN® ［1113-02-6］

49803-42	DES（C15730000）	残留農薬試験用	100mg	￥11,000

オメトエート-d_6
Omethoate-d_6

$C_5H_6D_6NO_4PS$...219.23 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［1219804-92-8］

49144-82	CDN（D-7264）		10mg	￥149,600

オミット標準品 → プロパルギット標準品

オミックス ピペットチップ C18 100μL 1000本
OMIX Pipettetips C18 100μL 1000 each

95347-45	ATI（A57003100BK）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥264,000

オミックス ピペットチップ C18 100μL 96本
OMIX Pipettetips C18 100μL 96 each

95347-30	ATI（A57003100）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥42,000
95347-31	ATI（A57003100K）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(6ｹｰｽ)	￥202,000

オミックス ピペットチップ C18 10μL 96本
OMIX Pipettetips C18 10μL 96 each

95347-26	ATI（A5700310）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥35,000
95347-27	ATI（A5700310K）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(6ｹｰｽ)	￥157,000

オミックス ピペットチップ C18 10μLミニベッド 96本
OMIX Pipettetips C18 10μL MINI BED 96 each

95347-24	ATI（A57003MB）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥36,000
95347-25	ATI（A57003MBK）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(6ｹｰｽ)	￥163,000

オミックス ピペットチップ C4 100μL 96本
OMIX Pipettetips C4 100μL 96 each

95347-22	ATI（A57009100）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥42,000
95347-23	ATI（A57009100K）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(6ｹｰｽ)	￥176,000

オミックス ピペットチップ C4 10μL 96本
OMIX Pipettetips C4 10μL 96 each

95347-20	ATI（A5700910）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥35,000
95347-21	ATI（A5700910K）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack(6ｹｰｽ)	￥130,000

オミックス ピペットチップ SCX 100μL 96本
OMIX Pipettetips SCX 100μL 96 each

95347-34	ATI（A57004100）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥42,000

オミックス ピペットチップ SCX 10μL 96本
OMIX Pipettetips SCX 10μL 96 each

95347-33	ATI（A5700410）	ｻﾝﾌﾟﾙ前処理用	1pack	￥35,000

オンダンセトロン-d_5
Ondansetron-d_5

$C_{18}H_{14}D_5N_3O$...298.39
CAS RN® [1219798-86-3]

49142-46	CDN（D-6623）		10mg	￥123,200

α-オノセリン
α-Onocerin

$C_{30}H_{50}O_2$...442.71
CAS RN® [511-01-3]

49868-52	PHY（83528）	天然物化学研究用	5mg	￥50,000

オン/オフバルブ MOVPT (T型デュアル出力ステンレススチール, 50mm, 1/16用)
On/off valve-MOVPT for T dual outlet stainless steel, 50mm, 1/16

95151-12	TRA（1236103）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥58,000

オン/オフバルブ MOVPT(L)(T型デュアル出力ステンレススチール, 50mm, 1/16用)
On/off valve-MOVPT(L) for T dual outlet stainless steel, 50mm, 1/16

95151-13	TRA（1236104）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥58,000

オン/オフバルブ MOVT (L型シングル出力ステンレススチール, 50mm, 1/16用)
On/off valve-MOVT for L single outlet stainless steel, 50mm, 1/16

95151-11	TRA（1236091）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥55,000

オン/オフバルブ SMOV (L型シングル出力ステンレススチール, 1/16, n/a用)
On/off valve-SMOVP for L single outlet stainless steel, 1/16, n/a

95151-16	TRA（1236283）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	1pack	￥15,000

オノニン
Ononin

$C_{22}H_{22}O_9$...430.40
CAS RN® [486-62-4]

49066-06	PHY（82359）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

オフィオポゴニンD
Ophiopogonin D

$C_{44}H_{70}O_{16}$...855.01
CAS RN® [945619-74-9]

49066-07	PHY（82614）	天然物化学研究用		10mg	￥66,000

オレンジI
Orange I

$NaSO_3C_6H_4N{:}NC_{10}H_6OH$...350.32
CAS RN® [523-44-4]

28041-32			G	25g	￥9,500

オレンジII
Orange II

警告

$C_{16}H_{11}N_2NaO_4S$...350.32
CAS RN® [633-96-5]

31035-31		鹿1級	G	25g	￥4,300
41656-1A	TFS（41656-0250）	certified		25g	￥4,700

オレンジIII → メチルオレンジ

オレンジIV → トロペオリンOO

オレンジG
Orange G

$C_6H_5N{:}NC_{10}H_4OH(SO_3Na)_2$...452.37
CAS RN® [1936-15-8]

31034-30		鹿特級	G	25g	￥5,200
15925-1M	M（1.15925.0025）	顕微鏡用(Certistain®)		25g	￥7,890
22982-1A	TFS（22982-0250）			25g	￥6,300
22982-2A	TFS（22982-1000）			100g	￥18,100

オルベンカルブ標準品
Orbencarb standard

$C_{12}H_{16}ClNOS$...257.78 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［34622-58-7］

49803-85	DES（C15740000）	残留農薬試験用	100mg	￥25,000

オルビフロキサシン標準品
Orbifloxacin standard

$C_{19}H_{20}F_3N_3O_3$...395.37 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［113617-63-3］

49832-62	DES（C15742000）	食品分析用	100mg	￥23,000

オルセイン
Orcein

$C_{28}H_{24}N_2O_7$...500.49
CAS RN®［1400-62-0］

31036-60		鹿特級	1g	￥6,200
7100-1M	M（1.07100.0005）	顕微鏡用(Certistain®)	5g	￥17,900
7100-2M	M（1.07100.0025）	顕微鏡用(Certistain®)	25g	￥84,200
41657-2A	TFS（41657-0050）	certified	5g	￥11,800
41657-3A	TFS（41657-0250）	certified	25g	￥43,400

オルシノール
Orcinol

$C_7H_8O_2$...124.13
CAS RN®［504-15-4］ mp105℃～109℃▲

41658-1A	TFS（41658-0050）		5g	￥5,900
41658-2A	TFS（41658-0250）		25g	￥17,600

オルシノール-*D*-グルコシド
Orcinol-*D*-glucoside

$C_{13}H_{18}O_7$...286.27 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［21082-33-7］

49869-95	PHY（83267）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

オルシノール一水和物
Orcinol monohydrate

警告

$CH_3C_6H_3(OH)_2 \cdot H_2O$...142.15
CAS RN® [6153-39-5] bp290℃† mp61℃▲

31037-60		>98.0%(GC)	鹿特級	G	1g	￥1,700
12955-1A	TFS（12955-0250）				25g	￥12,000
12955-2A	TFS（12955-1000）				100g	￥35,000

オリドニン
Oridonin

$C_{20}H_{28}O_6$...364.43
CAS RN® [28957-04-2]

49066-08	PHY（89745）	天然物化学研究用	10mg	￥55,000

オリエンチン
Orientin

$C_{21}H_{20}O_{11}$...448.37
CAS RN® [28608-75-5]

49066-09	PHY（89746）	天然物化学研究用	10mg	￥65,000

オリエンチン 2''-ガラクトシド
Orientin 2''-galactoside

$C_{27}H_{30}O_{16}$...610.51
CAS RN® [861691-37-4]

49868-53	PHY（83529）	天然物化学研究用	10mg	￥66,000

オリジナルバーコードラベル台紙タイプS(25枚/2000片)
Original bar code label sheets type S(25sheets/2000pieces)

96970-04	IASO用	25枚/pk	￥2,500

オルメトプリム標準品
Ormetoprim standard

$C_{14}H_{18}N_4O_2$...274.31 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［6981-18-6］

49833-02	DES（C15745000）	食品分析用		250mg	￥26,000

D L-オルニチン塩酸塩
DL-Ornithine hydrochloride

$C_5H_{12}N_2O_2$·HCl...168.62
CAS RN®［1069-31-4］ mp291℃▲

34700-1A	TFS（34700-0250）			25g	￥24,900

L (+)-オルニチン塩酸塩
L(+)-Ornithine hydrochloride

$C_5H_{12}N_2O_2$·HCl...168.62
CAS RN®［3184-13-2］ mp245℃▲

12956-1A	TFS（12956-1000）			100g	￥16,300
12956-2A	TFS（12956-0250）			25g	￥5,300

L-オルチニン-2,3,3,4,4,5,5-d_7塩酸塩
L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d_7 hydrochloride

$H_2N(CD_2)_3CD(NH_2)COOH$·HCl...139.20

49147-51	CDN（D-7319）	98 atom% D		100mg	￥44,000

L-オルニチン一塩酸塩(一塩酸 *L*-オルニチン)
L-Ornithine monohydrochloride

$NH_2(CH_2)_3CH(NH_2)COOH$·HCl...168.62
CAS RN®［3184-13-2］

31040-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥4,300
31040-60	>98.0%(T)	鹿特級	G	1g	￥1,500

オロセップノーマルFl
Oro-sep normal-Fl(Florisil)

充填剤量:600mg

49850-12	ORO（CRFL600-50）	50本/pk	￥23,000

オロセップノーマルSi
Oro-sep normal-Si(Silicagel)

充填剤量:600mg

49850-11	ORO（CRSI600-50）	50本/pk	￥23,000

オロセップRP-18
Oro-sep RP-18

充填剤量:600mg

49850-13	ORO（CRC18600-50）	50本/pk	￥32,000

オロセップSAX
Oro-sep SAX

充填剤量:600mg

49850-14	ORO（CRSAX600-50）	50本/pk	￥30,000

オロセップSCX
Oro-sep SCX

充填剤量:600mg

49850-15	ORO（CRSCX600-50）	50本/pk	￥30,000

オロチン酸一水和物
Orotic acid monohydrate

警告

$C_5H_4N_2O_4 \cdot H_2O$...174.11
CAS RN® ［50887-69-9］ mp345℃～346℃(dec.)†

31041-30	>98.0%(T)	鹿特級		25g	￥5,700

オロチン酸一水和物
Orotic acid monohydrate

警告

$C_5H_4N_2O_4 \cdot H_2O$...174.11
CAS RN® [50887-69-9] mp334℃

12957-1A	TFS（12957-0050）		5g	￥2,000
12957-2A	TFS（12957-1000）		100g	￥6,900
12957-3A	TFS（12957-5000）		500g	￥26,200

オロキシリンA
Oroxylin A

$C_{16}H_{12}O_5$...284.26
CAS RN® [480-11-5]

49066-10	PHY（82615）	天然物化学研究用	10mg	￥71,000

オロキシリンA 7-グルクロニド
Oroxylin A 7-glucuronide

$C_{22}H_{20}O_{11}$...460.38
CAS RN® [36948-76-2]

49874-45	PHY（84247）	天然物化学研究用	10mg	￥45,000

オルタニル酸 → *o*-アミノベンゼンスルホン酸

オルト過よう素酸
Orthoperiodic acid

危険

H_5IO_6...227.94 [危] 1-PA-1-I [労] 57,57-2
CAS RN® [10450-60-9] mp130℃ †

32061-30	>98.5%(T)	鹿特級	G	25g	￥3,700

オリサストロビン標準品
Orysastrobin standard

$C_{18}H_{25}N_5O_5$...391.42 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［248593-16-0］

49860-26	DES（C15749000）	残留農薬試験用		100mg	￥29,000

オリサストロビン標準液
Orysastrobin standard solution

$C_{18}H_{25}N_5O_5$...391.42 ［劇］II［危］4-1-S-II［労］57,57-2［PRTR］1-13 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［248593-16-0］

100mg/L アセトニトリル溶液

49833-18	DES（XA15749000AL）	残留農薬試験用		1mL	￥15,000

オリザリン標準品
Oryzalin standard

$C_{12}H_{18}N_4O_6S$...346.36 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［19044-88-3］

49802-71	DES（C15750000）	残留農薬試験用		100mg	￥11,000

4%オスミン酸溶液 → 4%四酸化オスミウム溶液(4%オスミウム酸溶液)

オスミン酸 → 酸化オスミウム(VIII)

オスミウム標準原液(Os 1000)
Osmium standard solution (Os 1000)

危険

［労］特-3,57,57-2

$(NH_4)_2OsCl_6$・HCl(2.5mol/L)溶液

31043-1B	Os:1000mg/L	原子吸光分析用	P	100mL	￥31,000

オステオモル迅速脱灰液
OSTEOMOLL rapid decalcifier

［劇］II ［労］特-2,特-3,57,57-2［PRTR］1-411

1736-1M	M（1.01736.1000）	顕微鏡用	1L	￥6,990

オステオソフトマイルド脱灰液
OSTEOSOFT mild decalcifier

1728-1M	M（1.01728.1000）	顕微鏡用	1L	￥6,990

オストール
Osthole

$C_{15}H_{16}O_3$...244.28 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［484-12-8］

49066-11	PHY（89747）	天然物化学研究用	20mg	￥49,000

オベックス標準品 → クロルフェンソン標準品

オキサベトリニル標準品
Oxabetrinil standard

$C_{12}H_{12}N_2O_3$...232.23 ［劇］III ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［74782-23-3］

49830-60	DES（C15755000）	残留農薬試験用	100mg	￥8,500

7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane

危険

$C_6H_{10}O$...98.14 ［危］4-2-III
CAS RN® ［286-20-4］ bp129℃～130℃† d(20/20℃) 0.97▲ Fp27.2℃†

31525-30	>97.0%(GC)	鹿特級	G	25mL	￥3,900

3-オキサビシクロ[3.1.0]ヘキサン-2,4-ジオン
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione

$C_5H_4O_3$...112.08
CAS RN® [5617-74-3] bp100℃～102℃▲ mp54℃～60℃▲

37012-1A	TFS（37012-0010）			1g	￥10,500

オキサシリンナトリウム塩水和物標準品
Oxacillin sodium salt hydrate standard

$C_{19}H_{18}N_3NaO_5S \cdot nH_2O$ ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [7240-38-2]

49829-83	DES（C15755100）		残留農薬試験用	100mg	￥9,500

オキサジアルギル標準品
Oxadiargyl standard

$C_{15}H_{14}Cl_2N_2O_3$...341.18 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [39807-15-3]

49833-42	DES（C15758000）		残留農薬試験用	100mg	￥18,000

1,2,5-オキサジアゾール-3-カルボン酸
1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid

$C_3H_2N_2O_3$...114.05
CAS RN® [88598-08-7] mp102℃～104℃▲

49270-96	TFS（CC07901DA）	97%		1g	￥44,700
49270-97	TFS（CC07901CB）	97%		250mg	￥14,800

オキサジアゾン標準品
Oxadiazon standard

$C_{15}H_{18}Cl_2N_2O_3$...345.21 ［PRTR］1-363 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [19666-30-9]

49826-19	DES（C15760000）		残留農薬試験用	100mg	￥11,000

オキサジキシル標準品
Oxadixyl standard

警告

$C_{14}H_{18}N_2O_4$...278.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [77732-09-3] mp104℃～105℃†

31127-92		>98.0%(GC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥12,000
49826-94	DES（C15770000）		残留農薬試験用		100mg	￥20,000

オキサル酢酸
Oxalacetic acid

$HOOCCOCH_2COOH$...132.07 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［328-42-7］ mp161℃▲

41660-1A	TFS（41660-0250）	25g	￥27,300
41660-2A	TFS（41660-0050）	5g	￥7,000

二塩化オキサリル
Oxalyl chloride

危険

$C_2Cl_2O_2$...126.92 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［79-37-8］ bp63℃～64℃ mp12℃ d1.478 Fp>100℃

12961-1A	TFS（12961-0010）	1kg	￥62,400
12961-3A	TFS（12961-0250）	25g	￥5,700
12961-4A	TFS（12961-1000）	100g	￥9,700

オキサミン酸
Oxamic acid

H_2NCOCO_2H...89.05
CAS RN® ［471-47-6］ mp210℃(dec.)▲

12962-1A	TFS（12962-0100）	10g	￥5,800
12962-2A	TFS（12962-0250）	25g	￥11,800

オキサミン酸ヒドラジド
Oxamic hydrazide

$H_2NCOCONHNH_2$...103.08 ［危］5-HY-1-I
CAS RN® ［515-96-8］ mp216℃～218℃(dec.)▲

12964-1A	TFS（12964-0250）	25g	￥9,800

オキサミド
Oxamide

警告

$H_2NCOCONH_2$...88.06
CAS RN® [471-46-5] mp418℃ †

31202-00	>98.0%(T)	鹿特級	G	500g	￥7,500
31202-30	>98.0%(T)	鹿特級	G	25g	￥1,800
12965-2A TFS（12965-1000）				100g	￥4,800

オキサミル標準品
Oxamyl standard

危険

$C_7H_{13}N_3O_3S$...219.26 [毒] II [PRTR] 1-434 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [23135-22-0]

49801-51 DES（C15780000）	残留農薬試験用		100mg	￥15,000

オキサスルフロン標準品
Oxasulfuron standard

$C_{17}H_{18}N_4O_6S$...406.41 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [144651-06-9]

49838-56 DES（C15781500）	残留農薬試験用		100mg	￥33,000

オキサチアピプロリン標準品
Oxathiapiprolin standard

$C_{24}H_{22}F_5N_5O_2S$...539.52 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [1003318-67-9] d1.47▲

49866-38 DES（C15781700）	残留農薬試験用		10mg	￥35,000

オキサジクロメホン標準品
Oxaziclomefone standard

警告

$C_{20}H_{19}Cl_2NO_2$...376.27 [PRTR] 1-172 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [153197-14-9] mp149.5℃～150.5℃ †

31116-96	>99.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	100mg	￥25,000

2-(1,4-オキサジナン-2-イルメチル)-1*H*-イソインドール-1,3(2*H*)-ジオン
2-(1,4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-dione

$C_{13}H_{14}N_2O_3$...246.26
CAS RN® [499771-20-9] mp138℃～143℃▲

49271-01	TFS（TL01033DA）	90%		1g	￥31,300

オキサゾール-5-カルボン酸
Oxazole-5-carboxylic acid

$C_4H_3NO_3$...113.07
CAS RN® [118994-90-4]

31039-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥33,000
31039-62		>95.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

2-オキサゾリドン
2-Oxazolidone

$C_3N_5NO_2$...87.07
CAS RN® [497-25-6] mp86℃～89℃†

12966-1A	TFS（12966-1000）			100g	￥17,000
12966-2A	TFS（12966-0250）			25g	￥6,200
12966-3A	TFS（12966-0050）			5g	￥2,900

3-(1,3-オキサゾール-5-イル)アニリン → 5-(3-アミノフェニル)オキサゾール

4-(1,3-オキサゾール-5-イル)アニリン → 5-(4-アミノフェニル)オキサゾール

4-(1,3-オキサゾール-5-イル)ベンゼンスルホニルクロリド
4-(1,3-Oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride

$C_9H_6ClNO_3S$...243.66
CAS RN® [337508-66-4] mp101℃▲

49271-07	TFS（CC14503DA）	97%		1g	￥54,900
49271-08	TFS（CC14503CB）	97%		250mg	￥27,700

3-(1,3-オキサゾール-5-イル)安息香酸 → 3-(5-オキサゾリル)安息香酸

3-(5-オキサゾリル)安息香酸
3-(5-Oxazolyl)benzoic acid

警告

$C_{10}H_7NO_3$...189.16
CAS RN® [252928-82-8] mp259℃～261℃▲

49271-09	TFS（CC35801DA）	97%		1g	￥66,900
49271-10	TFS（CC35801CB）	97%		250mg	￥22,200

4-(1,3-オキサゾール-5-イル)安息香酸
4-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid

$C_{10}H_7NO_3$...189.16
CAS RN® [250161-45-6] mp300℃～301℃▲

49271-11	TFS（CC14501DA）	97%		1g	￥10,100
49271-12	TFS（CC14501CB）	97%		250mg	￥7,100

5-(1,3-オキサゾール-5-イル)-2-チオフェンスルホニルクロリド
5-(1,3-Oxazol-5-yl)-2-thiophenesulfonyl chloride

$C_7H_4ClNO_3S_2$...249.69
CAS RN® [321309-40-4] mp80℃～82℃▲

49271-13	TFS（CC14203DE）	97%		5g	☆
49271-14	TFS（CC14203DA）	97%		1g	￥59,000

オクスフェンダゾール標準品
Oxfendazole standard

$C_{15}H_{13}N_3O_3S$...315.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [53716-50-0] mp253℃†

31058-96	>97.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥9,500

オクスフェンダゾールスルホン標準品
Oxfendazole-sulfone standard

$C_{15}H_{13}N_3O_4S$...331.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [54029-20-8]

49867-67	DES（C15783010）	食品分析用		10mg	￥32,000

オキシベンダゾール標準品
Oxibendazole standard

$C_{12}H_{15}N_3O_3$...249.26 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［20559-55-1］ mp230℃～230.5℃†

31065-96	>99.0%(HLC)	食品分析用	G	20mg	￥16,000

オキシムレジンHL(100-200mesh)
Oxime resin HL (100-200 mesh)

49926-11	NBC（8.55090.0005）	5g	￥55,200
49926-12	NBC（8.55090.0001）	1g	￥14,000

オキシムレジンLL(100-200mesh)
Oxime resin LL (100-200 mesh)

49926-09	NBC（8.55089.0005）	5g	￥44,500
49926-10	NBC（8.55089.0001）	1g	￥11,900

オキシインドール
Oxindole

警告

C_8H_7NO...133.14
CAS RN® ［59-48-3］ mp123℃～128℃▲

31020-32	>98.0%(HLC)		G	25g	￥16,000
31020-52	>98.0%(HLC)		G	5g	￥6,200
12967-1A	TFS（12967-0250）			25g	￥14,900
12967-2A	TFS（12967-0050）			5g	￥4,900
12967-3A	TFS（12967-1000）			100g	￥46,900

オキシン → 8-キノリノール

オキシン銅標準品
Oxine-copper standard

警告

$C_{18}H_{12}CuN_2O_2$...351.84 ［労］57,57-2［PRTR］1-325 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［10380-28-6］ mp>270℃(dec.)†

31053-96		>98.0%(HLC)	残留農薬試験用	G	200mg	￥5,500
49861-28	DES（C15786000）		残留農薬試験用		250mg	￥10,000

4-オキソ-3-アザトリシクロ[4.2.1.0(2.5)]ノナ-7-エン
4-Oxo-3-azatricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene

C_8H_9NO...135.16 ［冷］ 0℃～6℃
mp117℃～122℃▲

26811-1A	TFS（26811-0010）			1g	￥30,500

4-オキソ-4*H*-1-ベンゾピラン-2-カルボン酸
4-Oxo-4*H*-1-benzopyran-2-carboxylic acid

$C_{10}H_6O_4$...190.15
CAS RN®［4940-39-0］ mp260℃(dec.)▲

12388-1A	TFS（12388-0250）			25g	￥12,800
12388-2A	TFS（12388-0050）			5g	￥3,800

3-オキソ-3,4-ジヒドロ-2*H*-1,4-ベンゾオキサジン-6-スルホニルクロリド
3-Oxo-3,4-dihydro-2*H*-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride

$C_8H_6ClNO_4S$...247.65
CAS RN®［31794-45-3］ mp178℃▲

49271-16	TFS（CC46803DA）	97%		1g	￥33,700
49271-17	TFS（CC46803CB）	97%		250mg	￥10,700

*N*1-(1-オキソ-2,3-ジヒドロ-1*H*-インデン-5-イル)アセトアミド
*N*1-(1-Oxo-2,3-dihydro-1*H*-inden-5-yl)acetamide

$C_{11}H_{11}NO_2$...189.21
CAS RN®［58161-35-6］ mp172℃▲

49271-18	TFS（TL00757EB）	97%		25g	￥91,300
49271-19	TFS（TL00757DE）	97%		5g	￥28,500
49271-20	TFS（TL00757DA）	97%		1g	￥17,800

3-(2-オキソ-1,2-ジフェニルエトキシ)プロパン酸
3-(2-Oxo-1,2-diphenylethoxy)propanoic acid

$C_{17}H_{16}O_4$...284.30
CAS RN® [879896-64-7]

49271-21	TFS（MO07773EE）	97%	50g	￥29,900
49271-22	TFS（MO07773EA）	97%	10g	￥7,400
49271-23	TFS（MO07773DA）	97%	1g	￥2,700

(2*R*,3*S*)-6-オキソ-2,3-ジフェニル-4-モルホリンカルボン酸 ｔｅｒｔ-ブチルエステル
(2*R*,3*S*)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid *tert*-Butyl Ester

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [112741-49-8]

49213-70	ダイセル（100511-001G）		1g	￥21,200

(2*S*,3*R*)-6-オキソ-2,3-ジフェニル-4-モルホリンカルボン酸 ｔｅｒｔ-ブチルエステル
(2*S*,3*R*)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid *tert*-Butyl Ester

$C_{21}H_{23}NO_4$...353.41
CAS RN® [112741-50-1]

49213-71	ダイセル（100512-001G）		1g	￥21,200

2-オキソグルタル酸 → α-ケトグルタル酸

2-オキソグルタル酸二ナトリウム二水和物 → α-ケトグルタル酸二ナトリウム二水和物

2-オキソヘキサメチレンイミン → ε-カプロラクタム

2-オキソインドリン-5-スルホニルクロリド
2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride

$C_8H_6ClNO_3S$...231.65
CAS RN® [199328-31-9] mp160℃(dec.)▲

49271-24	TFS（CC53303EA）	10g	☆
49271-25	TFS（CC53303DA）	1g	￥81,200
49271-26	TFS（CC53303CB）	250mg	￥33,500

オキソリン酸標準品
Oxolinic acid standard

警告

$C_{13}H_{11}NO_5$...261.22 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [14698-29-4] mp314℃～316℃(dec.)†

31055-96	>98.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥6,500
49832-81	DES（C15788000）	食品分析用		250mg	￥14,000

11-オキソモグロシドIII-E
11-Oxomogroside III-E

$C_{48}H_{80}O_{19}$...961.13
CAS RN® [2096516-68-4]

49874-46	PHY（84248）	天然物化学研究用	10mg	￥70,000

11-オキソモグロシドV
11-Oxomogroside V

$C_{60}H_{100}O_{29}$...1285.41
CAS RN® [126105-11-1]

49066-12	PHY（80899）	天然物化学研究用	10mg	￥95,000

オキソン酸カリウム
Oxonic acid potassium salt

$C_4H_2N_3O_4K$...195.17
CAS RN® [2207-75-2] mp>300℃▲

16853-2A	TFS（16853-0250）	25g	￥18,300
16853-3A	TFS（16853-1000）	100g	￥55,700

6-オキソピペコリン酸
6-Oxopipecolic acid

$C_6H_9NO_3$...143.14
CAS RN® [3770-22-7]

31513-52	>97.0%(HLC)	G	5g	￥25,500
31513-62	>97.0%(HLC)	G	1g	￥9,500

2-オキソピペラジン-3,3,5,5,6,6-d_6
2-Oxopiperazine-3,3,5,5,6,6-d_6

$C_4H_2D_6N_2O$...106.15
CAS RN® [1219803-71-0]

49142-47	CDN（D-6904）	98 atom% D	100mg	￥49,500

6-オキソピペリジン-2-カルボン酸 → 6-オキソピペコリン酸

2-オキソプロパン酸 → ピルビン酸

4-(2-オキソ-1-ピロリジニル)ベンズアルデヒド
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde

$C_{11}H_{11}NO_2$...189.21
CAS RN® [36151-45-8] mp121℃～122℃▲

49271-27	TFS（MO01193EA）	97%	10g	☆
49271-28	TFS（MO01193DA）	97%	1g	￥62,500
49271-30	TFS（MO01193CB）	97%	250mg	￥24,100

(*R*)-(-)-5-オキソ-2-テトラヒドロフランカルボン酸
(*R*)-(-)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid

$C_5H_6O_4$...130.09
CAS RN® [53558-93-3] mp71℃～73℃†

29488-1A	TFS（29488-0010）		1g	￥13,300

*N*1-(5-オキソ-5,6,7,8-テトラヒドロナフタレン-2-イル)アセトアミド
*N*1-(5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide

$C_{12}H_{13}NO_2$...203.23
CAS RN® [88611-67-0] mp127℃～129℃▲

49271-32	TFS（NRB00998EA）	97%	10g	￥79,500
49271-33	TFS（NRB00998DA）	97%	1g	￥8,500

6-オキソ-1,4,5,6-テトラヒドロピリダジン-3-カルボン酸
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid

$C_5H_6N_2O_3$...142.11
CAS RN® [27372-38-9] mp199℃～200℃▲

49271-34	TFS（BTB07054EE）	97%	50g	☆
49271-35	TFS（BTB07054EA）	97%	10g	￥30,200
49271-36	TFS（BTB07054DA）	97%	1g	￥3,800

4-オキソ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-d_{17}
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d_{17}

$C_9D_{17}NO$...172.34 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [52168-48-6]

TEMPONE spin label precursor

49131-73	CDN（D-2785）		250mg	￥43,200

4-オキソ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-d_{16},1-^{15}N-1-オキシル
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d_{16}, 1-^{15}N-1-oxyl

$C_9D_{16}{}^{15}NO_2$...187.31 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [80404-14-4]

49131-77	CDN（M-2327）		100mg	￥86,400

4-オキソ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-d_{16}-1-オキシル
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d_{16}-1-oxyl

$C_9D_{16}NO_2$...186.32 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [36763-53-8]

49131-76	CDN（D-2328）	98 atom% D	100mg	￥60,800

4-オキソチアン
4-Oxothiane

C_5H_8OS...116.18
CAS RN® [1072-72-6] mp59℃～61℃▲

16798-1A	TFS（16798-0050）		5g	￥14,000

5-オキソ-1-(2-チエニルメチル)ピロリジン-3-カルボン酸
5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid

$C_{10}H_{11}NO_3S$...225.26
CAS RN® [175136-92-2] mp144℃～146℃▲

49271-38	TFS（DFP00358EA）	97%	10g	￥25,800
49271-39	TFS（DFP00358DA）	97%	1g	￥4,400

4-オキソ吉草酸 → レブリン酸

オキスポコナゾールフマル酸塩標準品
Oxpoconazole fumarate standard

警告

$C_{42}H_{52}Cl_2N_6O_8$...839.80 [冷] 0℃～6℃
CAS RN® [174212-12-5]

49834-20	DES（C15789000）	残留農薬試験用	100mg	￥42,000

オキシベンゾン → 2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン

(1*R*,1′′*R*)-3,3′′-[オキシビス(メチレン)]ビス-[1,1′-ビナフタレン]-2,2′-ジオール
(1*R*,1′′*R*)-3,3′′-[Oxybis(methylene)]bis-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diol

$C_{42}H_{30}O_5$...614.68
CAS RN® [265116-85-6]

49216-04	ダイセル（135977-100MG）		100mg	￥36,400

(1*S*,1′′*S*)-3,3′′-[オキシビス(メチレン)]ビス-[1,1′-ビナフタレン]-2,2′-ジオール
(1*S*,1′′*S*)-3,3′′-[Oxybis(methylene)]bis-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diol

$C_{42}H_{30}O_5$...614.68
CAS RN® [336800-79-4]

49216-05	ダイセル（135978-100MG）		100mg	￥36,400

(11b*R*,11′b*R*)-2,2′-[オキシビス(メチレン)]ビス[4-ヒドロキシ-4,4′-ジオキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン]
(11b*R*,11′b*R*)-2,2′-[Oxybis(methylene)]bis[4-hydroxy-4,4′-dioxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin]

$C_{42}H_{28}O_9P_2$...738.61
CAS RN® [1022915-09-8]

49215-95	ダイセル（135905-025MG）		25mg	￥29,000

(11b*S*,11′b*S*)-2,2′-[オキシビス(メチレン)]ビス[4-ヒドロキシ-4,4′-ジオキシド-ジナフト[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]ジオキサホスフェピン]
(11b*S*,11′b*S*)-2,2′-[Oxybis(methylene)]bis[4-hydroxy-4,4′-dioxide-dinaphtho[2,1-*d*:1′,2′-*f*][1,3,2]dioxaphosphepin]

$C_{42}H_{28}O_9P_2$...738.61
CAS RN® [1447217-75-5]

49215-94	ダイセル（135904-025MG）		25mg	￥29,000

(±)-オキシブチニン-d_{11}塩酸塩
(±)-Oxybutynin-d_{11} HCl

$C_{22}H_{20}D_{11}NO_3$･HCl...405.01
CAS RN® [1185151-95-4]

49142-48	CDN（D-6104）	99 atom% D	50mg	￥149,600

オキシカルボキシン標準品
Oxycarboxin standard

$C_{12}H_{13}NO_4S$...267.30 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [5259-88-1]

49803-43	DES（C15790000）	残留農薬試験用	100mg	￥9,500

オキシクロザニド標準品
Oxyclozanide standard

$C_{13}H_6Cl_5NO_3$...401.45 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［2277-92-1］

49828-97	DES（C15793000）	残留農薬試験用	100mg	￥21,000

2,2′-オキシ二酢酸
2,2′-Oxydiacetic acid

警告

$O(CH_2COOH)_2$...134.08
CAS RN® ［110-99-6］ mp141℃～145℃†

10677-01	>95.0%(T)	鹿1級	G	500g	￥95,000
10677-31	>95.0%(T)	鹿1級	G	25g	￥5,600

2,2′-オキシジエタノール → ジエチレングリコール

4,4′-オキシジフェノール
4,4′-Oxydiphenol

$C_{12}H_{10}O_3$...202.20
CAS RN® ［1965-09-9］ mp163℃～168℃▲

41668-1A	TFS（41668-0250）		25g	￥35,200

オキシフルオルフェン標準品
Oxyfluorfen standard

$C_{15}H_{11}ClF_3NO_4$...361.69 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® ［42874-03-3］

49803-86	DES（C15800000）	残留農薬試験用	100mg	￥18,000

オキシマトリン
Oxymatrine

$C_{15}H_{24}N_2O_2$...264.36
CAS RN® ［16837-52-8］

49066-13	PHY（89748）	天然物化学研究用	25mg	￥40,000

オキシペオニフロリン
Oxypaeoniflorin

$C_{23}H_{28}O_{12}$...496.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［39011-91-1］

49066-14	PHY（80608）	天然物化学研究用	10mg	￥80,000

オキシポイセダニン
Oxypeucedanin

$C_{16}H_{14}O_5$...286.27 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［26091-73-6］

49066-15	PHY（89876）	天然物化学研究用	10mg	￥60,000

オキシポイセダニンヒドラート
Oxypeucedanin hydrate

$C_{16}H_{16}O_6$...304.29 ［凍］ -20℃以下
CAS RN®［2643-85-8］

49066-16	PHY（80907）	天然物化学研究用	10mg	￥46,000

ｔｒａｎｓ-オキシレスベラトロール
trans-Oxyresveratrol

$C_{14}H_{12}O_4$...244.24
CAS RN®［29700-22-9］

49868-55	PHY（83530）	天然物化学研究用	20mg	￥43,000

オキシソホカルピン
Oxysophocarpine

$C_{15}H_{22}N_2O_2$...262.34 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN®［26904-64-3］

49874-47	PHY（80511）	天然物化学研究用	10mg	￥40,000

$^{13}C_{22}$,$^{15}N_2$-オキシテトラサイクリン標準液
$^{13}C_{22}$,$^{15}N_2$-Oxytetracycline standard solution

$^{13}C_{22}$ $^{15}N_2$ $H_{24}O_9$...460.43 ［冷］ 0℃～6℃

「毒素等を試験研究用に使用することを確認する証」が必要です。2.5ppm solution is prepared by dissolving dried down reagent in 1mL solvent.

49151-01	B.P.（10001841）	食品分析用	1mL×5	￥120,000

オキシテトラサイクリン
Oxytetracycline

$C_{22}H_{24}N_2O_9$...460.43
CAS RN® [79-57-2] mp183℃▲

can be used as secondary standard

25770-1A	TFS（25770-5000）			500mg	￥24,600

オキシテトラサイクリン二水和物
Oxytetracycline dihydrate

$C_{22}H_{24}N_2O_9 \cdot 2H_2O$...496.46
CAS RN® [6153-64-6] mp181℃～182℃▲

31059-52		>95.0%(HLC)	G	5g	￥6,000
31059-62		>95.0%(HLC)	G	1g	￥3,400
12384-1A	TFS（12384-1000）			100g	￥71,800
12384-2A	TFS（12384-0100）			10g	￥10,900

オキシテトラサイクリン二水和物標準品
Oxytetracycline dihydrate standard

$C_{22}H_{24}N_2O_9 \cdot 2H_2O$...496.46 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [6153-64-6] mp181℃～182℃(dec.)†

31056-96	>95.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥12,000

オキシテトラサイクリン塩酸塩
Oxytetracycline hydrochloride

$C_{22}H_{24}N_2O_9 \cdot HCl$...496.89
CAS RN® [2058-46-0]

can be used as secondary standard

30127-1A	TFS（30127-5000）			500mg	￥31,600

オキシテトラサイクリン塩酸塩標準品
Oxytetracycline hydrochloride standard

$C_{22}H_{24}N_2O_9 \cdot HCl$...496.89 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [2058-46-0]

31057-96	>93.0%(HLC)	食品分析用	G	500mg	￥11,000

4-(1,3-オキサゾール-5-イル)安息香酸ペンタフルオロフェニル
Pentafluorophenyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate

$C_{16}H_6F_5NO_3$...355.21
CAS RN® [898288-91-0] mp141℃～143℃▲

49271-75	TFS（CC14526DA）	97%		1g	￥33,500

オキシ塩化りん → 塩化ホスホリル

オクタデカン酸カリウム-2,2-d_2
Potassium octadecanoate-2,2-d_2

$CH_3(CH_2)_{15}CD_2COOK$...324.57
CAS RN® [352438-86-9]

49132-76	CDN（D-5169）	98 atom% D		500mg	￥39,600

オクタデカン酸カリウム-d_{35}
Potassium octadecanoate-d_{35}

$CD_3(CD_2)_{16}COOK$...357.78
CAS RN® [352438-89-2]

49132-77	CDN（D-5173）	98 atom% D		500mg	￥38,500

オレイン酸カリウム
Potassium oleate

警告

approx.$C_{17}H_{33}COOK \cdot H_2O$
CAS RN® [143-18-0] mp235℃～240℃†

32367-01		95.0%～110.0%(T) 鹿1級	C	500g	￥10,000

オクタデカン酸ナトリウム-d_{35}
Sodium octadecanoate-d_{35}

$CD_3(CD_2)_{16}COONa$...341.67
CAS RN® [1219794-97-4]

49134-05	CDN（D-5375）	98 atom% D		500mg	￥35,200

1-オクタンスルホン酸ナトリウム
Sodium 1-octanesulfonate

$CH_3(CH_2)_7SO_3Na$...216.27
CAS RN® [5324-84-5]

37447-31	>95.0%(G)	鹿1級	G	25g	￥9,500
37447-61	>95.0%(G)	鹿1級	G	1g	￥1,500
37447-43	>97.0%(T)	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ用	G	10g	￥8,000

n-オクタン酸ナトリウム
Sodium *n*-octanoate

警告

$CH_3(CH_2)_6COONa$...166.19
CAS RN® [1984-06-1]

37139-32	>98.0%(T)		G	25g	￥7,000

オクタン酸ナトリウム-8,8,8-d_3
Sodium octanoate-8,8,8-d_3

$CD_3(CH_2)_6COONa$...169.21
CAS RN® [1219795-01-3]

49134-06	CDN（D-5376）	99 atom% D		500mg	￥48,400

オクタン酸ナトリウム-d_{15}
Sodium octanoate-d_{15}

$CD_3(CD_2)_6COONa$...181.28
CAS RN® [56408-90-3]

49134-07	CDN（D-5377）	98 atom% D		1g	￥61,600

オクチルベンゼンスルホン酸ナトリウム標準液
Sodium octylbenzensulfonate standard solution

危険

$C_{14}H_{21}NaO_3S$...292.37 ［危］4-AL-S-II［労］有-2,57,57-2 ［冷］ 0℃～6℃
CAS RN® [6149-03-7]

0.1mg/mL メタノール溶液

37113-96		水質試験用		2mL×5	￥8,000

n-オクチル硫酸ナトリウム
Sodium *n*-octyl sulfate

警告

$CH_3(CH_2)_7OSO_3Na$...232.27
CAS RN® [142-31-4] mp195℃(dec.)†

37448-42			G	10g	￥40,000

オクチル硫酸ナトリウム-d_{17}
Sodium octyl-d_{17} sulfate

$C_8D_{17}O_4SNa$...249.37

49143-60	CDN（D-6763）	98 atom% D		250mg	￥44,000

オレイン酸ナトリウム
Sodium oleate

警告

approx.$C_{17}H_{33}COONa$
CAS RN® [143-19-1] mp232℃～235℃†

37225-01	7.2%～8.1%(as Na)(T)	鹿1級	G	500g	￥5,300
37225-31	7.2%～8.1%(as Na)(T)	鹿1級	G	25g	￥1,800

オルトけい酸ナトリウム *n* 水和物(粉末)
Sodium orthosilicate *n*-hydrate, powder

危険

$Na_4SiO_4 \cdot nH_2O$
CAS RN® [13472-30-5]

38158-02	50.0%～55.0%(as Na_2O)(T)/25.0%～30.0%(as SiO_2)(T)		P	500g	￥2,000

オルトバナジン酸ナトリウム (バナデート)
Sodium Orthovanadate (Vanadate)

Na_3VO_4...183.90 ［凍］ -20℃以下

100mM

49889-20	NEB（P0758S）	1mL	￥5,500
49889-21	NEB（P0758L）	5mL	￥21,800

2-オキソプロパン酸ナトリウム → ピルビン酸ナトリウム

オキシ塩化イオウ → 塩化チオニル

オルトチタン酸テトラ-*n*-ブチル,モノマー → チタニウムテトラ-*n*-ブトキシド,モノマー

オルトチタン酸テトラ-*n*-ブチル,テトラマー → チタニウムテトラ-*n*-ブトキシド,テトラマー

オルトけい酸テトラエチル → テトラエトキシシラン

オルトけい酸テトラエチル
Tetraethyl orthosilicate

危険

$(C_2H_5O)_4Si$...208.32 ［危］4-2-III［労］57,57-2
CAS RN® ［78-10-4］ bp166℃～169℃ mp77℃ d0.94 Fp45℃

15781-1A	TFS（15781-0010）	1L	￥7,100
15781-2A	TFS（15781-0025）	2.5L	￥13,300
15781-4A	TFS（15781-1000）	100mL	￥2,400
15781-5A	TFS（15781-2500）	250mL	￥3,800

オルトけい酸テトラエチル,3N → テトラエトキシシラン,3N

オルトチタン酸テトライソプロピル → チタニウムテトライソプロポキシド

オルトチタン酸テトライソプロピル,6N → チタニウムテトライソプロポキシド,6N

オルトチタン酸テトラ-*ｉｓｏ*-プロピル → チタニウムテトライソプロポキシド

オオアワガエリ花粉(輸入)
Timothy Pollen

［凍］ -20℃以下

49906-12	ITEA（10904）	1g	￥36,000
49906-13	ITEA（10905）	2g	￥70,000

オオアワガエリ花粉抽出物
Timothy Pollen Extract

［冷］ 0℃～6℃

49906-05	ITEA（10112）	1mL	￥21,000

オルト酢酸トリエチル
Triethyl orthoacetate

$CH_3C(OC_2H_5)_3$...162.22 ［危］4-2-III
CAS RN® ［78-39-7］bp142℃† d(25/4℃) 0.885† Fp32℃†

40831-02	>90.0%(GC)	G	500mL	￥23,000
40831-32	>90.0%(GC)	G	25mL	￥2,400

オルト酢酸トリエチル
Triethyl orthoacetate

$CH_3C(OC_2H_5)_3$...162.22 ［危］4-2-III
CAS RN® ［78-39-7］bp142℃ d0.885 Fp36℃

13965-1A	TFS（13965-0025）	2.5L	￥35,700
13965-3A	TFS（13965-1000）	100mL	￥3,500
13965-4A	TFS（13965-5000）	500mL	￥10,600

オルトぎ酸トリエチル
Triethyl orthoformate

警告

$CH(OC_2H_5)_3$...148.20 ［危］4-2-III
CAS RN® ［122-51-0］bp146℃† mp-76℃† d(20/4℃) 0.893† Fp36℃†

14177-01	>97.0%(GC)	鹿1級	G	500mL	￥5,200
14177-31	>97.0%(GC)	鹿1級	G	25mL	￥1,400

オルトプロピオン酸トリエチル
Triethyl orthopropionate

$C_2H_5C(OC_2H_5)_3$...176.25 ［危］4-2-III
CAS RN® ［115-80-0］bp155℃～160℃▲ d0.886▲

13967-2A	TFS（13967-1000）	100g	￥5,200
13967-3A	TFS（13967-5000）	500g	￥20,800

オルトぎ酸トリイソプロピル
Triisopropylorthoformate

$HC(OCH(CH_3)_2)_3$...190.27 ［危］4-2-III
CAS RN® ［4447-60-3］bp64℃～65℃(18mm)▲

32544-1A	TFS（32544-0250）	25mL	￥4,400

オルト酢酸トリメチル
Trimethyl orthoacetate

危険

$CH_3C(OCH_3)_3$...120.14 ［危］4-1-II
CAS RN® ［1445-45-0］bp107℃～109℃▲ d0.944▲

40976-02	>95.0%(GC)		G	500mL	￥10,500
40976-32	>95.0%(GC)		G	25mL	￥2,200
21818-2A	TFS（21818-1000）			100mL	￥5,100
21818-3A	TFS（21818-5000）			500mL	￥14,300

オルト安息香酸トリメチル
Trimethyl orthobenzoate

$C_6H_5C(OCH_3)_3$...182.21 ［危］4-3-III
CAS RN® ［707-07-3］ bp87℃～88℃(7mm)▲ d1.061▲

17292-1A	TFS（17292-0100）			10g	￥5,600
17292-2A	TFS（17292-0500）			50g	￥19,100

オルトぎ酸トリメチル
Trimethyl orthoformate

危険

$CH(OCH_3)_3$...106.12 ［危］4-1-II
CAS RN® ［149-73-5］ bp100.6℃† d(20/20℃) 0.97▲ Fp16℃†

25306-00	>98.0%(GC)	鹿特級	G	500g	￥4,600
25306-30	>98.0%(GC)	鹿特級	G	25g	￥1,900

オルトイソ酪酸トリメチル
Trimethyl orthoisobutyrate

$C_7H_{16}O_3$...148.20 ［危］4-2-III
CAS RN® ［52698-46-1］

40449-32	>95.0%(GC)		G	25mL	￥12,000
40449-52	>95.0%(GC)		G	5mL	￥4,800

オルトプロピオン酸トリメチル-2,2,3,3,3-d_5
Trimethyl orthopropionate-2,2,3,3,3-d_5

$C_6H_9D_5O_3$...139.20 ［危］4-1-II
CAS RN® ［1219803-49-2］

49144-28	CDN（D-6580）	98 atom% D		250mg	￥74,800

オキシ硫酸バナジウム *n* 水和物 → 硫酸バナジル *n* 水和物

黄血カリ → ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム三水和物(フェロシアン化カリウム)

オレイン酸亜鉛
Zinc oleate

警告

approx.$Zn(C_{17}H_{33}COO)_2$
CAS RN®［557-07-3］

48038-11	>6.2%(as Zn)(T)	鹿1級		250g	￥8,500

オキシ塩化ジルコニウム八水和物 → 塩化酸化ジルコニウム八水和物

オキシ塩化ジルコニウム八水和物,3N5 → 塩化酸化ジルコニウム八水和物,3N5

オキシ硝酸ジルコニウム二水和物(硝酸ジルコニル) → 硝酸酸化ジルコニウム二水和物(硝酸ジルコニル)